

طیور مصر

تألیف

محمد محمد عنانی



۱۹۹۳

طیور مصر

الغلاف والأخراج الفني : احمد عبد الغفار

رسوم : محمد محمد عتاني

تصدير

هذا كتاب فريد ، وهو يسد فراغاً هائلاً في المكتبة العربية ، إذ يعرض لجميع طيور مصر المستوطنة والزائرة ، ويستقى مادته من المصادر الأصلية ، وأهمها الرصد والمشاهدة والفحص قبل الرجوع إلى الكتب المتخصصة ، ويقدم أسماء جميع تلك الطيور بالإنجليزية والعربية ، إلى جانب أسمائها العلمية باللاتينية حتى يكون مرجعاً للمتخصص والقارئ العادي على حد سواء ، ويتضمن رسوماً توضيحية وصوراً بالألوان لجميع هذه الطيور من رسم المؤلف نفسه وتلوينه .

وقد قضى المؤلف في إعداد هذا المرجع ما يربو على عشرين عاماً ، لم يقتصر فيها على الدراسة العلمية للطيور ، بل شغل نفسه بحياتها وأحوالها حتى لقد شاركته حياته ليلاً ونهاراً وكان يتمنى ألا يوافيه الأجل قبل أن يرى كتابه النور ليرى كيف يسعد غيره بمخالطة هذه الكائنات الجميلة ، ولكنه رحل عن دنيانا والكتاب ما يزال في المطبعة .

لقد كانت حياة المؤلف - والذى رحمه الله - حياة فريدة مثل هذا الكتاب ، إذ توفر على الدرس والاطلاع طول عمره غير أنه بمنصب أو مال ، بل لقد أنفق كل ماورثه من مال وفير في هذا الباب دون غيره ، إذ اقتنى آلاف الكتب ، وقرأ التراث العربى والإسلامى حتى استوعبه ، واشترى قطعة من الأرض الرملية في رشيد - البلد التى ولد فيها ونشأ - فأحاطها جنة غناء حتى تهوى إليها أفئدة الطير من كل مكان فيأتنسن بها ويرقبنها عن كثب ، وكان يرى في الطير المثل الأعلى للحرية والجمال ، وهو المثل الذى اهتدى به في حياته فشقى وأشقى ، إذ تغير العالم سريعاً بعد الحرب العالمية الثانية وفقد ذلك المثل أنصاره واحداً بعد الآخر .

واحتراماً للذكراه لم أغبر حرفاً واحداً مما كتبه في هذا الكتاب ، وأبقيت على مقدماته
له كما هي ، وظنى أن الكتاب يمثل في مجموعه صورة للعلم والعالم في فترة خصبة من
حياة هذه الأمة الصالحة كما كان العقاد يقول .

وأخيراً فإننى لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى زميل وصديقى الدكتور سمير
سرحان رئيس هيئة الكتاب الذى أبى إلا أن يخرج هذا الكتاب في هذه الصورة
البديعة ، حتى يكون مصدر فخر لكل مصرى ودليلاً على عظمة العقل المصرى وقوته
وثرائه . ولاغرو فسمير سرحان أستاذ جامعى مرموق وفنان أصيل قبل أن يكون راعياً
للعلم والمعرفة على رأس الهيئة التى نعتز بها جميعاً .

ولا يفوتنى أن أشكر العاملين في هيئة الكتاب ممن تابعوا طباعته وإخراجه بالصورة
اللائقة إذ أولوه من حماسهم ومن وقتهم ما هو جدير به .
وبعد فإذا كان في الكتاب هنات فأرجو من القارىء أن يغفرها ، فالخطأ من
سهات الإنسان ، وأرجو أن تتداركها في الطباعات التالية ، والله ولى التوفيق .


محمد محمد محمد عثمان

الأستاذ في جامعة القاهرة
(القاهرة ١٩٩٠ م)

الاهداء

إلى هواة الطيور
الذين تذوقوا
حقيقة الجمال من
فاتن ألوانها،
وجرعوا زلال
الحياة من ساطع
بريقها .

الأقاليم الجغرافية الخاصة بأكثر مجموعة من الحيوانات في العالم
 تقلا عن ظهور المائل (أوليفر - ك. - أومس)



المقدمة

أهم ما دفعني إلى تأليف هذا الكتاب ، هو أنه لا يوجد مؤلف في اللغة العربية خاص عن طيور مصر يحتوى على كل طائر بصورته مثلما فعلت ، وإن لم أذكر في الوصف اللون مكتفيا بالصورة الملونة للطائر تلونا طبيعيا يسهل على القارئ رؤيته ومعاينته كأنه أمامه بالضبط ، وقد اعتمدت في تأليفه على مراجع كثيرة ذكرتها في صفحة ٢٦ - ١ من هذا الكتاب وكان أهمها مرجعا ، وهو المعول الأول هو كتاب (طيور مصر للكلونيل مينرتز هاجن - وهو باللغة الانجليزية ، وخاص بالطيور المصرية) وقد استوعب فيه المؤلف كل طيور مصر تقريبا ، غير أنني لما قرأته وجدت فيه بعض ملاحظات خفيت عليه أحب أن أذكرها وهي :

ذكر أن الفتح الأسود الرأس الغربى Western Black-headed Wagtail نادر في الربيع في مصر ، مع أنه شائع فيها في شمال الدلتا في أواخر مارس (من ٢٠ فيه لآخره) .

وأن صرد الصحراء الرمادى الكبير (Great-grey shrike (saharan Form لا يوجد في المواطن الزراعية مطلقا مع أنه يرى بالقرب من الزقازيق بجوار قرى الفلاحين ، فقد تحول إليهم .

وأن دج الصخور Rock-thrush أكثر في الربيع منه في الخريف وهذا على العكس مع أنه في الدلتا في سبتمبر أكثر منه من الربيع وأن الوروار المصرى الصغير Little Green Bee-eater لا يقرب الدلتا ، مع أنني أشاهده مرارا قرب كفر الزيات .

وأن الصرد الشامى نادر في الخريف مع أنه كثير Woodhat وأن البيدق الأوروبى European Hobby نادر الرؤية في مصر ، مع أنه شائع جدا في الدلتا في الربيع وخاصة في أيام الحر وكذلك في الخريف في ابريل ومايو وفي سبتمبر ، وهو في الربيع أكثر منه بكثير من الخريف .

وأن الكوكال المصرى لا يوجد في مصر إلا في رشيد وبولاق والفيوم ولا يعرف في غير هذه الأماكن ، مع أنني أشاهده في معظم الدلتا كلها مثل دسوق وقلين وكفر الشيخ (١) .

(١) قرأت في كتاب طيور مصر للمرحوم الدكتور أحمد حماد الحسينى عن الكوكال المصرى ص (٢٠٧) يقول في مؤلفه صفحة ٢٥٢ عن هذا الطائر : له عادة عجيبة حيث أنه يعلق نفسه على الشجرة عند الفجر وينادى (كك كك كك) وهذا بالطبع خرافة - وكيف طابت نفسه لقبول مثل تلك الخرافة ؟

وإننا يمكننا أن نتغاضى عن مثل هذه المفوات ، بل إننا نشكره على أنه أول واحد حصر طيور مصر في كتاب وأبانه إلى الوجود ، وصار كتابه عند أى مؤلف هو المرجع الأول لطيور مصر إلى وقتنا وما بعد وقتنا ، فله منا خير الثناء ، ومن الله حسن الجزاء .

هذا وليس كل ما يطير يسمى طيرا ، فالخفاش يطير ولكنه يرضع أولاده من الثديين ويعتبر من الحيوانات الثديية ، والنعامة لا تطير وإنما تعتبر من الطيور . وإذن فالعامل الأساسى للطيور هو وجود الريش .

وتنقسم الطيور في العالم إلى قسمين وهما : طيور اليابسة ، وطيور الماء ، ويطلق على طيور اليابسة اسم الطيور الجواثم (passerines) أى التى تجثم أى تقف إما على الأرض مباشرة أو على الأشجار . وهى تربو على أكثر من خمسة آلاف نوع من الطيور ، وهى أكثر مراحل من كل ما تحويه رتب الطيور الأخرى مجتمعة مع بعضها . على أن معظمها صغير الجسم أو متوسطه . وهى موزعة باتساع فوق كل سطح المعمورة ما عدا مناطق القطب الجنوبي (Antarctic) على أن السواد الأعظم منها يقطن المناطق الاستوائية . كما أن معظمها يقطن الغابات أو بعبارة أخرى مكان وجود الأشجار . وهى تمتاز كلها بوجود الأصابع فى الأقدام ، وعدد الأصابع ٤ ، ويكون أول إصبع منها معكوسا (متجهها للخلف) والباقي للأمام . هذا ولا توجد موافقة إجماعية فى توزيع فروعها ضمن نطاق مجموعة رتب الجواثم . ولكنها هنا مقسمة إلى حوالى ٥٦ عائلة (فصيلة Family)(*) .

ويرجع عدم الإقبال على تأليف كتب باللغة العربية فى الطيور هو قلة الهواة والمشتغلين بها من الناطقين بالضاد وعدم الاهتمام بدراساتها يرجع إلى أنها ليست مادة أساسية تدرس فى المدارس والجامعات ، حيث إن أهم ما يعنى به الطالب هو دراسة المادة التى تؤهله لأن ينجح فى الحياة ويحصل على شهادة تبوئه منصب الوظيفة المرتقبة ، بخلاف الأجانب فإن هواية الطيور عندهم وخاصة عند الإنجليز والألمان هى من أمتع الهوايات ويقتنون فيها كتباً قيمة ويضحون من أجل شرائها بكل نفيس لديهم ، وأذكر من أهم علماء الطيور المشهورين هو سافيني ، وهيجلن ، وسكلاتر ، وهارتسرت ، وينادمان ، وشلى ، وتيكون ، وميزر تسهاجن السابق ذكره وللأسف فكلهم أجانب وليس بينهم واحد مصرى .

وأخيرا أقول كما قال الشاعر :-

إن هذا الكتاب كان كالعنقا ، لا يرتجى إليه وصول
تتمنى أولوا الفضائل أن لو كان يوما لديهم حصول


* فى صبح الأعشى ج ١ ص ١٥٥ هناك أسماء مؤنثة تطلق على الذكر والمؤنث ، وأسماء مذكرة تطلق على الأنثى مثل غراب فهو مذكر ويطلق على ذكر الغراب وأثناء كذلك البعامة على ذكر البعامة وعلى أثناءه .

تلخص أسماؤها حسب ما ذكرته اللائحة الحكومية للجمهورية العربية المتحدة وهي :-
الزرزور ، الوروار ، الهدهد ، الأخيل (الغراب الزيتوني) ، صياد الذباب ، الدج ، السنونو ،
القبرة ، الفتاح ، الصعو ، الهوازج ، البلاليل ، الكوكو ، البلشون ، الكروان الجبل ، الطيور
الخواضة ، القطقاط الشامي والبلدي ، الأبلق ، الحميراء ، الحسيبي ، الخطاف ، اللواء ، اللقلق ،
أبو قردان ، الكورسار ، الكركي ، القليبي ، الهزار ، أبو الحناء .

ولكن للأسف لا يعمل بهذا أحد ، بل هي كثيرا ما تصاد في شمال الدلتا (رشيد ودمياط والبرلس
وبور سعيد والمنزله وإدكي) كل عام بالدينق (المخيط) وتباع علنا في الأسواق معروضة للأكل .

هذا ويخشى على الباقي من الانقراض وخاصة البط الذي يصاد منه كل عام بالملايين . فليت
الحكومة تسن قانونا تحدد فيه صيد البط كما فعلت أمريكا عندما انقرض منها بط لبرادور .

خريطة الجمهورية العربية المتحدة (طبيعية)




كلنا نعلم أن الطيور تصاد بطرق مختلفة وأهمها البندقية إذ هي العامل الأول في صيدها ، كما تصاد أيضا بالنبل وكذلك بالفخ ، وهذه تُرَدَى الطائر ويقع ميتا غالبا بهذه الأدوات .

ولكن هناك أيضا أدوات تصيد الطير حيا مثل الشرك في صيد السماني في مصر وهو على طريقتين الأولى أن يُؤَقَّ بساريات من الخشب طول الواحدة حوالى مترين وتغرس في الأرض لنصف متر ، وتكون المسافة بين كل عمود حوالى ٥ أمتار ثم ينصب بينها الشباك ويطوى طرف الشرك من أسفل بهيئة جيب ، فإذا ما أتت السماني من فوق سطح الماء (البحر الأبيض المتوسط) بسرعة صدمت بالشباك فنسقط في الجيب وترتبك ويراها الصياد فيأخذها حية (١).

والطريقة الثانية : هو أن تعمل حفرة في الأرض عمقها حوالى قدم تقريبا ، ثم يقام عليها مربع من القصب له ناحيتان إحداها التي تجاه البحر مفتوحة ، والثانية مسدودة بالشرك (وتظهر كأنها مفتوحة) ، فإذا ما هبطت السماني من فوق سطح الماء (أعلاه على ارتفاع ضئيل) على الأرض ووجدت أمامها الفتحة دخلت فيها حسب غريزتها وجبها للتستر والخبء ، ويمر الصياد من الناحية المفتوحة تجاه البحر ، فإذا وجدته اتجهت بالهرب من الناحية الأخرى التي بها الشرك كأنه شباك بعيون وترتبك فيه وتحاول الهرب منه ولا تفكر في الرجوع للناحية الخالية من الشرك ، فيهجم عليها الصياد ويمسكها من قلب العش حية .

وتوجد طرق أخرى للصيد حيا مثل طريقة الدبق (المخيط) وهي منتشرة في شمال الدلتا مثل رشيد ودمياط وإدكو والبرلس (في أغسطس وسبتمبر) . كذلك طريقة صيد البط حيا بطريق الظرة وهي منتشرة أيضا في الأماكن السابقة المذكورة . وطريقتها هي :-



١ - يغرس قائم حديدى أو خشبى متين في أرض البحيرة التى لا يزيد عمقها عادة على متر تقريبا ، وبالطبع فإن القائم يكون متصلا بحبل متين ويدخل في رأس الزاوية بحلقة (أ) ثم إلى الحلقة (ب) ثم إلى الحلقة (ج) ثم يصل بطوله إلى حوالى ٣٠ مترا إلى أرض الجزيرة إلى داخل العش الكائن بداخله الصياد مخبئا .

(١) ربما يتساءل القارئ ويقول بأن السماني يمكنها أن تتفادى الساريات والشرك وتعلو في الجو وتفر من فوق الشرك وتنجو ولكننا نقول بأن عادة السماني في طيرانها هو أنها وهي آتية من فوق سطح البحر الأبيض المتوسط يكون طيرانها عادة على ارتفاع لا يزيد عن متر من سطح الأرض .

٢ - يدخل طرف آخر من الحبل في الحلقة (أ) ثم إلى (د) ثم إلى (ح) حتى يصل كذلك للعش (د) يقفل الصياد العش عليه جيداً ويراقب الطير فوق المعين الذي نثر فوقه الحبوب طعاماً للطير ، وينظر من خلال ثغرات من العش ، فإذا ما وجد الطير بداخله ، جذب الحبلين إليه فينطبق المعين على الطير بشكل مثلث هكذا Δ ، فيذهب إليه الصياد لأخذ الطير حياً منه .

أما طريقة الصيد بالدبق ، فهي أن تصنع عجينة الدبق اللزجة وذلك بمزج لباب ثمرة المخيط بنسبة الربع تقريباً من عسل الكندية ، ثم تعرض للشمس حتى تقوى على اللصق بأرجل الطائر إذا ما وقف وجثم على عود الدبق (عود الإثفل) المكسو بالعجينة إلى النصف . تطوى رؤوس الغصون مع الأوراق في أجزاء من الشجرة ثم تربط بالخوص ثم يفرس فيها عود الدبق من أسفله .

أما في المناطق الخالية من الأشجار فإنه يعمل بها قوائم من القصب (البوص) تفرس بالأرض ثم يتفرع القوائم إلى أفرع - ويجوز أن يبقى على فرع واحد أو أكثر ، ثم تهب رؤوسها لوضع عود الدبق فيه كي يقف عليه الطائر ويلتصق به . وأختم قولى بما قاله الشاعر وهو :-

إنما الصيد همة ونشاط يعقب الجسم صحة وصلاحا
ورجاء ينال فيه سرورا حين يلقى إصابة ونجاحا

طيور الصيد

هي الطيور التي تصاد من أجل أن تؤكل ، ومنها آكل الحشرات والنباتات كالبط بكل أنواعه ، ومنها آكل الحبوب مثل السمان والحمام بكل رتبة وفصائله ومعه القمري ، ومنها ما يأكل الديدان مثل البكاشينة والمراعي . وكذلك الحجل والقطا الذي يشترك كذلك في الحبوب . وتمتاز بأنها سريعة الطيران ، ممتلئة الأجسام ، صغار الرؤوس ، أرجلها تصلح للحفر والنبش ، والأجنحة إما طويلة مدببة كالبكاشينة والسمان أو قصيرة مستديرة مثل الحجل والتدرج والطاوس ، وهي سريعة العدو على الأرض في كثير منها مثل الحبارى والتدرج والطاوس .

ومنها الطيور الخواضة التي تخوض في المياه فهي كذلك من ضمن طيور الصيد وإن كانت لا تأكل الحبوب أو الحشرات إلا أنها تستعاض عن هذا بالقشريات والحلمايات المائية والديدان المائية والأرضية وكذلك الحشرات المائية .

تاريخ الطيور

كشف فنانجار Wanger سنة ١٨٦١ في بلغاريا في طبقات العصر الجوراسي هيكلًا عظميًا لحيوان في حجم الغراب أشبه بالطيور وسماه (أركيوبتركس) Archaeopteryx يختلف اختلافاً قليلاً عن الطيور . كما اكتشف غيره طائرين آخرين وصفهما مارش Marsh وأسماهما (هسبرورنس Hesperornis) و (إكتيورنس Ichthyornis) والأول ضعيف الجناحين وكان يغوص تحت الماء ليقتنص السمك ويغمه عدد من الأسنان . أما الثاني فكان كبير الجناحين .

ويذكر أن أكبر الطيور جسماً هو طائر بائد من نوع النسور يسمى (تيراتورنس Teratornis) اكتشف في كاليفورنيا .

ومن الطيور البائدة حديثاً طائر ضخيم جداً اسمه (الماو Moa) ولكنه لا يطير غير أنه لا يألف الإنسان ، والثاني هو (إيبيرورنس Aepyornis) وكان معروفاً في مدغشقر لعهد قريب وربما كان هو الذي يرد ذكره في قصص (ألف ليلة وليلة) تحت اسم الرخ (وهو طائر الفيل) وكان وزن بيضته يعادل وزن ٦ بيضات من بيض النعام أى ما يعادل وزن ١٥٠ بيضة من بيض الدجاج .

هذا ولم تكن الطبيعة قد حبت الطيور الأولى التي عاشت في العصر (الجوراسي) بما يجعلها إنذاراً للزواحف الطائرة التي كانت إذ ذاك سادة الجو . . ولكن على مر الحقب صارت الزواحف الطائرة ذمة التاريخ ، بينما تطورت الطيور الأخرى وانعقد لها لواء السيادة على الجو .

الطيور عند قدماء المصريين

كان قدماء المصريين مولعين بصيد الطيور ، بل كانوا يرسمونها على معابدهم ، وإليك الأدلة على ذلك ، فقد عثر على أكثر من ١٢ طائراً هيروغلوفاً مرسوماً رسماً كروكياً على جدران المعابد والمقابر وخاصة في سفارة ، وأهرام أوناس وبني حسن ، مثل طيور الكركى والببيلو ، والدقناش الأكلحل والقبلى والخطاف المصرى والقرلى والبومة البيضاء والنسور ، وغربان الماء والأوز والحمام والنعام والسماح .

الهجرة عند الطيور

يسأل البعض كيف يعرف الطائر مواطن هجرته التي يهاجر منها وإليها كل عام ؟ والجواب على ذلك هو الغريزة القهرية وشدة الإدراك والملاحظة والأمور التي يقوم بعملها الطائر من أنه يرتفع في طيرانه أثناء هجرته على مسافة عالية ليكتشف أوسع مدى في الأفق ولترسم الأرض تحته والماء كما ترسم الخريطة

عندنا ، ثم يتبع نظاما خاصا في طريقه بأن يتبع النيل مثلا أو المناطق الزراعية ، وهذه العملية هي في أغلب الطيور ، ولا ننكر أن قليلا منها يطير قريبا من سطح الأرض والماء كما تفعل السماني ولكن يساعدها على ذلك غريزتها الموهوبة وإدراكها بتغير الجو وأنها سائرة معه في اتجاه الرياح حسب إرادتها ، ولكن الطريقة الأولى هي الأكثر شيوعا ، وقد عثر مرة على طيور كانت متجهة إلى مكان معلوم ثم شردت فغيرت موطنها لأنها لم تجد ما تسترشد به من رؤية المعالم ، ولوحظ مرة أن الطيور المائية فوق ساحل بحر البلطيق شردت مرة عن مواطن قصدها في الاتجاه الصحيح وأنها تعمقت في الأرض فعادت ثانية إلى ساحل البحر مستدلة به كما تفعل الحرشنة القطبية Arctic Tern التي تسترشد بسواحل غرب أوروبا وغرب إفريقيا وسواحل شرق الأمريكتين حتى تصل إلى القطب الجنوبي . والدليل على صحة ما نقول أيضا ، أنه في أيام الضباب تضل بعض الطيور عن طرق هجرتها المعهودة ويحدث هذا كذلك في الأيام المظلمة والليالي الخالكة السوداء بخلاف الليالي المظلمة التي هي أهم سبيل للهجرة لها .

أجريت تجارب على خطاطيف Swallows بين سنة ١٩١٠ ، وسنة ١٩١٣ م كانت تستوطن بعض جزر المكسيك ، واستطاعت الخطاطيف الرجوع إلى مواطنها من مسافات تزيد على ٨٥٠ ميلا معظمها كان مطلوقا فوق عرض البحر وذلك بعد نقلها في أقفاص مغلقة على ظهر سفينة ، فضلا عن أن الطيور التي أرسلت إلى الشمال كانت قد نقلت إلى مناطق مجهولة خارج المجال الطبيعي لنوعها ، ومع ذلك فقد عادت كذلك إلى مواطنها وبما هو جدير بالذكر أن الخطاطيف يقطع المسافة بين إنجلترا وكيبتون في بضعة أسابيع وهي مسافة بين ٥ ، ٦ آلاف ميل .

والحرشنة القطبية السابقة تهاجر من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي وهي مسافة بين طرفي الأرض لا تقل عن ١١ ألف ميل وهي أكبر مسافة يقطعها أي طائر في العالم . أما سرعة الطيور فهي لا تتجاوز بحال ما عن ٩٠ ميلا في الساعة ، وهي تعمل في طريق هجرتها محطات استراحة ولذلك تأخذ فترة حوالي شهر أو أقل عندما تصل إلى مكانها بحسب مسافة الطريق وتارة في أقل من أسبوع وأحيانا في مدى يوم حسب سرعتها واتجاهها المباشر دون راحة .

على أن الدافع للهجرة أيضا هو الرزق بالطبع وتغير الجو ، فإذا شعر الطائر ببرودة الجو بدأت الحشرات مثلا تنقب في مخابها ولا تظهر فوق سطح الأرض ، فتهاجر إلى مواطن أدفا منها وفي معدل طقسها ومناخها التي كانت عليه حتى تظهر بنفس الحشرات التي كانت تلتهمها ، وكذلك في المزروعات فإن القمري مثلا يعود إلى الدلتا في مايو في تمام نضوج القمح ، وفي نهايته يهاجر إلى أوروبا حيث القمح (لأنه كلما اتجهنا إلى الشمال كلما تأخرت زراعته) وبذلك يضمن القمري أن يتوالد صيفا في أوروبا ورزقه بها مكفول ، حتى إذا أتى الخريف وأحوى القمح ، هاجر ثانية إلى الجنوب مارا بمصر في طريقه إلى السودان وإفريقية الاستوائية حيث يكون بها القمح من جديد (لأنه يكثر هناك في الجنوب) .

وتهاجر الطيور إلى مصر عن طريقين : (أ) الطريق الشمالي الغربي - والطريق الشمالي الشرقي . والخلاصة أن الطير يعتمد عادة على البصر في كشف طريقه المهاجر إليه بدليل أن معظم الطيور لا تهاجر الانهيارا أو تشاهد على ارتفاعات شاهقة لهذا الغرض .

وذكر (روان) كلمة عن هجرة الطيور بخصوص أن أهم العوامل في الهجرة هو اختلاف طول النهار ، فعمل تجربة على ذلك في طائر الجنتس بأن عُرِضَ بعضاً منه لأشعة ضوئية تساوى في المقدار أشعة النهار في الأقاليم التي ترحل منها ثم أطلقها . فلما أحسّت بالاختلاف بدأت هجرتها على الفور . أما الطيور التي لم تعرض لهذا النهار الصناعي فلم ترحل . ويؤيد صحة ذلك الآتي :-

ذكر بعض العلماء أن الطيور لا تكون مدفوعة إلى الهجرة بسبب الغذاء والبرد بدليل أن بعض الطيور تهاجر من مكان دافئ إلى مكان أبرد منه مثل الفتح الذي يهاجر من مصر في الربيع إلى أوروبا مع أن الحشرات لا تكثر إلا صيفاً في مصر . ولكن العوامل الدافعة إلى الهجرة هو زيادة أو نقصان ضوء الشمس وهذه العوامل تؤدي إلى إفراز مواد معينة في جسم الطائر تلك هي الهرمونات Hormones وهذه الهرمونات تحدث (سلوك) الهجرة فهي تولد غريزة الميل للاختلاط بمجموعات أخرى من الطيور كما تسبب حالة في جسم الحيوان كذلك فإنها تؤدي إلى تراكم كميات من المواد الدهنية لمواجهة إرهاق الرحلة ومخاطرها .

مراتب الطيران

ذكر الثعالبي في كتابه المسمى (فقه اللغة) في تعريف أنواع الطيران على النحو الآتي :-

- ١ - إذا حركَ الطائر جناحيه ورجليه بالأرض قيل (دَفَّ) .
- ٢ - فإذا طار قريباً من سطح الأرض قيل (أَسْفَ) .
- ٣ - فإذا كان مقصوداً وطار كأنه يرد جناحيه إلى الخلف ، قيل (جَدَفَ) ومنه سُمِيَ (مجداف السفينة) .
- ٤ - فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريباً من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع فيه ، قيل (زَفَرَف) .
- ٥ - فإذا طار في كبد السماء ، قيل (حَلَقَ) .
- ٦ - فإذا طاروا استدار قيل (دَوَمَ)
- ٧ - فإذا بسط جناحيه في الهواء وسكنها فلم يحركها كما تفعل الحداة والرخم . قيل : (صَفَّ) في القرآن : والطيور صافات .
- ٨ - فإذا ترمى بنفسه في الطيران قيل : (زَفَّ) - زففاً .
- ٩ - فإذا انحدر من بلاد البرد إلى بلاد الحر ، قيل قَطَعَ (قُطوعاً)

هذا ولم يذكر مرتبة أخرى وهي ما إذا كان ثابتاً في مكانه في طيرانه وحركَ جناحيه لتثبيت نفسه بحيث لا يبرح مكانه الهوائي وهو المسمى بالانجليزية Hovering . فماذا يسمى ذلك الثعالبي ؟ وشائع في الطيور مثل صقر الجراد والقرلى .

هذا ولم يعرف للان أي مخلوق كيف يطير الطائر بسرعة عظيمة متجهاً للأمام ، فمن قائل بأن الطائر يحرك جناحيه حركة علوية أمامية ويخفضها بحركة سفلية خلفية مثل المجداف كأنه يدفع الهواء

للخلف . وإذا كان الأمر كذلك فما الذى يُسِرُّ الطائر الذى يصف جناحيه (يسطهما) طول النهار مثل القادوس Albatross . أهو الانزلاق من أعلى إلى أسفل ؟ وإذا كان كذلك فكيف يتجه لأعلى مع أن الانزلاق لا يكون من أسفل إلى أعلى . إنها بحق مشكلة تحير فيها علماء الطيور ؟ وإذا كان الموضوع بسيط الأجنحة ، فلم لا يطير الطائر المحنط الباسط جناحيه ؟ وإذا كان الموضوع لحفة الجسم ، فكيف يتجه الطائر للأمام ؟ (١) غير أن أهم ما نذكره في العوامل المساعدة على الطيران هو الآتى :-

- ١ - تجويف الريش يساعد على خفة الطائر وكذلك ارتفاع الحرارة في جسمه من ٤٠ : ٤٤ درجة مئوية ، كذلك يوجد له - وهو حى - أكياس هوائية في جسمه - كذلك يمكن الطائر أن يحفظ توازنه وهو حى في الهواء بخلاف ما إذا مات فإنه يفقد توازنه مثل عصا البهلوان ، والإنسان إذا كان حيا استطاع أن يسير وإذا مات هبط للأرض مرة واحدة .

الغزل عند الطيور والتكاثر

عندما يحىء الربيع ، تدب الحياة في أجساد النباتات المتساقطة الأوراق ، فتبدأ البراعم في الظهور من جديد ثم تتشكل إلى أوراق تكسو بها أبدان الأشجار فتكسوها حلا خضرا ، وتزينها بالأزهار والورود ، كما أن الطائر يشعر بالدفء وبرغبته في التزاوج بحلول الربيع ، فتبدأ الذكور - وهى التى اختصها الله بالجمال دون الإناث - في عرض زيتها ، وإبراز جمال ألوان ريشها ، وغنائها بعذب الألحان لاستجلاب قلوب إناثها ، فتحن إليها الإناث وتتزوج معها ، ثم تبيض ويفقس البيض بعد حين تارة في خلال ١٤ يوما وتارة بعد شهرين ، فالقادوس يحضن بيضه ٩ أسابيع ، والإيمو والريا والنعام شهرين ، والبط حوالى ٤ أسابيع ، والدجاجة حوالى ٢٠ يوما .

وتبنى بعض الطيور أعشاشها إما في الأشجار ، أو على الصخور ، أو بين أدغال الماء ، أو على وجه الرمال مباشرة كالنعام ثم تهبل عليه الرمال ويحضنه الذكر ليلا ويكتفى بحرارة الشمس نهارا وتارة ترقد الأنثى عليه نهارا .

والمجابهود Megapode يضع البيض على الرمل ويتركه كله لدفء التربة كما تفعل الزواحف وبعدها تفقس الفراخ ثم تصبح لها القدرة على الطيران مباشرة بعد الفقس ؟ !!

وبعضها يتطفل ويضع بيضه في عش غيره ليربيه له مثل الكوكو . ومنها ما يبني أعشاشا معلقة تشدها بحبل ملتو أو تلصقها بالطين إلى أصل فرع أو إلى صخرة عالية مثل العصفور النساج ، ومنها ما يزين مكان عشه بالورود الملونة كأنما هو يجعله معرضا مثل الطائر المعرش Bower-bird ومنه ما يخط ورقتين من أوراق النبات مثل العصفور الحياط الذى يقطن الهند .

(١) يقول القزوينى (زكريا بن محمد بن محمود) المتوفى سنة ١٢٨٣ م في كتابه (عجائب المخلوقات) ص ٢٩٥ : ومن عجيب طيران الطير في الهواء وعدم سقوطه مع أن الهواء أخف منه وهو أثقل من الهواء في أى وضع . قال تعالى : ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله)

وعندما تضع الأنثى البيض وترقد عليه يقف الذكر حارسا لها على باب العش ويدها بالطعام ، وتخرج الأولاد من البيض عارية عمياء ، غير أنها تفتح أفواهها طلبا للغذاء ، وفي أثناء الليل يحنو أحد الأبوين أو كلاهما على الفراخ فيضمهما تحت جناحيه ليفيء عليها الدفء ، وقد ثبت أن هرمونا تفرزه الغدة النخامية في جسم الأنثى اسمه (البرولاكتين) يزيد في الدم في هذا الفصل ومن المعروف أن هذا الهرمون في الحمام ينبه إلى إفراز (لبن الحمامة) أو (اللبن) وهو سائل أبيض غليظ القوام تفرزه حويصلة الحمام وتطعم به أفراخها - أشبه بذلك إفراز اللبن في المرأة والحيوان بعد الولادة .

نقصان الطيور وانقراضها

لقد أخذت الطيور في التناقص من عالم الوجود بكافة أنواعها ، ويرجع السبب في ذلك إلى العوامل الآتية :-

- ١ - تجميع كثير من البرك المائية والمستنقعات مثل بحيرة إدكو والمنزلة الخ ، وتحويلها إلى أراض زراعية ، مما أدى إلى اختفاء كثير من الطيور المائية مثل البط وباقي الطيور الخواصة وأهمها البكاشينية والعصافير المغنية (الموازج) (Warblers) الخاصة بالمستنقعات والأعشاب المائية .
- ٢ - ازدياد السكان من آدميين زيادة فاحشة ، وكلها تبحث عن القوت ومن ضمنها الطيور - كما ازدادت أيضا نسبيا كثرة الصيادين الذين يتعقبون الطيور بالصيد ويقتلون بها وبغير حاجة .
- ٣ - اتساع رقعة الأراضي الزراعية وانتشار الحدائق الحديثة فأصبح السرب المكون مثلا من ألف طائر يتوزع في ألف فدان بدلا من مائة فدان .
- ٤ - اجتثاث مناطق الغابات التي هي أهم مورد للطيور النادرة الجميلة الألوان مثل الكويترال والبيغاوات وطيور الفردوس ، وإحلال مناطق زراعية مكانها تزرع قمحا وأرزاً وبرسيا وقطنا الخ خدمة للإنسان والحيوان .
- ٥ - تحويل مناطق زراعية إلى مصانع تشع منها أبخرة ودخان تؤذي الطير في مملكته في الهواء .
- ٦ - تفجير القنابل الذرية وعمل مناطق خاصة لهذا التفجير في البحار والصحراء أو مناطق القطبين ، وعند قيام الحرب سيعم التفجير المدن والقرى ، وبذلك ينتج إشعاعات ذرية تسمم الجو وتسبب إلى مسافة أميال (مئات منها) إلى طبقات الجو وشرقا وغربا مع الرياح وكل هذا يقضى على حياة الطيور وأهمها القادوس Albatross وطائر البارجة ومثل ذلك من الطيور النادرة الوجود ، وكذلك في الصحراء على القطا وفي القطبين على البط .

هذا وقد انقرضت طيور سابقة كانت تنعم بالحياة فيها مضي وهي :-

مرعة ليزان Laysan Rail انقرضت من جزيرة ميدواي حوالى عام ١٩٤٤ ، وكذلك ببغاء كارولينا Carolina parrot ولكن مازال بعض منه مأسورا لغاية سنة ١٩١٤ ، وكذلك حمام باسنجار




ص ٣٦١

صيفاً

Grey Plover

لاحظ زوائد الريش السوداء تحت الإبط
فهى سوداء باستمرار صيفاً وشتاء (المشار لها بسهم)



ص ٣٦٠

Golden Plover

لاحظ ريش الإبط المشار إليه بسهم ،
فهو دائماً أبيض اللون صيفاً وشتاء .



ص ٤٨٥
ولوحة ٦٧ شكل (٣)

Common Tern



ص ٤٨٦ ولوحة ٦٧ شكل (٤)

Arctic Tern

ص ٤١٣

ملاحظات يجب معرفتها : لاحظ في رقم (١) أن أطراف الذيل بمساواة أطراف القوائم . ولاحظ في
رقم (٢) أن أطراف الذيل تزيد قليلاً على طرف الجناح وقد تزيد أطراف الذيل كثيراً على القوائم
كما في الخرشنة الوردية . Roseate Tern

Passinger Pigeon ، ومكاو كوبا الأحمر (كان لغاية ١٨٨٥ مأسورا) Cuban Red Macaw ، كذلك بومة جزيرة سيشل ، وطائر المامو ، وحمامة شوزيل المتوجة ، وطيطوى تيمبي ، والدودو ، والشهرمان المتوج (Crested shelduck) ، ويط لبرادور ، والأكتع الكبير ، وزرزور ليجوات Leguat والأو الذى يقطن هاواى ، والهيوا ، والريوكيو .

هذا وتوجد طيور الآن قليلة الوجود ويخشى عليها من الانقراض وهى :- الونس Red-crested Pochard ، وأبو فروة Ruddy Shelduck ، والشهرمان Common Shelduck ، دجة الدبق Missel-thrush ، والكاهوا (Cahow) إذ لا يوجد منه إلا حوالى ٢٠ واحدا ، كذلك الباراكيت الفاسخ (Splendid Parrakeet) .

وتدرج الميكادو ، والكوكى الصباح Whooping Crane ، والقادوس أبو ذيل قصير Short-tailed Albatross ، ونقار الخشب أبو مفار عاجى اللون ، وغنمة الشجر الصياحة Noisy Scrub-bird ، وكوندرو كاليفورنيا (لا يوجد منه الآن إلا من ٦٠ : ٦٥ واحد فقط جرد عام ١٩٦٠ ، وأيس تيفون ، وبومة نيوزيلند الضاحكة ، والدقناش الأكل هذا ويوجد غير ذلك الكثير ، وقد انتهت الحكومات إلى ذلك وخاصة أمريكا الشمالية ، وسنت الحكومة هناك قوانين لمنع الصيد إلا فى أشهر خاصة وبكمية محدودة . وحيداً لو عملت حكومتنا المصرية بهذا . علماً بأن أبا الحن الأمريكى Amer-ican Redstart كاد ينقرض بفعل نيران هواة الصيد الذين كانوا شديدي الشغف به وبصيده من الأمريكين ، ولم يكتب لهذا الطائر البقاء إلا عندما صدر أخيراً قانون بتحريم صيده .

٧ - رش المحاصيل الزراعية بالمواد الكيماوية السامة التى يتسبب عنها أكل الحيوانات الصغيرة كالخشرات وصغار الثدييات كالأرانب والفئران لهذه المحصولات المسممة ، فلا تجد الطيور وخاصة الجارحة ما تأكله من هذه الحيوانات كما أن هذه الكيماويات المنتشرة فى الجو تضعف القدرة على التوالد عند هذه الطيور وبعد .

فهل تعلم أن كثيراً من الدول الأوربية وغيرها تفرض غرامات كبيرة على كل من يضبط متلبساً بطائر معه من جوارح الطير أو معه بيض من بيضها أو مستحوذاً على عشها فإن أمثال هذه الجوارح هى فى حماية تامة بالقانون وخاصة فى بريطانيا فكل من يضبط تفرض عليه غرامة تصل إلى ٢٥ جنيه استرليني وكذلك تفرض عليه نفس الغرامة كل من يحتفظ بطائر حتى فى قفص أو خلفه إلا إذا كان الطائر مجروحاً وكان من يحتفظ به هو من أجل العناية به ومعالجته .

وأنه فى إنجلترا إذا سقطت بومة صغيرة من عشها ورأها السائرون فلا يقربها أحد بل يتركها لأنها بعد حين ستعود إليها أمها أو الآباء وينقلونها من على الأرض إلى العش أو أى مكان آمن ومهما بالغ الإنسان فى الاعتناء بالبومة الصغيرة فلن تبلغ قدر عناية آبائها بها . ولذلك بدأت الطيور فيها تتكاثر من جديد وحيداً لو أجريت مثل هذه التعليمات فى مصر وخاصة فى الطيور المهاجرة التى يقتل منها سنوياً

بمئات الآلاف كالبط والقمري الخ - هذا وتوجد في الأردن محطة ضخمة لهجرة الطيور تعرف (بواحة الأزرق) تحط بها الطيور المهاجرة من شمال أوروبا وروسيا لأواسط إفريقيا لقضاء الشتاء هناك . ولقد تأسست في الأردن لجنة لحماية الطبيعة تقوم على حماية واحة الأزرق ضد عبث الإنسان للمحافظة على المحطة هذه - ولقد سنت الحكومة قوانين لحماية الطيور منها : (١) منع صيد الطيور المفردة منعاً باتاً . (٢) تحديد مواسم معينة لصيد أنواع محدودة من الطيور . (٣) منع صيد الطيور أثناء تكاثرها . (٤) تحديد كمية الطيور التي يضطادها الفرد خلال موسم الصيد . (٥) منع استعمال البنادق الأوتوماتيكية منعاً باتاً . (٦) تحريم استعمال الشبك لصيد الطيور إلا للتواصي العلمية وبإذن خاص . (٧) منع صيد الطيور إلا بترخيص من الحكومة .

محادثة طريفة عن الهجرة للخطاف

بقلم اللادى إرسكين كروم Lady ErskineCrom

مترجمة بقلم المؤلف بتصرف فيها

أنجبت أنثى خطاف ولدا وجرت بينهما محادثة ساقها الإبن لأمه تمشياً مع غريزة حب الاستطلاع ، وقد آن ميعاد الهجرة من أوروبا إلى الجنوب .
قالت الأم يجب علينا أن نحتشد حالا لنرحل إلى الجنوب
الإبن : نحتشد ؟! ماذا تعين بالاحتشاد يا أماه ؟!
الأم ضاحكة : نجمع أنفسنا في أسراب صغيرة أو كبيرة . هل تظن أن الاحتشاد هو اجتماعنا في سلال (جمع سلة) أو صناديق ! كلا . إنه ليس لدينا ما يحملنا من سفن شراعية أو بخارية أو طائرات أو قطارات لتقطع أرجاء المعمورة من اليابس والماء مثل ما يعمل الناس ، بل نحن طائرات أنفسنا . ولهذا يجب ان نظير في جموع كبيرة طلبا للطمأنينة والتسلية والائتناس سواء رحلنا شمالا في الربيع أو الى الجنوب في الخريف مثل الآن .
الإبن : ولكن كيف تعرفين الطريق يا أماه ؟!
الأم : أعرفه بغريزي وإلهامي . فإني أشاهد تحتي الماء واليابسة فأعرف يقينا أين أنجه مدفوعة بتغير الجو تدريجيا حتى يلائم درجة حرارته أجسامنا ونعرف ذلك حتى في الظلام ، حتى ولو لم تكن النواهض قد سبق لها الهجرة يمكنها معرفة ذلك الاتجاه والدليل على هذا أننا نعود من نفس الطريق في هجرة العودة .
الإبن : أنا واثق من صحة كلامك ، وأحب أزاملك في الهجرة حيث أراك في اثنائها تلتوين يمينا وشمالا في طيرانك وتدورين في الهواء وتطيرين قريبة من سطح الماء تجرعين قطرة منه كلما احتاج الأمر ، وسيكون معنا سنونو البيت House-martin
الأم : أرجو ألا يكون الشتاء قارسا في مكان توألدنا هذا حتى نجد العش سليا أو على الأقل لا نحتاج إلى عناء كبير في إصلاحه وترميمه من جديد .

الإبن : أمل كبير في ذلك ،، وهذا ما أتمناه ، وإننا سنطير إلى مسافة شاسعة بطول قارة أفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ، بعد أن نعب البحر الأبيض المتوسط ونكون قد فارقنا أوروبا وعندئذ سنشعر بتغير الجو ولن نعرضنا أى صعوبات .
الأم : شكرا لك . والآن حيث أن منارات البحار قد أوجدت محطات لاستراحاتنا ، وصارت بمثابة محطات هداية ، فقد أصبحت من صالحتنا وليست خطرا علينا ، مع أنها كانت قديما تجذب الطيور إليها فترطم بها ويموت منا الكثير بسببها (بسبب النور الباهر الذى يخطف الأبصار) وخاصة في أيام الضباب فلا نكشف بذلك الطريق .

الإبن : هذا كلام صحيح وحسن . والآن يجب علينا أن نهيء أنفسنا للسفر إلى الجنوب وعلينا أن نحتشد ، ها هو سرب من الخطاطيف قادم علينا للتجمع معنا ، وهالك سرب آخر قادم لنفس تلك العملية وكلنا الآن محتشدون على أسلاك البرق وسيقان الأشجار استعدادا للرحيل .
ثم طار الإبن صاعدا للسماء بصياح قصير المدى وتبعه الباقون كأنه مرشد ودليل لهم . . . وطاروا

أن المدروان Sanderling هو أكثر الطيور تحولا في قطع المسافات في هجرته حيث يطوف حول العالم كله في هجرته الشتوية ، فهو يتوالد في شمال أوروبا وشمال آسيا وفي كندا عند القطب الشمالي ، ثم يهاجر في الخريف جنوبا ليقطع الشتاء في جنوب آسيا (في الهند والصين واليابان وجزائر الهند الشرقية واستراليا وجزائر هاواي وهونولولو ، وكل جزائر المحيط الهادى والهندي ، وكذلك أمريكا الجنوبية لغاية شيلي وبتاجوينا ؟ ولذا أخذ اسمه من تحواله ودورانه حول الأرض ؟ !

وأن كروان الماء Curlew-Sandpiper يطلق عليه الانجليز اسم (مكتشف الكرة الأرضية) (Globe Discoverer) لأنه كالسابق في قطع مسافات في هجرته حول الأرض فإنه يتوالد صيفا في أقصى شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية في التندرا ، ثم يهاجر شتاء حتى يصل إلى الكاب والملايو واستراليا وتسمانيا ونيوزيلند مثل السابق تقريبا .

وأن القطقاط المصرى المعروف باسم (طائر التمساح) يدفن البيض في الرمل ثم يرقد عليه ، وكذلك يدفن أولاده ثم يرقد عليها ليظلمها من وهج الشمس ولهيها ظهرا .

وأن الأذن في الطيور تكون خلف العين ما عدا في البكاشينة فإن موضع الأذن هو تحت العين وكذلك في ديك الغاب (البكاشنة) أو (حمار الحجل) Woodcock

وأن ريش ذيل البكاشينة الكبيرة ١٦ ريشة ، والعادية ١٤ ريشة ، والصغيرة ١٢ ريشة . وهذه أهم ملاحظة وقُل من يلحظ ذلك .

وأن الخنول (البكاشينة المزوقة) Painted Snipe هو من الطيور الليلية التي تسعى لرزقها ليلا بعد غروب الشمس . وأن الذكور فقط هي التي تحضن البيض دون الإناث . وأنه وهو من فصيلة البكاشينة - يقيم طول السنة في مصر .

وأن الخنكور (قطقاط السرطان) يضع بيضة واحدة فقط في توالده ، وهي بيضة كبيرة في حجم بيضة الأوزة المنزلية . مع إنه في حجم القطقاط البلدى Egyptian Spur-winged plover

وأن الحجل المغربى Barbary partridge إذا أطلق أحد عليه النيران وأصابه المقذوف النارى وجرح بفعله ولم يمت ، رمى بنفسه في البحر الأبيض المتوسط إذا كان بجواره عند مرسى مطروح مثلا ، وذلك كي لا يقع أسيرا في قبضة الصياد ؟ !

وأن الحجل الرمل (التهامى) هيز - إذا أطلق الصياد عليه النيران وأفلت منه ونجا ، ثم عثر عليه الإنسان ، أمكنه أن يقبض عليه بيده حيا ؟ أما إذا انتظر الصياد أن يهب ثانية من الأرض ليظهر فإن الحجل يتجول بين الصخور ويفلت من يد الصياد .

وأن مناقير الإناث في جنس الدجداجيات Calidris (الدنلن كروان الماء والفطيرة والنط) أطول قليلا من مناقير الذكور

وأن ذكر الحجالة يظهر له لبادة كثيفة في الربيع والصيف حول العنق ينشرها لجذب قلب أنثاه ، ويتلون الذكر في الربيع بأشكال مختلفة ، فقد نجد أكثر من عشرة ذكور كل واحد منها بلون يخالف الآخر .

وهذا اللبد (الذى هو أشبه بلبد الأسد) ينعدم في الخريف والشتاء ولا يبقى له أثر . واللبد بالطبع من الريش .

وأن أنثى فرخة الغيط (الصفرد) Corncrake التى نشاهدها في مصر في الخريف مع السماء ، هي في غاية الوفاء على المحافظة على بيضها وأولادها حتى إنه يمكن أن يمسكها الإنسان وهي راقدة على عشها .

وأن دجاجة الماء لا تأوى الى الماء المالح ، بل العذب فقط .

وأن السماء هي أصغر طائر هام من طيور الصيد في العالم تقريبا ، وأنه يأتى إلى مصر قمرى صيفى من مارس إلى سبتمبر يتوالد في الواحات الداخلة والخارجة ، وأنه يأتى مع القمرى الأوروبى في المهجرتين قمرى شرقى شبيه جدا بالأوروبى ، ولكنه أفتح لونا منه وغطائيات الجناح فيه صفراء فاقعة .

وأن البعض يزعم أن الكوكال المصرى Egyptian Coucal : lark-heeled Cuckoo إذا صاح علق نفسه بغصن وذلك قبل طلوع الشمس وهذا خرافة (انظر كتاب طيور مصر لحمام الحسينى ص ٢٥٢ طبعة ١٩٥٤) .

وأن دجاجة الماء Moorhen لها في كل من رجلها ، أصبعان أماميان ، وواحد خلفى ، فقط ، وقَلَّ من يلحظ ذلك .

وأن الأطيش Booby: Gannet كل أصابع قدمه ملتحمة بالأغشية خلاف البط والأوز الخ فإن أصابعها الثلاثة الأمامية هي الملتحمة فقط بالأغشية أما الأطيش فإن أصابع قدمه الأربعة كلها ملتحمة بالأغشية .

وأن معظم النورس الصغير يوجد له خط عرضى أسود في طرف الذيل ، فإذا تم نموه ضاع هذا الخط وصار الذيل أبيض رائقا مثل نورية البحر الأبيض المتوسط السوداء الرأس ، والنورية العادية ، والنورية الزرقى ، والكيتويك .

وأن الغراب مغرم بالسرقة وإن لم يستفد شيئا من المسروق ، فقد يحمل إلى عشه بعض قطع النقود أو الملاعق الصغيرة أو قطع الصابون أو الحلى لا يريد بهذا العمل إلا إشباع ظمأ الطبع .

وأن الأذن اليمنى في الخبل Tawnyowl أكبر بكثير من اليسرى .

وأن الكركى Crane مرسوم في الدير البحرى ومنقاره مربوط إلى عنقه ، وعلل بعض الجهلاء ذلك كى لا تلتقط الحبوب والغذاء ، والحقيقة أنه كى لا يطير مثلما يوضع الحديد في أيدي الأثيم فلا يستطيع الجرى والهروب .

ويقول الجاحظ : إذا قطعت رجلا الطائر فإنه لا يقدر على الطيران ، كما إذا قطعت يد الإنسان فإنه لا يستطيع العدو (الجرى) .

وهل تعلم أن صقر الجراد Kestrel عندما يخلق في طيرانه وهو ثابت في مكانه بحثا عن فريسة له على الأرض نجده يتجه برأسه نحو هبوب الرياح حتى إن الإنجليز أطلقوا عليه اسماً آخر وهو محلّق الرياح Windhover وذلك من جرّاء هذه العملية ؟

تأخذ الطيور في اللغات أسماءها من عدة عوامل حسب الآتي :-

(١) من منطق أصواتها :-

وهذا هو الأصل في التسمية وتشارك في ذلك معظم اللغات ، فمثلا في اللغة الإنجليزية نجد الكثير منها مثل الهدهد المسمى عندهم Hoopoe وهذا الاسم اشتقه الإنجليز من صوته وهو Hoop hoop الذي يردده الذكر في أواخر الشتاء وأوائل الربيع (فبراير ومارس) مناجيا أنثاه ، وكان صوته ينادي بهذا اللفظ وذلك تمثيا مع صوته . وقس على ذلك في الطيور الآتية وهي (الحجل التهامي الفلسطيني) الذي يسميه الانجليز See-See لأن صوته هكذا (ص ٥٢٨) كذلك الصعو Pipit وأيضاً Notmot وكذلك الغراب Crow وأيضاً Swallow وال Duck ، Cuckoo وفرخة الغيط Crex Crex وهذا هو اسمها اللاتيني مأخوذ من صوتها الذي تردده في طيرانها وكذلك البيغاء Parrot ثم أطلق على باقي البيغاوات ومنها البيغاء الأسترالي المسمى عندهم Twenty-eight لأن صوته يقارب هذا النطق – وغير ذلك نجد الكثير في اللغات والأسماء الانجليزية (١) .

وعلى هذا القياس نجد الكثير من ذلك في اللغة العربية فمثلا نجد أن اسم الهدهد السابق قد أخذ العرب اسمه كذلك من صوته وهو الهدهد إذ يصيح بهذا اللفظ تقريبا هكذا (هُدْهُدْ) الذي يردده في الربيع كما قلنا ، كذلك أخذ العرب اسم الغراب من صوته الذي يردده هكذا (غراب غراب) كذلك القطا لأنها تصبح هكذا (قطا قطا) وأيضاً (الوروار) لأنه في ندائه يصيح بما يشبه هذه الكلمة (ور – ور) وأيضاً الواق لأنه صوته (وق – وق) كذلك اللقلق لأنه يفرق بمنقاره هكذا تقريبا (لق – لق) وأيضاً (البط) الخ ما في اللغة العربية من هذا القبيل .

٢ - من تكيف أصواتها :-

وهذا كثير في اللغات ففي الإنجليزية نجد الكثير منها مثل Bell-bird لأن صوته كصليل الناقوس كذلك طائر القط Cat-bird لأن صوته كمواء القط وأيضاً Screamer سمي بذلك من صياحه ، كذلك الأوز الزماء Trumpeter Swan لصوته الذي يردده في طيرانه وفي العربية الكثير من هذا القبيل ، فالبومة البيضاء (بومة الأجران) تسمى عندنا باسم (المصاصة) لأن نداءها وخاصة أولادها في العش تردد الصوت بما يشبه مص الإنسان للماء ، الخ ما في هذه المسميات ، كذلك Song-thrush .

٣ - من بناء أجسامها ومميزات خاصة بها :-

وفي الإنجليزية الكثير من هذا مثل Ping - Ouzel لأن له شبه طوق أبيض وأيضاً الشحرور Blackbird لعموم السواد بجسمه كذلك Blue-bird لونه الأزرق وأيضاً Whitethroat كذلك Gross-beak وأيضاً Ferruginous duck كذلك أبو قرن Hornbill وأيضاً Wornbill و Scimitar-bill كذلك

(١) كذلك البيغاء الذي يسمى في أمريكا الجنوبية Ara وهو صوته أيضا . كذلك درجعة كلديرا الأمريكية فقد أخذ اسمها من صوتها كلديرا Kildeer ، وكذلك Tit وكذلك Kottiwake وكذلك Whipbird الأسترالي فإن صوته مثل صوت فرقة الكيراج وكذلك Rhoebie أخذ اسمه من صوته وهو أمريكي وكذلك Bobwhite

يسمى الانجليز البيلوب أبا ذيل مسنن Pintail^(١) وأيضاً أبو مقص Scissor-bill لأن منقاره كالمقص واسمه عندهم أيضاً القشاش Skimmer لأنه عندما يبحث عن طعامه يطير فوق سطح الماء غامراً فكاه السفلى فقط في الماء كأنه يقشط الماء به وأيضاً السكرتير Secretary-bird لأن له ريشاً على جوانب الرأس أشبه بالقلم الذي كان يضعه قدماء الكتاب على أذانهم كذلك Umbrella-bird وأيضاً Spur-winged plover لوجود شوكة في الكتف كذلك Waxwing لأن جناحه كان عليه شمعا وأيضاً العقاب الصلعاء Bald-eagle لبياض رأسه الذي هو أشبه بالصلع، وأيضاً Finfoot - لأن أقدامه أشبه بزعانف السمكة، وكذلك Parrot-bill الخ ما في الانجليزية من هذه المسميات .

واللغة العربية حافلة بالكثير من هذا القبيل مثل البط أبو سيلة وهو البيلوب كذلك (البطريق) لأن شكله بلباسة الأبيض والأسود أشبه بما يرتديه البطريق (القيسيس) من اللون الأبيض والأسود - وأيضاً (الغرة) أشبه بغرة الحصان ، كذلك أبو منجل وأيضاً (الحوصل) وهو (البجع) لأن له كيساً كبيراً تحت الفك السفلي يعتبر كحوصلة يخزن فيها طعامه وأيضاً (جلم الماء) لأنه في طيرانه فوق سطح الماء دون أن يحرك جناحيه كأنه يحملهم أى يقطعه ويشقه وأيضاً (الصغير) من لونه الأصفر ، وكذلك (التفاحي) لحمرة صدره وأيضاً الأبلق لأن الغالبية في لونه هو وجود السواد والبياض فيه وأيضاً أبو (قرن) وكذلك طائر الفردوس لجمال ألوانه كأنه آت من الجنة وأيضاً أبو صليب^(٢) الخ .

٤ - من أعمالها وحركاتها وطبائعها :-

وهذا أيضاً كثير في اللغة الانجليزية مثل Dipper أى يغمس في الماء ، Road-runner و Honey-guide و Weaver و Woodpecker و Turnstone و Oystercatcher و Flycatcher و Wagtail أى هزاز الذنب ، Dipper ، Bee-eater لأن الأصل فيه هو أنه يحب يرقات نحل العسل ، وأيضاً Swift لأنها تعتبر أسرع الطيور قاطبة تقريباً ، Tailor-bird لأنه ينحيط عشه من ورقتين من الشجر بنسج العنكبوت ، وأيضاً Oven-bird لأنه يبنى عشه على هيئة الفرن ، Honey buzzard وأيضاً أى حوام النحل لأنه يسرق عسل النحل ، كذلك Cow-bird لأنه يلازم الماشية ويضع فوق ظهرها وعلى قربها وأيضاً Mocking-bird لتقليده الأصوات كأنه يسخر بها^(٣) ، كذلك Gardener ، Diver^(٤) ، Humming Bird ، Kingfisher ، وكذلك Squirrel-cuckoo لأنه يجري على الأغصان بين الأشجار

(١) وأيضاً اللقاط أو الكيش يسميه الانجليز أبو جاروف لأن منقاره أشبه بالجاروف أو المحرقة وهو shovel فسموه باسم Shoveller أى ذو الجاروف بالنسبة لمقاراه .

وأيضاً Hoope-Lark وهي مكان والصحراء تشبهها لها بالهدد في جناحها . وكذلك أبو مطرقة وكذلك Hummer-Head وكذلك أبو سعة Adjutant سمي بذلك من عادته في مثنية بخطا واسعة مثلاً يفعل الضابط في الحرب ، والكلمة هي هذا المعنى .

(٢) وقد يسمى الطائر باللاتيني مثل Apteryx وهو الكيوى أو عديم الأجنحة .

(٣) وأيضاً Oaioher وكذلك Fruit eater + Cant — eater آكل الثمار + Honey eater . الخ .

(٤) وأيضاً هازجة الجنادب Grasshopper لأن صوتها أشبه بصوت الجندب ولأنها أيضاً تشاركه في تردد صوتها ليلاً . وكذلك الحمام المسافر Passenger Pigeon لأنه مهاجر في فصل الخريف من أمريكا .

مثل السنجاب ، وأيضاً Frigate- bird لتابعته للسفن ، وأيضاً Mute swan لأنه صامت ، Torrent- duck أى بط التيارات المائية عند منابع الأنهار فوق الجبال وهو فى مكان آمن فقلّ لذلك استعمال الأجنحة وأصبح لا يطير ، أنظر كذلك أسفل رقم (١) .

وفى اللغة العربية كثير من هذه المسميات مثل المدروان لأنه تقريباً يدور حول معظم الكرة الأرضية فى هجرته ، كذلك الأطيش لما عرف عنه من الطيش والبلادة فى إلقاء نفسه من شاهق علوه ويرتطم بالماء كما أنه يشاهد على سطح السفينة فلا يرحها حتى يمسك به الإنسان — كذب الحجل لأنه يظهر للرائى كأنه يحجل فى مشيته وأيضاً أبو النوم لأنه ينام نهاراً ويطير ليلاً وكذلك الحوام لأنه يحوم كثيراً فى طيرانه وأيضاً الصياح Screamer .

٥ - من إضافة صفات إلى الاسم الأصلى زيادة فى التعريف وتصبح هذه الصفة مع الاسم كأنها من مستلزمات الاسم :

وهذا كثير فى الإنجليزية مثل الطائر الباربت المسمى (باربت الحداد) Coppersmith Barbet لأن صوته أشبه بصوت مطرقة الحداد على السندان تقريباً هكذا — tong يردده بصوت ضعيف — ومثله كذلك Blacksmith Plover وأيضاً البيغاء الخفاش Bat- parrot لأنه يتعلق بفروع الأشجار عند الراحة والنوم مثل الخفاش ، كذلك Trumpeter Bullfinch لأنه صوته كنقر الترومبيط كذلك Quail- thrush لأنها تحنى رأسها كالسمان وأيضاً Night- heron لأنه يستريح وينام نهاراً وينشط ليلاً وأيضاً Lazuli ، Emerald ، Cinnamon ، Masked ، Indigo ، Corn Hunting أى دراسة القميص — Sacred ، Hermit ، Painted ، Horlequin ، saffron وباللغة العربية الكثير من هذا مثل البط أبو سبلة وهو البلبول .

٦ - قد تكون مختصة بمكان أو منسوبة إلى أول من رآها واكتشفها وهذا كثير فى الإنجليزية مثل Lady Amhyrst أو Griffon ، أو Ruppell أو Bonelli ، أو Wilson أو Richard ، أو Savi أو Tsava ، أو Egypt ، أو Daruin ، أو Somli ، الخ واللغة العربية بها مثل هذا القليل مثل الرخم المصرى الخ (٢) .

٧ - قد تكون التسمية سماعية بمعنى أن الاسم سمع لأول مرة من واحد ثم تداولته الألسن على أنه اسم خاص بالطائر وأصبح شائعاً ومعظم لغات العالم من هذا القبيل ففى الإنجليزية الكثير من هذا مثل Sparrow ، Tern ، Vulture ، Courser ، Snipe ،

(١) وكان القديس بطرس st Peter سائراً على بحر الجليل فى فلسطين ثم شاهد طائراً كأن أقدامه تضرب الماء وتحدث مرفعة فسماء Petrel أى (المفرق) ومن وقتئذ أطلقت هذه التسمية على هذا الطائر وهو petrel وكذلك الأطيش الأحمق Booby سمي بذلك لبلاهة وطيشه لأن قد يسمح للإنسان أن يقترب منه ولا يطير ، وكذلك دجة الصخور لأنها تآوى إلى الجبال صيفاً فى أوروبا وتتوالد بين الصخور Rock Thrush

(٢) كذلك طائر الفردوس Bird of paradise لأن الزوار الأوروبيين لجزيرة غينيا الجديدة أخبرهم أهل الجزيرة أن هذه الطيور قد أتت من الجنة فأصبحت التسمية ملازمة لها كذلك فإن طائر الفردوس ساكسونى عندما رآه لأول مرة حاكم ساكسونيا فى ألمانيا سمي باسمه The King bird of Sxony وأيضاً Doller Bird وهو الغراب الزيتونى الأسترالى سمي بذلك لوجود بقعة زرقاء فاتحة تشق وسط القوادم أشبه بالعملة الفضية .

‘Ostrich , Bittern , Dove , Rail , Gull , Lark , Kite , Kestrel , Albatross

والعربية مليئة بأمثال هذه المسميات مثل حمام وحمام وجبارى ونعام وقبرة ونحام وعصفور وعقاب ورحم وصقر ودج وبوم وسمان ونسر الخ .

وإن اللغة العربية لم تعط أسماء كافية للطيور كلها بل إن هذه الأسماء لا تبلغ ١ ٪ من مجموع طيور العالم والباقي بدون أسماء ومعظم الأسماء العربية التي نعرفها هي ما كانت تحت أبصار العرب في الجزيرة العربية والبلاد التي افتتحوها .

وهذا وقد راعت في اختيار أسماء الطيور الاسم الشائع المتداول على الألسنة فمثلا الشاهين اسمه بالإنجليزية Peregrine أى الباز الجوال ولكن اسم الشهرة في العربية هو الشاهين لذلك أخذنا بهذا الاسم . كذلك الكوكال المصرى فقد سماه فيتزهاجن Lark-heeled cuckoo أى الكوكي القبرى الدابرة ولكن من يعرف هذا ؟ أما إذا قلنا الكوكال المصرى Egyptian coucal كما سماه شلى بذلك فيكون أسهل في النطق والتعريف لذلك أخذنا به بصرف النظر عن باقي الأسماء العربية له مثل (الملك) و (عرق البوص) الخ – كذلك ترجمنا لفظ Roller (للغراب الزيتوني) وأيضا Flycatcher ترجمناه (صياد الذباب) أسهل من لفظ (أبى شبقونة) وهو لفظ سورى . وكذلك دجاجة الماء Moorhen وكلمة Moor أى مستنقع .

الطيور التي تزور مصر صيفا للتوالد

فيها حسب الجدول المبين على اليسار

من هذا الرسم نستنتج أن الطيور التي تزور مصر صيفا من أجل التوالد فيها قليلة جدا ومحدودة وهي سبعة أنواع وهذا الجدول منقول من عالم الطيور الكولونيل ميتزهاجن ، غير أننا لاحظنا بعض أشياء لم يسجلها مثل الحداة المصرية فإن منها بعض أفراد تنجول وتهاجر شتاء من مصر إلى كينيا وبلاد العرب ثم تعود ثانية إلى مصر في الربيع للتوالد فيها فترة الصيف وبذلك يجب أن تدرج هذه الحداة مع هذه القائمة السبعة واسمها (الحدأة المصرية) السوداء .

Black Egyptian Kite .


(Milvus migrans aegyptius) .


كما أننا نذكر بعض ملاحظات على هذا الجدول حسب أرقامه المبينة عليه وهم :

- ١ - ربما يقضى قليل منه فصل الشتاء .
- ٢ - هو مهاجر كذلك من البلاد .
- ٣ - يحتمل أن يقضى الشتاء في مصر العليا .


الاسم العربي	الاسم العلمي	البحر الأبيض المتوسط				وادي النيل			الواحات				الصحراء		البحر الأحمر	سببها
		غربا	شرقا	الدلتا	الفيوم	مصر العليا	وادي النطرون	سيوة	الغربية	الدقهلية	ليبيا	استنفك				
مفتى زيتوني مصري	Hippias pallid pallida	•	•	+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•
بابل أهر مفتى	Zrythropygia e. ga.acotes	+	+	+		+	+	+	+	•	•	•	•	•	•	؟
سنوزو ارحال المصري	Riparia rixaria abelleui	•	•	+	+	+		•	•	•	•	•	•	•	•	•
وروار عراقى	Meratus subercillas pesisicus	•	•	+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
كوكو أرط كبير	lalamator glaucidarius	•	•	+	•	+			•	•	•	•	•	•	•	•
قوى صيفى	Straptofalais turtur isabellina	•	•	•	+	؟		•	؟				•	•	•	•
أبو النسر مطون	Iy lareolia h. pratincola	•	•	+	•	•	؟		•	•	•	•	•	•	•	•

لوحة رقم (١)






Tails of:



Leg

ص ٢٤٧




Rough-legged Buzzard

ص ٢٤٩

Bills of:-



ص ٣٣٩ Black-throated Diver



ص ٣٣٩ Red-throated Diver.



Honey Buzzard

ص ٢٦٠






الرجل Leg

طيور مصر - ٣٣



Peregrine Falcon
(In Flight)



طريقة قياس الجناح



قياس المنقار
من القبر




The Western Black-eared Wheatear.



The Western Black-eared Wheatear.
(Black Throated Form).



The Eastern Black-eared Wheatear.



The Eastern Black-eared Wheatear.
(Black Throated Form)

(١٦١)

يحرم من الطير أكل كل ذي غلب (ظفر) يصيد به كالصقر بكافة أنواعه ، بخلاف ما له ظفر لا يصطاد به كالحمام فإنه حلال .

وقالت المالكية يحل أكل كل حيوان طاهر غير ضار لم يتعلق به حق الغير فيجوز عندهم أكل الطير الذي له غلب كالبارز والنسر الخ ما ذكر .

ومن الطير المحرم في كل المذاهب هو المدهد والخطاف والصدرد واليوم والحفاش^(١) والرخم والعقنق . — أما الغراب الأعصم فحلال أكله . وقالت المالكية : يحل أكل المدهد مع الكراهة وكذلك يحل أكل الخطاف عندهم والرخم وسائر الطيور عندهم إلا الوطواط فإنه مكروه وقيل حرام . وقالت الحنفية بأنه يحل أكل الخطاف واليوم ويكره الصدرد والمدهد — وفي الحفاش عندهم قولان في الكراهة والحرم . وقالوا إن العقنق مكروه فقط لأنه يأكل الحب تارة والجيف تارة أخرى . وقال المالكية بأنه يحل أكل الغراب بجميع أنواعه .

ويحل من الطير العصافير بأنواعها والقطا والكروان والبيغاء والنعام . والطاوس والكركي والبط . وقالت الشافعية بأنه لا يحل أكل البيغاء ولا أكل الطاوس .

هذا وقد أجمع المسلمون على حل أكل الصيد إذا كان برياً غير مملوك للغير كالبط البري والحمام البري بخلاف الحمام الأهلي والبط الأهلي الخ .

ويشترط في الصائد أن يكون مسلماً أو كتابياً ، فلا يحل صيد المجوسى والوثني المرتد وكل من لا يدين بكتاب .

وقد ثبت الصيد من قوله تعالى (وإذا حلتتم فاصطادوا) وفي الحديث : ما رواه البخارى ومسلم أن إبا ثعلبة قال : قلت يا رسول الله ، إنا بأرض صيد أصيد بقوسى أو بكلى الذى ليس بمعلم أو بكلى المعلم ، فما يصلح لى ؟ . فقال ﷺ : ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلك غير المعلم فادركت ذكاته (أى أدركته قبل أن يموت ثم ذبحته) فكل .

وروى البخارى ومسلم أنه سئل ﷺ عن صيد المعراض (سهم لا يمين له — دقيق الطرفين غليظ الوسط — يصيب بعرضه دون حده) . فقال : إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيدٌ — طبعاً هذا إذا صيد الطائر فوق ميتا ، أما إذا كان حياً فهو حلال على الإطلاق . والوقيد فى حكم من تردى من فوق مكان عال فسقط ميتا .

(١) حقيقة أن الحفاش ليس من الطيور — رغم أنه يطير — بل هو من الحيوانات الثديية ، ولكن كتب الفقه ذكرته باعتباره أنه يطير فحسب .

الصيد بالنبل والبندقية

إذا أصاب الصياد الصيد بسكين أو سيف أو حربة أو سهم ، فأصاب بنصلها أو حدها فقتله فإنه يحل أكله ، أما إذا كانت الإصابة بعرضها فقتله ثقلها ولم يدركه حيا ويذبحه ، فإنه لا يحل ، ومثال ذلك ما إذا رماه بعصا أو خشبة أو حجر كالنبل فإنه لا يحل . وكذلك إذا رماه برصاص البنادق أو رشها فأماته فإنه لا يحل .

وقالت المالكية : لم يوجد نص من المتقدمين في الصيد برصاص البنادق ، ولكن كثيرا من المتأخرين يوثق بهم قالوا يحل أكل ما يصاد به ويميته لأنه يسيل الدم من جسم الطائر ويسرع في القتل أكثر من غيره ، والغرض من الذكاة (الذبح) الشرعية إنما هو الإجهاز السريع على الحيوان كي يستريح من التعذيب ، فكلمة كان أسرع في الإجهاز عليه ، كان استعماله أحسن ، ولا يشترط أن يكون الجرح بالشق ، بل يصح أن يكون بالحرق أيضا .

وفي المذاهب الأخرى : يجوز الاصطياد بالبندق إذا كان الرامي حاذقا وكان الحيوان يحتمل الضربة فيقع حيا .

وإذا اصطاد الإنسان صيدا ووقع في الماء ثم أخرجه من الماء ميتا ، وتأكد أنه مات بفعل الماء ، فلا يحل أكله ، أما إذا أطلق عليه النيران وهو في طيرانه وعلم بموته يقينا قبل أن يسقط الماء ، ثم أخرجه من الماء ميتا ، فعندئذ يحل أكله لأنه مات بفعل الصيد لا بسبب الماء .

ومن أراد أن يتوسع فعليه بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة طبع وزارة الأوقاف - قسم المعاملات - الجزء الثاني - في كتاب الحظر والإباحة في مبحث ما يمنع أكله وما يباح ومباحث الصيد والذبائح في أول الكتاب .

رتبة المصفوريات (باسيريفورمس)

Order (Passeriformes- Passeres)^(١)

Land Birds- Perching Birds

هي طيور اليايسة أو بعبارة أخرى هي طيور فنية أعنى طيور مناطق الأشجار ، فإن السواد الأعظم منها يقطن موطن وجود هذه الأشجار وخاصة في المناطق الاستوائية في غاباتها ، ولا تختص مناطق الأشجار بها فحسب بل توجد أيضا في أى مكان في اليايسة في الصحارى والقفارى والسهول والجبال ، والوديان والتلال ، والمدن والقرى وتصل حتى قرب القطب الشمالى (لا عنده) ولكنها لا توجد في منطقة القطب الجنوبى ، فحيثما طاب لها الحلول ، أقامت واستقرت ، .وهى طيور عالمية التوزيع ، يبلغ عدد فصائلها ما يقرب من ٥٦ فصيلة وهذه هي أعظم رتبة في تعدد أنواع طيورها ، فهى أكبر بكثير من باقى أنواع رتب الطيور الأخرى كلها مجتمعة ، وهى تحتوى على أكثر من خمسة آلاف نوع Species يبلغ عدد أفرادها أكثر من نصف طيور العالم كلها .

ومن الصعب إيجاد مميزات كثيرة مشتركة لهذه الطيور بالنسبة لكثرتها ، إذ أن الفروق مختلفة في كثير منها ، ولكنه رغم ذلك فإن هناك مميزات متحدة فيها وهى أن المقار متوسط الطول أو صغيره ، خال من الغير ، وعدد أصابع القدم ٤ دائما ، وإحدى هذه الأصابع يكون متجها للخلف ، وليس بالأصابع أغشية (ليست مكففة) ، كما أن الأولاد تولد عارية من الريش ولا تبارح العش إلا بعد أن تأنس من نفسها على الطيران ، وتوجد غدة زيتية عارية من الريش — لا من الزغب — تحت وأسفل قاعدة الذيل — وريش القوادم من ٩ : ١٠ ريشات ، والذيل عادة ١٢ ريشة (نادرا ١٠ ريشات وقد يصل إلى ١٦ ريشة) .

عائلة الغربان أو الفصيلة الغربانية

Family (Corvidae) Crow Family

Ravens Y Crows Y Jackdaws, Joys Y choughs, Uaghies, Y Rooks, Tree-Pies, Y Nutcrack-

تقطن هذه الفصيلة أو العائلة كل أنحاء المعمورة في اليايس (٢) في المناطق الحارة والمعتدلة والباردة ، على أنها تكثر في المعتدلة وتقل في الباردة ، ومعظمها من الأوبد أى التى لا ترح أمكنتها بل تلازمها طول العام ، وقليل منها هو الذى يهاجر ، والبعض يقوم بجولات . وهى لصوص ماهرة في اختلاس البيض من أعشاش غيرها والنهام الأولاد .

(١) أى peching Birds تشمل Swallows — finches + thrushes + tits + وتضم فصيلة ALaulidae أى القناير + الفئاح Lanudae + Oipits + أى القنايش + ariolus الصغير + الزرزور + الغربان + والزرياب وناقر البندق وشحروور الماء + عصفور الشوك + warblers + واكل الذباب والأبلق - كل واحد بفصيلته .

(٢) ماعدا نيوزيلند

وهي تتكون من ١٠٠ مائة نوع (١) Species، ولا تقطن نيوزيلند أو بعض جزائر بولينيشيا .
وطعامها الأساسي اللحم ، على أن السواد الأعظم منها يأكل كل شيء من فواكه وخضروات وأسماك
وخبز ولحم الخ .

الغراب النوحى (إربى)

Irby's Raven

(Corvus corax tingitanus) (٢)

Crow Family

الوصف : طوله حوالى ٢٥ بوصة – انظر الصورة فى لوحة (٣) رقم (٨) .
موطنه : مقيم . جزائر قناريا ، وساحل شمال غرب إفريقيا من مراكش إلى سيرينكا وشمال
غرب جمهورية مصر العربية .
فى مصر : من السلوم إلى برج العرب ، وأول الطريق الزراعى من ناحية الإسكندرية .
توالده : على المرتفعات . البيض من ٣ : ٧ زرقاء مخضرة .
مميزاته : أجزاؤه العليا سوداء بلمعان أزرق . منقاره أغلظ من منقار الأوروى ، وذيله أقصر
منه . يغشى الصحارى والمناطق التلالية والصخرية .

الغراب النوحى الأسمر الرقبة

Brown necked Raven

(Corvus corax ruficollis)

Crow Family

الوصف : طوله حوالى ٢٥ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (١) رقم (٧) .
موطنه : من الأوابد(مقيم) – ومتجول أيضا . يتجول من شمال إفريقيا إلى وسط آسيا وغرب
الهند .
فى مصر : مقيم فى واحات مصر الغربية ، والبعض يتجول إلى قرب ساحل البحر الأبيض
المتوسط ولكن ذلك نادر – يرى على جانبى الطريق الصحراوى بين القاهرة والسويس ، وبين القاهرة
والإسكندرية ، كذلك على كلا جانبى وادى النيل من القاهرة جنوبا حتى أسوان ، ولا كذلك على أى
جانب من فرعى رشيد ودمياط أو فى الدلتا .

توالده : يمكن رؤية عشه فى آثار معبد الكرنك والأقصر ، وعلى التلال ، وفى سعف النخيل فى
الواحات ، وفى الصخور . البيض من ٣ : ٤ بيضات ، وأحيانا ٥ بيضات .

(١) بالضبط ١١٢ المعروف منها ، والذي على قيد الحياة هو ١٠٢ والجنس ٢٠ Genes

(٢) الذى لم نذكر فيه الفرق بين لوى الذكر والأنثى يكون الذكر فى اللون تقريبا

مميزاته : طائر صحراوي . يشاهد منفردا أو مثنى ، وأحيانا في أسراب . يراه من يزور آثار الوجه القبلى . الرقبة وأعلى الشواح والصدر ، بنى بلون الشكولاتة . باقى الجسم أسود بلمعان أرجوانى .

الغراب المروحي الذنب
Fan - tailed Raven
(Corvus rhipidurus)
Crow Family

الوصف : طوله حوالى ١٧ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٣) رقم ١٢ ، ٢ ب .
موطنه : مقيم : على جانبى ساحل البحر الأحمر الجنوى ، والسودان والحيشة والصومال وشمال
كينيا وبلاد العرب ، وعلى طول الساحل الشرقى للبحر الأحمر من عدن إلى سينا وفلسطين ومنخفض
البحر الميت .

فى مصر : عند الحدود المصرية جنوبا على ساحل البحر الأحمر عند جبل علبة .
توالده : فوق التلال والجبال الصخرية . العش فى شق أو فجوة - البيض ٣ : ٤ زرقاء مخضرة
بها نقط بنفسجية وأخرى سمراء زيتونية يتوالد فى مستعمرات .

مميزاته : يشاهد فى جماعات . يسمع صوته على بعد كصوت المستغيث . يشاهد فوق الجليلد فوق
جبل كتارينا فى سينا . الرقبة سوداء بلمعان أحمر نحاسى وكذا الأجزاء العليا . أما الأجزاء السفلى فهى
سوداء بلمعان أزرق .

الغراب الأورق (الشكل الأوروبى)
Hooded Crow (European Form)
(Corvus corone cornix)

وصفه : طوله حوالى ١٨,٥ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٣) رقم (١) .
موطنه : مقيم . فى النصف الشرقى من أوروبا إلى جبال أورال . لا يوجد فى أسبانيا ولا فى
جنوب فرنسا .

فى مصر : حصل نيقول على واحد منه فى قتال السويس فى يناير سنة ١٩٢٤ م ، واصطاد
مينرتزهاجن واحدا آخر من وادى النيل فى إبريل سنة ١٩٢٣ م ، وكانا مهاجرين للجنوب ، ويحتمل أن
تزرأ أفراد منه مصر شتاء لأنه يصعب تفسيره وهو فى الحقل .
مميزاته : اللون الرمادى فيه ظاهر الواضح ، والسواد فيه شديد بلمعان أرجوانى .

الغراب الأورق (شكل البحر الأبيض المتوسط)

Hooded Crow (Mediterranean Form)
(Corvus corone sardonius)

وصفه : طوله حوالى ١٧ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٣) رقم (٦) .
موطنه : مقيم . البلقان وسردينيا وقورسика وسوريا وفلسطين .
فى مصر : يقيم فى الدلتا ومصر العليا وكذلك فى جنوب أسوان أو غرب دمنهور ، ويظهر أن
الحد الشرقى له فى الدلتا هو قنال السويس . يحل كذلك فى الفيوم ولا كذلك فى الواحات أو وادى
النطرون أو سيناء . وشاهدته طائرا متجولا فى ساء الإسكندرية عند الحضرة مرارا .
توالده : العش فى الأشجار - البيض ٣ : ٥ لونها خضراء مائلة للزرقة بها بقع .
مميزاته : يشاهد فى مصر فى كل مكان ، فى المدن - وخاصة القاهرة - وفى القرى ، والحقول -
أصغر من الأوروبي وأفتح منه لونا .

الغراب الجيفى


Carrion Crow
(Corvus corone corone).


وصفه : طوله حوالى ١٨ ١/٢ بوصة - انظر الصورة فى لوحة (٣) رقم (٥)
موطنه : أوروبا . أسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا .
فى مصر : لم يُر فيها ، وقيل إنه شوهد ، ولا يعتمد على ذلك .
مميزاته : أسود لامع فى الضوء . طعامه الجيف كما هو ظاهر من اسمه . كذلك فضلات الغير

غراب القيط (الشكل الغربى)

The Rook (Western Form.)
(Corvus frugilegus frugilegus)
Crow Family

وصفه : طوله حوالى ١٨ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٣) رقم (٤)
موطنه : مهاجر (من القواطع) . يتوالد فى قلب أوروبا ولكنه ليس فى شمالها ولا جنوبها . يتوالد
كذلك فى الجزائر البريطانية . يهاجر شتاء إلى جنوب أوروبا فى حوض البحر الأبيض المتوسط وأحيانا فى
شمال إفريقيا .
فى مصر : قليل منه يزور مصر شتاء فى ديسمبر ويناير
مميزاته : يشاهد فى الأراضى المنزرعة فى الدلتا ولكن بقلّة جدا . له بقعة رمادية واضحة عند قاعدة
المنقار .





(١) ص ٤٣

Ad. M Winter
European Starling



(٣) ص ٤٤

Asia-minor Starling



ص ٤٣

Ad. M. Spring
European Starling



(٢)

ص ٤١

Poltaratsky Starling



(٥)

ص ٤٥

Tristram's Grackle



(٧)


ص ٤٣

Ad. F. Winter



ص ٤٥

Rose-Coloured Starling.



ص ٢٢٢

(٨)

Rough - Legged Buzzard

الزاع (الشكل الشرقى)
Jackdaw (Eastern Form.)
(Corvus monedula soemmeringu)
Crow Family

وصفه : طوله حوالى ١٣ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (١) رقم (٣)
موطنه : مهاجر (من القواطع) - من شرق أوروبا إلى التركستان وكشمير .
مصر : لم يشاهد فيها إلا مرة واحدة ، رآه مينرتز هاجن فى مايو سنة ١٩٢٢ م ، رغم أنه يشاهد
شتاء فى فلسطين فى جموع .
مميزاته : صوته هكذا (Jack) يردده أثناء وقوفه على الأشجار أو الأرض أو فى طيرانه . صغير
الجسم - يهز جسمه أثناء سيره . يقع على ظهر الغنم ويقلبها من الحشرات .

العققى
Magpie
(Pica Pica.)
Crow Family

وصفه : طوله حوالى ١٨ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (١) رقم (١١)
موطنه : مقيم . فى كل أوروبا ما عدا جزائر قورسيقا وسردينيا والبلبار .
مصر : لم يعثر عليه . وبعض الرحالة ذكر أنه رآه فيها ، ولكن لا يعتمد عليه .
مميزاته : لونه الأبقع المكون من السواد والبياض

الغراب الأعصم = غراب الصرود الأحمر المتقار
Chough.
(Pyrrhocorax.)
Crow Family.

وصفه : طوله حوالى ١٦ ½ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٣) رقم (٩)
موطنه : مقيم : فى جبال كريد وآسيا الصغرى والحبشة وجنوب أوروبا ما عدا إيطاليا (شمالها)
مصر : ذكر البعض من المتقدمين أنهم رأوه ولكن لا اعتماد لكلامهم .
مميزاته : كله أسود بلمعان أرجوانى أو أزرق بنفسجى . منقاره وأرجله حمراوان .

غراب الصرود الأصفر المنقار

Alpine Chough.

(Pyrrhocorax graculus.)

(Pyrrhocorax alpinus)

الوصف : طوله حوالى ١٥ بوصة — انظر الصورة فى لوحة (٣) رقم (١٠)
موطنه : مقيم . فى جبال لبنان والهرمون فى سوريا . كذلك فى البلقان وشمال إيطاليا ومعظم
أسبانيا ما عدا جنوبها الغربى . وفى جزيرة قورسيقا . ليس فى سردينيا ولا قبرص أو كريد
فى مصر : ذكر إهرنيرج أنه رآه بمصر ، وكذلك روبل وهاسل كويست ، ولكن لا يعتمد كلامهم
لأنه لم يحصل على واحد منه لأن من مصر .
مميزاته : منقاره أصفر اللون وأقصر من الغراب الأعصم الأحمر المنقار .



عائلة الزرازير أو الفصيلة الزُرُزُورية

(^١) Starlings, Family (Sturnidae)
Starlings + Gvavkles + Mynas

تحتوي هذه الفصيلة على حوالي ١١٤ نوعا (^٢) species تقطن معظمها إفريقية وخاصة الاستوائية منها ، كما أن بعضها يقطن جنوب آسيا كذلك في أوروبا وقد تمحلت حتى وصلت إلى استراليا ونيوزيلند وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية حيث تقيم بكل ذلك طول السنة فيها ومنها ما يهاجر جنوبا شتاء وأدخل في استراليا ويقيم بها طول السنة .

ريشها براق لامع . وأجنحتها مدببة ومثلثة الشكل تقريبا ، ولا فرق يلحظ بين الذكر والأنثى ، أما الأولاد فتختلف اختلافا كبيرا في ألوانها عن آبائهم .

وهي عديدة الأهل (الشوارب) . وهي أيضا طيور اجتماعية بمعنى أنها تعيش دائما في جماعات — في تناولها الغذاء ، وفي تزاوجها (توالدها) ، وفي طيرانها ، وتتخذ هذه الطيور أعشاشها في ثقب في سيقان الأشجار الضخمة ، كذلك في شقوق الصخور المرتفعة ، وأحيانا في شق في جدران المنازل أو في أكواخ صناعية صغيرة بحجم الأقفاص كما في أمريكا وأوروبا .

طعامها الرئيسي الحشرات والديدان إلى جانب الفواكه وخاصة التين والبلح الرطب ، وكذلك النباتات والخضروات ، وقد تأكل بعض الحبوب إذا اضطرها الجوع .

جنس الزرازير

Genus (sturnus.)

الموجود منها حاليا هو ١٠٧ نوعا منتشرة في أنحاء العالم ماعدا مناطق القطبين .
تمتاز طيور هذا الجنس بأن طول المنقار بطول الرأس تقريبا ، وهو مسطح ومستقيم ومدبب قليلا كسنان الرمح من طرفه تقريبا . وتصل فتحة المنخر بأول ريش الجبهة ولكن الريش لا يغطيها . الجناح مثلث الشكل تقريبا ، وأول قادمة فيه ظاهرة الواضحة رغم صغرها وطولها من ١ : ٢ سم . الذيل قصير ومستقيم طوله نصف طول الجناح تقريبا . الشقان متماثلان . ولكن الأولاد الصغيرة تختلف اختلافا كبيرا في لونها عن الآباء الكاملة النمو .

الزرزور الأوروبي

European Starling.

(Sturnus Vulgaris Vulgaris.)

الوصف : طوله حوالي ٨ ١/٢ بوصة . انظر الصور في لوحة (٤) رقم ١ ، ٤ ، ٧

موطنه : يتوالد صيفا في شمال ووسط أوروبا . وهو من القواطع (^٣) .

(١) Grackle Talking Myna = الجنس ٢٤

(٢) المعروف منها هو ١١٤ ، والذي على قيد الحياة هو ١٠٧

(٣) أدخل في أمريكا الشمالية بعد سنة ١٩٢٠ وأصبح الآن كثيرا فيها سنة ١٩٧٥ م وهو في ازدياد كذلك في استراليا وتسمانيا ونيوزيلند وجنوب إفريقية وأيضا في جنوب شرق إفريقية أدخله سسل رودس Cesil Rudes في سنة ١٨٩٩ وتكاثر وأصبح كثيرا الآن وسيصبح بعد حين عالميا .

في مصر : يشاهد فيها من الدلتا إلى الأقصر ولا يتجول جنوبا أكثر من ذلك إلا نادرا ، كذلك يرى في سيناء والفيوم وسيوة ، كل ذلك شتاء من نوفمبر إلى آخر فبراير تقريبا وأوائل مارس .
مميزاته : سريع الطيران قويه ، يحتشد في أسراب ، وأحيانا يرى مثنى أو منفردا ولكن ذلك نادرا . طعامه الحشرات والبلح الرطب في أوائل الشتاء وعند انتهائه (أى البلح) يرعى في البرسيم طلبا للحشرات والديدان والخضروات مثل الطماطم الخ . يبيت في أسراب بداخل القصب النامي وسط البحيرات ، كذلك بقلب الأشجار . منقاره بني غامق شتاء ، يتغير إلى اللون الأصفر في الربيع والصيف .

زرزور بولتارا تسكى

Poltaratsky's Starling
(Sturnus Vulgaris Poltaratkyi.)

الوصف : طوله حوالى ٨ ١/٢ بوصة . انظر : صفحة (١٢) رقم (٢) لوحة ٤
موطنه : مهاجر : يتوالد من غرب سيبيريا شرقا إلى نهر ينيسى ، وجنوبا إلى جبال الشاى فى أوروبا .
في مصر : يصحب الأوروبي في نفس الميعاد ، غير أنه يصعب التمييز بينه وبين الأوروبي وهو في طيرانه أو في الحقل ، اللهم إلا إذا كان بيد الإنسان ، ويحتمل أن يكون هو أكثر أنواع الزرازير التي تشاهد شتاء في مصر مع الأوروبي .
مميزاته : طبائعه كالأوروبي تماما . غير أنه يختلف عنه في أن ريش الأذنين مائل للون الأرجواني وكذلك الرأس . أما باطن الحناح فهو فاتح اللون قليلا عن الأوروبي .

زرزور آسيا الصغرى

Starling (Asia Minor Form.)
Sturnus vulgaris Purpurascens.

الوصف : الطول حوالى ٨ ١/٢ بوصة . انظر الصورة لوحة (٤) رقم (٣)
الموطن : مهاجر شتاء : يتوالد صيفا في آسيا الصغرى .
في مصر : من نوفمبر إلى آخر فبراير في الدلتا فقط ، وتارة في سيناء ، وشهد أكثر من مرة مختلطا مع الأوروبي وبولتاراتسكى . وهو أقل الزرازير شيوعا في مصر رغم شيوعه شتاء وحول رفع على ساحل سيناء الشمالى الشرقى .
مميزاته : طبائعه كزملائه السابقين . الرأس والرقبة يلعبان بلون أخضر ، وريش الأذن يلعب أرجوانى أو برونزى . الظهر يعطى بريقا أزرق ، أو أرجوانيا في وسط الريش ، وأرجوانيا في هوامش الريش . الصدر لونه أرجوانى ، والبطن برونزى اللون .

الزرزور الوردي

Rose – coloured starling

Rose – coloured Pastor.

(Pastor roseus.)

الوصف : طوله حوالى ٨ ١/٢ بوصة – انظر الصورة لوحة (٤) رقم (٦)

الموطن : متجول أحيانا : يتوالد صيفا من البلقان وجنوب شرق أوروبا خلال آسيا الصغرى إلى التركستان . يتجول أحيانا جنوب ما ذكر في الخريف في أسراب .

في مصر : نادر التجول لها . صيد في ١٩١٧/٨/١٠ قرب رفح . واصطاد هيجلين واحدا آخر صغيرا قرب الجيزة في ١٩٦٤/٨/٢٥ .

مميزاته : يمتاز بلونه الوردي والأسود ذى اللمعان الأرجوانى . طعامه الأزهار . بداخل الأشجار

سوادية ترسترام

Tristram's Grackle.

(Onychognathus tristrami tristrami.)

starling Family.

الوصف : طولها حوالى ٩ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٤) رقم (٥)

الموطن : من الأوبد : مصرية صميمة . تقيم في شبه جزيرة سيناء في وادى فيران ، كذلك في منخفض البحر الميت جنوب جيروكو وعند بتره وبالقرب من مدينة العقبة .

مميزاتها : في حجم الشحرور وطباعها مثل الزرزور . تحتشد في جموع صغيرة في الوديان الصخرية وخاصة المقفرة ، وهي خوافة وقد تكون أليفة للغاية ما لم تنزعج .

توالدها : البيض لونه أزرق شاحب به نقط بنية بوضع في شق أو في فجوة فوق الصخور العالية .

ويلاحظ أن الأنثى تختلف عن الذكر بأن الرأس والرقبة والصدر رمادى بنى بها خطوط زرقاء سودة . الجسم أشد سودا من الذكر كما أنها أصغر منه جسما .

فصيلة الصفيير

Oriole Family

Family (Oriolidae) Orioles.

تمتاز طيور هذه الفصيلة ببريق ألوانها الجذاب الأصفر الذهبى وخاصة في الذكور . وهى تتكون من حوالى ٣٤ نوعا (الجنس ٢ يشمل ٢٨ نوعا معروفة وعلى قيد الحياة وهو صفيير الدنيا القديمة فقط) وطيورها في حجم الزرزور أو الدج وهى من خواص الدنيا القديمة الاستوائية والمعتدلة منها ، على أن مراكزها الرئيسية هى أندونيسيا وتنتشر منها الأنواع غربا إلى الهند وأفريقية ، وجنوبا إلى استراليا ، ونوع واحد منها يقطن شمالا في مانشوريا ، على أن نوعا واحدا منها يمتازا يقطن أوروبا ويهاجر إلى مصر في الاعتدالين .

وطيورها لا تقطن الدنيا الجديدة ، على أن الدنيا الجديدة أنواعها الخاصة بها والتي تحمل نفس الاسم الانجليزى Oriole لا العلمى ولكنها لا تتبع هذه الفصيلة . طعامها الرئيسى الديدان والحشرات والفواكه كذلك مثل التين والتوت والجوافة الخ . وهى طيور خاصة بالأشجار ولا تقف إطلاقا على الأرض . العش على هيئة فنجان مربوط بروابط على غصن الشجرة .

جنس الصفير

Genus (Oriolus.)

تتماز طيور هذا الجنس بأن القسمه مغطاة بالريش . الباقي كالفصيلة .

الصفير الذهبى

Golden Oriole.

Oriolus oriolus Oriole Family.

الوصف : طوله حوالى ١٠ بوصة . انظر الصورة فى لوحة رقم (٥)

الموطن : مهاجر : يتوالد صيفا فى معظم أنحاء أوروبا ، وبعضه فى شمال غرب إفريقيا وآسيا شرقا عند أيركستك يقضى الشتاء فى افريقية الاستوائية والسودان وجنوب افريقية ومدغشقر . يمر فى هجرته على فلسطين وجزائر قناريا وأزورة وماديرة .

فى مصر : يمر على مصر وخاصة الدلتا فى الربيع من ١٢ إبريل إلى ٤ مايو حيث يتغذى بأكبر قسط ممكن من ثمار التوت الذى هو طعامه الرئيسى فى الربيع فى عودته من الجنوب ، وهو يكثر فى الأسبوع الأخير من إبريل والأول من مايو . أما فى الخريف فإنه يبدأ فى الظهور من أواخر أغسطس من ٢٦ فيه . تقريبا وأحيانا من ٢٤ فيه ، ولكنه لا يكثر إلا فى سبتمبر ويستمر طول الشهر فى التكاثر والرحيل إلى مصر ثم لا يبقى بها شىء بعد الأسبوع الأول من أكتوبر ، لأنه يكون قد وصل إلى السودان وإفريقية ، الاستوائية ومنه ما يتم هجرته إلى إفريقيا الجنوبية ، حيث يشترى فى كل هذه المواطن . ويلاحظ أن الذكور فى الربيع تسبق الإناث فى مجيئها بنحو عشرة أيام تقريبا أى تظهر فى حوالى ١٢ إبريل ، وبعد عشرة أيام أى حوالى ٢٢ إبريل تبدأ الإناث فى الظهور - فى مصر - كما أن الذكور فى الخريف تغادر البلاد بنحو عشرة أيام مقدما أيضا ، كما لوحظ أن الذكور لا تهاجر إلى شرق إفريقيا ، بينما ترحل إليها الإناث والنواهاض حيث يكون واقع الشوق والحنين فى الإناث قد بلغ نهايته .

مميزاته : ذكره أجمل الطيور التى ترى فى مصر قاطبة من القواطع والأوبد معا ، فالذكر لونه أصفر ذهبى وجناحه وذيله أسود فاحم . يغشى الحداثق والبساتين ومناطق الأشجار والغابات والنخيل حيث يأكل الثمار من التوت الذى هو أهم غذائه فى الربيع كذلك التين السلطان والجوافة والكمثرى والبرقوق وكل ما وجده سائغا طريا ، كذلك الحشرات من يرقات و فراشات . وللذكر اسم خاص به فى رشيد فاسمه (الشاويش) والأنثى صغيرة والأنثى والذكر جنس الصفير .

العائلة المصفورية (فرينجيليداي)^(١)

Family (Fringillidae.) = Finch Family

تحتوى طيور هذه الفصيلة على جميع أنواع الفش . Finches والدُّرس. Buntings والعصافير البيوتية بأنواعها . Sparrows مع ملاحظة أن هناك عصافير مختلفة أسماؤها مثل (السسكن) . Sis-kin والسيرين . Serin والأماندافا . Amandava والنفاحي . Linnet، والعصفور النساج . Weavers التي له عائلة مستقلة خاصة بها والكناري . Canaries ، ولكن كل ما سبق يعتبر ضمن عائلة الفنش حيث أنها تقتنى للزينة في الأفقاص ، ولها كل مميزات وعوائد الفنش .

وتحتوى عائلة الفرينجيلداي (المصفورية) هذه على حوالى ٤٢٥ نوعا كلها تقريبا في حجم العصافير البيوتية التي نراها أمانا في كل مكان في الدنيا في المدن والأرياف والحقول والمنازل والقرى — ماعدا مناطق الصحارى والقطبين حيث هي تآلف الانسان . (بكتاب حيوان الحيوان للدوميرى محاورة عن العصفور) والخاص بالفنش يحتوى على ٢٩ جنسا يشمل ١٢٤ نوعا يوجد منه حاليا ١٢٣ نوعا . وهي لا توجد في استراليا إلا في طرفها الجنوبي الشرقى كما أنها لا توجد في الهند والهند الصينية وجزائر الهند الشرقية وبلاد العرب وليبيا وجرينلاند ومدغشقر .

ويلاحظ على هذه العائلة أنها غليظة المنقار قوية وغروطى الشكل ، ينطبق كل فك منها على الآخر تمام الانطباق مما يهيء للعصفور أن يقشر حبة القمح والأرز من غلافها كأنه يدرسها كما يفعل النورج في درس القمح ، لأنها من آكلات الحبوب . وقد أصبحت هذه الطيور الآن عالمية . وهي تُبَدَّل ريشها مرة واحدة في السنة وذلك بين الشتاء والربيع . ويتقارب الذكر والأنثى في لونها ، ولا يتميز الذكر عن الأنثى بوضوح إلا في الصيف وفي فصول التزاوج ، كما تعرف هذه العصافير أيضا بأن الذيل فيها مشقوق قليلا .

والفنش هو أكثر أنواع العصافير وجودا في أمريكا الجنوبية ، وكذلك في الأقاليم الحارة من نصف الكرة الشمالى (أوروبا وشمال إفريقيا وما يتبعها من جزر المحيط الأطلسى) . وغرب وشمال آسيا حتى اليابان ، ولكنها لا توجد في استراليا أو مناطق القطب الجنوبي ، وطعامها الرئيسى البذور والحبوب علاوة على الفواكه والبراعم والحشرات التي تعطى للأولاد الصغار خاصة . ويعيش معظم الفنش في مناطق الأشجار ، على أن بعضها يحتل السهل والجبل في جموع كبيرة بحيث يكتظها الأشواك الجبلية وقل أن توجد في مناطق الصخور الجرداء ، وهي مهاجرة في الحريف إلى الجنوب لقضاء الشتاء فيه ، ثم تعود ثانية في الربيع للتوالد صيفا في مواطنها الرئيسية . ويغنى كثير منها بصوت عذب شجي وأخصها الكنارى المعروف الشهير لدينا في الأفقاص في معظم مدن الدنيا .

(١) وتشمل كذلك على Redpoll + Bramblings + Crossbill + Grosbeak + Blackcaps + Silverbill + Yello- whammer + Twites

ويبنى العش على هيئة فنجان أو سكرية ، يتخذ عادة في الأشجار ، وأحيانا على سطح الأرض مباشرة أو في شقوق وفجوات الصخور ، ويلاحظ أن الأنثى هي التي تبني العش بمفردها ، وما على الذكر إلا أن يأخذ قسطه فقط في حضانة البيض وإطعام أنثاه أثناء حضانتها للبيض ، ثم يشتركان بعد ذلك معا بعد فقس البيض في إطعام الأولاد ويلاحظ أن فتحة العش تكون من أعلاه ، وجدرانه من الخارج تكون من الطين الممزوج بسيقان الفروع الرفيعة والأعشاب ، ويبطن من الداخل بالريش والشعر ليكون فراشا وثيرا . ويتراوح عدد البيض من ٤ : ٧ بيضات لونها بني فاتح به نقط . وتفرخ الأنثى مرتين في العام .

ومن ضمن الفئش عصفور الكاردينال ، والدرس ، والفئش الأصل ، وكل منها يحتوي على أكثر من مائة نوع .

ومما هو جدير بالذكر والملاحظة أن بعض هذه العصفائر كالظام Chaffinch تعيش ذكوره في عزلة تامة عن الإناث فلا يلتقيان إلا في فترة التزاوج ، وحتى عند الارتحال نجد أن كلا منهما يرحل بمفرده ، وبمجرد وصول الذكور ، تأخذ في البحث عن مواطن أعشاشها السابقة أو عن أماكن ملائمة أخرى لنفس العملية حتى إذا ما اهتدت إليها وتمت العملية اشتركت معها الإناث في إعداد العدة لبناء العش بشرط أن تكون الأشجار مورقة .

فصيلة النساج

Family (Ploceidae.) Weaver Birds.


تستوطن طيور هذه الفصيلة الحبشة غالبا ، ويعتبر وجودها هناك من سمات هذه البلاد ، كما أنها تستوطن إفريقية وجزيرة مدغشقر والهند والملايو وأستراليا .


وتضم هذه الفصيلة نحو من ٥٠٠ نوع من الطيور المغردة ذات المناقر القصيرة السمكية التي تسترعى النظر لأول وهلة لقرب الشبه بينها وبين باقي العصفائر الأخرى العصفورية السابقة (فرنجيليداي Fringillidae) وكان السبب في فصل الفصيلتين هو اختلاف عدد ريشات القوائم فيها ، حيث أن عددها في فصيلة النساج هو ١٠ ريشات ، بينما هي في الفصيلة العصفورية ٩ فقط ، لأن للفصيلة العصفورية قادمة عاشرة ضامرة ، ولذلك فإن الفصل بينهما أصبح في غير ذات موضوع ولا اعتبار له وصار في غير محله ، وزيادة على ذلك فإن القادمة الأولى في فصيلة النساج ليست كاملة النمو ، بل كثيرا ما تكون بالغة الضمور ، وبذلك لم يبق لتبرير الفصل بين الفصيلتين سوى التعلل بغريزة معظم الطيور النساجة التي ينجل أثرها في بناء أعشاش محكمة ذات خاصية لا توجد إلا فيها ذاتها .

ففى أواسط إفريقية وجنوب آسيا تكون هذه الأعشاش التي تعد أحيانا بالآلاف متداخلة ومتداخلة مع الأغصان وعلى هيئة كرات فتحانها من أسفل ، ومن العجيب أن هذه الأعشاش تكون مظلة على الماء حماية لها من زحف الأفاعى عليها وكى لا يتمكن العدو من الاقتراب إليها . فها أحكم صنع الطبيعة في غريزة هذا العصفور النساج !! كما يندر أن يوجد عش منفرد بل تكون الأعشاش كأنها مستعمرة كبرى

Golden Oriole (European Form)







تحتوى على مئات منها . ويشترك الزوجان فى بناء العش ويتمانه فى يوم واحد بطريقة النسيج العجيب ويكون محكما كأنه منسوج كفعل نسيج القماش عندنا ، وقد تبقى هذه الأعشاش أعواما عدة معلقة دون أن تنال منها الرياح والأمطار . وتتخذ هذه الأعشاش فى القرى أو بالقرب منها ، وتارة فوق المباني العالية أو النخيل ، ولا يعير السكان هناك أى أهمية لهذه المصافير ولا لأعشاشها ولا يزعمونها قط .

وهى طيور نشيطة ، وكثيرا ما يجتهد القتال بينها فى فترات التكاثر تنافسا على المكان الأصح . وتبنى الأعشاش من سيقان الحشائش المتينة اللدنة وأعوادها الرطبة الخضراء ، ويصنعها الطائر بأن يمسك بمنقاره طرف العود بجوار أحد العروق ثم يأخذ فى فصله فى هواده ويلفه حول الفرع مثلما تفعل فى لف الدويارة ، ثم يأتى بغيره ويقفل معه نفس الفعل حتى يتضخم العش ويصبح كالكرة ويجعل فتحة من أسفل . طعامها بذور الحشائش والأعشاب ، كما أنها تغزو حقول القمح فتقضى على ما به بجمعها الهائلة .

عشيرة المصفور النساج

Family (Viduinæ.) Weaver-bird Family.

تشمل طيورها على أنواع كثيرة ، لها من المميزات ما للفصيلة . وهى تتميز بصغر حجمها ، وقصر مناقيرها وغلظها أو رُفعها ، وضعف أقدامها وأجنحتها المتوسطة الطول . أول القوادم ضامرة ، أو خافية مدببة ، وأحيانا لا تبلغ من الطول مبلغ الغطائيات . كما أن الأذنان مستقيمة مستديرة الطرف ، وأطول ريشاتها ريشتا الوسط أو الأربع ريشات الوسطى من الذيل .

جنس المصفور فضى المنقار

Genus (Euodice) إيوديس

Weaver-bird Family.

يستوطن هذه الجنس قارة إفريقيا وآسيا .

وتمتاز طيورهم بأذنان مدببة مسحوبة من وسط الذيل بشبه المخروط . أطول ريشات الذنب هى الوسطى .

عصفور فضى المنقار

Silver-bill

Euodice Cantans

Weaver-Bird Family

الوصف : الطول حوالى ٤ بوصة : انظر لوحة (٧٣) شكل (١)
الموطن : من الأوايد ومتجول : يقطن المناطق الغربية والشمالية الشرقية من إفريقية جنوبا حتى زنجبار وجنوب بلاد العرب .
فى مصر أدخل فى قائمة الطيور المصرية لصيد أفراد منه شتاء من جبل علية .

مميزاته : - الأجزاء العليا بنية رمادية ، الجبهة حروف ريشها فاتح . الفزحية محمرة قرنية . الشق الأعلى للمنتقار أزرق رمادي داكن ، أفتح لونا عند القاعدة ، والشق الأسفل رمادي أزرق فاتح . القدم حمراء باهته . والذكر : الأجزاء العليا بنية فاتحة مخططة ، والرأس أدكن قليلا وعليه بقع خفيفة وأطراف ريشاته مسودة والقسم والصدغان وغطاء الأذن كلها بيضاء ، وعلى الذقن وجانبى الوجه بقع محمرة وجانب العنق بنى مصفر ، وكذلك لون جانبى الجسم ، وعليها خطوط خفيفة مبيضة ، والظهر بنى ونهاية حافات ريشاته مبيضة ، وغطائيات الجناح والخواقي الداخلية بنية ، بينا الغطاءيات السفلى والإبطان بنية مصفرة باهته . القوادم مائلة للسواد وتصلها الأنسى بنى مصفر باهت . العجز أبيض وعلى ريشاته المتصلة بأسفل الظهر خطوط متقاربة بنية . الذنب أسود ، وعلى منتصف النصل الوحشى من ريشاته الوسطى وشم محمر . لون بقية الأجزاء السفلى أبيض ذو مسحة محمرة . الشقان لا يختلفان إلا أن الأنثى أصغر قليلا من الذكر .

الفنش الأفوه Hawfinch

(Coccothraustes Coccothraustes Coccothraustes)

الوصف : الطول : حوالى ٧ بوصة . انظر الصورة لوحة (٦) شكل ٢ ، ٣
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا أقصى شمالها .
كذلك يتوالد صيفا في بعض أجزاء غرب آسيا .
في مصر : تزور بعض أفراد منه الدلتا شتاء ولكن بقلّة جدا . وشوهد أيضا في وادى النطرون
وصدته أنا نفسى من رشيد في ٢٣ مارس سنة ١٩٤١ م .
مميزاته : أكبر قليلا من العصفور البيوق ، يتراءى للناظر إليه وهو فى طيرانه أنه صرد (قرناص) .
ضحخم المنقار . إذا طار ظهر الخط الأبيض العرضى الذى يشق القوادم ومثلها فى الخواقي . انظر
الصورة .
طعامه الفواكه والحبوب والحشرات والديدان . يختفى جيدا بداخل أوراق الأشجار يغمى
الحداثق . الأنثى أغمق من الذكر .

الفنش الأخضر (شكل الرشق الأوسط) (Greenfinch middle East Form.) (Chloris Chloris Chlorotica.)

الوصف : الطول حوالى ٥ ¼ بوصة . أنظر لوحة (٦) شكل ١٠
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في سوريا وفلسطين وأقصى شمال سيناء بين العريش ورفع .
في مصر : يتوالد صيفا في أقصى شمال سيناء بين العريش ورفع ، كما يرى بها شتاء في أسراب في
مارس خاصة . كذلك يرى في الدلتا من نوفمبر إلى مارس ولكن بقلّة جدا .

مميزاته : يشاهد في أسراب صغيرة شتاء لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة وربما بلغت ستا أو سبعا .
يأكل الفواكه والحبوب والبذور .
إذا طار ظهر ردفه الأصفر الذهبي وكذلك تظهر صفرة جوانب الذيل .
توالده : تبيض الأنثى من ٤ : ٦ بيضات ، لونها بيضاء أو زرقاء شاحبة وبها بقع متفاوتة الأحجام والألوان معتمدة بنية تقريبا .
يتخذ العش غالبا في الأشجار

التفاحي (شكل البحر الأبيض المتوسط)
Linnet (Mediterranean Form)
Acanthis Connabina Mediterranea)
Finch Family

الوصف : الطول حوالي ١٠ بوصة . انظر لوحة (٧) شكل (١)
الوطن : من القواطع : يتوالد صيفا في أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط (الأقاليم الشمالية من أسبانيا إلى البلقان)
في مصر : شائع فيها شتاء في الدلتا ممتدا إلى الفيوم ، وأحيانا في وادي النطرون . يظهر من حوالي ١٠ أكتوبر ، ويستمر حتى أواخر مارس . لم يسجل في سيناء .
مميزاته : يغشى المواطن شبه الصحراوية مثل الأراضي الرملية المكشوفة ذات الأشواك القصيرة المبعثرة ، وتارة على حواف المناطق الزراعية ولا يقف على الأشجار أو الأشواك بل يجثم على الأرض مباشرة . وهو إذا طار ردد صياحه أثناء طيرانه بحالة مستمرة وكذلك إذ يخاف وانزعج طعمه الحبوب والبذور كلية . يحتشد في أسراب صغيرة من ٣ : ١٠ وأحيانا تزيد في وقت الهجرة . حروف ريش القوادم بيضاء تلاحظ في طيرانه أو عند استراحة . في الربيع يظهر الصدر الأحمر في الذكر فقط . وهو أكبر قليلا من الأوروبي وأعمق منه قليلا .

شرشور جبلي — عصفور زغاري
Brambling. (Finch Family)
(Fringilla Montifringilla)

الوصف : الطول حوالي ٥ ٣/٤ بوصة : انظر لوحة (٧) شكل (١٠)
الوطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شمال أوروبا وآسيا ، ويهاجر جنوبا شتاء . وهو شائع شتاء في العراق وفلسطين
في مصر : نادر الزيارة لها شتاء للدلتا ، ولم يسجل من سيناء .
وسجل صدفة منها ومن الاسكندرية . ولم يسجل من جنوب القاهرة .
مميزاته : يشبه الظالم في طبائعه ولكن ردفه أبيض يظهر عند طيرانه بوضوح ، وهو أول ما يلتفت النظر وبهذا تعرف أثناء عن أنثى الظالم . Chaffinch وهو من هواة الوقوف على أغصان شوك العوسج والعليق كما يعرف من تسميتها بالانجليزية Bramble الذي هو العوسج أو العليق وهو شوك معروف .

الحسون (شكل الشرق الأوسط)
Goldfinch (Middle East Form)
(Carduelis Carduelis Niediecki)

الوصف : طوله حوالى ٤ ٣/٤ بوصة . الذكر كالأنثى . انظر الصورة في لوحة (٦) رقم ١
الموطن : من الأوبد ومنه ما يهاجر . يتوالد ويقيم طول السنة في اسيا الصغرى والأردن وفلسطين
وحول رفح والعريش وأدخل في استراليا وغيرها من القارات .
في مصر : يقيم طول السنة حول رفح والعريش في شمال سيناء ، وتهاجر أسراب منه إلى مصر
وخاصة في الدلتا فترى فيها من نوفمبر إلى مارس وأوائل إبريل .^(١)
مميزاته : يشاهد في أسراب صغيرة من ٣ : ١٠ تقريبا ، يغشى السهول الرملية ذات الاشواك
والأعشاب ، وكذلك الأعشاب النامية على جوانب المرتفعات ، وبعض الحقول . طعامه الحبوب
والبذور التي يقتلعها من سنبليها . لا يوجد في المدن أو الحدائق . يشاهد كثيرا في أفاص الزينة وهو
يأكل قلب الحنظل . له بقعة حمراء دموية في جبهته وأخرى صفراء ذهبية في ريش وسط القوائم والخواقي .
الأنثى أعمق قليلا من الذكر . توالده : العش في الأشجار المنخفضة ، البيض : من ٤ : ٦ بيضات .

المصفور السُميلي (يسكن)
Siskin
Carduelis Spinus
Finch Family

الوصف : طوله حوالى ٤,٥ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٦) رقم ٨
الموطن : مهاجر : يتوالد صيفا في غابات جبال وسط أوروبا وشمالها وشمال إيطاليا حيث هو كثير
في الغابات الصنوبرية . يهاجر شتاء إلى حوض البحر الأبيض المتوسط .
في مصر : نادر الزيارة لمصر شتاء .
مميزاته : تظهر الصفرة الذهبية في جوانب الذيل ، طعامه البذور والحبوب . كما تظهر فيه أغطية
ريش الخواقي الصفراء . الذيل مشقوق .

النَّغَر (سيرين)
Serin. (Finch Family)
(Serinus Canaria Serinus.)

الوصف : طوله حوالى ٤,٥ بوصة انظر الصورة لوحة (٦) رقم ١١
الموطن : يتوالد صيفا في قلب أوروبا ، ما عدا أطرافها الشمالية كإنجلترا وشبه جزيرة اسكندناوة ،
ويتحول أحيانا فيها ، ويزور شتاء إيطاليا والبلقان وأسبانيا والبرتغال .
في مصر : يشاهد شتاء بها من نوفمبر إلى مارس وخاصة في الدلتا ولكن ذلك قليل .
مميزات : يغشى الحدائق والمزارع . يشاهد في أسراب ، بطنه صفراء ، مستدير المنقار . طعامه
الحبوب . صوته لذيذ كالكناري يردده في الربيع من فوق قمة الشجرة .

(١) : أدخل في مناطق أخرى من الدنيا مثل استراليا الآن

فجر ترسترام
Tristram's Serin.
(Serinus Canaria Syriacus.
Finch Family

الوصف : طول حوالى ٥, ٤ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٦) رقم ٩
موطنه : من الأوابد . يقيم طول السنة ويتوالد على التلال فى جنوب روسيا والمهرمون ولبنان .
فى مصر : حصل نيقول على واحد منه عند وادى خوف بحلوان مصر فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٩ م
مميزاته : يشاهد فى أسراب طعامه البذور ، كما لسابق . زوره وصدره بنى فتران . التصل الوحشى
لأغطية الجناح أصفر كبرى . البالغ منقاره أحمر وجسمه مشرب بحمرة خفيفة

الزمر المصرى (Egyptian Form) Trumpeter Bullfinch
(Erythrosiza githaginea githaginea)

الوصف : طول حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٦) رقم ٥
موطنه فى مصر : مقيم على حافة الصحراء فى مصر العليا . بين قنا والقصر شتاء .
مميزاته : فى حجم العصفور البيوتى : يرى غائبا فى جماعات . يقف على الأرض مباشرة ، ويجرى
كما لقبرة . طعامه الحبوب . ألوانه تنطفئ فى الربيع وتزهو فى الشتاء عكس المألوف .
توالده : العش تحت الحجارة أو فى شق فى صخرة . البيض ٤ : ٥ خضراء خفيفة بها نقط غالبا .
منقارة قصيرة وغليظ
له أغنية خاصة تشبه صوت (ترميطه — طبله) من الصفيح ولذا يسميه الأجانب العصفور الطبال
كما فى العنوان . جسمه فى الربيع مشرب بحمرة خفيفة . منقاره مائل للحمرة قليلا وقصير . الانثى
كأنثى العصفورة البيوتى

زمر سيناء (Sinai Form) Trumpeter Bullfinch
(Erythropsiza githaginea Crassirostris.)

الوصف : طول حوالى ٦ بوصة . انظر الصورة لـ لوحة (٦) رقم (٦) .
موطنه : مقيم . فى فلسطين وفارس وأفغانستان إلى السندورا جيوتانا
فى مصر : مقيم فى جبال سيناء . ويمكن مشاهدته فى أسراب فى وادى فيران والفيدرات
مميزاته : كالمصرى السابق غير أنه أكبر قليلا .

زمر الجزائر (Algerian Form) Trumpeter Bullfinch
(Eryth Rospiza githaginea Zedlitz)

الوصف : طول حوالى ٦, ٥ بوصة . انظر الصورة لـ لوحة (٦) رقم ٧
موطنه : مقيم طول السنة فى الجزائر وتونس والصحراء الكبرى جنوبا إلى أصبين
فى مصر : التلال شرق النيل ، وقرب القاهرة وحلوان .
مميزاته : خجل يطير من بعيد فى الصحراء — يغشى الأراضي المنزرعة شتاء ، وإذا خاف وانزعج
طار إلى أعلى الصخور العالية . أكبر زملائه . يكثر فيه اللون الوردى عن زملائه .
توالده : البيض ٥ : ٦ زرقاء بها علامات بنية .

فنش سيناء الوردى . Sinai Rose - Finch.
(*Erythrina Sinoa Sinoa*.)

الوصف : طوله حوالى ١/٢ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٦) رقم ١٢
موطنه : مقيم - مصرى بحت - الأجزاء المقفرة من شبه جزيرة سيناء ما عدا شمالها . يرى بها
صيفا على جبالها التى تبلغ ٧ آلاف قدما . يحل كذلك فى بئر فى الأردن ، وسنخفض البحر الميت .
مميزاته : لونه الوردى فى الذكر ، ويصعب رؤيته على الصخور الوردية . جبان . طعامه البذور
والحبوب

الظالم Chaffinch
Fringilla Coelebs Coelebs

الوصف : طوله حوالى ١/٤ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٦) رقم ٤
الموطن : كل أوروبا وغرب سيبيريا من جنوب الدائرة القطبية الشمالية إلى حوض البحر الأبيض
المتوسط فى مصر : مهاجر لها فى الخريف فيصل فى نوفمبر ويبقى بها حتى آخر مارس وخاصة الدلتا وسينا
مميزاته : البقعة البيضاء على الكتف . طعامه الحبوب والحشرات والبراعم . يغشى الحقل
والحدائق يرى فى أسراب أو منفردا .

المصفور البيوتى المصرى (Egyptian Form) House -- Sparrow
(*Passer domesticus niloticus*.)
Weaver - bird Family

الوصف : طوله حوالى ٣/٤ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (٧) رقم ١
الموطن : مقيم فى كل مكان فى الدنيا يحل فيه ، حتى استراليا وأمريكا الجنوبية . ولا يوجد فى
إيطاليا .
فى مصر : كلها ما عدا مرسى مطروح والسلوم ووادى النطرون ولا أية واحدة مصرية ولا القصير ،
وبمرور الزمن إذا عمرت مرسى مطروح الخ نجده فيها لأنه أليف مع الإنسان فى كل مكان .
مميزاته : زوره الأسود وقتته الرمادية فى الذكر . أمام أعيننا فى كل مكان . طعامه الحبوب أغطية
القوادم الكبرى فقط أطرافها بيضاء .
توالده : البيض ٤ : ٥ ، عادة ٤ لونها أغبر فقط . العش فى أى مكان فى الشجر والبنبان
الخ .

المصفور البيوتى الفلسطينى (Palestine Form) House - Sparrow
(*Passer domesticus biblicus*)
Weaver Bird Family

الوصف : طوله ٦ بوصة تقريبا . كما لمصرى تماما ولكنه أكبر منه . الصورة لوحة (٧) رقم ٢
الموطن : مقيم فى فلسطين وسوريا والعراق وسينا
فى مصر : الطور وأبو زينة . ليس دائم الإقامة فى سيناء .
مميزاته : كالسابق فى كل شئ .

عصفور وادى حلفا البيوت (Wadi Halfa Form) House - Sparrow

Passer domesticus halfae

Weaver - Bird Family

الوصف : طوله حوالى ٦ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٧) رقم ٣
الموطن : مقيم في وادى حلفا ويخترق الحدود عند أبى سنبل مصرى
مميزاته : شكله كالمصرى ما عدا أغشية الأذن فهى أفتح بياضا ، واللون القسطلى واضح في
الوشاح وأغمق . الباقي كالمصرى .

العصفور البيوت الايطالى Italian Sparrow

Passer italiae italiae

Weaver Bird Family

الوصف : طوله حوالى ٥ ٣/٤ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٧) رقم ٤ .
الموطن : مقيم في إيطاليا وقورسقا وصقلية وكريد .
في مصر : تجول فيها ، وحصل عليه مبرز تزهاجن في ٢١ يناير سنة ١٩٢٠ عند السلوم .
مميزاته وطبائعه : كل الفنة لونها قسطلى جذاب . الباقي كالمصرى . أنثاه كأنثى المصرى تماما . أغشية
القوائم الصغرى أطرافها فقط هى البيضاء .

العصفور الأسبانى الغربى (Western Form) Spanish Sparrow

Passer hispaniolensis hispaniolensis

Weaver Bird Family

الوصف : طوله حوالى ٥ ٣/٤ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٧) رقم ٥٠
مكانه : من الأوايد والقواطع معا . يتوالد صيفا في حوض البحر الأبيض المتوسط (من جبل
طارق إلى آسيا الصغرى) .
في مصر : يشاهد بكثرة في أسراب هائلة في حقول القمح في مارس وإبريل ومايو ، وكذلك في
الحريف في أسراب تغزو حقول الأرز ، كما يشاهد بقلة في الشتاء ، ولا يتجول أبعد من الأقصر جنوبا .
ويوجد كذلك في الفيوم .
مميزاته : يمتاز بالنقط السوداء في أجزائه السفلى ورأسه القسطلى مع قفاه . وذقنه ومقدم صدره
أسودين . يهلك محاصيل القمح . دائما في أسراب . يختلط بالبيوت . الأنثى كالمصرى ولكن الخاصرة
بها خطوط غامقة .
توالده : لم يعثر على أفراد منه تتوالد في مصر .

العصفور الأسباني الشرقي (Spanish Sparrow (Eastern Form)

Passer hispaniolensis transcaspicus

Weaver Bird Family

الوصف : طوله حوالي ٦ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٧) رقم ٦ .
توزيعه : مقيم ومهاجر . يتوالد في وسط آسيا جنوبا إلى أفغانستان ، وفلسطين حيث يكثر خلال السنة ومعظمه في الأردن . وهو أكبر قليلا من الغربى .
في مصر : يشاهد شتاء في سيناء . قد حل وأقام في الفيوم . يشاهد شتاء أيضا في مصر .
مميزاته : أجزاء الذكر العليا أفتح لونا ، والنصل الوحشى في الوشاح أوضح من الغربى . الساقى كالغربى . أغطية القوادم الصغرى والكبرى بيضاء .

عصفور الشجرة البيوق Tree-sparrow

(*Passer montanus*)

Weaver-bird Family

الوصف : طوله ٥ ١/٤ بوصة . انظر الصورة لوحة (٧) رقم ٧
الموطن : مقيم . كل أوروبا ما عدا البلقان وشمال شرق اسكتلندا ، وأدخل في أستراليا
في مصر : سجله هيجلن مرة كزائر شتوى لمصر ، ولم يعثر عليه لآن . ويحتمل وجوده
مميزاته : كل القنة بنية واضحة مع الرأس . له بقعة سوداء واضحة على أغطية الأذن . وأطراف عطة القوادم الكبرى والصغرى بيضاء

عصفور الصخر الباهت Pale Rock-sparrow

Carpospiza brachydactyla

Weaver bird Family

الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٤ بوصة انظر الصورة أمام الصفحة ٢٤ رقم (٨) لوحة (٧)
توزيعه : آبد . الصحارى من جنوب فارس إلى بلاد العرب وسواحل البحر الأحمر .
في مصر : أحضر مينر تزهاجن واحدا منه عند العريش في سيناء في ٢ ابريل سنة ١٩١٧ م .
مميزاته : ليس له لون أصفر في زوره ومقدم صدره . شبيه بأنثى البيوق المصرى ، ولكنه أفتح منه لونا . الذيل به نقط بيضاء في أطرافه . يتوالد في الأشجار وليس في الصخور كزميله ، الذكر كالأنثى .




(١) ص ٣٠٤
Ringed Plover



(٢) ص ٣٠٤
Little - Ringed
Plover.



(٣) ص ٣٠٥
Kentish Plover




ص ٥٨ بالغ شتاء
(٤) Cirl Bunting.




(٧) Tree-Pipit.




ص ٥٩ أول الصيف
بالغ في الربيع
(٥) Black-headed-Bunting




(٨) Meadow-Pipit



ص ٥٨ بالغ صيفا
أول الشتاء
(٦) Ortolan Bunting








(٩) Richard pipit.



(١٠) Tawny Pipit

ص ٧٥



عصفور أحمر هندي (الأماندافا) Amandavat

(Amandava amandava.)

weaver-bird Family

الوصف : طوله حوالى ٤ بوصة . انظر الصورة لوحة (٧) رقم ٩

وجوده : مقيم . يتوالد في الهند شرقا إلى جنوب الصين . أدخل إلى موريتيوس (جزيرة في المحيط الهندي شرق جزيرة مدغشقر عند خط عرض ٢٠° جنوب خط الاستواء) ، ومصر ، وقد كان من عهد قريب جدا شائع الوجود قرب الجزيرة وأنشاص وبلبيس وعند القناطر الخيرية حيث الحدائق تجم كل بقعة في جميع ما سبق ، ولكنه الآن يظهر أنه قد اختفى . وقد سجل هاشيسكو وجود هذا العصفور من الفيوم . وأول ظهوره في الدلتا كان في عام ١٩٠٥ م ، ثم اختفى نهائيا بعد عام ١٩٢٤ م من الدلتا ، ولو أن مينا تزهاجن رأى قليلا منه عند الأقصر في فبراير سنة ١٩٢٨ .
مميزاته : فنش صغير يغشى الحدائق وقرار القصب (البوص) صوته كصوت كتكوت صغير فد ضل الطريق .

توالده : العش في الأشجار الكبيرة وتارة على الأرض في المستنقعات . البيض من ٥ - ٨

جنس الدرس (امبريزا) Genus Emberiza

Bunting Family الدرس Buntings^(١)

يدخل في مجموعة وعائلة وفصيلة الفرنجليداى ، ويمتاز بأن خط انطباع الفكين ليس في استقامة واحدة ، ولبعض منها سنة قرنية في سقف حلق الفك العلوى كما في درسة القمح . محدود الوجود في الدنيا القديمة ، وبعض الأجناس الشبيهة به توجد في الدنيا الجديدة . ويوجد منه نحو ٣١ نوعا في الإقليم البلياركتك والموجودة منه في العالم كله هو الآن ١٩٧ واحدة .

درسة القمح Cornbunting

Emberiza calandra calandra

الوصف : اسمها كذلك Common bunting طولها حوالى ٧ بوصة انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ١

الموطن : مهاجرة : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا شبه جزيرة اسكتلندا وكذلك في شمال غرب إفريقيا وقناريا وفلسطين وآسيا الصغرى وفارس وشرق آسيا وغربها .
في مصر : تشاهد في الدلتا وسينا شتاء من نوفمبر إلى آخر مارس .

(١) قسم فيشر ، بيترسون ، عائلة الدرس Family Embrizini التي تحتوى على الدرس Buntings + العصافير الأمريكية American Sparrows إلى ٥٦ جنسا تشمل ١٩٩ نوعا والموجود منها حاليا هو ١٩٧ نوعا Species

المميزات : تحتشد في أسراب . طعامها الحبوب والبذور مضافا إلى الحشرات . تغشى أراضي القمح والبرسيم وتقتلع القمح من سنابله كما يشير إليها اسمها بذلك . لها غدة شبه متحجرة في حجم (دُخْرِيْجَة القمح) في سقف حلق الفك العلوى عندما تطير من مكانها إلى مسافة قصيرة تدلى رجليها عادة .

درسة سِيرْل Cirl Bunting (*Emberiza cirius cirius*)

الوصف : طولها حوالى ٦ ¼ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ٧ ، لوحة رقم (٤) .
التوزيع : مهاجرة تتوالد صيفا في جنوب أوروبا (البلقان وإيطاليا وألبانيا وفرنسا وجنوب إنجلترا) وفي مراكش والجزائر وصقلية . وتحوّلت في مالطة . كذلك تتوالد في آسيا الصغرى . تمتاز بذقتها الأسود . توجد مثنى غالبا .
في مصر : صيدت واحدة فقط بواسطة اسكرادار عند دمياط في سنة ١٨٧٩ م . وتعرف بردها الزيتونى والبقة السوداء على الذقن تحت المنقار مباشرة .

درسة سنجابية Cinereous Bunting *Emberiza cineracea semenowi*

الوصف : طولها حوالى ٧ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ٥
الموطن : مهاجرة : تتوالد صيفا في سوريا وفارس ، وتهاجر شتاء إلى السودان وإريتريا وجنوب غرب بلاد العرب .
في مصر : أحضر اسكرادار ٥ منها لمينرتزهاجن من الإيكويت على البحر الأحمر وحصل على واحد منها وكان ذكرا من جبل علبة في ١٢ إبريل سنة ١٩٢٨ .
المميزات : تمتاز بزورها الأصفر . أكثر ما تشاهد شتاء هو على سواحل البحر الأحمر ، الجسم رمادى^(١)

درسة أُرْتُلَانْ Ortolan Bunting (*Emberiza hortulana* .)

الوصف : طولها حوالى ٦ ¼ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ٢ ، لوحة ٨ رقم (٦)
المكان : من القواطع : تتوافر صيفا في كل أوروبا تقريبا ما عدا الجزائر البريطانية وجنوب إيطاليا .

(١) الأنثى : القنة بنى رمادى . الزور بنى مصفر . أعلى الصدر بنى .

في مصر : شائعة الظهور في مصر في الربيع ولكن بقلة جدا ، ونادرة في الخريف ، وربما كان ذلك لمرورها على مصر في هجرتها بدون طويل مكث فيها في الخريف لأنها لا توجد فيها شتاء بل تشتت في السودان والحبيشة .

مميزاتها : لها دوائر أصفر حول العين ، والذقن صفراء ، والرأس والصدر أخضر زيتوني

درسة كرتز شممار Cretzschmar's Bunting *Emberiza coesia*

الوصف : طولها حوالي ٦ ١/٤ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ٦
الموطن : من القواطع . تتوالد صيفا في جنوب شرق أوروبا وآسيا الصغرى والقوقاز . وتشتت في شمال شرق إفريقيا وجنوب بلاد العرب .
في مصر : تشاهد في الخريف في مصر وسينا من ٢٥ أغسطس إلى ٢٤ سبتمبر ، وفي الربيع من ١٢ مارس إلى ٩ إبريل .

مميزاتها : طعامها الحبوب على سطح الأرض : تأوى الحداثق والأراضي الزراعية . هي في شكلها مثل درسة أرتلان غير أن صدرها ورأسها يميلان للون الرصاصي . الزور مائل للون البرتقالي بدلا من الأصفر في درسة أرتلان . قليل العثور عليها في مصر .

درسة سوداء الرأس Black-headed Bunting (*Emberiza melanocephala*)

الوصف : طولها حوالي ٦ ١/٤ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ٤ ، لوحة ٨ رقم (٥) .
المكان : مهاجرة : تتوالد صيفا في شبه جزيرة البلقان وساحل إيطاليا الشرقي . وفي آسيا الصغرى وفلسطين وقبرص وجنوب روسيا . تهاجر في الخريف إلى الهند .
في مصر : سجلت مرة داخل الحدود المصرية من وادي فيران في ٢٥ أغسطس سنة ١٩١١ م .
مميزاتها : طعامها الحبوب . رأسها أسود . جسمها أصفر من أسفل ، وبني من أعلى ، تغشى الحداثق والأراضي الزراعية .

درسة مخططة آسيوية Striolated Bunting (Asiatic Form) (*Emberiza striolata striolata*)

الوصف : طولها حوالي ٥ ١/٤ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ٩ .
الموطن : من الأوباد (مقيمة) : تقيم طول السنة في المواطن شبه الصحراوية من شمال غرب إلى بلاد العرب ومنخفض البحر الميت والسودان .

في مصر : نادرة الوجود في مصر في وادي فيران في سيناء حيث حصل اسكردادار ومينر تزهاجن على أفراد منها في مارس وأغسطس . تتوالد غالبا هناك .
مميزاتها : صغيرة الجسم . صوتها كصوت الفنش . ليس لها لون أبيض في الذيل : لها خطوط على الزور والصدر . أكثر لونها بني . الأنثى أغمق من الذكر . الصدر والزور رماديان التوالد : العش من القش على الأرض أو الصخر . البيض لم يعثر عليه .

درسة مخططة (شكل الصحراء الكبرى) Striolated Bunting (Saharan Form) Embering striolata sahari

الوصف : طولها حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ١٠
الموطن : من الأوايد ، وقد تتجول أحيانا . تتوالد وتقيم طول السنة في تونس والجزائر ومراكش وجنوبا إلى إقليم الطوارج .
في مصر : قد تتجول إلى مصر . حصل مينر تزهاجن على ذكر من السلوم في ٢٨ يناير سنة ١٩٢٨ . تمحلت كذلك إلى جنوب أسبانيا وجزائر قناريا .
مميزاتها : كالسابقة ولكن الأجزاء العليا أغمق بكثير من سابقتها الآسيوية في اللون البني وأفتح منها في اللون الرمادي . الرأس به خطوط ولكن ليست متقاربة كالأسيوية . أكبر قليلا من الآسيوية . تغطي الواحات والقرى والمواطن الصخرية محدودة في مواطن توالدها . تقف دائما على سطح الأرض . طعامها الحبوب والبذور مضافا إلى الحشرات .

درسة القصب الدلماشية Reed Bunting (Dalmatian Form .) (Emberiza schoeniclus canneti)

الوصف : طولها حوالي ٥ ٣/٤ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم ٨
الموطن : من القواطع . تتوالد صيفا في جنوب هونغاريا ، ودلماشيا ، وبلغاريا ، والصرب والبوسنة والبنانيا . وتقضى الشتاء في قبرص واليونان وآسيا الصغرى .
في مصر : حصل عليها لينز lynes في ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٦ م عند بور سعيد حيث شاهد اثنين منها واصطاد واحدة منها . ورآها أيضا مينر تزهاجن عند السلوم في سرب في ٢٨ يناير سنة ١٩٢٨ م واصطاد ذكرها منها .
المميزات : هي شكل المصفور البيوق تماما في الأجزاء العليا والسفلى ، غير أن الرأس أسود وكذلك الذقن وأعلى الصدر شكلها أسود يشقها خط أبيض عريض مائل وهذا في الذكر - لها بياض في ريش الذيل الجانبي الذيل منتشر دائما . تغطي قرار القصب والمستنقعات .

درسة القصب الإيطالية
Reed Bunting (Italian Form)
(Emberiza schoeniclus compiler)

الوصف : طولها حوالي ٦ بوصة . انظر الصورة في لوحة (٩) رقم (٣) .
الموطن : من الأوايد وقد تتجول أحيانا . تتوالد في إيطاليا جنوبا إلى صقلية ، كذلك في آسبانيا وجنوب فرنسا .
في مصر : حصل شلٌ على أنثى من دمياط في ٢٢ مارس سنة ١٨٧١ م موجودة الآن بالمتحف البريطاني .

مميزاتها : طبائعها وعاداتها كسابقتها ، غير أن المنقار أغلظ ، والخطوط البنية في الخاصرة مائلة للحمرة ، والأجزاء العليا أغمق من سابقتها ، ولكن المنقار الغليظ هو أهم ميزة لها .

عائلة القُبر أو الفصيلة القُنبيرية

(Larks. Family (Alaudidae)

Lark Family

تتكون هذه الفصيلة من حوالي ٨٠ نوع (١) Species يقطن معظمها إفريقية ، ويقطن في مصر خاصة منها ٢٩ نوعا والباقي في أوروبا ، وآسيا وجزيرة مدغشقر . وهناك نوع واحد يقطن استراليا أبقع اللون ، وآخر جُلب إلى أمريكا الشمالية وانتشر فيها وهو قنبرة الغيط أو قنبرة الرياض — Meadow lark ، كما أن بها قنبرة الألب التي تمتد ويصل مدى وجودها إلى القطب الشمالي . ولا توجد القناير في أمريكا الجنوبية أو الوسطى أو فلوريد أو جرينلان أو شمال آسيا في سيبيريا . ويحتوى القبر أبو شوشة على حوالي ٥٢ نوعا منه كلها تقريبا قريبة الشبه من بعض ، ولا يميزها عن بعضها إلا فروق ضئيلة . وتفرخ القناير مرتين أو ثلاثا في السنة ، ولذا تطول فترة الغزل عندها ، وهذا هو السبب في كثرة شلدها وغنائها وخاصة على جناح الهواء . وهي أكثر ما ترى مثنى ، وأحيانا فرادى ، وكثيرا في أسراب وخاصة في الأفراد المهاجرة وهي التي تقطن المناطق الشمالية مثل قنبرة السماء ، أما التي في الجنوب فهي عادة من الأوايد .

منها ماله زوائد ريشية (شوشة) تخرج من وسط القننة ، ومنها ما ليس له هذه الزوائد ، ومنها ما له شوشتان على كلا جانبي القننة مثل القنبرة القرناء Horned lark.

ويلاحظ أن كل قنبرة تقطن المكان الذي يكون بلون ريشها ، فالقنبرة الغامقة تقطن التربة السوداء كما في الدلتا عندنا ، أما القنبرة التي تأوى إلى الصحارى فهي رملية فاتحة اللون ، وهكذا حتى يصعب رؤيتها إذا أرادها الصياد بأذى فيكون ذلك كالحماية الطبيعية لها Natural Protection ولا ترى إلا إذا تحركت . على أن منها ما يأوى إلى الأراضي الزراعية والمروج والسهول ذات الحشائش والأعشاب القصيرة (الاسبتس) طعامها الحشرات وخاصة في ذات المناقير الضعيفة الطويلة المستدقة ، أما القصيرة

(١) نعرف منها ٧٨ والذي على قيد الحياة هو ٧٥ وهي عالمية ما عدا أمريكا الجنوبية وجرينلاند ، وهو ١٥ جنسا - وفي تناب حياة الحيوان للدوميرى محاولة عن القنبرة .

الغليظة القوية فهي تأكل الحبوب والبذور زيادة على الحشرات . وهي تجرى على الأرض عادة بمجرد وقوفها ، على أنها تجرى على الأرض بحثاً عن طعامها ، ومنها ما يقف على الأشجار كذلك على الصخور أو الرمال ، على أنها أكثر ما تشاهد وهي على الأرض . غلبها الخلفى طويل مستقيم تقريباً . وهي إذا أمّنت اقتربت من الناس وخاصة في القرى وضواحي المدن ، أما في الصحراء فتكون عادة جبانة خوافة لبعدها عن الناس ، وعدم الفتها للعمران . وكثيراً ما تتمرغ في التراب في الطرق الطينية والأراضي الرملية الخ .

العش في منخفض في الأرض يبطن بالقش والزغب ، تضع الأنثى به من ٤ : ٦ بيضات في أول الأمر ، ثم من ٣ : ٥ بيضات في المرة الثانية .

القبرة الغليظة المنقار Thick - billed Lark (Ramphocorys Colt - bey)

الوصف : طولها حوالي ٧ ¼ بوصة . انظر الصورة في لوحة (١٠) رقم (١)
الموطن : من الأوابد : تتوالد في هضاب شمال الصحراء الكبرى الصحيرية في الجزائر وتونس وسيرينكا .

في مصر : يحتل أن تكون مقيمة طول العام فيها ، حيث صيدت أفراد منها من طريق القاهرة - السويس عام ١٩٢٢ ، ٢٣ ، ٢٨ م .

مميزاتها : غليظة المنقار . بها بقع سوداء منتظمة في أجزائها السفلى . تغشى الصحراء ذات الحجارة . خوافة وخجولة عادة . طيرانها منخفض وقريب من سطح الأرض . يلاحظ أثناء طيرانها البياض في أجنحتها مثل مطاء الصحراء (Bifaciated lark) الأنثى كالذكر وأحياناً أشد حمرة منها توالدها : تتوالد على سطح الأرض ؟ ولم يعلم بالضبط عدد البيض غير أنه بنفسجي فاتح اللون .

الأساوة Calandra lark (M elanocoryypha calandra calandra)

الوصف : طولها حوالي ٨ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٠) رقم (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفاً في جنوب أوروبا في حوض البحر الأبيض المتوسط (البلقان وإيطاليا وألبانيا) ، وجنوب روسيا وآسيا ، في الجزائر وتونس والقوقاز .

في مصر : تزور مصر وسيناء عادة في المنطقة الساحلية فقط من السلوم إلى بورسعيد ولا تبعد جنوباً أكثر من الدلتا (من ٢٠ نوفمبر إلى آخر يناير) .

مميزاتها وطبائعها : قليلة الوجود - تغشى الأراضي الزراعية والعشبية . لها بقعة سوداء على الصدر من الجانبين . لون حروف الحوائق والقوام الخارجية أبيض يظهر أثناء الطيران بوضوح توجد في أسراب متفرقة عادة . الشقان متماثلان (١)

(١) صوتها مثل صوت قبرة الساء ص ٤٤ ، ولكنه أكثر منها ارتفاعاً .

قبرة بمكّلاتد = الأساوة الشرقية
Bimaculated lark = Eastern calandra Lark
(*Menlanocorypha bimaculata*)

الوصف : طولها حوالي ٧ ½ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٠) رقم (٣)
المكان : من القواطع : تتوالد صيفاً على جبال وتلال منطقة بحر قزوين ، وجنوباً إلى أفغانستان وفارس وآسيا الصغرى وسوريا .
تهاجر شتاء جنوباً إلى الهند وبلاد العرب والسودان .
في مصر : نادرة الهجرة شتاء لمصر ، وحصل ميتر تزهاجن على اثنين منها في طريق قنا - القصير في ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٨ .

مميزاتها وطبائعها : كالسابقة . تشاهد دائماً في بلاد العرب والسودان مثني ، أو فرادي - تغشي الجبال . تفضل الصحراء شتاء . من الصعب تمييزها عن القبرة القصيرة الأصابع (العلعل) إلا بصوتها . ليس لها لون أبيض في ذيلها أو جناحيها في طيرانها . الذكر كالأنثى وهي شبه الأساوة فيها بقعتان سوداوان على الجانبين وعلى الصدر ولكنها أقل سمكاً منها في الأساوة .

علعل أو قبرة قصيرة الأصابع (طراز البحر الأبيض المتوسط)
Short-toed lark (Mediterranean Form)
(*Calandrella brachydactyla brachydactyla*)

الوصف : طولها ٥ ½ بوصة . انظر الصور لوحة (١٠) رقم (٤)
توزيعها : من القواطع : تتوالد صيفاً في حوض البحر الأبيض المتوسط (جنوب أوروبا ووسطها وشمال غرب إفريقيا) وآسيا الصغرى وفارس . وتقضى الشتاء في الصحراء الكبرى والسودان والحبشة وشمال غرب الهند .
في مصر . تمر عليها في الربيع والخريف في جموع كبيرة ويندر أن يبقى منها أفراد شتاء ، تشاهد جماعات في الدلتا من ٢٧ أغسطس إلى آخر سبتمبر ، ومن ٩ مارس إلى ٧ إبريل .
مميزاتها وطبائعها : دائماً في أسراب في الأراضي غير المنزرعة . تردد صوتها وهي في طيرانها وإذا حطت على الأرض سكنت طعامها الحبوب والحشرات . ليس لها بقعة سوداء على كلا جانبي الرقبة ^(١) ولا كذلك نقط بها كغيرها . الشقان متماثلان .

(١) قد توجد هذه البقعة البنية الخفيفة أحياناً .

القبرة القصيرة الأصابع الشرقية
Short toed lark (Eastern Form)
(Calandrella brachydactyla longipennis)

الوصف : طولها ٥ ¼ بوصة . انظر الصورة في لوحة (١٠) رقم (٥)
الموطن : من القواطع تتوالد صيفا في منطقة بحر قزوين والتركستان وأفغانستان .
في مصر : قليل منها يتجه إلى مصر وسينا شتاء ، وحصل ميزتهاجن على افراد منها في سبتمبر
دايريل .
مميزاتها وطوائعها : كالسابقة : غير أنها ليس فيها لون رملي كالسابقة ، ولكنها تميل للون
الرمادي .

القبرة القصيرة الأصابع الفلسطينية
Short toed Lark (Palestine Form)
(Calandrella brachydactyla hermonensis)

الوصف : طولها ٥ ¼ بوصة . انظر الصورة في لوحة (١٠) رقم (٦)
موطنها : مقيمة طول السنة في فلسطين ، وبعض الأفراد تتجول شتاء إلى شمال أفريقية
والسودان .
في مصر : بعضها يقيم طول السنة ، وبعضها يزورها شتاء من فلسطين . صيدت من وادي
النطرون في إبريل ومايو وأكتوبر كذلك من السويس والجيزة وبور سعيد ، وفي منتصف الطريق بين
الواحات الداخلة والخارجة .
مميزاتها : أشد حمرة رملية من سابقتها . منقارها أشد صفرة . تختص بالصحراء أكثر من
السابقتين . الباقي كزيميلتها .
التوالد : لم يعثر على بيض لها رغم أنها شوهدت بعيدة عن عشها في وادي النطرون .

عليلة الصحراء الكبرى
Lesser Short toed Lark (Saharan Form)
(Calandrella rufescens minor)

الوصف : طولها حوالي ٥ ¼ بوصة . انظر الصورة في لوحة (١٠) رقم ٧
الموطن : مقيمة ومتجولة أحيانا شتاء . تتوالد في صحراء شمال غرب إفريقية من مراکش إلى
الجزائر وتونس ، كذلك في فلسطين في جنوبها .
في مصر : نادرة المشاهدة في مصر في تجوالها ، وشوهدت عند أهرام الجيزة ومريوط وشمال سيناء
في الربيع والحريف .




Thick-billed Lark.



(Mediterranean)
Short-toed Lark



Short-toed Lark
Eastern Form




Short-toed
Lark (Palestine Form)



Calandra Lark



Bimaculated Lark
(Eastern Cealandra Lark)



Finch Lark



Lesser Short-toed Lark
(Saharan Form.)




Lesser Short-toed Lark
(European Form.)



Lesser Short-toed Lark
(Egyptian Form)




Desert Lark
(Egyptian Form.)



Desert
(Isabelline Form)



Bar-tailed
Desert Lark.



Sinai Desert-Lark.

مميزاتها : كغيرها من زميلاتها . لها نقط واضحة على الصدر وليس لها بقعة على الرقبة ، وأجزاءها العليا بنية رملية ولها خط فوق العين ، الصدر أصفر جلدي باهت به خطوط أو نقط أغمق .

العليلة الأوروبية

Lesser Short toed Lark (European Form)
(*Calandrella rufescens heinei*)

الوصف : طولها ٥ ١/٤ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٠) رقم (٨)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في منطقة بحر قزوين ، وسهول جنوب روسيا وجنوب أسبانيا .
في مصر : نادرة الرؤى يا بها شتاء ، شوهدت في بورسعيد في ٢١ أكتوبر ، وأخرى بالإسكندرية في ٢٧ ديسمبر . تتجول إلى مالطة والعراق .
مميزاتها : أجزاءها العليا مائلة للرمادي هي أهم ملاحظة على الردف - أكبر قليلا من عليلة الصحراء السابقة .

العليلة المصرية

Lesser Short - toed Lark (Egyptian Form)
(*Calandrella rufescens nicolli*)

الوصف : طولها حوالي ٥ ١/٤ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٠) رقم (٩)
الموطن : مقيمة . محصورة في شمال الدلتا المصرية وسواحلها من الإسكندرية ، إلى بورسعيد .
في مصر : كما ذكر
مميزاتها وطياتها : توجد في الأقاليم الخالية من الزراعة وتكون على هيئة أسراب فيها في الخريف . جسمها أغمق من سابقتها والناهض أجزاءه العليا حمراء رملية وحروف الريش صفراء جلدية ، والأجزاء السفلى صفراء جلدية بها خطوط بنية على الصدر .
التوالد : العش على سطح الأرض مباشرة يطن بالزغب ، والبيض أبيض مخضر به بقع بنية . يوضع البيض بين إبريل ويوليو . وتبيض الأنثى مرتين في السنة .

قبرة الصحراء المصرية

Desert Lark (Egyptian Form)
(*Ammomanes deserti deserti*)

الوصف : طولها حوالي ٥,٧٥ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٠) رقم ١٠
التوزيع : تقيم طول العام في وادي النيل في مصر من قنا إلى قلب الأقصر وأسوان ووادي حلفا - وفي الطريق بين قنا والقصر ، وحول القصير على البحر الأحمر . ولا تشاهد خارج الحدود المصرية ما عدا في أقصى شمال السودان .

مميزاتها : من طيور الصحراء البحتة ، وقد تغشى الأماكن الزراعية على حواف الصحراء ، تحب الاختباء ، ويصعب أن يراها الإنسان مكشوفة في الصحراء واقفة على صخرة . صوتها منخفض . توجد مثنى وفي أسراب صغيرة من ٧ : ٨ تقريباً في غير التوالد . أجزاؤها العليا رمادية رمادية بها نقط بنية غامقة على الذقن والزور . أعطية باطن الجناح رملي قرنفلي .

التوالد : تحت حجرة أو صخرة في الصحراء أو تحت شجرة صغيرة صحراوية . العش يبنى من القش والأزهار الجافة الصحراوية ، أحياناً تحمي جوانب العش المكشوفة ضد الريح والأنربة بسور صغير من الحصى . البيض من ٣ : ٤ أبيض رائق وأحياناً به بقع بنية غامقة وفاتحة .

ملاحظة : الذكر كالأُنثى .

قبرة الصحراء الرملية اللون

Desert Lark (Isabelline Form)
(*Ammomanes deserti isabelline*)

الوصف : طولها حوالي ٥,٧٥ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٠) رقم (١١)

الموطن : من الأوايد : تقيم في مصر في سيناء بالقرب من العقبة ، وكذلك على جانب النيل الشرقي قرب القاهرة ولكن قليل من يلاحظها ، كذلك تشاهد على تلال المقطم ، وفي طريق القاهرة - السويس ، وحول حلوان ، كما تكثر في الواحات الداخلة والخارجة

مميزاتها وطبائعها كسابقتها .

قبرة سيناء الصحراوية

Sinai Desert Lark
(*Ammomanes deserti katherinae*)

الوصف : طولها حوالي ٥,٧٥ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٠) رقم (١٢)

الموطن : من الأوايد : تقيم على تلال جنوب سيناء وعلى هضبتها الشمالية قرب نخل . وهي كثيرة في وادي فيران .

مميزاتها وعاداتها : ترى عادة في أواسط الشتاء على جبال سيناء وهي تتناول طعامها على أكوام الثلوج . أغمق من القبرة السابقة خصوصاً الفنة ، كذلك الأجزاء السفلى أكثر عتياً .

قبرة الصحراء الموشمة الذنب

Bar - tailed Desert Lark (Saharan Form)
(Ammomanes phoenicura arenicolor)

الوصف : طولها حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر الصورة لوحه (١٠) رقم (١٣)
التوزيع : من الأوايد : تقيم في الجزائر وخلال الصحراء الكبرى إلى مصر كذلك في سينا وشمال
غرب بلاد العرب والسودان وجنوب الصحراء الكبرى في إقليم الطوارج .
في مصر : من الأوايد : شائعة في الصحراء المصرية طول السنة من السلوم جنوبا إلى سيوه ، وفي
الصحارى حول الفيوم ووادي النطرون ، وشوهدت في الواحات الداخلة والخارجة . كذلك ترى في
طريق القاهرة - السويس ، على أنها نادرة الوجود في سينا .
مميزاتها وطبائعها : كغيرها غير أن أجزاءها العليا حمراء رملية مغطاة بلون رمادى ، والقنة بها
خطوط بنية غامقة . أطراف القرواد بني غامق . الصدر والبطن لونها رملي فاتح . أطراف الذيل
مائلة للسواد ما عدا ريشتيه الوسطيتين فهما على نمط واحد وبدون نقط فلونها أحمر اللون رملي . الشقان
متماثلان .

القبرة الحسونية Finch lark

(Eremopterix nigriceps melanauchen)

الوصف : طولها حوالى ٤ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (١٠) شكل (١٤)
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة في الحبشة وسواحل البحر الأحمر والسودان والصومال
وسومطرة .
في مصر : نادرة الإقامة فيها : وصيدت في سبتمبر من وادي النطرون وشتاء من الواحات
الداخلة .
مميزاتها وعاداتها : اللون الأسود في الذكر ، صغيرة الجسم في حجم الفنش ، ومنقارها كمنقاره ،
والأنثى ليس بها سواد ما عدا باطن أغطية الجناح . مختصة فقط بالصحراء .
يمتاز الذكر باللون الأحمر الرملي في أجزائه العليا .
ليس بالأنثى سواد إلا تحت الجناح فقط .

كلمة عن القبر المتوج Galerida cristata

انظر الملاحظات والكلام عليه في صفحة ٣٢ ابتداء من السطر (١١)

القبيرة المتوجة المعتمدة
Dark Crested Lark
Galerida Cristata nigricans

الوصف : طولها حوالى ٦ ¼ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ١

الموطن : من الأوابد . تقيم طول السنة في مصر في الدلتا . وقد تتجول شتاء .

مميزاتها وطبائعها : معروفة لدينا وأمام أعيننا في كل مكان في الدلتا . تشاهد مثنى وفردى ولا تتجمع إلا عند الغذاء بجوار حظائر الماشية . تمشى دائما بتكبر على سطح الأرض ولا تقف على أسلاك البرق أبدا إلا نادرا بل على أعمدته وذلك قليل أيضا . طعامها الديدان والحشرات . تصبح غالبا في طيرانها عند التزاوج خاصة وقد تعلو إلى الجوع على مسافة ٥٠ مترا تقريبا مع صياح دائم ثم تنهبط فجأة إلى الأرض تغشى الأراضي الزراعية وغير الزراعية ولكن غير الصحراء . الشقان متمائلان .

س : التوالد : العش في فجوة على سطح الأرض بين الأدغال والحشائش ، يخفى جيدا ، ويبطن بالقش والزغب . البيض من ٢ : ٤ ، عادة ثلاث بيضات بيضاء مغبرة ومدة الحضانة من ١٢ : ١٣ يوما . والتوالد في الربيع والصيف .

القبيرة المتوجة الوسطى
Crested lark (Intermediate Form)
(Galerida cristata maculata)

الوصف : طولها حوالى ٧ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم (٢)

الموطن : من الأوابد : تقيم طول السنة على حواف الدلتا المصرية (لا تحمل أبدا في الصحراء ، وأحيانا توجد على مسافة ٢٠ ميلا داخل الدلتا .)

وتحمل متجولة في شرق قناة السويس وغرب مريوط ويعيدا في أعلى النيل إلى أسوان وتتقابل مع قبيرة وادي حلفا بين هذا المكان وبين وادي حلفا . تحمل كذلك في الفيوم .

مميزاتها : أفتح لونا من سابقتها . الباقي كغيرها من الطبائع والتوالد ، والبيض يوضع في مارس (في أوائله)

قبيرة وادي حلفا المتوجة
Crested Lark (Wadi Halfa Form)
(Galerida Cristata halfae.)

الوصف : طولها حوالى ٦ ¼ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ٣

الموطن : من الأوابد : تقيم وتتوالد في المنطقة ما بين أبي سنبل على النيل مباشرة إلى شمال وادي حلفا وجنوبا إلى الشلال الثاني . محدودة الوجود على كلا جانبي النيل .

مميزاتها . لونها وسط بين القيرتين السابقتين ، أى أغرق من القبيرة الوسطى ، وأفتح من القبيرة إلغامقة . لا توجد في الواحات أو في طريق قنا والقصير أو في القصير على البحر الأحمر ولا أية قبيرة أخرى متوجة .

القبيرة المتوجة الآسيوية
Crested lark (Asiatic Form.)
(Galerida cristata magna.)

الوصف : طولها حوالي ٦,٧٥ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ٤
المكان : من الأوبد ، وقد تتجول أحيانا . تتوالد في وسط آسيا وفارس والعراق وفلسطين
وشمال بلاد العرب والأردن وسينا والمنطقة الساحلية من الإسكندرية إلى السلوم وكذلك في وادي
النطرون . وقد تتجول هذه القبيرة في غرب أوروبا ولكن ذلك نادر ،

القبيرة المتوجة الصغيرة المنقار
Small-billed crested lark.
Galerida theklae cyrenaicoe.

الوصف : طولها حوالي ٦ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم (٥)
الموطن : من الأوبد . تتوالد في سيرنيكا إلى مصر مباشرة عند السلوم حيث كانت شائعة في سنة
١٩٢٠ م ، ولكن لم تشاهد في سنة ١٩٢٨ م
مميزاتها وطبائعها : أكثر ما تكون موجودة بالأراضي ذات الحجارة والحصى وأحيانا على
الصخور . طيرانها متموج ومثل الفراشة تقريبا .
ريش الذيل الجانبي أحمر رملي فاتح . الباقي كغيرها .

قبيرة الغياض الأوروبية
Wood Lark (European Form.)
(Lullula arborea arborea)

الوصف : طولها حوالي ٦ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ٦
المكان : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا تقريبا ما عدا شبه جزيرة اسكندناوة وشمال
الجزائر البريطانية وأيرلندا . كذلك تتوالد في شمال غرب إفريقيا شرقا إلى القوقاز .
في مصر : سجلت زيارتها شتاء لمصر صدفة في الجزيرة وبورسعيد في نوفمبر ، ولم يثبت حلولها في
سيناء .
مميزاتها : صوتها عذب للذيد هكذا تقريبا لُو لُو (Lu,lu) وربما كانت التسمية اللاتينية لها من ذلك
الصوت . تقف على الأرض وعلى الأشجار أيضا . لها بقعة سوداء بين بقعتين بيضاوين على هوامش
القوادم . في أسراب قليلة .

قبرة الغياض الآسيوية

Wood Lark (Asiatic Form.)

(Lullula arborea Pallida.)

الوصف : طولها ٦ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ٧
المكان : من القواطع : تتوالد على تلال منطقة بحر قزوين وفارس .
في مصر : حصل ميتر تزهاجن على واحدة من مرسى مطروح في ٣٠ يناير سنة ١٩٢٨ م وكانت
ضمن سرب مكون من ٦ قبرات .
مميزاتها وطبائعها : هي من عشاق الغابات والأدغال . لونها يميل للومادي وأكثر شحوبا من
الأوروبية . لها في أعلى المنكب بقعة سوداء وسط بقعة بيضاء .

قبرة الغياض البلقانية

Wood lark (Balkan Form.)

(Lullula arborea flavescens.)

الوصف : طولها ٦ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ٨
المكان : من القواطع : تتوالد في شبه جزيرة البلقان وفي كريد .
في مصر : حصل نيقول على اثنين منها من وادي النطرون في ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١١ م .
مميزاتها . كسابقتها ، غير أن أجزاءها السفلى مائلة للصفرة الجلدية .

قبرة السماء (شكل جنوب شرق أوروبا)

Skylark (South-eastern European Form)

(Aluda arvensis cantarella.)

الوصف : طولها حوالي ٧ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ٩
التوزيع : من القواطع . تتوالد صيفا في معظم أوروبا وخاصة جنوب شرقها وأدخلت في
أستراليا .
في مصر : تزور مصر بكثرة شتاء وخاصة الدلتا ، ولكن لا تكثر في جنوب حلوان ولم تشاهد في
الفيوم . وتكثر في سواحل شمال الدلتا وتصل إلى مصر في نوفمبر وتبقى بها حتى آخر مارس ثم تغادر
البلاد .
مميزاتها وطبائعها : تاجها (شوشتها) قصير وقليل الملاحظة ، تغشى الأراضي المزروعة شبه
المكشوفة كالبرسيم القصير والقمح الذي لا يتجاوز ارتفاعه أكثر من ٢٠ سم . تأوى أيضا إلى الأراضي
غير المزروعة والتي بها بقايا فئات الأرز والشعير الخ . تكون دائيا في جماعات . تصيح وهي على جناح
الهواء باستمرار (١) ، وإذا ما حطت على الأرض صمتت في الحال . ريش الذيل الجانبي أبيض يظهر في
طيرانها . تأكل الحشرات .

(١) ومن ذلك سميت قبرة السماء وأقرب لفظ لصوتها في طيرانها بالانجليزية هو = chiuap = وقد أدخلت في
جنوب شرق أستراليا .

قبرة الساء الأسيوية
Skylark (Asiatic Form.)
(Alauda arvensis intermedia.)

الوصف : طولها حوالى ٧ بوصة . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ١٠
المكان : من القواطع . تتوالد صيفا في شمال آسيا إلى منشوريا والتركستان ، كذلك في جنوب
شرق أوروبا . تقضى الشتاء في الهند والعراق وسينا وفلسطين ومصر وفارس وبلاد العرب وفي أقصى
الشرق عند الصين .
في مصر : تزورها شتاء من نصف أكتوبر وتبقى بها حتى أوائل إبريل
مميزاتها : طبائعها كالسابقة تماما . أجزاءها العليا تميل للون الرمادى وهى شاحبة . الشقان
متماثلان .

قبرة الساء (شكل وسط آسيا)
Skylark (Small Central Asiatic Form.)
(Alauda arvensis inconspicua.)

الوصف : طولها ٦ ١/٤ بوصة تقريبا . انظر الصورة لوحة (١١) رقم ١١
الموطن : من الأوايد . تتوالد وتقيم طول السنة في منطقة بحر قزوين والتركستان خصوصا على
الجوانب الجنوبية منها . كذلك في بلوخستان . متجولة أحيانا شتاء .
في مصر : تجولت لها ، فقد حصل نيقول على واحدة ضمن اثنتين منها في أكتوبر سنة ١٩١٤ م من
وادي النطرون .
مميزاتها : هى صورة مصغرة للأسيوية ، ولكنها أفتح منها لونا وميلا للون الرمادى . كذلك فإن
أجزاءها العليا مائلة للون الأحمر الرمل وهو أهم ما يميزها .

مُكَّاء الصحراء الغربية
Bifasciated Lark (Western Form) = Hoopoe Lark
(Alaemon alaudipes alaudipes.)

الوصف : طولها حوالى ٧ ١/٤ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٢) رقم ١
التوزيع : من الأوايد : تتوالد وتقيم طول السنة في الصحراء الكبرى غرب أفريقية من ريودورو
إلى مصر حتى تمحل في الصحراء على كلا ضفاف نهر النيل ، وشمالا إلى البحر الأبيض المتوسط ، وجنوبا
إلى حدود السودان . وشوهدت في شبه جزيرة سينا .
في مصر : صحراء العرب وصحراء مصر على كلا ضفتى وادى النيل والصحراء على جوانب
الدلتا لغاية ساحل البحر الأبيض المتوسط . تشاهد كذلك في الطريق الصحراوى بين مصر
والإسكندرية وبين القاهرة والسويس .

مميزاتها وعاداتها : البياض والسواد في جناحيها اللذين يظهران بوضوح في طيرانها . تلتقط الحشرات على جناح الهواء في الصحراء

قد تنظلل تحت أشواك الصحراء . تشاهد أيضا على طول ساحل البحر الأبيض من السلوم إلى الإسكندرية بجوار الصحراء ، تجرى بسرعة على الأرض . ينذر أن تطير مالم تنزعج . طيرانها متموج وليس مرتفعا تجتمع في الخريف والشتاء في أسراب صغيرة ، وفي هذين الفصلين تكون بعيدة عن موطن توالدها ورقادها ومسكنها . يسمع لها صوت في الربيع وهو أهم ما يميزها . الشقان متماثلان . جناحيها شبه جناح المدهد الذي قد تسمى أيضا باسمه وهو Hoopoe lark يظهر بوضوح في طيرانها .

التوالد : العش تحت شجرة صغيرة ثابتة بالصحراء وتارة على سطح الأرض بدون شجرة تظله وينذر أن يكون العش أعلى من الأرض . البيض من ٢ : ٤ ، عادة ثلاث بيضات ، لونها أبيض ذات نقط بنية وبرتقالية . والبياض في البيض ليس ناصعا بل باهتا .

مكاء الصحراء العربية

Bifasciated Lark (Arabian Form.)

(Aloemon alaudipes desertorum.)

الوصف : طولها حوالي ٧ ١/٢ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٢) رقم (٢)
الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة في جنوب بلاد العرب
في مصر : يوجد في متحف الترنج اثنان منها أطلق عليهما النيران أ.د. برهم من الصحراء بين القاهرة والسويس في ١٠ نوفمبر سنة ١٨٥١م
مميزاتها : كسابقتها . أجزاءها العليا أكثر لونا رماديا .

قبرة ديوبن السيرينيكية




Dupon's Lark (Cyrenaican Form.)


(Chersophilus duponti margaritoe.)

الوصف : طولها حوالي ٦ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٢) رقم ٣
الموطن : من الأوباد : تتوالد وتقيم طول السنة في معظم جنوب الجزائر وتونس وكل شمال سيرنيكا .
في مصر : تحل في المنطقة الساحلية من غرب مصر من السلوم إلى مرسى مطروح ولكنها لا تبعد عن ذلك أكثر من ٢٥ ميلا .

مميزاتها : الأجزاء العليا حمراء وبرتقالية ، ووسط الريش أغمق يعطى شكلا أرقط جميلا . لها خطوط على الزور والصدر والخاصرة لونها أحمر رملي . والأقدام حمراء دموية . صوتها مرتفع قليلا هكذا تقريبا tsii تردده على جناح الهواء مع قليل من اللعب والاستعراض وعدم الاستقرار . وهي تعرف لأول نظرة بعدم وجود البياض في جناحيها وبقوة سرعة جريها على الأرض حيث يظنها الرائي أحيانا كأنها حيوان ثديي صغير كالفأرة وغيرها . طيرانها منخفض وسريع وليس متموجا مثل طيران مكاء الصحراء السابقة .

توالدها : لم يعثر لها على عش وبيض حتى يدون ها هنا .





Duponts Lark
(Cyrenican Form)



Desert Horned Lark



ص ٧١

Bifasciated Lark (Western Form.)
= Hoopoe Lark.



Bifasciated Lark
(Arabian Form.)

قبرة الصحراء القرناء^(١)
Horned Lark (Desert Form.)
(Eremophila alpestris bilopha.)

الوصف : طولها ٥ ٣/٤ بوصة تقريبا . انظر الصورة لوحة (١٢) رقم (٤)
الموطن : من الأوايد : تتوالد وتقيم طول السنة في الصحراء الكبرى من جنوب مراکش إلى مصر ، وفي سينا وبلاد العرب ، ولا تشاهد كثيرا في مصر جنوب خط عرض القيوم ، على أنها تلاحظ رؤيتها في سينا على الهضبة الشمالية وتوجد كذلك في أمريكا الشمالية .
في مصر : ذكر مع الموطن

مميزاتها وعاداتها : تطير جماعات ابتداء من الحريف وتستمر في التجمع لغاية شهر إبريل . جميلة المنظر ، يميزها القرنان . طيرانها سريع . صوتها ضعيف هكذا تقريبا (تري) (tri) ترددها غالبا وهي على جناح الهواء ومع ذلك فيندر أن يسمع هذا الصوت . وهي قبرة صحراوية بحتة لا تقرب المناطق المزروعة أبدا . لها بقعة سوداء على مقدم صدرها أجزاءها العليا حمراء برتقالية كلون الطوب الأجر تقريبا .

التوالد : تبنى الأنثى عشها من النباتات ومن القش وتبطنه بالصوف وبعض صغير الأعشاب . العش عادة في منخفض من الأرض تحت ظل شجرة أو تحت صخرة كوقاية له من التراب والرمال وما تجلبه الرياح معها من الغبار وذرات الرمال . البيض عادة بيضتان بهما يقع بنية توضعان في آخر إبريل ، لونها رملي شاحب بهما علامتان مائلتان للصفرة والخضرة وتعم العلامتان كل البيضة وقد يميل لون البيضة قليلا إلى البنفسجي . ويلاحظ أن السواد في الرأس في الأنثى أقل من الذكر ، كما أن قرنيتها أقصر في الرأس من قرني الذكر .

فصيلة هزازي الذنب Wagtail Family
Family (Motacillidae) = Wagtails & Cpipits.

تشمل هذه الفصيلة أو العائلة جنس الفتاح (أبو فصادة) والصعو (بنوعيهما) اللذين يربو أنواعهما على أكثر من ٥٠ نوعا ، والمعروف هو ٥٦ نوعا والموجود الآن هو ٥٣ تقطن معظم أنحاء المعمورة كلها ماعدا جزر المحيط الهادى وكلها من آكلات الحشرات ، وإن كان البعض يأكل أيضا بعض البذور والحبوب . وهي تتميز بضالة أجسامها ودقة مناقيرها الرفيعة المستدقة والمهيئة لأكل الحشرات والديدان ، كذلك الثلاث ريشات الأخيرة في الحوافي التي قد تصل إلى طرف الجناح . جميعها يبنى عشه على سطح الأرض مباشرة أو في حفرة فيها . ويعمر الصعو عن الفتاح (أى يعيش أكثر منه) تمز ذيلها بمجرد وقوفها على الأرض ويقل الاهتزاز عند تحركها وسيرها ولو أنها تمز كذلك . يوجد من هذه الفصيلة في مصر نحو ١٩ نوعا . ولنتكلم على كل جنس على حدة . ولنبدأ بالصعو مثلا .

(١) سميها الأوروبيون Shore-lark

جنس الصعو Pipits = Genus (Anthus)
Wagtail Family.

يمتاز جنس الصعو بطول مخليه في الأصبع الخلفي الحاد ، معظمها أى معظم الصعو يعيش على سطح الأرض ، وقلٌ من يتردد منها على الأشجار اللهم إلا للراحة أو للهرب . طعامه الحشرات والديدان وبعض البذور ولكن الحشرات هي الأساس . أرجلها صفراء عسليه ماعدا صعو الماء والصخور ، فإن أرجلها بنية سوداء ، ألوانها كلها تقريبا متقاربة ، وقلٌ من يلاحظ الفروق فيها اللهم إلا من عاداتها وطبائعها . العش على سطح الأرض يتخذ من ألياف النبات ويطن بالصوف وبعض شعر الحيوان . تبيض الأنثى مرتين عادة في السنة . منه ما يأوى إلى المروج الخضراء في الأراضي الزراعية الفسيحة ومنه ما يأوى إلى الجبال صيفا خاصة ، ومنه ما يأوى إلى الصخور على شواطئ الأنهار والمجاري المائية ، ومنه ما يأوى إلى الحقول ويرى وسط المحاصيل الزراعية . وهو عالمي النوع يقطن من انقطب إلى القطب ، وجميعه يأوى إلى مصر كمهاجر لها فقط ولا يتوالد أى نوع فيها ، ٨ أنواع منها في مصر .

صعو رتشارد

Richard's Pipit (Anthus R.Richardi.)

الوصف : طوله حوالى ٧ بوصة . (أنظر الصورة لوحة (١٣) رقم (١))

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في سيبيريا وآسيا الوسطى ، عادة في واد نهر ينيس شمالا إلى خط عرض ٥٨° كذلك في السهول المرتفعة من التركستان الشرقية ، وفي ناحية بحيرة بيكال ومنغوليا - ويهاجر شتاء إلى الجنوب فيزور الهند والصين وبورما وجنوب أوروبا وشمال إفريقيا .
في مصر : قليل الوجود بها شتاء من أكتوبر إلى مارس ، وأكثر ما يشاهد في الدلتا ، وشوهد في الفيوم .

المميزات والعادات : يأوى إلى الأرض العشبية الرطبة وإلى سهول المستنقعات وحقول الأرز . وهو أكبر من الصعو الذى يشاهد في مصر حيث هو أكبر قليلا من العصفور البيوق House Sparrow مخليه الخلفى طويل جدا وهو أطول مخلب في الصعو كله . جبان يطير من بعيد . ريش ذيله الخارجى أبيض . صدره به خطوط صغيرة غامقة مسودة وهى أقل من غيره . طعامه الديدان والحشرات . يقف على الأرض معتدل القامة . الشقان متماثلان لونا وشكلا (انظر الرجل لوحة ٨ شكل ٩ ، الأجزاء السفلى بدون خطوط . له حاجب قمحى اللون وثان تحت العين وثالث تحت الخد بنفس اللون . صوته صراخ هكذا تقريبا (re-eeep) . يشاهد مثنى أو فى جموع صغيرة . يتراءى من بعيد كأنه أبو فصادة . الأرجل باهتة أو بنية مصفرة باهتة . قليل المشاهدة . الأجزاء العليا بنية غامقة مع خطوط الردف ليس به خطوط

الصعو الأصحم
Tawny Pipit (Anthus C-Campestris)

الوصف : طوله ٦,٥ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٣) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا الجزر البريطانية وشبه جزيرة اسكندناوة .
في مصر : يشاهد في الربيع والخريف كذلك في سينا والفيوم ووادي النطرون ، ولكنه نادر في الواحات الداخلة والخارجة أو غرب الاسكندرية ولكنه شائع الوجود في سيناء في الاعتدالين . الهجرة في مارس وسبتمبر .

مميزاته وعاداته : صعو كبير يلى صعور تشارد في ضخامة الجسم . رملي اللون أى بلون الرمال التي تغشاها ذات الأعشاب القصيرة المبعثرة . ليس بصدرة خطوط ولوبأى جزء من جسمه ماعدا خطوط رفيعة غامقة قليلا على قنة الرأس ، وكذلك في أعلى الصدر . له حاجب كريمي يجرى على الأرض ، وقد يختلط بصعور تشارد . صوته هكذا تزيت (tzeet) يختلف قليلا في طريقة إلقائه عن باقي الصعو - الأرجل حمراء لحمية . يقف ويمشي معتدل القامة يهز ذيله في سيره ، ويتراءى كذلك من بعيد كأنه أبو فصادة يردد صوته عند نزوله إلى الأرض من طيرانه . طعامه الحشرات . يوجد مثنى أو فرادى . يعيش في الأراضي الرملية وجوانب التلال وشبه الصحراوية وتارة في الأراضي الزراعية الرطبة - الشقنات متماثلان وقد تكون الأنثى أغمق من الذكر (انظر الرجل لوحة ٨ شكل ١٠) - يجرى سريعا على الأرض .

الصعو الأصحم الشرقي
Tawny Pipit (Eastern Race)
(Anthus campestris griseus)

الوصف : طوله حوالى ٦,٥ بوصة - انظر الصورة لوحة (١٣) رقم (٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في التركستان ومنطقة بحر قزوين وشرق فارس في مصر : نادر الزيارة شتاء لمصر حيث لم يحصل منه إلا على عشرة افراد كلها من الدلتا والفيوم بين ٩ ، ٢٩ مارس .
مميزاته : كالسابق تماما غير أنه أكثر منه لونا رماديا وأقل في الصفرة ، ومنقاره وجناحه أقصر من سابقه قليلا .

صعو الشجر
Tree - Pipit
Anthus trivialis trivialis

الوصف : طوله حوالى ٦ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٣) رقم (٤)
الموطن : من القواطع يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا جنوب إيطاليا وجنوب اليونان ، وجنوب شبه جزيرة أيبيريا - يتوالد كذلك في غرب آسيا ، يتحرك شتاء إلى أفريقية حتى الكاب ، كذلك في شمال الهند - وهو الصعو الأوربي الوحيد التي يأوى إلى الغابات وشبه الغابات أما في أثناء الهجرة فيستريح مع غيره من الصعو على الأرض المكشوفة الخالية من الأشجار .

في مصر : يشاهد بكثرة في الاعتدالين من أكتوبر إلى نوفمبر ومن نصف مارس إلى آخر إبريل ، ولا يبقى منه شيء وقد يبقى القليل به حتى أول مايو .

مميزاته وعاداته : أكبر قليلا من صعو المراعى (meadow pipit) أهم ما يميزه هو قصر مخالبه الخلفي نسبيا كباقي الطيور الفنية التي تقف على الأفنان أى أغصان الأشجار) ويمتاز كذلك بالخطوط السوداء أو البنية الدكناء من أسفله على الصدر أو الخاصره ولكنها لا تمتد إلى أسفل الصدر ، وهذه الخطوط أقل منها من خطوط صعو المروج meadow pipit والمنقار بني باهت وهو أكثر قفزا وتحركا في طيرانه من غيره ، يمشى ويجرى على الأرض وسط الحشائش ، وصوته هكذا تقريبا Sip يردده في طيرانه عندما يهب مذعورا من الأرض وأسلاك البرق . ليس بالردف بقع . بالصدر بقع سوداء ظاهرة الوضوح ، أرجله قرنفلية اللون . أكثر الصعو ألقة واطمئنانا ، يوجد متجولا بين الحشائش الطويلة كالقمح والبرسيم التي يتخللها الأشجار والنخيل وفي ضواحي الغابات والتلال ذات الأشجار المنفرقة ، وإذا خاف وانزعج طار مصحوبا بصوت هكذا تقريبا Zit ثم وقف على الشجرة والنخلة ويشاهد ذلك في مصر في أوائل الربيع . الزور رملي فاتح خفيف في الذكر أبيض رائق في الأنثى - الشقان متماثلان . لونه العام قمحي مصفر (انظر الرجل لوحة ٨ شكل ٧)

صعو المروج — Meadow — pipit (Anthus patensis.)

الوصف : طوله حوالى ٥,٧٥ بوصة . (انظر الصورة لوحة (١٣) رقم (٥))

الموطن : من القواطع : يتولد صيفا في شمال ووسط أوروبا غرب آسيا وشمال التركستان كذلك في فاروس وأيسلند ، ويهاجر شتاء إلى جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا .

في مصر : شائع الزيارة لمصر شتاء وسينا من أكتوبر إلى آخر مارس .

مميزاته وطبائعه : هو أصغر أنواع الصعو الموجودة والمعروفة في مصر - يغشى المساحات الزراعية الفسيحة الخضراء المكشوفة وبعض المستنقعات ، وفي أراضي البرسيم القصير والنامى حديثا ، ويجرى ويمشى بين الخضرة - الأرجل صفراء قمحية ، منقاره أرفع من منقار صعو الشجر - مخطط في أجزائه السفلى والعليا ، ريش الذيل الخارجى أبيض : له صوت معروف به - يغنى وهو على جناح الهواء عندما يهب مفزوعا من الأرض فيعلو قليلا بضعة ياردات ثم يهبط ثانية قليلا في الهواء ثم يرتفع ويغنى ويجرى هذه العملية عدة مرات وفي كل مرة يصيح هكذا (Zit) ويكرر هذه العملية عدة مرات إلى أن يهبط أخيرا على الأرض ثم يستقر بعد ذلك ويبحث عن طعامه من الحشرات ، وطيرانه ليس حلزونيا بل هبوط وارتفاع فقط . لونه العام مائل للخضرة قليلا عن زملائه ، ردفه ليس به نقط - مخالب الأصبع الخلفي طويل . انظر لوحة ٨ شكل ٨ اللون العام والأرجل أغمق قليلا من صعو الشجر

الصعو الأحمر الزور Red - Throated Pipit
(*Anthus rufogularis*)

الوصف : طوله حوالى ٤/٣ بوصة . انظر اللوحة (١٣) شكل (٦)

توزيعه : من القواطع : يتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا وآسيا من شمال اسكتلنداوة إلى كامتساتكا في شرق فنمارك . ويهاجر شتاء للجنوب ، جنوب أوروبا وبلاد العرب والهند والصين وملقا وسيام وأرخييل الملايو . ويندر التجول في جزائر أبوشيان والسكا وأسفل كاليفورنيا .
في مصر : يكثر شتاء في مصر في أيام البرد وخاصة من نوفمبر إلى مارس ، والبعض ينم رحلته إلى وسط افريقية في السودان وكينيا وأوغندا .

مميزاته وطبائعه : يعرف الذكر بلون زوره الأحمر الطوي في الربيع ، يتميز عن صعو المروج P. meadow بخطوطه الكثيرة وخاصة في الردف ، يغشى الأراضي الزراعية المكشوفة الفسيحة الخالية من الأشجار والأراضي الرطبة ، أيضا وبعض أجران الغلال (كالأرز) المكشوفة ، وعلى السطوح لأكل السوس وفئات الأرز ، الشقان متماثلان . الصوت كغيره يردده عندما يهيم بالطيران .

صعو الماء الفارسي Water - Pipit (Persian Form)
Anthus spinoletta coutellii

اسمه كذلك Warter Pipit = Alpine Pipit

الوصف : طوله حوالى ٤/٦ بوصة : انظر الصورة لوحة (١٠) رقم (٧)

الموطن : من القواطع تتوالد صيفا في تلال فارس ولبنان وفلسطين ولذلك يطلق عليه كذلك اسم (الصعو الجبلى = Alpine pipit) ويهاجر شتاء إلى شمال غرب الهند وإلى العراق وسينا وفلسطين .

في مصر : يهاجر إلى مصر وسينا شتاء من نوفمبر إلى ابريل .

مميزاته : يغشى الأراضي الزراعية المرواة والمستنقعات ، وصوته هكذا يردده مرتين عند الخوف tit — tit يردده على جناح الهواء - يقف غالبا على الأشجار وأسلاك البرق يشاهد على شواطئ الترع وكساحة البلاليع وسواحل البحيرات ينذر أن يطير جماعات إلا عند التجمهر فقط . وهو الصعو الوحيد الذى أرجله بنية غامقة ، وهى أغمق من كل أرجل الصعو - يغشى قمم الجبال والتلال صيفا وحتى في المدن لوجود الثلوج والمياه عليها كما أنه يتوالد عليها صيفا ، لونه صيفا رمادى في أجزائه العليا وأصفر جلدى في السفلى - الشقان متماثلان ، بالصدر صبغة قرنفلية بدون خطوط صيفا - ريش الذيل الجانبي أبيض - له حاجب واضح فوق العين - يميل صدره للبياض عن غيره من الصعو . ويعم كذلك السهول والجبال شتاء - حركاته قفز في الهواء أثناء طيرانه يجرى ويمشى على الأرض . المنقار بنى مسود ، والأرجل بنية محمرة وهو الصعو المصرى الوحيد الذى أرجله لونها بنى محمر معتم ، ريش الذيل الجانبي أبيض يوجد منعزلا ولا يجتمع إلا عند الهجرة - شتاء ، توجد خطوط بالصدر .

صعو الماء (شكل وسط آسيا)
Water pipit (Central Asian Form)
Anthus spinoletta Blankestoni

الوصف : طوله حوالى ٦ ¼ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٣) رقم (٨)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في مناطق أوسع من الصعو الفارسى السابق ، ذات التلال من وسط آسيا ويمتد جنوبا شتاء إلى الهند والصين والعراق .
في مصر : يشاهد شتاء من نوفمبر إلى آخر يناير .
مميزاته : أرجله بنية غامقة كالسابق - وهما الوحيدان في ذلك . يشاهد في الدلتا فقط وقتال السويس . أكثر شحوبا في لونه من الفارسى ، والأجزاء العليا واضحة في لونها البنى -
الباقى كالسابق .

جنس الفتحاح (أبو فصادة)
Genus Motacilla (= Wagtails)

يتميز هذا الجنس من الفتحاح بالوانه التى تنحصر فى الأسود ، والأبيض ، والأصفر ، والأخضر والأسود .
كذلك بالذيل الطويل الذى يتحرك حركة علوية سفلية ملحوظة بمجرد وقوفه على الأرض ، وبقلّة عند المشى والحركة ، يبيت بداخل أوراق وأغصان الأشجار الكثيفة في المدن والأرياف ، وبعضها بقرار القصب الذى ينمو وسط البحيرات والمستنقعات . طيرانه عادة متموج بارتفاع وانخفاض مع صوت في كل خفضة وارتفاعه ، ويصيح وهو على الأرض طلبا للنداء أو الغذاء أو الاحتشاد . منه ما يقف على الأرض وآخر على الأشجار وسيقان الحشائش الطويلة والقصيرة ، يغشى الأماكن الرطبة وعلى ضفاف الأنهار ، والمستنقعات والأراضي المنزرعة أرزا طالما هي مغمورة بالماء ومكتظة بالبعوض والحشرات والبرقات المائية . طويل الذيل نسبيا . ليس في هذا الجنس نوع أرقط أبدا . يوجد في الإقليم البلياركتك بجميع أنواعه ومن بيئة مدغشقر حيث توجد به أفراد مقيمة طول العام لا ترحلها (١) ومنه ما يهاجر من وإلى الإقليم البلياركتك . البيض أبيض مائل للخضرة أو بالعكس وبه نقط . العش على الأرض أو على السدود المائية أو ضفاف الأنهار أو في الجدران على شواطئ المياه . (٢) نوعان منه يتوالدان في مصر . ١١ نوعا منه توجد بمصر .

(١) موطنها أوروبا وآسيا وإفريقية .

(٢) مع ملاحظة أن الردف في الفتحاح الأبقع Pied لونه اسود ، وفي الفتحاح الأبيض رمادى ، وفي الفتحاح الرمادى أصفر وفي الفتحاح الأصفر (لا يوجد في مصر) - أخضر ويوجد من النوع الأصفر في استراليا شوهد صدفة .

الفتاح الأزرق الرأس

Blue-headed Wagtail
(Motacilla flava Flar)

الوصف : طوله ٦ بوصة . انظر اللوحة (١٤) رقم (١) ، (١٣)

الموطن : من القواطع . يتوالد صيفا في وسط أوروبا . ويهاجر شتاء إلى إفريقيا لغاية الكاب .
في مصر : يشاهد في مصر وسينا في الاعتداليين من ٢٠ مارس إلى أواخر إبريل ، ومن أواخر
أغسطس إلى أواخر سبتمبر .

مميزاته وطبائعه : يعرف بخطه الحاجبي الأبيض الممتد فوق العين من المنخر إلى نهاية غطاء
الأذن . أكثر أنواع الفتاح الأصفر شيوعا في مصر . يغشى المستنقعات والمواطن الزراعية الرطبة وأحيانا
الجافة . دائما في أسراب كبيرة أثناء هجرته . طعامه الحشرات والديدان .

الفتاح الأزرق الرأس الرومان

Blue-headed Wagtail (Rumanian Form)
(Motacilla flava dombrowskii)

الوصف : طوله حوالي ٦ بوصة . انظر اللوحة (١٤) شكل (٢)

الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة ويتوالد في رومانيا

في مصر : يهاجر لمصر في الربيع ويكون مختلطا مع السابق وحصل عليه من الفيوم بين ١٧ ، ٢٨
مارس ، ولم يسجل بعد من الدلتا ، كما حصل عليه من سيناء بين ٧ ، ٢٥ إبريل ، كما حصل عليه من
السودان في آخر مارس ومنتصف إبريل ولكن لم يحصل على شيء من جنوب خط الاستواء .
مميزاته وطبائعه : كالسابق . أغطية الأذن أغمق . القنة . أغمق . الذقن بيضاء . له خط أبيض
حاجبي كالسابق .

الفتاح الرمادي الرأس

Grey-headed Wagtail
(Motacilla flava Thumbergi)

الوصف : طوله حوالي ٦ بوصة . انظر اللوحة (١٤) رقم (٣)

الموطن : يتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا عند اسكندناوة وشمال روسيا وسيبيريا إلى شرق
آسيا . ويهاجر شتاء إلى الجنوب ، ومنها الهند وبرما وسيام وفي أفريقيا الاستوائية حتى الترنسفال . وهو
من القواطع

في مصر : يشاهد في الربيع في النصف الأخير من مارس حيث حصل عليه من الفيوم ولم يحصل عليه من الدلتا ولا سينا . وهو نادر في الخريف .

مميزاته وطبائعه : أغطية الأذن سوداء تقريبا . القنة رمادية ، أعرق الصدر ، به بعض ظلال مائلة للسواد . هذا في الذكر . في الخريف نجد أن الأجزاء العليا معظمها بني زيتوني على الوشاح . الباقي كسابقه .

الفتاح الأغبر الرأس

Ash - headed Wagtail

(Motacilla flava cinereocapilla)

الوصف : طوله حوالي ٦ بوصة . انظر اللوحة (١٤) رقم (٤)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب أوروبا . يشتت في إفريقية الاستوائية

في مصر : سجل صدفة في هجرته في الربيع والشتاء من الفيوم في منتصف مارس ، في الخريف من رشيد في ١٢ أكتوبر .

مميزاته : زوره كله أبيض . حاجبه ليس عريضا كغيره . الباقي مثل غيره من العادات .

الفتاح الأزرق الرأس المصري

Blue - headed Wagtail (Egyptian Form)

Motacilla Flava Pygmoea







الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (١٤) رقم ٥

الموطن : من الأوبد : يقيم ويتوالد في مصر وخاصة الدلتا والفيوم ووادي النطرون وأعلى النيل في الشمال مثل أسوان . وهو لا يوجد في سينا . وشوهدت أفراد سباحة في الهواء عند قنال السويس .

في مصر : لم يعرف بعد خارج مصر وهو مصري صميم كما ذكر .

مميزاته وعاداته : يمكن رؤيته في أي وقت في الدلتا في المواطن الرطبة وخاصة حقول الأرز ذات المياه والبعوض والحشرات . نادر في الصيف والخريف ويكثر حوالي آخر يناير . لا يوجد على الساحل الغربي للإسكندرية صغير الجسم . الخط الحاجبي الأبيض تارة يكون واضحا وأحيانا لا غاية صدره به علامات مائلة للسواد والخاصرة بها صبغة زيتونية واللون الأصفر في أسفل ليس واضحا تماما . الأنثى أكبر من الذكر ولكنها بلونه (١)

(١) فانتنا أن نفكر نوالده : العن من القش ويطن بالصوف والشعر يضعه على الأبيض بداخل المحاصيل الزراعية وعادة في بقايا جذور النباتات . البيض من ٣ : ٥ بيضات توضع في النصف الأول من إبريل . بها بقع ونقط بني .



ص ٧٤ Richard's Pipit

الفتاح الأسود الرأس الغربي
Black - headed Wagtail (Western Form)
(Motacilla flava Feldeggii)

الوصف : طوله حوالى ٦ بوصة . انظر اللوحة (١٤) رقم ٦ ، ٧
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط وجنوب أوروبا .
في مصر : كثير في مصر في الربيع والخريف من ١٠ مارس إلى ٧ إبريل ، ومن ١٠ سبتمبر إلى ٢٤
فيه ولكنه يكثر في الربيع عن الخريف وخاصة في شمال الدلتا والفيوم .
مميزاته وعاداته : يمتاز الذكر برأسه اللامع في الربيع وأجزاءه السفلى كلها صفراء كنارية : الباقي
كغيره . يغشى البرسيم المحصود وكذلك كل مكان رطب طلبا للحشرات .

الفتاح الأسود الرأس الشرقي

Black - headed Wagtail (Eastern Form)
(Motacilla flava Kaleniczenkii)

الوصف : طوله حوالى ٥ ٣/٤ بوصة . انظر اللوحة (١٤) شكل (٨)
الموطن : من القواطع . يتوالد صيفا في أجزاء من التركستان ، ويقضى الشتاء بكثرة في الهند
وفارس وبقلة في شمال شرق إفريقيا جنوبا إلى الصومال حيث حصل أرشاد على واحد منه في ٣١
مارس .
في مصر : له تسجيل واحد فقط فيها لذكر أطلق نيقول النيران عليه من وادى النطرون في ٢٤ مارس .
مميزاته وطبائعه : يختلف عن الغربى السابق في أن أجزائه السفلى أقل لمعانا ، والرأس ليست في
غاية السواد كالغربي . كذلك يمتاز عنه بالذقن البيضاء (الخط الشاربى الأبيض المكون من ريشة أو
ريشتين ، وقد يكون معدوما في أحوال قليلة . الباقي كالغربي .

الفتاح الأصفر الرأس

Yellow - headed Wagtail
(Motacilla citreola)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (١٤) رقم (٩)
الموطن : يتوالد صيفا في شمال غرب أوروبا شرقا إلى شمال غرب الهند وهو من القواطع .
ويهاجر شتاء إلى الجنوب في امبراطورية الهند ويكون بكثرة فيها . ويندر أن يتجول إلى جنوب ووسط
وشمال أفريقيا
في مصر : يذكر نيقول بأنه حصل على اثنين صغيرين قرب القاهرة في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٠٧
وعند البرلس في ١٦ أغسطس سنة ١٩١٦ .
مميزاته : الذكر صيفا رأسه كله وأجزاءه السفلى أصفر كنارى .

الفتاح الرمادى الأوروبي
Grey Wagtail (European Form)
(Motacilla cinerea cinerea.)

الوصف : طوله حوالى ٧ ١/٤ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (١٤) شكل (١٠)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا فى كل أوروبا تقريبا ، وكذلك فى حوض البحر الأبيض المتوسط حيث يقيم طول السنة فيه ، كذلك يتوالد فى آسيا الصغرى وفارس وشمال غرب الهند وفى وسط جبال أطلس فى مراكش ، وفى جزائر قناريا ، كذلك على جبال الألب على ارتفاع حوالى ٦٥٠٠ قدم .

يقضى الشتاء فى إفريقية من شمالها حتى السنغال وغينيا كذلك فى تونس ووادي النيل وأوغنده وهو لا يبعد فى هجرته كثيرا جنوب خط الاستواء أكثر من مستعمرة كينيا .

فى مصر : شائع الوجود فى مصر وسينا شتاء ، فيصل فى أوائل أكتوبر (٤ فيه تقريبا) ويبقى طول الشتاء ثم يرحل من البلاد فى منتصف مارس وأحيانا يبقى فى الدلتا إلى منتصف إبريل . وهو يكون شائعا فى الفيوم كذلك ولكنه نادر فى وادى النطرون . ويكون شائعا أيضا على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى السلوم ومرسى مطروح فى يناير وفبراير كذلك فى جبال جنوب سيناء وسفوحها الشمالية .

مميزاته وعاداته : يشاهد فى مصر دائما منفردا أو مثنى ، ولا يرى فى جماعات أبدا ، يرى على ساحل جدول أو ترعة ، أو مستنقع ، ويجوار ماشية ترعى أو على قمم المجارى المنزلية فى القرى والأرياف ولا كذلك فى المدن . يغشى كذلك الحدائق ، ونافورات البساتين حيث هى أيضا مأوى الحشرات والديدان والبرقات التى هى أهم طعامه . وفى مصر شتاء لا يرى فيه غير دفة الأصفر وغطاء أسفل الذيل الأصفر ، والذيل بنى يغلب عليه السواد وريشه الخارجى أبيض . ظهره رمادى اللون . له خط أبيض حاجبى . الذقن بيضاء .

أما فى آخر الشتاء (فبراير ومارس) والصيف فتكون الذقن سوداء والأجزاء السفلى صفراء . الأنثى كالذكر ولكنها أكبر منه قليلا . وهو أطول أنواع الفتاح التى ترى فى مصر من حيث الذيل . وهو لا يغشى سواحل البحار ولا الأنهار .

الفتاح الأبيض
(White Wagtail)
(Motacilla alba alba)

الوصف : طوله حوالى ٧ ١/٤ بوصة . انظر صورته فى اللوحة (١٤) شكل (١١)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا فى كل أوروبا تقريبا حتى جزيرة فاروسى وأيسلند وبعض أنحاء جرينلند وليرادور (جنوبها) كذلك فى جزيرة جان ماين .

يقضى الشتاء فى حوض البحر الأبيض المتوسط وفى إفريقية حتى خط الاستواء وبلاد العرب والواحات بجوار البحر الأحمر .

في مصر : هو أكثر الفتحاح شيوعا ووجودا في مصر كلها وكذلك سينا ، فيصل في أول أكتوبر ويبقى حتى أول مايو ، ويشاهد في كل مكان حتى في الواحات والفيوم ووادي النطرون وسيوه ، وفي القرى والمدن وسط الحدائق العامة والخاصة ويكون في غاية الألفة ما لم يمس بأذى وشوهد في سينا على جبل كتارينا على علو ٧٠٠٠ قدم فوق الجليد في مارس ، وأحضر زيتلتر أنوعاً منه في ٣٠ إبريل من سينا حينئذ وربما كان على هذه الجبال صيفاً للملأمة الجو له . وشاهدته بنفسى في رشيد في ٢ مايو على حافة ترعة .

مميزاته وعاداته : هو أكثر الفتحاح ظهوراً في مصر ، يلاحظ فيه أنه عندما يقف على الأرض عقب الطيران يهز ذيله مباشرة حركة علوية سفلية لمدة ثلاث ثوان أو ثانيتين تقريباً . صوته معروف يردده دائماً في تحركاته على الأرض للنداء أو بحثاً عن الزملاء وهو هكذا تقريباً (تشيزيك) = (chizzick) ولا يردد هذا الصوت على جناح الهواء ، بل له صوت خاص يردده أثناء هبوطه وصعوده في طيرانه المرتفع والمنخفض لونه عبارة عن ثلاثة ألوان فقط : رمادى في الظهر ، والباقي سواد وبياض . يوجد في الأماكن الجافة والرطبة على السواء . نجده عند المساء يجتشد في أسراب في المدن ويقف على سطوح المباني عند المغرب ثم يهبط منها إلى قلب الأشجار التي في الميادين العامة ، مثل ميدان العتبة بالقاهرة وذلك للمبيت بقلب الأشجار الكثيرة الأوراق الدائمة الخضرة مثل أشجار (الفيكس) ويرى ذلك في كثير من بلدان مصر كلها كذلك منه ما يبيت على الأشجار في القرى أو القصب وسط المياه الضحلة في البحيرات والمجاري المائية الكبرى . طعامه الحشرات والبعوض والديدان والذباب . يقف كذلك على أسلاك البرق . نجده في الوجه القبلي يبيت بداخل المحاصيل الزراعية كالبرسيم والحلبة والفول في أسراب كبيرة .

اسمه الشهير به في مصر هو (أبو فصاده) .

في شهر فبراير ومارس نجد أن الذقن في الذكر تكبر بفتحها السوداء . وهو على العموم من أشهر العصافير المعروفة في مصر ، بل وفي معظم أنحاء الدنيا لآفته تقريباً للإنسان ، وظهوره أمامه في كل مكان . السواد في صدر وزور الذكر أكثر من الأنثى .

الفتحاح الأبقع الإفريقي

Pied Wagtail (African Form)
(Motacilla alba aguimp)

الوصف : طوله حوالي ٧ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (١٤) شكل (١٢)
الموطن : من الأوايد . هذا الفتحاح يقيم طول السنة في كل افريقية حيث هو خاص بها ، ويشاهد على طول وادي النيل من منبعه إلى أسوان . وسجل كذلك من فلسطين وكان ذلك نادراً .
في مصر : شوهد اثنان منه عند الشلال الأول قرب أسوان في يناير سنة ١٩٢٨ م . ولم يعثر عليه بعد ذلك شمالاً داخل الحدود المصرية .

مميزاته وطبائعه : الأجزاء العليا سوداء ، رمادية في أسفل الظهر ، والذيل أسود وريشته
الخارجيتان سوداوان له خط أبيض عريض يمتد من المنخر فوق العين إلى جوانب القفا . الجناح أسود
وحروف ريش الخواقي (النصل الوحشي) أبيض .
توالده : لم يعثر على عش له داخل الحدود المصرية .

فصيلة مصاصي العسل^(١)

Family (Nectarinudae)

= Sunbirds = Sunbird Family

Sunbirds & Honey - suckers ،

تحتوى على أبى الزهور ومصاصى العسل
وأنواعها كثيرة جدا ، ينتشر نصفها تقريبا في أفريقية الاستوائية ومدغشقر وفلسطين والهند ،
وأجزاء من آسيا حتى استراليا . وتتميز بصغر جسمها وضآلة وهي أشبه في حركتها وطبائعها وطيرانها
بالطائر الطنان الأمريكى ، ولسانها طويل كالأنبوبة لامتنصاص الرحيق من الأزهار ، والذكر جميل اللون
جذاب لامع ، وخاصة في ضوء الشمس ولذا سميت الجواهر الطيارة ، توجد مثنى وأحيانا جماعات
صغيرة لفتنرات قصيرة مدة التزواج ، مغرمة بالحدائق وخاصة المزدهرة وقد تقترب من المنازل إذا وجدت
الأزهار ، وهي آمنة لعدم الاكثرات بها والأهمية لها .

جنس السنيرس (أبو الزهور)

Genus (Cinnyris)

الذيل أقصر من الجناح ، ريش وسط الذيل ليس طويلا . الأنثى بنية اللون . الذكر جذاب
للغاية ، جميل المنظر . نوع واحد منه في الحدود المصرية والموجود منه في العالم كله هو ١٠٥ نوعا

أبو الزهور الحبشى (الشكل العربى)

Abyssinian Sunbird (Arabian Form)

(Cinnyris habessinicus hellmayri)

اسمه كذلك Shining Sunbird أى التميز المتلألئ : طوله حوالى ٤ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة
(١٥) شكل (١) وهو من الأوابد .

الموطن : مقيم في جنوب بلاد العرب وجبل علة في جنوب شرق مصر .
مميزاته وعاداته : غذاؤه رحيق الأزهار والحشرات التى بداخلها يلتهمها بلسانه الطويل ذى
الحراشيف ، الباقي مثل الفصيلة .

(١) تحتوى هذه الفصيلة على ٤ أجناس تشمل ١٠٥ جنسا موجودة حاليا

جنس التميز (مصاص العسل) (Nectarinia) Genus

يستوطن بأنواعه شمال شرق أفريقية ويتشتر حتى جنوب بلاد العرب ، كذلك في وادي صوب الجنوب حتى أسوان . الذكر جميل المنظر براق لامع خاصة في الضوء ريشان وسط الريش طويلتان مثل الوروار ساكن وهاديء في الصباح والمساء ، ونشط إذا ارتفع قرن الشمس وخاصة في الظهيرة بعكس غيره من الطيور . فتجدها تصخب وتشدو أزواجا دون تفرقة . جريئة لاتباب غيرها من الطيور ، ولا الإنسان وتسمح بالاقتراب منها وتعطى للرائى فرصة رؤيتها وسماع صوتها . البيض من ٣ : ٤ بيضات .

تميز وادي النيل Nile - Valley Sunbird (Nectarinia metallica)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (١٥) شكل (٢)

الموطن : من الأوايد : يقيم في معظم وادي النيل وخاصة مصر العليا ، كذلك الحبشة والصومال وأريتريا وربما امتد إلى جنوب غرب بلاد العرب .

في مصر : ينذر رؤيته والعثور عليه حيث يكون دائما بلون الأشجار التي يأوى إليها ، ويمكن رؤيته في حدائق الأقصر وأسوان ولكن بقله . ولم يرقى الدلتا وشوهد مرة قرب القاهرة وأخذت له صورة شمسية .

مميزاته وعاداته : مثلما تقدم في الكلام على جنس التميز ، صغير الجسم ، يحب الاختباء ، يتردد على الأزهار لامتصاص رحيقها والتهام الحشرات الكامنة بداخلها بلسانه الذى يمد خارج المنقار . يصعب رؤيته ما لم يتحرك .

توالده : يعلق عشه على غصن شجرة بداخل الشجرة - البيض عادة ٣ توضع في إبريل ، لونه أبيض رائق وتارة به بقع بنية . ولم يعثر على عشه داخل حدود مصر .

زحاف الحيطان Wall - creeper (داب) (Tichodroma muraria) Wallcreeper Family

الوصف : طوله حوالى ٦ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (١٥) شكل (٣)

الموطن : من الأوايد : جبال البرانس والألب والبلقان .

في مصر : يذكر شلى في كتابه عن طيور مصر صفحة (١١٣) بأن هذا الزحاف أو الداب يأتي إلى مصر ولا صحة لما يقول ، حيث لم ير إطلاقا فيها ولا من شمال شرق أفريقية ، ولكنه يحل على جبال لبنان وسوريا وجبل الهرمون ، على أنه لا يوجد لا في كريد ولا في قبرص وربما كان يحل في جبال سينا (لأنه من سكان المناطق الجبلية) حيث أن الطيور التي تغشى قمم جبال هملايا في شمال غرب الهند ، تحل شتاء في اقليم البنجاب وهى في عاداتها لا تختلف كثيرا عن هذا .

مميزاته وعاداته : هو في حجم العصفور البيوتى . جناحه قرمزي . شكله العام رمادى . مولع بقمم الجبال صيفا وينحدر إلى وسطها شتاء أو تحت القمم بقليل . طعامه الحشرات سهل الطيران فوق الصخور القائمة العمودية .

قائص البندق Nuthatch
Wall - creeper Family (Sitta europaea).

الوصف : طوله حوالى : ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (١٥) شكل (٤)
الموطن : يقيم طول السنة فى أوروبا كلها حيث هو من الأوابد ، ولا يوجد فى النصف الشمالى الشرقى من اسكتلندا ولا فى أيرلند أو اسكتلندة أو صقلية أو سردينيا أو قورسقا . كذلك يقطن آسيا الصغرى وسوريا .

فى مصر . يقول يقول بأنه شاهده فى الجزيرة فى ١٠ فبراير سنة ١٩٠٣ .
مميزاته وعاداته : رمادى اللون فى أعلاه ، أكبر قليلا من العصفور الببوق . من هواة الأشجار ودائم الحركة يتحرك عليها كالفأر لأعلى وأسفل . لم يشاهد فى مصر للآن .

أبو قنزة ذهبية
Goldcrest = Gold -crested Wren. (Kinglet Family)
(Regulus regulus regulus.)
Wren. (Kinglet Family)

الوصف : طوله ٣ ١/٢ بوصة . انظر الصورة فى لوحة (١٥) شكل (٥)
الموطن : من الأوابد : يقطن ويقيم طول السنة فى جبال كل أوروبا ، ما عدا ألبيريا والبلقان (والا فى جبالها) منجولا أحيانا .
فى مصر : نادر الزيادة أو التجول لمصر ولم يسجل بعد من سيناء ولا من فلسطين . حصل يقول على اثنين من الذكور فى ١٢ أكتوبر سنة ١٩١٠ م وكذلك على اثنين آخرين فى ٩ سبتمبر سنة ١٩١٦ وكلها بالقرب من الجزيرة نفسها .
مميزاته وعاداته : يشاهد شتاء فى جموع صغيرة . خط خلف العين ليس شديدا . ليس له لون خاص بأغطية الأذن . القنة صفراء برتقالية خفيفة . دائم الحركة بين أوراق الأغصان . صوته (سى) يردده على الأشجار وتارة على قممها . طعامه الحشرات .

أبو قنزة نارية
Firecrest. (Kinglet Family.)
(Regulus ignicapillus.)

الوصف : طوله ٣ ١/٢ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٥) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا فى وسط أوروبا ، ويهاجر شتاء إلى جنوبها .
فى مصر : يذكر يقول فى كتابه صفحة ١٢ بأن Buxton شاهد ذكر منه فى حدود مصر الشمالية الغربية فى نوفمبر سنة ١٩١٦ ومن الصعب تصديق ذلك .
مميزاته : الخط الذى يشق العين واضح وأغطية الأذن واضحة والقنة أكثر وضوحا .

الفصيلة الدقناشية Shrike Family
Family (Lanidae)

تقطن هذه العائلة كل الدنيا ماعدا أمريكا الجنوبية وما عدا استراليا والجزائر وتكثر بالأقاليم الاستوائية والمتندلة ، ويوجد السواد الأعظم منها في افريقية ، وهي تتكون من حوالى ٧٠ نوعا (المعروف هو ٧٥ نوعا ، والحق الآن ٧٤ يقطن أورداسيا وإفريقية وأمريكا الشمالية وجزائر الهند الشرقية ما عدا الملايو وسيليس وغنيا الجديدة) ولا يوجد في أمريكا الشمالية غير نوعين فقط . تمتاز بأهلاب (شوارب) تخرج من قاعدة الفك العلوى ، كما أن لها خطا عرضيا أسود يبدأ من قاعدة المنقار ويمر بالعين إلى ما بعدها بقليل . المنقار قوى مدبب الطرف وبه تنوء يكون بيته يتخذها عدة للإفتراس ، ولأرجل البعض منها مخالب حادة يقبض بها الطائر على فريسته الضعيفة من العصافير وصغار الثدييات كالفتران والضفادع أو الزواحف ثم يشبها على فرع شوك لتثبيتها ، ومنها ما يأكل الخنافس والنمل الكبير والجعارين من فوق سطح الأرض وكذلك الحشرات الطائرة كالرعاش وهو على جناح الهواء . ويسمى الإنجليز والأمريكان النوع المقترس منها باسم (الطائر الجزار) birds — وذلك لشراسة من العض والافتراس لصغار العصافير .

تختلف الذكور عن الإناث . يوجد منها في مصر حوالى عشرة أنواع ، منها المهاجر ومنها المقيم طول السنة فيها لا يرحلها . مأواها المناطق الأهلة بالأشجار والنخيل كذلك الأماكن الخلوية البعيدة عن المبانى ، كذلك في مناطق الصحراء التى يثبت بها بعض الأشواك أو الشجيرات الصحراوية .

جنس الدقناش
Genus (Lanus .)

لطيور هذا الجنس ما للفصيلة من خصائص وميزات . وهي أيضا تقطن أوروبا وآسيا جنوبا إلى سيليبس وتيمور وفي إفريقية ، وأمريكا الشمالية إلى المكسيك . ولا تقطن أمريكا الجنوبية .

يغطي الريش والأهلاب جزءا كبيرا من فتحتى الأنف (المنخر) .
وفتحة الأنف مستديرة . الجناح مكوّن من عشر ريشات (القوادم) .

الصدر الرمادى الصغير
Lesser -grey shrike .
(Lanus minor .)

الوصف : انظر اللوحة ١٦ شكل (١) والطول حوالى ٨ ١/٢ بوصة
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط وجنوب شرق أوروبا (ووسطها وإيطاليا والبلقان وسردينيا وتوريسا) . كذلك في شمال وغرب آسيا إلى سيبيريا . يقضى الشتاء في أفريقيا الاستوائية والجنوبية .

في مصر : أشهر أنواع الصدر رؤىة فيها وخاصة في الدلتا في شمالها ، إذ يشاهد فيها من ٨ أغسطس إلى ٢٧ سبتمبر في الحريف فقط ، ولا يرى في الربيع في عودته ، ويرى على السواحل فقط ، ولا يرى في الواحات ولا في الفيوم ، ويشاهد كذلك في الحريف في سيناء . وتأتى الذكور أولا .

مميزاته : اسمه في رشيد قرناص أكحل . يوجد بكثرة في الحدائق والغابات والتخيل في الرمال على السواحل في اسكندرية وبورسعيد وكل ساحل البحر الأبيض المتوسط وكذلك دمياط . يعرف الذكر بصدره الوردى وجبهته السوداء ، والسواد في جبهة الأنثى أقل من الذكر . يجثم على قمم الأشجار والأشواك في الحلاء ، وأكثر ما يرى هو على أسلاك البرق والتليفون وسط المزارع والأشجار ، يترقب فريسته منها على الأرض . طعامه الحشرات والديدان كالجراد والخنفس ، يأكله أهل السواحل مثل رشيد والاسكندرية وبورسعيد ودمياط ضمن العصافير المهاجرة ومحسونه بعصفورين . يحرك ذيله أثناء وقوفه يظهر في طيرانه الخط العرضي الأبيض في ريش القوادم . يحدث ضجيجا عند أول قدومه وسط الجماعات بصوته المشهود . الشقان متماثلان .


صرد صحراوي رمادي كبير
Great Grey Shricke (Desert Form, .)
Lanius excu litor elegans

الوصف : طوله حوالي ٩ ١/٤ بوصة . انظر لوحة (١٦) شكل (٢)
الموطن : من الأوايد . يقيم طول السنة من صحراء الجزائر وتونس وسيرينكا ، إلى مصر في مصر : يشاهد في صحرائها وعلى طول شاطئها من السلوم إلى الإسكندرية وفي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي قرب الإسكندرية ، وعلى حافة الدلتا والفيوم ومنطقة قنال السويس في الطريق الصحراوي . نادر في الواحات وسينا .
مميزاته : مولع بالصحراء ، والأشجار الصغيرة التي تنبت في الصحراء ، لا يوجد في الأماكن الزراعية مطلقا (١) . طبائعه كسابقة . كفه أبيض وليس رماديا كالسابق . أكبر قليلا من السابق وجناحه مستدير قليلا عنه . إذا صاده الإنسان حيا عمل صلصلة كصلصلة الجرس (الناقوس) في نهاية صياحه .
توالده : العش في أشجار الصحراء . البيض من ٤ : ٦ بيضاء رافقه توضع في مارس بها بقع رمادية بنية .

صرد البحر الأحمر الرمادي الكبير
Great Grey Shricke (Red Sea Form.)
(Lanius excubitor aucheri)

الموطن : طوله حوالي ٩ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (١٦) شكل (٣)
الموطن : من الأوايد : يقيم في فارس والعراق وشمال بلاد العرب وفلسطين وجنوب سيناء . في مصر : يشاهد طول السنة في جنوب سيناء وعلى سواحل البحر الأحمر .
مميزاته : كالسابق ولكن أجزاءه العليا أكثر عتيا والسفل دائيا مغطاة رمادي مزرق فاتح وخاصة على الخافضة والصدر . الباقي كالسابق .
توالده : كالسابق .

(١) شاهدته في ضواحي الزقازيق جوار السكة الحديدية المتجهة إلى الإسماعيلية - في الأراضي الزراعية في القرية يوم ١٣ يوليو سنة ١٩٦٤ م ، ويظهر أنه يتجول في الأراضي الزراعية والقرى . واسمه في أمريكا هو Northern Shrike





ص ٨٤

Abyssinian Sunbird (or)
Shining Sunbird. (Arabian Form.)



ص ٨٥

Nile Valley Sunbird.




ص ٨٦

Wall Creeper.
(Summer)




ص ١٠١

Nuthatch.



ص ٨٦

Goldcrest.



ص ٨٦

Firecrest.

صرد بحر قزوين الرمادى الكبير
Great Grey Shrike (Transcasian Form)
(*Lanius excubitor Pallidirostris* .)

الوصف : طوله حوالى ٩ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (١٦) شكل (٤)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة في منطقة بحر قزوين والتركستان الروسية . البعض يقضى الشتاء في العراق وشمال شرق إفريقية .
في مصر : شاهد ميز تزهاجن أنثى منه عند القصير على البحر الأحمر في ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٨ م وهذا هو التسجيل الوحيد له .
مميزاته : يختلف عن السابقين بأن أجزاء السفلى مغطاة بلون وردى قذر ، والريش المحيط بقاعدة الفك العلوى مائل للبياض وليس أسود كما في صرد الصحراء وصرد البحر الأحمر السابقين .
البياض على الخواقي حجمه أكبر من السابقين .

صرد شامى أوروبى
Woodchat (European Form .)
(*Lanius senator senator* .)

الوصف : طوله : ٦ ٣/٤ بوصة . انظر اللوحة (١٦) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً في جنوب غرب أوروبا
في مصر : يشاهد بكثرة في الحريف في شمال الدلتا من ٤ أغسطس إلى ١٧ سبتمبر ، ويشاهد كذلك في الربيع ولكن قليل جداً ، ويُرَى من ١٦ مارس إلى ٢٢ إبريل وشوهد عندئذ بكثرة في اليوم ووادي النطرون ، ولم يشاهد في سينا لا في الربيع ولا في الحريف رغم أنه يمر على فلسطين في الاعتدالين .

مميزاته وطبائعه : عاداته وغذاؤه كغيره من السابقين . أجل أنواع الصرد رؤية في مصر . القنة قسطنطين براءة جذابة . الردف أبيض يظهر عند الطيران يكون بصحبة الصرد المهاجرة في الحريف وكذا الدقائش . يسميه البعض (قرناص شامى) المنكب أبيض وظهره أسود . الأنثى كالذكر ولكن السواد يحل محله لون بني أسود واللون القسطنطيني في القنة يكون أفصح لونا ، والأنثى أكبر من الذكر . والناقص لونه غريب مختلف (انظر اللوحة ١٦ شكل (٥))

صرد شامى شرقى
Woodchat (Eastern Form)
(*Lanius Senator niloticus*)

الوصف : طوله حوالى ٦ ٣/٤ بوصة . انظر اللوحة (١٦) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً في فارس وفلسطين ويهاجر شتاء إلى السودان وبلاد الحبشة ومستعمرة كنيا ولا كذلك في جنوب خط الاستواء

في مصر : حصل عليه من سيناء بين ٦ أغسطس ، ٢٧ سبتمبر . شائع في مصر في الربيع بين ١٦ مارس ، ٨ ابريل . يحل في هجرته في وادي النطرون والواحات الداخلة والخارجة في الربيع ولم يعرف في الفيوم في الربيع .

مميزاته وطياته : كغيره من الصرد . في كل الريش وفي الذكر والأنثى معا نجد قاعدة ريش وسط الذيل أبيض لمسافة ٢٠ مليمترا على الأقل . يوجد في صقيلية نوع آخر ليس فيه البقعة البيضاء في الجناح يقيم فيها طول السنة .

الدقناش القبطي (الدقناش المقنع)

(Masked Shrike)

(Lanius nubicus)

الوصف : طوله حوالي ٦ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (١٦) شكل (٨)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في آسيا الصغرى واليونان وجنوب يوغوسلافيا إلى جنوب فارس ، وفي قبرص وسوريا ويتجول في هجرته على غرب أوروبا ، ويمر في الخريف على مصر وميسوبوتاميا .

يقضى الشتاء في شمال شرق إفريقيا وجنوب بلاد العرب والسودان والعراق .

في مصر : يشاهد - ولكن بقلّة - في الربيع والخريف - ونادر في الدلتا ولم يعرف بعد في غرب الإسكندرية أو الفيوم أو واحات الصحراء الغربية . شائع في الربيع أكثر من الخريف . الخريف من أوائل سبتمبر إلى أواخر أكتوبر ، والربيع من ١٢ مارس إلى ٧ مايو ، وقليل منه يقضى الشتاء في مصر العليا من كوم أمبو إلى أسوان ووادي حلفا .

مميزاته : من أجل أنواع الدقناش لونا ، فهو جميل المنظر للغاية ، ولكنه لا يصطحب مع باقي الدقناش بل يكون منفردا . جبهته بيضاء وكذا كتفه .

الدقناش الأكحل Red - backed Shrike

(Lanius cristatus collurio)

الوصف : طوله حوالي ٧ بوصة . انظر اللوحة (١٦) شكل (٧)

الموطن : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا شبه جزيرة أيبيريا واسكندناوة كذلك في منطقة بحر قزوين وآسيا الصغرى وسوريا والتركستان . يهاجر شتاء إلى إفريقيا الاستوائية والشرقية والجنوبية وبلاد العرب .

في مصر : كثير جدا في الخريف من ٤ أغسطس إلى أوائل أكتوبر ، وخاصة في شمال الدلتا بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط . ويندر رؤيته في الربيع فيها على أنه في سيناء في الربيع أكثر من الخريف .

مميزاته : الذكر جبل المنظر ، كحيل العين ، ولذا يسميه أهل رشيد (الدقنوش الأكل) ، والأنثى (الدقنوش الأقرع) وهذه التسمية في معظم سكان شمال الدلتا ، الإسكندرية أيضا ^(١) الباقي كغيره كثير الصباح إذا قدم من هجرته في أى مكان ويصبح جماعات ، ومتفردا أحيانا .

الدقناش الرملى (دقناش أحمر الذيل)

Isabelline Shrike = Red - Tailed Shrike

(Lanius cristatus isabellinus)

الوصف : الطول ٧ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٦) شكل (٩)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط آسيا من التركستان الشرقية إلى منغوليا ، ويقضى الشتاء في شمال غرب الهند ، وجنوب العراق ، وجنوب غرب بلاد العرب ، وفي السودان والحيشة .
في مصر : حصل اسكرادار على ذكر من جبل علبة في ٢٨ مارس سنة ١٩٢٨ م ، واصطاد كذلك ميتر تزهاجن ذكرا منه من القصير على البحر الأحمر في ٢١ فبراير سنة ١٩٢٨ م
مميزاته وطبائعه : مثل زملائه السابقة .

دقناش بصدر وردى

Rose-Patched Shrike

(Rhodophoneus Cruentus Cruentus)

الوصف : الطول حوالى ٩ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (١٦) شكل (١١)
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة في السودان شمالا في منطقة البحر الأحمر إلى جبل علبة في مصر ، وجنوبا إلى إريتريا والحيشة .
في مصر : يقيم طول السنة عند جبل علبة في جنوب شرق مصر على البحر الأحمر .
مميزاته : أليف لا يخشى من أحد أذى . مأواه الأشجار وخاصة الشوكية منها . يوجد في أسراب عائلية . الأجزاء السفلى قرمزية اللون وتلك ميزة هامة له وخاصة به عن غيره من بني جنسه وفصيلته .

فصيلة الخنثاق (هيبوكوليوس)

Family (Hypocolius) Shrike Family

تمتد مواطن هذه الفصيلة بأنواعها من إفريقية إلى ساحل جنوب آسيا حتى غينيا الجديدة وأستراليا .

وهي تمتاز بمناقير قوية أطرافها ومدببة ومقوسة ، وعلى الرسغ توجد صفائح صغيرة ترسية كثيرة ، الأمر الذى يعتبر أهم مميزات هذه الفصيلة . يغلب على ريشها اللون الواحد يختلف بين الأسود والبني والأبيض والرمادى . وتعيش هذه الطيور في الغابات والأدغال ، كما أنها تتغذى على الحشرات والثمار البرية

(١) قد يعترض أحد على تسمية الذكر باسم والأنثى باسم آخر ولكن أقول له بأن ذلك يوجد أيضا في الاسماء الإنجليزية مثل المجوالة الذكر اسمها Ruff ، والأنثى اسمها Reeve

جنس الخنثاق (هيبوكوليوس)
Genus (Hypocolius)

تتميز طيور هذا الجنس بقصر قدامتها الأولى التي لا تكاد تصل إلى غطائيات القوائم . الباقى مثل
الفصيلة من طبائع ومن سمات .

الخنثاق الرمادى
هيبوكوليوس رمادى Grey Hypocolius
(Hypocolius ampellus)

الوصف : الطول حوالى ٧ ١/٢ بوصة

انظر لوحة (١٦) شكل (١٠) ولوحة (٧٥) والأنثى أصغر قليلا من الذكر .

الموطن : من الأوبد ومتجول أحيانا . يقيم السنة في شمال شرق إفريقية وفي الهند .

في مصر : أدخل ضمن قائمة الطيور المصرية لصيد واحد منه من وادى شلال بجبل علبة على
ساحل البحر الأحمر جنوب شرق مصر في ٣٨/١٢/٢٢

مميزاته : لون الذكر العام رمل اللون مائل للرمادى . له بقعة عرضية سوداء تشق العين وتغطى
الأذنين ، وغطاء الأذنين به صبغة فضية القوائم سوداء وأطرافها بيضاء أو بيضاء رمادية . أطراف الذيل
سوداء .

الفصيلة البلابية

Bulbuls Family

Family (Brachypodidae) = Bulbuls

تمتاز طيور هذه الفصيلة بريشها المتناهي في نعومتها ، وشاربها المعتدل ، واستطالة ريش القنة قليلا . يعمل أشبه تاج قليل الملاحظة ، كما أن الأجنحة مستديرة ، والشقان متماثلان في لونهما وليس بينهما فروق ملحوظة . ويعرف من هذه العائلة ١١٩ نوعا توجد حاليا هي الآن وهي على ١٥ جنسا ، موطنها أفريقية وجنوب آسيا ، وبلاد العرب ، وجنوب شرق استراليا وأندونيسيا . تتخذ أعشاشها بقلب الأشجار عموما ، البيض أبيض ، وهي تغني بصوت لذيذ عذب ، محصورة وجودها في المناخ الدافئ والمعتدل ، غذائها الرئيسي الفواكه الناضجة أهمها التوت والبرقوق وذلك بالإضافة إلى الحشرات . ومنها ما يوجد غرب أوروبا كما أنها تستوطن أيضا المناطق الاستوائية وهي تأوى إلى الحدائق والمروج والفياض وسط المدن والقرى على السواء ، قرب المساكن أو بعيدة عنها . وهي بطيئة الطيران . تأوى كذلك إلى سفوح الجبال والتلال بشرط أن تكسوها الأشجار . وهي تعرف بمجرد سماع صوتها ، وتكون دائما مثنى ويندر أن ترى منفردة .

وللمهنود في جزيرة سيلان طرق عجيبة في اقتناء هذه البلاب حيث أن الهندوسيلان مكتظة بها ، نجدهم يأخذون ذكور البلاب من أعشاشها ويدربونها على أن تقف على أيديهم بعد أن تتمرن ويربطون أرجلها بخيط ثم يواجه كل واحد طائره (بلبله) تجاه الآخر حتى يحدث بينهما عراك كما نفعل نحن عندنا في عراك الديكة والحرفان ، ويتسل المهنود بذلك المنظر ، وإذا احتلم العراك بينهما جذب أحدهما بلبله خوفا من تطور المعركة إلى موت أحدهما . ويوجد البلبيل الأحمر العجز (الشرج) في استراليا أيضا حيث أدخل فيها من آسيا .

نوعان منها بداخل الحدود المصرية يقيمان فيها من جنس بكنونوتوس (Pycnonotus) البلاب (Pycnonotus) لهذا الجنس ما للفصيلة منميزات وأنواع .

البلبيل المصرى

White — vented Bulbul (Egyptian Form)

(Pycnonotus barbatus arsiniae)

الوصف : طوله حوالى ٧ بوصة انظر اللوحة (١٧) شكل (١) .

الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة في مصر والسودان ، ولا كذلك في شبه جزيرة سيناء .

في مصر : في كل مكان من شمالها إلى جنوبها ، ويكثر حول القاهرة وفي الفيوم وحول الجيزة في حدائقها ، وهو لم يظهر في الدلتا إلا عام ١٩٠٩ م ثم أخذ في الزيادة بعد عام ١٩٤١ م في شمالها .

مميزاته : كله بنى كستتائى فى أجزائه العليا ، وأبيض فى السفلى والرأس وما حوله أسود . كثير فى الأقصر وأسوان والفيوم ، بل وكل مكان فيه حدائق مثل حدائق الجيزة والأورمان ، بل وفى قلب القاهرة بداخل الحدائق إبان ثمار الثوت التى يأكلها .
توالده : العش من العصى الرفيعة يطن بالشعر أو الصوف ، يتخذ على الأشجار أو النخيل ، البيض من ٣ : ٥ توضع فى أواخر مارس .

البلبل الفلسطيني

Yellow - vented Bulbuk (Palestine Form)

(Pycnonotus capensis vallonbroose)

الوصف : طوله حوالى ٧ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (١٧) شكل (٢) .
الموطن : من الأوبد . يتوالد فى فلسطين ويطره فى شمال غرب بلاد العرب ، وفى جنوب سيناء حيث هو كثير فى وادى فيران .
مميزاته : كسابقه وطعامه الفواكه مضافة إلى الحشرات كالسابق تماما . الباقي كالسابق ، وهو لا يمتطى الجبال فى سيناء على علو أكثر من ٣٠٠٠ قدم .
فى مصر : كما ذكر ، وزيادة على ذلك فإن يقول حصل على ذكر عند خزانات ، الدلتا فى ١١ إبريل سنة ١٩٢٠ كان فى صحبة بلبل مصرى .

عائلة آكلة الذباب

Family (Muscipidae) Flycatchers

تتكون هذه العائلة أو الفصيلة من حوالى ٤٠٠^(١) نوع تختلف كل الاختلاف فى ألوانها وفيها بينها وفى أشكالها وحجمها ، ومنها ما يكون قريب الشبه منها داخلا فى طبائعها مثل الدقائش (Shrikes) على أنها تشمل الموزاج Warblers والثرثار Babbler والدج Thrushs ، والأبلق Wheatears والمسويده chats والقلبي Whinchats والفسقه Stonechats وأخيرا أبا الحناء Robins وهذه يرى منها فى مصر حوالى ٧٢ نوعا مختلفا فى أجناسها وطبائعها .
على أن الأجناس الأصلية من نوع آكل الذباب بالذات Genus (Muscipidae) يرى منه فى مصر ٦ أنواع فقط .

وهذه الفصيلة كلها تعتبر عالمية التوزيع وأكثر ما تكون وجودا هو فى إفريقية وياقى الدنيا القديمة وهى تغشى المناطق الاستوائية والمعتدلة تقريبا ، وهى تعيش فى المناطق التى تكتظ بالأشجار إذ حيث هى المأوى الطبيعى لها ، والمورد من الفواكه التى تأكلها أحيانا على أن غذاءها الرئيسى هو الحشرات كالفراش والدايدان والنمل الكبير والصغير والخنفساء الصغيرة ، حيث هى تلازم غصن الشجرة تطل

(١) الخاص بآكلة الذباب بالدنيا القديمة ، والى هى تحمل اسم (Flycatchers) هى ٣٥ جنسا يعرف منها ٢٨٦ نوعا هى الموجودة أيضا حاليا .

حولها على الحشرة ثم تطير من الفرع إلى مكان منخفض جريا وراء الحشرات سواء كانت طائرة أو على الأرض فتأخذها ثم تعود إلى نفس المكان الذي كانت عليه من قبل ، وتتموج عندئذ في طيرانها ومناكير هذه الفصيلة قوية نوعا ما ومستدقة ولها أهلاب (شوارب) ظاهرة عند قاعدة المنقار .

منها ما يأوى إلى الأشجار في الحدائق في الوديان أو التلال أو الجبال ، ومنها المغنى المتواضع ومنها الصادح المطرب ومنها الصامت ، ومنها المهاجم الجريء لعدوه الأكبر منه حججا الشجاع مثل الذى فى الولايات المتحدة المسمى (Musciura forficata) (Scissor-tailed Flycatcher) أكل الذباب أبو ذبل مقص ، فقد يهاجم الغربات . أولادها الصغيرة دائما بها نقط ويقع وخطوط . وكثير من هذه الفصيلة لها ميزة أنها تحرك ذيلها ، وأجنحتها بمجرد استراحتها على الغصن أو الأرض لفترة وجيزة .

قائص الذباب الأرقط - صياد الذباب

(Spotted Flycatcher)

(Muscicapa striata striata)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة انظر اللوحة (١٧) شكل (٣)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا فى كل أوروبا وشمال غرب إفريقيا ، وتقضى الشتاء فى جنوب إفريقيا إلى الكاب .

فى مصر : تشاهد بكثرة فى الحريف من ٢٥ أغسطس إلى ٢٠ أكتوبر ، وفى الربيع (ولكن أقل) من ٣ إبريل إلى ٢٢ مايو . فى كل مصر ما عدا الواحات .

مميزاته وطبائعه : يختار الطائر مكانا بارز الوضوح مثل غصن شجرة قائم عار مرتفع أو القمة العارية أو عصا قائمة فوق سطح فى الريف وأحيانا فى المدن ، أو طرف القبة فى المسجد فيتخذ مقرا يقف عليه لصيد فريسته من الحشرات الطائرة التى يتناولها على جناح الهواء ثم يعود إلى مكانه ثانية لعودة الكرة ، ويمجد وقوفه يحرك ذيله وأجنحته لأعلى وأسفل محدثا صوتا . اسمه فى رشيد (أم جمعة) . قد يقف على أسلاك البرق وأشواك كرانييف النخيل . يغشى الحدائق والمناطق الشجرية وأحيانا الأماكن الفسيحة ذات الأشجار الشوكية أو الاشواك .

صياد الذباب الأبقع الأوروبي

Pied Flycatcher (European Form)

(Muscicapa hypoleuca hypoleuca)

الوصف : طوله ٥ بوصة . انظر اللوحة (١٧) شكل (٤) ، (٥)

الموطن : من القواطع : يتوالد فى كل أوروبا ما عدا البلقان وفرنسا .

فى مصر : يرى فيها فى هجرته فى الربيع بين ١١ إبريل ، ٢١ منه ويكون جميل المنظر جدا مكونا من لونين : نهار شامس ، وليل دامس ، وهو فى الربيع أكثر من الحريف فىرى فى الدلتا ومصر العليا ووادى النطرون ، أما فى الحريف فيكون قليل العثور عليه ولا يكون لونه جذابا كما فى الربيع .

مميزاته وطبائمه : كالسابق ولكنه لا يكون مكشوفاً ظاهراً كالسابق ، بل يتوارى في قلب الأشجار وقليل أن يرى مكشوفاً .

المهجرة : يقضى الشتاء في كل إفريقية ولكن لا يبعد جنوباً عن خط الاستواء .

صياد الذباب المطوق الغربى
Collared Flycatcher (Western Form)
(Muscicapa albicollis albicollis)

الوصف : طوله حوالى ٥ ¼ بوصة : انظر الصورة لوحة (١٧) شكل (٧)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً في إيطاليا وشمالها في وسط أوروبا لغاية بحر البلطيق ثم جنوباً إلى كل شبه جزيرة البلقان . يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية جنوباً إلى إقليم الطوارج وأوغندا ، ويندر أن يبعد جنوباً أكثر من خط الاستواء .

في مصر : يشاهد فيها في الربيع فقط طول شهر إبريل .

مميزاته وطبائمه : كسابقه .

صياد الذباب المطوق الشرقى
Collared Flycatcher (Eastern Form)
(Muscicapa albicollis semitorquata)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة انظر اللوحة (١٧) شكل (٨)

الموطن : من القواطع : يتوالد في القوقاز وشمال فارس وأرمينيا وأجزاء من آسيا الصغرى .


في مصر : يرى فيها في هجرته لها في الربيع فقط من ٢٥ مارس إلى ١١ أبريل ، حيث يمر على الدلتا في جموع كبيرة وعلى الفيوم ووادي النطرون ، على أنه يرى في سيناء أيضاً في الربيع بين ١٨ أبريل ، ١٨ مايو .

مميزاته وطبائمه : الخزمة البيضاء في رقبة الذكر تمتد إلى ما تحت القفا بقليل وتتصل بالسواد في الرأس والظهر ، ولذا فإن الطوق الأبيض ظاهر في جوانب الرقبة ، في حين أنه ليس ظاهراً في الأبعد الأوروبى . الجناح كالغربى وجانب ريش الذيل أبيض .



صياد الذباب بصدر أحمر
Red-breasted Flycatcher
(Muscicapa parva Parva)


الوصف : طوله حوالى ٤ ¼ بوصة . انظر اللوحة (١٧) شكل (٦)

الموطن : يتوالد في النصف الشرقى من أوروبا إلى غرب سيبيريا ويقضى الشتاء في شمال غرب الهند ، ولذا فهو من القواطع .




Great Grey Shrike 3 Species





ص ٩٣

(١) White-vented Bulbul



ص ٩٤

(٢) Yellow-vented Bulbul.



(٣)

Pied Flycatcher
(European Form.)
(Summer & Spring)

ص ٩٥



(٤)

Ditto
Autumn &
Winter

ص ٩٥



(٥)

Red - breasted
Flycatcher

ص ٩٦



(٦)



(٧)

Collared Flycatcher.
(Western Form.)

ص ٩٦



(٨)

Collared Flycatcher.
(Eastern Form.)

ص ٩٦

في مصر ينذر أن يرى فيها ، ويوجد بالمتحف الحيواني ٦ أفراد منه حصل عليه بين ١٤ أكتوبر ، ١٨ نوفمبر .

مميزاته وطبائعه : يشبه الأبلق أو القليعي في طبائعه . يغشى قرار القصب والأشجار الصغيرة يأكل الحشرات غالباً على الأرض صدره أحمـر .

Warblers فصيلة الهواذج أو (السلفيداي)^(١) Sylvudae Warbler Family

تحتوي هذه العائلة المغنية (Warblers) على أكثر من ٣٠٠ نوع كلها من آكلات الحشرات ، وهي ضئيلة الأجسام ، مستطيلة الأبدان ، دقيقة المناقير ، يوجد أكثرها أو حوالي ثلثها (١/٣) في إفريقيا والباقي في أوروبا وآسيا وكذلك في أجزاء من أمريكا الشمالية . ومنها القواطع ومنها الأوبد التي لا تيرج أمكنتها طول العام . وتغشى هذه الهواذج الأدواح (الأشجار العظيمة الضخمة) والحمائل والأشجار الصغيرة وكذلك القصب النامي في المستنقعات والنباتات والسفانا حيث يحتوي كل ذلك على الحشرات الطيارة والديدان الخ التي تلصق بالفروع الدقيقة ، في حين أن البعض منها يأكل الثوت البرى ومنه ما يأكل الثوت المعروف . وهي تكثر في المناطق المعتدلة ، يأوى إلى مصر منها حوالي ٥٧ نوعاً ، يتفرع منها الأنواع والأجناس الآتية .

جنس النقشارة والسكسكة (فلسكوبوس)

(شاديات الحمائل)

Phylloscopus

Warbler Family

يشتمل هذا الجنس (Gynus) على العصافير الصغيرة التي تقطن جميع المناطق الباردة والمعتدلة من الدنيا القديمة ، على أن نوعاً قريب الشبه منها يأوى إلى شمال غرب الدنيا الجديدة .

وهي تتميز بمناقيرها الضعيفة المهيئة لأكل الحشرات ، إذ هي عريضة قليلاً عند قاعدتها ، مستديرة من وسطها ، ولون أجزائها العليا مائلة للخضرة والسفلى للصفرة وتعطى الطائر عموماً لونا أخضر يتناسب مع لون أوراق الحمائل والأدواح التي تعيش بين أغصانها وفي ربوع أوراقها فيصعب بذلك رؤيتها ما لم تتحرك حيث هي دائمة الحركة لا ترى واقفة ثابتة أبداً ، بل تنتقل من غصن لغصن ، ومن فنن لفنن بحثاً عن اليرقات النباتية والمن اللاصق بأوراق الأشجار والحشرات القشرية والمعتادة ، وكذا الديدان والبق الدقيقى والندوات العسلية وما يشابهها فهي بذلك في غاية الحركة والنشاط .

والعش إما على الأرض مباشرة أو فوق شيء بارز على الأرض قليلاً مثل حجرة أو قطعة خشب أو كوم من الطين والعشب أو أعشاب يابسة أو في شق جذع شجرة .

(١) لوجود الآن هو ٣٢١ موزعة في كل الدنيا ماعدا بلاد العرب والصحراء الكبرى الإفريقية والولايات المتحدة والنصف الجنوبي من أمريكا الجنوبية وكذلك في استراليا وهي ٦١ جنساً وذلك خاص بالدنيا القديمة .

ومن عجيب أمر هذا الجنس أنك تجد فيه فتحة العش مواجهة للشمس حتى يتمتع الأولاد بقسط وافر من التدفئة وأشعة الشمس كأن ذلك لازم له ومن ضروريات حياته كما نفعل نحن عندنا في المنازل ونرى أن من شروط القواعد الصحية دخول الشمس في الحجرات ، وكذلك كما ترى في أبي الهول في مصر فإن وجهه مواجه للشمس التي هي عندهم مصدر الحياة للعالم كله . والبيض في الاثنين من ٤ : ٧ لونه أبيض وبه نقط بنية . يرى منها في مصر ٩ أنواع تشمل النقشارة أو مغنى الصفصاف الغربى والشرقى ، والسكسكة الغربية والشرقية ، ومغنى بونلى الغربى والشرقى ، ومغنى الغياض الشمالى والجنوبى ، والمغنى ذو الحجاب الأصفر .

نقشارة الغرب = مغنى الصفصاف الغربى

Willow-warbler = Willow-wren (Western Form.)

(Phylloscopus trochilus trochilus.)

الوصف : طولها ٥, ٤ بوصة وتارة ٥ بوصة . انظر لوحة (١٩) شكل (١)
الموطن : تتوالد في وسط وشمال أوروبا كلها (لا تتوالد في البلقان أو إيطاليا أو شبه جزيرة أيبيريا) وذلك صيفا ولذا فهي من القواطع . تقضى الشتاء في جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقيا ، ومن شرق وغرب إفريقيا الاستوائية جنوبا إلى الكاب .
في مصر : شائعة في مصر في الخريف من أواخر أغسطس إلى نهاية أكتوبر وخاصة في شمال الدلتا ، أما في الربيع فهي نادرة الظهور .

مميزاتها وعاداتها : نفس حجم السكسكة دائمة الحركة بين أوراق وغصون أشجار الدوح والحمائل ، كما تشاهد كذلك في الأشجار المنخفضة والحشائش الطويلة . صوتها معروف hooee لذيذ شجى ، اسمها في رشيد الحُضِيرى ، . أرجلها دائما صفراء شاحبة ، والأجزاء السفلى بيضاء ولكن ليست ناصعة بل مصفرة قليلا (١) . طعامها الحشرات واليرقات على جناح الهواء وفي الاستراحة .

نقشارة الشرق = مغنى الصفصاف الشرقى

مغنى الصفصاف الشمالى

Willow-warbler = Willow-wren (Eastern or Northern Form)

(Phylloscopus trochilus eversmanni.)

الوصف : طولها حوالى ٤ ١/٢ بوصة وتارة ٥ بوصة . انظر اللوحة (١٩) شكل (٤)
الموطن : من القواطع : تتوالد في سيبيريا وشمال شرق أوروبا صيفا . وتقضى الشتاء في إفريقيا الاستوائية ونادرا في غربها .
في مصر : تشاهد في الخريف فقط من آخر سبتمبر إلى ١٧ أكتوبر ، وتكون كثيرة في الدلتا والفيوم ووادى النطرون ومصر العليا .

(١) الأنثى أقل لمعانا من الذكر والأجزاء السفلى في الناهض مصفرة قليلا أما في البالغ فهي بيضاء الجسم زيتون مخضر من اعلاه - المنقار بنى - الأرجل بنى فاتح أو أحمر عسل ، طيرانه منكسر ، الأجزاء السفلى صفراء وليست بيضاء .



لاحظ قصر أول قادمة
Wood Warbler

(١)



Reed Warbler




لاحظ قصر ثان قادمة
Chiffchaff.

(٢)



Marsh Warbler

(٣)



لاحظ طول ثان قادمة عنها في السككة السابقة .

Willow-Warbler

Wing Formulae

مميزاتها : تختلف عن السابقة بأنها خالية من اللون الأصفر أو الأخضر في ريشها ماعدا حافة الجناح والسواعد التي هي صفراء شاحبة ، وأجزاءها العليا سمراء شعرية والسفلى بيضاء مغطاة بلون أصفر جلدي مائل للرمادي . طبائعا كالسابقة .


السكسكة الغربية (Chiffchaff (Western Form.)
(Phylloscopus collybita collybita.)
Warbler Family.

الوصف : طولها من ٤ : ٥, ٤ بوصة . انظر لوحة (١٩) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شمال ووسط أوروبا ، وتنتجول في جنوبها ، . تهاجر شتاء إلى فلسطين ومصر وميسوبوتاميا وشمال غرب إفريقيا الاستوائية وإقليم البحر الأبيض المتوسط والسودان والحبشة
في مصر : تقضي الشتاء في مصر وتكون شائعة بكثرة ، من أوائل أكتوبر إلى منتصف إبريل حيث تكون مختلطة في الحريف مع مغنى الصفصاف ، وتكون في مصر في كل مكان — في الدلتا والفيوم ووادي النطرون ومصر العليا وسيوة ، وتكون في سينا أقل من مصر ، من أكتوبر إلى آخر مارس .
مميزاتها : الأجزاء السفلى بيضاء وليست صفراء ؛ صوتها مأخوذ من اسمها هكذا تقريبا (chiff- chafetc....) ولكن يندر أن يسمع هذا الصوت في مصر ، على أن لها صوتا آخر يسمع في مصر بنفس الصوت لمغنى الصفصاف وهو هكذا تقريبا (hoeee)
ويسمع أثناء تحركها . تختلف كذلك عن السابقة في أن أرجلها بني غامق سوداء وظهرها كذلك أغقم من السابقة . انظر الأجنحة



willow wosbler

لاحظ ثاني وخامس قاعدة على خط واحد
كذلك ٣ ، ٤ ، على خط واحد أيضا
وكذلك الجناح مستطيل وليس مستدير
كالذي على اليمين للسكسكة ،



lchiffchaff

لاحظ ثاني وسادس قاعدة على مستوى واحد تقريبا
كذلك ٣ ، ٤ ، ٥ ، على خط مستقيم واحد أيضا
لاحظ أيضا أن الجناح مستدير .

السكسكة الشرقية (Eastern Form.) Chiffchaff

(Phylloscopus collybita abietina.)

Warbler Family.

الوصف : طولها من ٤ : ٥, ٤ بوصة . انظر اللوحة (١٩) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال وشرق أوروبا شرقا إلى القوقاز . وهي في الشتاء تزور حوض البحر الأبيض المتوسط (شرقه فقط) وكذلك تزور فلسطين والسودان والحبشة ، وجنوب بلاد العرب .
في مصر : شائعة شتاء ولكن أقل من الغربية السابقة ، وأمكن الحصول عليها بين أول أكتوبر وأول إبريل ، وهي شائعة بكثرة عن غيرها في أسوان في فبراير ، وشوهدت في القصير وسينا شتاء .
مميزاتها وطبائعها : تختلف عن الغربية السابقة بأن جناحها أطول ، وأجزاءها العليا أكثر سمرة ، والسفلى أقل صفرة . ويصعب التمييز بينها وبين الغربية في الربيع إلا في الحجم ، أما في الخريف فيسهل التمييز .
الباقى من الطبائع كسابقتها .

هازجة بونلي الغربية

Bonelli's Warblers (Western Form.)

(Phylloscopus Bonelli bonelli.)

الوصف : طولها حوالي ٤ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (١٩) شكل (٥)
الموطن : من القواطع . تتوالد صيفا في جبال وسط وجنوب غرب أوروبا ، تقضى الشتاء في إفريقية وخاصة في شمالها الغربي وجنوب الصحراء الكبرى .
في مصر : تزورها في الربيع والخريف ولكنها نادرة في رؤيتها عندئذ ، وحصل عليه من ١٤ إلى ١٩ أغسطس فقط وكله من الدلتا ، وأيضا من ٢٨ مارس إلى ١٥ إبريل من وادي النطرون والفيوم والدلتا .

ولم تسجل بعد من سيناء .

مميزاتها وطبائعها : أهم ما يميزها هو ردفها الأصفر الشاحب ، وأجزاءها السفلى التي هي تميل للبياض أكثر من غيرها من سابقتها . تغشى الأشجار الضخمة (الدوح والخمائل) مثل الجميز والكافور والكازواوين الخ . الأجزاء العليا في الربيع بني مائل للرمادي ، له خط حاجبي أصفر مائل للبياض . من ثالث إلى خامس قادمة على خط واحد . القدم أسمر بني طيرانه أكثر تموجا وهو أنشط ويفضل قمع الأشجار حيث يتناول من فوقها الحشرة مثل صياد الذباب Flycatcher على جناح الهواء .

هازجة بونلي الشرقية

Bonelli's Warbler (Eastern Form.)

(Phylloscopus bonelli orientalis.)

الوصف : طوله ٤ ٢/٤ بوصة . انظر اللوحة (١٩) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في اليونان وآسيا الصغرى وفلسطين وكريشيا ، وفي الشتاء يزور فلسطين وشمال غرب بلاد العرب وشمال العراق إلى السودان .
في مصر : هي أكثر شيوعا من النوعين السابقين ، وشوهدت جموع كبيرة لها في الربيع بين ١٢ مارس ، ٢٦ إبريل في وادي النطرون ومصر العليا والدلتا .
وهي نادرة في الحريف من منتصف أغسطس إلى نصف سبتمبر .
مميزاتها : أجزاءها العليا أكثر وضوحا في اللون الرمادي الرائق مع ميل للصفرة الخفيفة ، وهي أكبر منها . الباقي كسابقتها . وأهم ما يميزها هو ردفها الأصفر كالسابق .

مغنى الغياض الشمالي

W ood - warbler = W ood - wren (Northern Form)

(Phylloscopus Sibilatrix Sibilatrix)

الوصف : طوله من ٤ ١/٢ : ٥ بوصة انظر لوحة (١٩) شكل (٧)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا اسكندناوة وجنوبها المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط . يقضى الشتاء في أفريقية في السودان والكونغو ولكنه لا يتعدى خط الاستواء جنوبا .
في مصر : موجود في مصر بكثرة في الربيع طول شهر إبريل ، ولكنه نادر جدا في الحريف ، وسجل مرة في الربيع في وادي فيران في ١٤ إبريل في سيناء ، وعثر عليه في الحريف في اسوان في ٤ سبتمبر .
مميزاته وطبائعه : أصفر كبيرتي في الزور ، البطن بيضاء ، حروف ريش الخواقي صفراء . الأرجل صفراء عسليه . (١) يلزم الصمت عن غيره . الباقي كغيره من الطبائع التي في مغنى الصفصاف .

مغنى الغياض الجنوبي

W ood — warbler = W ood — wren (Southern Form)

(Phylloscopus Sibilatrix Flavescens .)

الوصف : طوله من ٤ ١/٢ : ٥ بوصة انظر اللوحة (١٩) وشكل (٨)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب أوروبا وفي الساحل الشمالي من حوض البحر الأبيض المتوسط ما عدا اليونان . يقضى الشتاء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ولكن لم يعرف في السودان .

(١) له حاجب أصفر ملحوظ - المنقاري .

في مصر : يوجد فيها في الربيع طول شهر إبريل ، ولكنه لا يوجد في الخريف إطلاقاً في مصر ولا في سينا .

مميزاته وطبائعه : هو في لونه العام أكثر صفرة من السابق ، كما أنه نجد في بعض الأنواع أن الأجزاء العليا خاصة الجبهة والفئة لونها أخضر ذهبي . الباقي كالسابق .

مغنى بحاجب أصفر

Yellow - Browed Warbler

(*Phylloscopus inornatus* = *Supercilliosus auctorum*)

الوصف : طوله : ٤ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٩) شكل (٩)
الموطن : من القواطع : يتوالد في شمال سيبيريا ويقضى الشتاء في الصين والهند وقد تجول في أوروبا لغاية الجزائر البريطانية .

في مصر : سجله نيقول في كتابه صفحة ١٣ من الفيوم في ١٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩ م ، والثاني عند الجزيرة في ١٩ إبريل سنة ١٩١٢ م .

مميزاته وطبائعه : الحاجب الأصفر، الخطان الأصفران في اغطية الجناح الصغرى والوسطى .

جنس لوبيشنيولا (المغنى أبو شارب) = صدّاحة الغاب

Genus *Luscinola* (Moustached Warbler)

يدخل هذا الجنس ضمن الهوازج المتكلم عنها في المقدمة في صفحة (٨٢) ، تمتاز بلونها المعتم عموماً ، والدقن والزور أبيض ، والأجزاء السفلى بيضاء ذات بريق وصبغة صفراء نحاسية . لها حاجب أبيض ، أول قادمة أطول بكثير من اغطية القوادم وتصل إلى النصل الأنسى ، وثاني قادمة أقصر بكثير من الأولى . ثالث وخامس قادمة تقريبا على خط واحد واستقامة واحدة وهي أطول الريش ، المتقارب مدبب ورقيق ، له شارب شعري قائم معتدل . نوع واحد منه في مصر . تأوى إلى الشواطئ حيث ينمو القصب الذي تأوى إليه لتلتقط منه الحشرات لأولادها . تنفض الذيل وترفعها باستمرار .

(المغنى أبو شارب)

Moustached Warbler

(*Luscinola melanopogon melanopogon*)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (١٩) شكل (١٠)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب شرق أسبانيا ، وفي إيطاليا وصقلية وشمال ألبقار . يقضى الشتاء في اليونان وفلسطين ، والعراق ومصر .

في مصر : يزورها شتاء ، وكان قديماً شائعاً شتاء في الدلتا وهو الآن أصبح في حكم النادر وربما كان لتجفيف البحيرات التي يتخللها البردى والقصب اللذان يكون دائماً بداخلها مخفياً في قرارهما .

مميزاته وطائئمه : يجب الاختفاء كما سبق في قرار القصب والبردى وسط المستنقعات والبرك المائية ، كذلك يستقر بقلب الشجيرات المنخفضة الملتصقة بالأرض وسط المستنقعات . يميزه حاجبه الأبيض الكبير الواضح ، والقنة مائلة للسواد غامقة جدا . ليس بها خطوط . وظهره مخطط بخطوط سوداء . يصبح بقرار الغاب دائما . يمتاز كذلك بذيله المستحوب . ليس له شارب رغم اسمه ، لأن التسمية كانت على زعم أن حاجبه الأبيض الواضح دوناً عن غيره يشبه الشارب فبقيت التسمية وإن كانت مخالفة للحقيقة ، وحسبها من سماها على الحاجب الأبيض . الباقي مثل المقدمة في صفحة (٨٩) والظهر أكثر حمرة صادقة عن غيره من الهوازيج . الصوت Lu-lu تقريباً والقنة مائلة للسواد أكثر من غيره .

جنس لوكوستيلا

Genus (Locustella)

أى جنس آكلة الجنادب (الجراد الصغير)

يقطن هذا الجنس شرق وجنوب شرق أوروبا ، وآسيا ماعدا شرقها ، وشرق وغرب إفريقيا . ومميزاتها كغيرها من سوابقها من بناء الجسم غير أن لها شارباً قائماً معتدلاً والذيل أكثر استدارة من غيره غير أنه مسحوب أيضاً وغطاء أسفل الذيل طويل جداً يبلغ طول ريش الذيل الجانبى ، يختلف عن جنس (Cettia) بأن ذيله مكون من ١٢ ريشة ، ومن جنس Acrocephalus بعدم وجود شارب قائم ، ومن Luscinia بأن أول قادمة فيه قصيرة جداً . نوع واحد منه يحل في مصر . يتوارى بداخل النبات والخضرة .

مغنى سافى الغربى

Savi's Warbler (Western Form)

(Locustella luscinoides luscinoides)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ انظر اللوحة (١٩) شكل (١١) .

المكان : من القواطع : يتوالد صيفاً في كل أوروبا ماعدا الجزائر البريطانية وشبه جزيرة اسكندنافيا والبلقان وإيطاليا . ويقضى الشتاء في إفريقيا الاستوائية .

في مصر : يزور مصر في الربيع والخريف وقد يبقى قليل منه فيها شتاء فقد جمع شل ثلاث إناث من وادى النطرون بين ٢٠ ، ٢٣ مارس ، سنة ١٩١٠ م ، وأنثى أخرى من مربوط في ٧ إبريل سنة ١٩١١ ، وأخرى من البرلس في ١٦ أغسطس سنة ١٩١٦ ، وجمع مينرتزهاجن ذكراً من بور سعيد في ١٤ يناير سنة ١٩١٨ ، وحُصل على أنثى داخل منطقة سيناء عند رفح في ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٧ .

مميزاته وطائئمه : جبان للغاية ويسهل رؤيته ، يغشى قرار القصب حيث يزحف مثل الفأرة وهو لا يظهر نفسه مالم يسوقه أحد . ضعيف الصوت ، وهو أشبه بالنداء هكذا تقريباً (تشر churr) شبيه بصوت مغنى الجندب (Locustella naevia) Grasshopper Warbler وهو في مظهره العام شكل المغنى الكبير . Large-reed W يحتوى الذيل غالباً على خطوط عرض من الوسط ليست واضحة . أعلاه بدون خطوط وهو بنى محمر . أسفله أبيض ممسحة بنية . الحاجب ضعيف الوضوح يصيح في أعلى قمة القصب الثانى بالمستنقعات . الأرجل لونها بنى معتم . ويشبه مغنى الحديقة تقريباً وهو في حجمه غير أن منقاره أطول قليلاً منه . الذيل غروعلى .

مغنى سافى الشرقى
Savie's Warbler (Eastern Form .)
(Locustella luscinioides fusca .)

الوصف : طوله حوالى ٧/٥ بوصة . انظر اللوحة (١٩) شكل (١٢) .
المكان : من القواطع : يتوالد صيفا في منطقة بحر قزوين والتركستان وحصل نيقول على واحد من الفيوم في ١٢ مارس سنة ١٩٠٩م كذلك حصل مينرتزهاجن على ذكر من الأردن في ١٣ سبتمبر سنة ١٩٢٢م . يقضى الشتاء في أفريقية الاستوائية .
في مصر : يندر رؤيته في الربيع والخريف . انظر الكلام أعلاه .
مميزاته وطبائعه : كسابقه أفتح من السابق الغربى في لونه .

مغنى النهر
River Warbler
(Locustella fluviatilis .)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر الصورة لوحة (١٩) شكل (١٣)
الموطن : يتوالد صيفا في وسط شرق أوروبا وشمال شرقها ويقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية وجنوب خط الاستواء بقليل .
في مصر : نادر جدا رؤيته فيها في هجرته في الربيع أو الخريف ، حيث هو من القواطع وذكر البعض أنهم رأوه ولا إثبات عندنا بذلك .
مميزاته وطبائعه : يمتاز بالخطوط الرفيعة على الصدر ، يحب الأعشاب الكثيفة فيأوى بداخلها وكذلك الشجيرات المكتظة بالأوراق فيكون بقلها بجوار الماء عادة ويصبح من أعلى الشجرة .

مغنى الجنذب
Grasshopper Warbler
(Locustella noevia)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (١٩) رقم (١٤) (١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا كل جنوبها المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك ما عدا شبه جزيرة اسكندناوة في شمالها ويقضى الشتاء في أسبانيا ومراكش والجزائر في شمال غرب إفريقية .
في مصر : يذكر نيقول بأنه شاهده في ٢٨ سبتمبر ولا يعتمد على كلامه لأنه نقل عن لسان غيره .
مميزاته وطبائعه : يحب الأعشاب الكثيفة مثل السابق ، الحاجب فوق العينين ضعيف الرؤية صوت النداء مثل صوت بكرة صنارة صياد السمك - لونها إما بنى ومخططة بخطوط صغيرة في أعلاها

(١) انظر كذلك لوحة ٧٤ شكل (٣)

صوته كصوت الجندب يسمع غالبا ليلا ، صوته موسيقى طويل النغمة على وتيرة واحدة . خطوط قصيرة طويلة في الأجزاء العليا وكذلك في الردف (١) تتوارى بسرعة في الأدغال الصغيرة عند رؤيتها لحيوان غريب (٢) . تهبط للقرار .

مغنى ستي
Cetti's Warbler
(Cettia Cetti)

الوصف : طوله حوالي ٧/٥ بوصة . انظر اللوحة (١٩) رقم (١٥)
الموطن : من القواطع : يتوالد في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط من جنوب أوروبا (البلقان وإيطاليا وألبانيا) كذلك في آسيا الصغرى وسوريا .

في مصر : نادر جدا في زيارته شتاء لمصر ولو أنه للآن لم يعثر عليه

مميزاته وطيائمه : الذيل كامل الاستدارة وغالبا ما يكون منخفضا لأسفل ونصف مطوى ، والجنح مستدير أيضا وذيله أشبه بليل المغنى المروحي الذنب Fan-tailed Warbler خجول وحذر . في متكاثف الخضرة كالأشجار بجوار الماء وذيله ليس منتظما والحاجب أبيض والأجزاء السفلى بيضاء بالذقن .

الهوازي المائية : جنس أكروسيفالوس (٣)
Genus (Acrocephalus)

يشمل هذا الجنس هوازي القصب الماء وأم نوح ، وهي تقطن الأجزاء الشمالية من الدنيا القديمة ، كما توجد أيضا في إفريقيا والهند وجزر المحيط الهادى .

وهي رشيقة الأجسام ، مسحوبة الذيل قليلا ، مستطيلة الرؤوس ، عريضة الجبهة ، قصيرة الأجنحة مستديرتها ، وأطول قوائم الجناح هي الثانية والثالثة ، ولونها دائما يكون بلون القصب الذي تأوى إليه وتعيش فيه في البرك والمستنقعات . وهي تبدل ريشها مرتين في العام ، وتبقى أعشاشها دائما فوق سطح الأرض ، وهي دائمة الصباح يسمع صوتها من بعيد ، وهي نشيطة ولكنها خجولة . والذكر والأنثى متقاربان في لونهما ، والبيض يميل إلى الخضرة أو الزرقة أو الصفرة . ومنها المقيم طول العام لا يبرح مكانه (الأوبد) ومنها المهاجر في فصول العام المختلفة (القواطع) .

(١) غير أنها عرضية في ريش وسط الذيل . ويندر أن تطير وبالردف خطوط صغيرة وهو الوحيد المميز بهذا من الهوازي .

(٢) تتوارى بين الحشائش مثل الغارة ويندر أن يطير ، صوته مرتفع أشبه بصوت الجندب . يسمع أيضا صوته ليلا كصوت الجندب (الجراد الصغير) . الذيل مسحوب . المنقار رفيع مائل للبنى والأرجل قرنفلية .

(٣) هوازي الغياض (المستنقعات المائية) = هوازي المياه

هازجة القصب الكبيرة الغربية
Great Reed Warbler (Western Form .)
(Acrocephalus arundinaceus arundinaceus .)

الوصف : طولها حوالي ٧/٥ بوصة . انظر لوحة (٢٠) شكل (١)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا شبه جزيرة اسكندناوة والجزائر البريطانية ، تتوالد كذلك في أقصى غرب آسيا . على أنها تقيم طول السنة في شمال غرب أفريقيا (مراكش والجزائر وتونس) . تقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية لغاية ناثال ودامارالاند .

في مصر : تشاهد في الاعتدالين في الربيع من ٦ إبريل إلى ٩ فقط وتكون نادرة الوجود عندئذ ، أما في الخريف فتري من ٢٥ أغسطس إلى آخر أكتوبر ، على أنها شوهدت متأخرة في ٢٥ نوفمبر . ولا توجد لا في الواحات ولا في سينا .

مميزاتها وطبائعها : أكبر الموازج التي تزور مصر وترى فيها ، تغشى قرار القصب النامي في البرك والمستنقعات قرب سطح الماء وهي أغنى من زميلتها المصرية الفاتحة اللون الباهتة والتي ليس بياضها رائقا كهذه . لها حاجب أصفر باهت فوق العين واضح .

كثيرة الصباح فيسمع صوتها هكذا تقريبا (تشاك chack) . غداؤها الحشرات والبرقات المائية والفراشات المائية . تغنى ليلا ونهارا وأغلب صباحها هو بالليل .

هازجة القصب الصياحة المصرية
Glamorous Reed - warbler (Egyptian Form .)
(Acrocephalus stentoreus stentoreus .)

الوصف : طولها حوالي ٥/٥ بوصة انظر الصورة لوحة (٢٠) شكل (٢)

الموطن : من الأوبد : تقيم طول السنة في مصر السفلى (الدلتا) ووادي النطرون والفيوم ومنطقة قنال السويس والأردن إلى أقصى شمال البحر الميت ، ولا تعرف في غير هذه الأماكن إلا نادرا .

مميزاتها وعاداتها : كسابقتها ، وأحيانا تأوى إلى الحدائق زيادة على قرار القصب في الماء ، وهي كثيرة الصباح مزعجة الصوت إلا إذا كانت تبدل ريشها في سبتمبر وأوائل أكتوبر ؛ وصوتها هكذا تقريبا (chack) الباقي كالفريقية . لها حاجب أصفر جلدى فوق العين .

التوالد : العش في قرار القصب يتخذ بين ثلاثة أو أربعة أعواد ، يبنى من القصب الرفيع الجفاف ويطن بالأعشاب الناعمة اللطيفة. البيض من ٣ : ٤ ، عادة ٤ بيضات توضع من أوائل مايو لآخر يونيو .

هازجة القصب الشرقية
Reed-warbler (Eastern Form .)
(Acrocephalus scirpaceus fusca.)

الوصف : طولها حوالي ٥ ١/٤ بوصة . انظر لوحة (٢٠) رقم (٣)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفاً من مصب نهر الفولجا إلى التركستان وفارس وتقضى الشتاء في كينيا وتنجانيقا . تمر في هجرتها على فلسطين ومصر وسينا وجنوب بلاد العرب .
في مصر : تحل في مصر في الخريف من أواخر سبتمبر إلى آخر أكتوبر ، كذلك في الربيع من ١٧ مارس إلى منتصف إبريل ، والهجرة تكون قوية بالتساوي في الدلتا والفيوم ووادي النطرون وسينا .
مميزاتها وطبائعها : أجزاءها العليا بنى زيتونى على نمط واحد (أى بدون خطوط أو علامات فيها) ، لها خط جانبي ضعيف ، الذقن والזור والصدر من أعلاه ؛ أبيض مع صبغة صفراء جلدية خفيفة وكذلك الأجزاء السفلى بمثل اللون . القدم بنى غامق وداخل الفم يرتقالي (ميزة فيها مهمة)
الصوت Cherruk,Jack
صياحها كتقنقة الضفادع ، تغشى قرار القصب وكذلك في بعض المحاصيل الهامة كقصب السكر والترمس والفول .

هازجة البطائح
Marsh Warbler
(Acrocephalus palustris)

الوصف : طولها حوالي ٥ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٠) رقم (٤)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفاً في كل أوروبا ماعدا اسكندناوة وأيبيريا وإيطاليا واليونان . تقضى الشتاء في إفريقية الشرقية الاستوائية وجنوبها حتى الكاب
في مصر : قليلة الظهور في هجرتها في الربيع من ٢١ مارس إلى ٥ إبريل ، وكذلك بقلة أيضاً في الخريف في سبتمبر وأكتوبر .
مميزاتها وعاداتها : أجزاءها العليا أفتح من هازجة القصب (١) ، الأرجل أحمر قرنفلى وليست غامقة . تغشى قرار الأعشاب الكثيفة في المستنقعات والمحاصيل الزراعية . وأشد ولوعاً بالأماكن الرطبة من غيرها ، تصبح ليلاً أثناء توالدها في أوروبا . داخل الفم أقل في اللون البرتقالي من السابقة - مقلدة ماهرة في الصوت - للذئبة الصوت

(١) .الأجزاء العليا تميل قليلاً للون الزيتونى المخضر عن هازجة القصب السابقة - وأول قادمة وثالث قادمة على خط واحد .

هازجة البردى : أم نوح (Sedge-Warbler) هازجة الحلفا
(*Acrocephalus shocnoboenus* .)

الوصف : طولها حوالي ٥ بوصة . انظر لوحة (٢٠) رقم (٥)
الموطن : من القواطع : تتوالد في كل أوروبا ماعدا فنلندة ووسط النرويج واليونان وأيسيريا
وشمال إيطاليا . كذلك تتوالد في شمال روسيا وسيبيريا إلى خط عرض ٦٧° شمالا في وادي نهر ينيس .
تقضى الشتاء في أفريقية الاستوائية والجنوبية .
في مصر : شائعة في مصر وسينا وفلسطين في الربيع في مارس وأبريل ، وفي الخريف من منتصف
أغسطس إلى أوائل ديسمبر . ولا تشاهد في الفيوم أو وادي النطرون أو أية واحة في مصر .

مميزاتها وعاداتها : لونها العام بني يسميها الأجانب مغني نبات الحلفا كما هو واضح من العنوان ،
لأنها تغشى الأعشاب الكثيفة وخاصة نبات الحلفا وتختفي بداخله في البرك والمستنقعات تلتقط الحشرات
الطيارة منه وأحيانا التوت . تصبح بقرار القصب أوائل الصيف طوال الأربع والعشرين ساعة (١)
ظهرها مخطط ، لها حاجب فوق العين كرمي اللون واضح وهو أهم ميزة لها المخطوط في الظهر من القفا
إلى نصف الظهر فقط والردف ليس به خطوط ولونه أحمر رملي - المنقار اسود والأرجل رمادية والقنة مخططة
- المعجز أحمر رملي . الأجزاء السفلى لونها كرمي .

هازجة الماء Aquatic Warbler
(*Acrocephalus paludicola*)

الوصف : طولها حوالي ٥ بوصة . انظر لوحة (٢٠) رقم (٦)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في إيطاليا وصقلية وأجزاء من شبه جزيرة البلقان وغرب بحر
البلطيق ، وكذلك في الجزائر وتونس ، وتقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية .
في مصر : لم يعثر عليها للآن وهي في حكم النادر جدا إذا وجدت .
مميزاتها : شكلها تماما كسابقتها ، لها خط مائل للبياض عريض أسفل وسط وعلى جانبيه خطان
لونهما بني غامق على جوانب القنة .
تغشى المستنقعات والخضرة والأشجار والقصب بجوار الماء . كل ظهرها بما فيه الردف به
خطوط .

جنس هيپوليس Genus (Hypolaïs) جنس الخنثع

يشمل هذا الجنس هازجة إكترين والمغني الزيتوني بنوعيه ومغني الزيتون .
والأنثى في لونها كالذكر ، وبعض يقيم والبعض يهاجر . وتستوطن المناطق النائية الشمالية من
أوروبا وآسيا والحبشة . وأطول قوادمها الثالثة أو الرابعة ، وهي تغير ريشها مرتين في العام . قريبة الشبه
جدا من جنس أكروسيغالوس غير أن الذيل مربع أو قريب جدا من المربع . البيض قرنفلي أرقط .

(١) غني في طيرانها وكذلك على قمة البوص .

هازجة أكترين Icterine Warbler
(*Hypolais icterina icterina*)

الوصف : طولها ٥ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٢٠) رقم (٧)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا قلب جزيرة اسكندناوة والجزائر البريطانية وأيبيريا وفرنسا واليونان . نادرة الزيارة لإفريقية الاستوائية والجنوبية .
في مصر : تشاهد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط للدلتا في الحريف من ١٩ اغسطس إلى ٢١ سبتمبر .

مميزاتها وعاداتها : تغشى الحدائق والمناطق المزروعة الخضراء والمروج والأحراش وغابات النخيل . أليفة لا تخشى الأذى . يميزها أجزاءها السفلى الصفراء عن باقي الأجناس التي تحمل في مصر وأرجلها مائلة للزرقة لها صوت خاص تقريبا هكذا (tic)

هازجة الزيتون Olive - tree Warbler
(*Hypolais olivetorum*)

الوصف : طولها حوالي ٦ بوصة . انظر لوحة (٢٠) شكل (٨)

المكان : من القواطع : يتوالد صيفا في اليونان وجزائر الأيونيان
في مصر : حصل المستر روجير على واحدة بالقرب من الإسكندرية أحضرها إلى شل هي الآن في المتحف البريطاني ، وحصل مينرتزهاجن على أخرى عند القصير على البحر الأحمر في ٢١ فبراير سنة ١٩٢٨ م . على العموم هي نادرة جدا في زيارته في الحريف والشتاء لمصر .
مميزاتها وطبائعها : كبيرة الجسم ، طويلة المنقار ، تغشى أشجار الزيتون والبلوط في البلقان . ثالث قادمة أطول الريش .

البلبل الزيتوني المصري
Olivaceous Warbler (Egyptian Form)
(*Hypolais pallida pallida*)

الوصف : طولها حوالي ٤ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٢٠) رقم (٩)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في مصر (الدلتا والقيوم ووادي النطرون ومصر العليا جنوبا إلى بنى سويف) وشوهد في السويس في ١٨ مايو سنة ١٩٢٢ على حدود سيناء ، ولا يوجد غرب الإسكندرية ، وهو كثير في بورسعيد^(١) ، ويبدأ في الهجرة لمصر في الربيع من ٢٠ مارس ويبقى صيفا للتوالد لغاية آخر أكتوبر ثم يغادر البلاد جنوبا إلى السودان شتاء وكذلك الحبيشة ولا يبعد أكثر من ذلك في الجنوب .

(١) كذلك في رشيد .

توالده : العش في إبريل يتخذ في قلب شجرة ، البيض عادة ٣ بيضات ، وتبيض الأنثى مرتين في العام الأولى في أوائل مايو والثانية في أواخر يوليو ، والحضانة ١٣ يوما والإطعام ١٥ يوما ثم تفارق الأولاد العش بعد ذلك .
مميزاته وعاداته : مولع بالحدائق ، مَنّ لطيف الصوت ، لذيد السمع ، يعرف بصياحه العذب ، يرى في حدائق القاهرة ، وصوته أشبه بصوت الدقناش Shrike ثالث ورايع قادمة على خط واحد وهما الأطول .

البليل الزيتوني الشرقي

Olivaceous Warbler (Eastern Form)

(Hypolais Pallida elaeica .)

الوصف : طوله حوالي ٤ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٠) رقم (١٠)
الموطن : من القواطع : يتوالد في البلقان وكريد وآسيا الصغرى شرقا إلى العراق وفارس والتركستان وسوريا وفلسطين . يقضى الشتاء في إفريقية في الحيشة والسودان وكنيا وأوغندا ، ويمر في الخريف إلى الجنوب الغربي مباشرة .

في مصر : شائع فيها وفي سيناء في الربيع والخريف في إبريل وسبتمبر
مميزاته وطبائعه : كالسابق ظهره يميل للرمادي عن السابق ، وأسفله أشد بياضا .

(هازجة الحدائق) جنس سيلفيا (Sylvia) Genus

يستوطن هذا الجنس كل المناطق الشمالية من الدنيا القديمة وكثير منه في الإقليم البلياركتك وقليل منه يقيم طول السنة في شمال إفريقية والبعض يهاجر ، وهي صياحة مزعجة فيسمع صوتها — وخاصة في فترات التزاوج — عاليا مرتفعا ، ويسمع من قلب الدوح والخمائل وأشجار البساتين ، في أى مكان سواء على الوديان أو الجبال أو التلال ، وتتقى عادة الشجر العظيم مثل الصنوبر والكافور والجميز الخ وهي رشيقة الأجسام ، بادية النشاط ، طعامها الرئيسى اليرقات والحشرات ، وأحيانا الفواكه الغضة مثل التوت والبلح الرطب .

وأطول الريش في القوام هو الثالثة والرابعة ، والشقان (الذكر والأنثى (sexes) متقاربان في الألوان ولا يختلفان إلا قليلا ، والمنقار منحني قليلا من طرفه ، والعش يكون واضحا بين الأشجار أو في شجرة تحت أشجار أو ملتصقة بالأرض وليس على سطح الأرض نفسها ، والبيض أرقط .

هازجة الطرب - دخلة البساتين الشرقية

Orphean Warbler (Eastern Form .)

(Sylvia Hortensis Crassirostris .)

الوصف : طولها ٦ بوصة . انظر اللوحة (٢١) رقم (١)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى وفلسطين شرقا إلى فارس . كذلك في سيرنيكا .
تقضى الشتاء في بلاد العرب والسودان والحيشة وكنيا .

في مصر : حصل على قليل منها عند رفع بين ١٥ أغسطس ، ٧ أكتوبر . وسجل هيجلن واحدة بالقرب من القاهرة في أوائل مايو . ولم تلحظ في سينا .

مميزاتها وعاداتها : قريبة الشبه من أبي قلنسوة غير أنها أكبر منه بقليل ، تمتاز كذلك برأسها الأسود المائل للرمادي ، ويظهر اللون الرمادي أكثر على القفا وذلك في الربيع والجناح بني غامق - ريشتا الذيل من كل جانب أبيض ، العين لها دائرة بيضاء حولها . صوتها مزعج مرتفع . مولعة بالأشجار الضخمة والعادية وصوته هكذا تقريبا تيوت (tyut) تتواري بأطراف الأشجار العليا^(١) والأجزاء السفلى بيضاء والصدر والخاصرة مائلتان للصفرة الجلدية ، ويوجد نوع غرب (هازجة الطرب الغربية) نجد أن أجزائها السفلى أقل وضوحا في البياض .

مغنى الحديقة Garden Warbler (Sylvia borin)

الوصف : طوله ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢١) رقم (٢)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا شبه جزيرة البلقان ويقضى الشتاء في وسط إفريقية وجنوبها .

في مصر : يشاهد في الربيع في مايو ، والخريف من ٢٠ سبتمبر إلى ١١ أكتوبر ولكن برغم ذلك فإن رؤيته قليلة جدا في هذين الاعتدالين يوجد كذلك في شمال سينا في الخريف في سبتمبر ولكن بقلّة أيضا


مميزاته وطبائعه : كالسابق ، مغرم بشجر التوت لأكل ثماره مع الحشرات على جناح الهواء ، صوته تقريبا (teck) أو (check) قريب الشبه جدا من مغنى الزيتون غير أن لا بياض في نصل ريش الخواقي . كله بلون واحد تقريبا وليست له ميزة ظاهرة تفسره كغيره غير صوته . يشاهد في الحدائق العامة في المدن كذلك^(٢) .




أبو قلنسوة Blackcap (Sylvia atricapilla atricapilla) Warbler family

الوصف : طوله حوالي ٤ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٣١) رقم (٣) .

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط أوروبا شمالا إلى جنوب السويد والنرويج والجزائر البريطانية - كذلك في شمال غرب إفريقية (مراكش وتونس والجزائر) ، وشرقا إلى فلسطين وسوريا

(١) تغنى كذلك الزيتون - مغنى ممتاز ، كما تدل عليه التسمية الانجليزية arphean بمعنى شجى أو مطرب . صوتها يندب صوت الشحور - طعامها الحشرات والتوت
(٢) يحب الاشجار الكثيفة المتشابكة بداخلها .





وآسيا الصغرى وفارس وغرب سيبيريا . وقليل منه يقيم طول السنة في حوض البحر الأبيض (جنوب أوروبا - اليونان وإيطاليا وألبانيا وشمال غرب أفريقية) . يقضى الشتاء في أفريقية الاستوائية وجنوب بلاد العرب .

في مصر : كثير في مصر في الربيع والخريف وقليل منه يمكث في الدلتا لغاية الشتاء ثم يهاجر منها في آخر الربيع مع زملائه المهاجرة للشمال وبالمثل في وادي النطرون والفيوم . وهجرة الخريف في الدلتا هي من ٢٠ سبتمبر ، ويكثر لغاية ٢٨ أكتوبر تقريبا عندما يبدأ في مغادرة البلاد ويكثر في الربيع طول شهر إبريل^(١)

مميزاته وطبائعه : مولع بالحدائق ، يخفى أكثر من غيره ، قنة الذكر سوداء وقنة الأنثى بنى . يأكل البلح الرطب في سيوة وفي الدلتا في الخريف . يسمع صوته من داخل الشجرة هكذا تقريبا (tack) يردده مرار^(٢)

أبو رقة بيضاء الغربى (زرينة فيراني . دمسية) كبيره

Whitethroat (Western Form)

(Sylvia communis communis)

Warbler Family

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢١) رقم (٤)

المكان : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا . ما عدا شبه جزيرة اسكندناوة . يقضى الشتاء في أفريقية الاستوائية والجنوبية .

في مصر : يشاهد في الربيع من ٢٠ مارس إلى ٢٠ إبريل ، وفي الخريف من نصف أغسطس إلى آخر أكتوبر . لم يلاحظ في الواحات . يشاهد في سيناء في الخريف .

مميزاته وطبائعه : مولع بالأشجار الضخمة والمتوسطة ، لا يقش النخيل ، اسمه في رشيد (دُمسيّة) . يشاهد بياض ريش ذيله الجانبي أثناء طيرانه . يصاد بالدبق في أيام الخريف أيام فيضان النيل في شمال الدلتا وخاصة رشيد . أرجلها صفراء قمحية .

أبو رقة بيضاء الشرقى

Whitethroat (Eastern Form)

(Sylvia communis icterops .)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢١) رقم (٥)

الموطن : من القواطع : يتوالد في سوريا وفلسطين وفارس ؛ وشمال غرب هملايا والتركستان وجبال التاي . يقضى الشتاء في بلاد العرب ، وشرق إفريقية وشمال غرب الهند .

(١) سمع صوته في سيناء في نوفمبر وإبريل .

(٢) يحب الأشجار الكثيفة ويكون بداخلها .

في مصر : ميعاده نفس ميعاد الغربى السابق الذكر .

مميزاته وطبائعه : كالسابق في طبائعه ، ولكن الأجزاء العليا مائلة للون الرمادى أكثر من السابق ، والخاصرة تميل أيضا للون الرمادى وليست صفراء جلدية كالسابق . الذكر قنته رمادية والأنثى شاحبة

أبو رقبة بيضاء الصغير (زريقة فيرانى صغيرة)

Lesser Whitethroat

(Sylvia Curruca curruca)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٦١) شكل (٦)

الموطن : من القواطع : يتوالد في كل أوروبا ما عدا شبه جزيرة أيبيريا وشمال إنجلترا وأيرلنده وشمال اسكتلنداوة .

يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية غير أنه لا يتجاوز في هجرته خط الاستواء بل ويكون شماله بقليل .

في مصر : يشاهد في الربيع من ٢٥ مارس إلى ٤ إبريل ، والخريف من أول سبتمبر إلى ٢٣ منه وهو في الربيع أكثر منه في الخريف .

مميزاته : كالسابق غير أنه أصغر منه قليلا . يشاهد في آخر الخريف وهو يأكل البلح الرطب من النخيل في شمال الدلتا . أول قادمة أطول من غطاء القوادم بمقدار من ٢ : ٦ مليمترا ، والثالثة والرابعة هما الأطول ، والثانية بين الخامسة والسادسة وأحيانا يكونان متساويين (١)

أبو رقبة بيضاء صغير سيبيري

Lesser whitethroat (Siberian Form)

(Sylvia currucaaffinis)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢١) شكل ٧

الموطن : من القواطع : يتوالد في سيبيريا شرقا إلى منشوريا يقضى الشتاء في الهند وفارس .

في مصر : يوجد بالمتحف الحيوانى بالجيزة ١٤ واحدا منه حصل على إحداها من الفيوم في ٢٠ أكتوبر والباقي من الدلتا بين ٢٣ مارس ، ٢٩ إبريل ، وبين ٢٨ أغسطس ، ١٨ أكتوبر .

لا يوجد له تسجيل شتوى في إفريقية الاستوائية أو السودان .

مميزاته : ثانی قادمة أقصر مما يليها ولا يصل طرفها إلى طرف السادسة ويندر أن تكون أقصر من طرف السابعة . ويصعب تمييزه عن السابق .

(١) أرجله بنية سوداء وهذه أهم ميزة عن السابق الكبير .

هاجرة الصحراء الآسيوية

Desert Warbler (Asiatic Form)

(Sylvia nana mana .)

الوصف : طولها حوالي ١٢/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢١) شكل (٨)

الموطن : من القواطع : تتوالد في مناطق الصحراء من بحر رال وقزوين وشرق فارس ، ويحتمل كذلك في صحراء العرب وصحراء فلسطين . تقضى الشتاء في شمال غرب الهند وبلاد العرب وسينا ومصر وحوض البحر الاحمر .

في مصر : سجلت مرتين في ١٠ مارس سنة ١٩١٤ من المتانية في الصعيد ، والثانية بالقرب من حلوان في ٢٣ مارس سنة ١٩١٦ بواسطة مينترهجن

مميزاتها : جبانة تطير من بعيد ، لونها رملي ، صغيرة الجسم ، ينذر أن تخرج من الشجرة في الصحراء إلا إذا أحسّت بالخطر أو كانت وسط شجيرات مبعثرة . ثالث ورابع قادمة متساويتان وهما الأطول .

هاجرة صحراء غرب أفريقية

Desert Warbler (Saharan Form .)

(Sylvia nana deserti)

الوصف : طولها حوالي ١٢/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢١) شكل (٩)

الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة في الصحراء الكبرى الإفريقية من الجزائر إلى طرابلس جنوبا إلى خط عرض ٢٤° شمالا تقريبا ولم تسجل من سيرنكا .

في مصر : حصل مينترهجن على ذكر من الصحراء على مسافة عشرة أميال تقريبا غرب السلوم في ٢٨ يناير سنة ١٩٢٠ م ، ، كذلك في يناير سنة ١٩٢٨ ، حيث شاهد كثيرا منها في نفس المكان ولكنه أخفق في الحصول على واحدة منها . ربما كانت تتجول شتاء في غرب الحدود المصرية الغربية .

مميزاتها وطبيعتها : كسابقتها غير أن أجزاءها العليا رملية شاحبة بلون الرمل الذهبي الصحراوي . معظم أجزائها السفلى أبيض رائق به مسحة رملية خفيفة على الخاصرة .

هاجرة روبل (زريقة قصابي)

Ruppell's Warbler

(Sylvia ruppelli)

الوصف : طولها حوالي ١٢/٥ بوصة . انظر اللوحة (٢١) رقم (١٠)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في اليونان وكريد وآسيا الصغرى وشمال وغرب أوروبا . وتقضى الشتاء في النوبة والحبيشة وشمال شرق إفريقيا .

في مصر : شائعة في الربيع في مارس وإبريل ، وفي الخريف من ١٥ أغسطس إلى آخر سبتمبر وقليل منها يقضى الشتاء في الدلتا غير أن ذلك غير ملاحظ فيها وقد حصل على واحدة في ٢٦ فبراير مصادفة وهي تحمل في هجرتها في اليوم وواحد النظرون وسينا .

مميزاتها وطبائعها : تمتاز بالخط الأبيض الشاربي على كلا جانبي الزور في الذكر في الربيع ، وبالعين الحمراء في الذكر والأنثى على السواء ، كذلك الأرجل لونها أحمر في الإثنين . مولعة بالأشجار فتستقر بداخلها ، كذلك في الأعشاب الطويلة الكثيفة فتختبئ بداخلها لتلتهم الحشرات الطائرة ؛ صوتها تقريبا هكذا (chuck) يردد مرة واحدة .

مغني سردينيا Sardinian Warbler
(*Sylvia melanocephala melanocephala*)

الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢١) شكل (١١)

الموطن : البعض يقيم والبعض يهاجر : يتوالد في ممالك حوض البحر الأبيض المتوسط (شبه جزيرة أيبيريا وإيطاليا واليونان وشمال إفريقيا الغربية من مراكش إلى طرابلس) . وفي جنوب روسيا وفي آسيا الصغرى حيث يقيم بعضه طول السنة والبعض يهاجر في الخريف لقضاء الشتاء في الصحراء الكبرى ومصر وفلسطين .

في مصر : نادر الزيارة شتاء لمصر من ٨ نوفمبر إلى ٢٤ مارس .

مميزاته وطبائعه : دائرة حمراء حول العين والرأس أسود وذلك في الذكر . الأجزاء العليا فخرانية اللون . دائم الحركة ، يغشى الحقائق ومغرم بشجر السنط ، ينشر ذيله ويطويه أثناء انتقاله من غصن لغصن . صوته هكذا تقريبا (churr)

مغني سردينيا الفلسطيني = مغني بومان
Sardinian Warbler (Palestine Form)
or Bowman's Warbler .
(*Sylvia melanocephala momus* .)

الوصف : طوله حوالي ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢١) رقم (١٢)

الموطن : من الأوباد والقواطع فالبعث يقيم والبعض يهاجر . يتوالد بكثرة في سوريا وفلسطين خصوصا في وادي نهر الأردن .

في مصر : حصل على ٧ منه بين ٢٦ فبراير ، ١٤ مارس شتاء وكلها من الدلتا وربما كانت تتوالد حول رفح والفيديرات قرب حدود فلسطين . الطبائع والمميزات : كالسابق ، غير أن الأجزاء السفلى أكثر بياضا وأقل في اللون الرمادي ، والأجزاء العليا أوضح في اللون البني الرمادي . وهو أصغر أيضا من السابق . خوفاً يكثر على شجر الصبير (الصبار) نشيط أحيانا يفضل المواطن شبه الصحراوية على المواطن المرواة الزراعية ذات الأشجار .

مغنى سردينيا الفيومى
Sardinian Warbler (Faiyum Form)
(Sylvia melanocephala norissa .)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة انظر اللوحة ٢١ شكل (١٣)
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة على شواطىء وجزائر بركة قارون فى الفيوم فقط .
فى مصر : كما ذكر أعلاه .

مميزاته وطيائعه : كالسابق ، غير أن الأجزاء العليا بنية اللون قترانية خفيفة. الأجزاء السفلى بها صبغة خفيفة وردية بنية قليلا على الخاصرة والصدر . الأنثى لونها بنى شديد فى أعلاها ، وأسلفها مغطى بلون أصفر جلدى وردى . وهذا اللون هو فى الحريف . أما فى الربيع فيكون اللون فى الأجزاء العليا للذكر والأنثى أفتح لونا ، وأكثر فى اللون البنى ، والحمرة القرنفلية فى الأجزاء السفلى يختفى معظمها . وهو يختبئ بدهاء فى شجر الطرفاء .

التوالد : العش فى شجرة شوكية غالبا منخفضة لا يزيد ارتفاعها عن الأرض أكثر من ١٨ بوصة (عادة من ٨ : ١٨ بوصة) تقريبا . البيض ٤ عادة لونه أبيض به نقط ، يوضع فى فبراير ، وتستطيع الأولاد الطيران فى ٢١ مارس تقريبا . نقط البيض بنى أو خضراء .

مغنى سردينيا القبرصى
Sardinian Warbler (cyprian Form)
(Sylvia melanocephala melanotharax)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢١) شكل (١٤)
الموطن : من الأوبد ، ومتجول أحيانا . مقيم طول السنة ويتوالد فى قبرص . حصل ترسترام على اثنين قرب البحر الميت فى فبراير سنة ١٩٢٣ م .
فى مصر : يوجد اثنان فى متحف بيروت يقال بأنها من قبرص ، وحصل نيقول على ذكر بالغ قرب حلوان فى أول مارس سنة ١٩١٠ م وهو التسجيل الوحيد له داخل الحدود المصرية .
مميزاته وطيائعه : كسابقه غير أن الفنة شديدة السواد مع الزرقة اللامعة . حروف ريش الأجزاء السفلى بيضاء تعطيه شكلا أرقط على سواد الذقن والזור والصدر . له خط شاربى أبيض .

مغنى سردينيا الآسيوى . مغنى ميترى
Sardinian Warbler (Central Asiatic Form)
or M enetrie's Warbler
(Sylvia melanocephala mystacea)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢١) شكل (١٥) .

الموطن : من القواطع : يتوالد في ترانسقواز وجنوب القوقاز على تلال شمال فارس ومنطقة بحر قزوين وشمال أفغانستان ، كذلك خلال العراق من الموصل إلى البصرة وشمال نهر قارون إلى الأهواز وشرقا إلى شيراز وأصفهان . يجهل أن تكون هجرته في أنحاء مبعثرة ، وشوهدت أفراد منه شتاء في جنوب بلاد العرب والصومال والسودان .

في مصر : حصل نيقول على واحد منه من قنا في الصعيد في ٤ مارس سنة ١٩١٤ م وآخر عند المزغونة في ٢١ مارس سنة ١٩١٣ م .

مميزاته وطبائعه : له خط شاربي أبيض . الأجزاء السفلى وردية خمرية شاحبة . أعمق على الصدر والخاصرة اللتين هما مغطيتان بلون رمادى وسط البطن أبيض وهذا في الربيع .

المغنى أبو نظارة (شكل البحر الأبيض المتوسط)^(١)
Spectacled Warbler (Mediterranean Form)
(Sylvia conspicillata conspicillata)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر الصورة لوحة (٢٢) شكل (١)

الموطن : من الأوباد . يقيم ويتوالد في حوض البحر الأبيض المتوسط (إيطاليا وجنوب شرق أسبانيا) ، وفي الأردن وسيناء ومصر والعراق .

في مصر : يظهر أنه دائم الإقامة طول السنة في مصر وخاصة في شرقها في الصحراء الشرقية وفي سيناء ، وهوليس شائعا بكثرة حول القيوم ووادي النطرون وحلوان حيث الأشجار على حواف الصحراء وحول المناطق المنزرعة

مميزاته : لا يفارق الأشجار ، أما في الصحراء فيختار الوديان أو حواف المناطق المنزرعة ، وهو لا يوجد أبدا في الحدائق . كثير الاختباء والتستر ويصعب أن يخرج الإنسان من قلب الشجرة . يظهر بياض ذيله في طيرانه . صغير الجسم .

توالده : عثر له في مصر في سيناء ووادي حوف (قرب حلوان) على أعشاش قديمة له في الصحراء . العش على سطح الأرض يطن بالشعر وزغب النبات ، البيض من ٤ : ٥ لونها أبيض بها نقط خضراء أو بنية والبياض في البيض مائل للخضرة قليلا . يميزه الذقن البيضاء ، أما أسفل الزور والصدر والبطن فهي قرنغلية اللون تقريبا . الأنثى مائلة للبنى الفاتح في أجزائها العليا .

(١) له دائرة بيضاء حول العين ومنها اشتق اسمه (أبو نظارة) - يعيش في الشجيرات الجافة بجوار الشاطئ أو الساحل

هازجة الصرود الشرقية

(^١) Subalpine Warbler (Eastern Form)

(Sylvia cantillans allistriata)

الوصف : طولها حوالي ٤ ٢/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٢) شكل ٢

الموطن : من القواطع : تتوالد في شبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى ، وقبرص وتقضى الشتاء في فلسطين ومصر وسينا إلى جنوب بلاد العرب والصومال وتنجانيقا .

في مصر : تحل فيها وفي سينا وفي الربيع فقط من ٢٣ فبراير إلى ٥ إبريل وأكثر ما تظهر هوفى الدلتا والفيوم ووادي النطرون .

مميزاتها : مولعة بالأشجار وخاصة الشوكية منها لها خط شاربي أبيض في الذكر ، يظهر ريش الذيل الجانبي الأبيض في الطيران .

هازجة مارمورا

Marmora's Warbler

(Sylvia sarda)

الوصف : طولها حوالي ٤ ٣/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٢) شكل (٣)

الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة في جزائر حوض البحر الأبيض المتوسط الغربية ، شرقا إلى صقلية .

في مصر : حصل ميترتزاهاجن على ذكر عند السلوم في ٢٨ يناير سنة ١٩٢٨ م وهو التسجيل الوحيد لتجولها .

مميزاتها : تختبئ في الأشجار . لونها عام بني مائل للسواد . ترفع ذيلها غالبا

مغنى دار تفورد Dartford Warbler

(Sylvia undata)

يذكر هيجلن بأنه لاحظ في مصر في آخر مارس في صحبة هازجة الصرود ومغنى روبل ولكنه لم يحضر شيئا منه وربما اشتبه عليه الأمر ، ولا معول على كلامه .

الصورة لوحة (٢٢) شكل (٤)

(١) معنى Subalpine أى خاصة بمناطق جبال الألب

(٢) وكذلك الأعشاب الطويلة .

جنس إري ثرسبجيا جلاكتوتس (البلب الأحمر المغنى)
Genus (Erythropygia galactotes)

يستوطن هذا الجنس إفريقية وأجزاء من جنوب غرب أوروبا . ويمتاز بذيله الطويل الذى ينشره دائما ويطويه ويحركه إلى أعلى وأسفل ويظهر عند نشره أنه نصف دائرى من طرفه ، ويظهر في الأطراف - ما عدا ريشة الوسط - بقع بيضاء وأخرى سوداء ، وقادمة الجناح الأولى قصيرة ولكنها أطول منه الأغطية .

يجب الأماكن المكشوفة العارية حيث يتنقى منها أى شىء بارز أو منفرد مثل عصا منصوبة أو طرف شجرة جافة أو قممتها ، أو قنة صخرة صغيرة أو طرف ساقية ثم يقف على هذا الطرف ويرسل لحنه العذب الشجى حقا ويعرف به بسهولة ، وهو يتخذ غذاءه دائما على الأرض . وهو إلى جانب ذلك يجب الحدائق ولا يدخل بقلب الشجرة إلا للتوالد أو عند الخوف ، أما عند الاطمئنان فيتبقى قمة الشجرة معلنا عن نفسه ثم يشدو عليها وخاصة في الربيع والصيف كى يجذب إليه أنثاه . البيض أرقط . الجنس على شكلين أحدهما أفتح من الثانى .

البلب الأحمر المغنى^(١)

Rufous Warbler

(Erythropygia galactotes galactotes)

الوصف : طوله حوالى ٦ بوصة . انظر لوحة (٢٢) شكل (٥)

الموطن : من القواطع . يتوالد صيفا في مصر . وهو نادر التوالد في إيطاليا وصقلية ، على أنه يتوالد في جنوب أسبانيا وجنوب البرتغال وفي مراكش وسيرينكا وعلى طول الساحل إلى مصر وسينا وفلسطين . وجنوب سوريا وشمال السودان .


في مصر : يزور مصر صيفا للتوالد فيها ، فيأتى لها في شهر إبريل ويبقى بها حتى منتصف سبتمبر ثم يغادر البلاد إلى الجنوب في مصر العليا والسودان والساحل بين السلوم والإسكندرية ومنطقة قنال السويس والساحل الشمالى لسينا . ويوجد في الدلتا عند زيارته والقيوم ووادي النطرون والواحات الداخلة والخارجة .

مميزاته وطبائعه : هى نفس المذكورة في جنس إري ثروبيجيا في صفحة ١١٢ على اليمين بالضبط . لون الذكر بلون الأنثى .

توالده : العش يتخذ في قلب الشجرة أو بداخل رأس نخلة كثيفة أو غحابة بالكيب (غطاء) يتخذ من بقايا الجذور والألياف ويبطن بالصوف ، وأحيانا يكون العش قريبا من سطح الأرض . البيض من ٢ : ٥ وعادة ٤ بنضات توضع في مصر من أوائل مارس إلى آخر يونيو وبالبيض بقع بنية

(١) اسمه كذلك Rufous Bush Robin وأيضا Rufous Bushchat وأيضا Rufous scrub robin


اسمه العلمى كذلك = Cercotrichas ealactoces



Orphean (Eastern)

Garden Warbler

Blackcap.




Whitethroat (Western)

(Whitethroat)
(Eastern.)

Lesser Whitethroat
(European.)

(Siberian.)




Asiatic
Desert Warbler

Saharan

Ruppell's

Sardinian
(Common)







Palestine

Fayium

Cyprian

Central Asiatic.

Warbler.



شاحبة وتبيض الأنثى مرتين في العام . ومدة الحضنة عشرة أيام تقريبا . وقد أجريت مراقبة على أنثى كانت عندي بالحديقة وسجلت الآتي :-

في ٣٠ يونيو وضعت أول بيضة ، ثم أخرى في أول يوليو ، ثم ثالثة في ٢ يوليو ثم بدأت الحضنة في ٤ يوليو وفقس البيض في ١٣ يوليو ثم فارقت الأولاد العش في ٢٣ يوليو . (١)

جنس اسكوتوسيركا (ثمنمة الشجر)

Genus (Scotocerca)

يقطن هذا الجنس المناطق الصحراوية من شمال إفريقيا وبلاد العرب وإيران وشمال غرب الهند حتى أواسط آسيا . وهو نشيط يشبه الفأرة المنزلية في حركاته ، يذبذب ذيله المكون من ١٠ ريشات ويندر أن يمتد الذيل خلف الجناح . والقادمة الأولى أطول من ضعف غطاءيات القوادم ، ثالث ورابع وخامس قادمة على استقامة واحدة .

ثمنمة الشجر العربية

Scrub Warbler (Arabian Form)

(Scotocerca inquietus inquietus)

الوصف : طولها حوالي ٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٢) رقم (٦) (٥٥)

الموطن : من الأوابد : تقيم وتتوالد في صحراء جنوب فلسطين وبلاد العرب وجنوب جبال سينا وصحراء شرق مصر .

في مصر : تقيم طول السنة أيضا على التلال خلف القاهرة ، وطريق السويس - القلعة ، والتلال خلف السويس ، وقرب أسوان والأقصر ، وطريق قنا والقصر . وليس لها تسجيل في غرب النيل . ويظهر أنها محدودة على الجبال الجنوبية من سينا حيث تغشاها بكثرة على ارتفاع لا يقل عن ٣٠٠٠ قدم تقريبا ، وترى هناك شتاء وهي تتناول الذباب على جناح الهواء على جبل كتارينا من فوق أكوام الثلوج .

مميزاتها وطبائعها : دائمة الحركة وليس لها استقرار واليفة يقترب الإنسان منها ، تغشى الأشجار العالية في الوديان . تجرى تحت الصخور والأشجار ، دائمة الاهتزاز عند وقوفها تحت الصخور أو فوقها . طيرانها منخفض جدا ، ذيلها دائما منتصب . لها صوت . الذكر لونه كالأني . أجزاؤها العليا في الربيع رملية رمادية ، وفي الخريف بني غامق ولكن الغالب هو الرمل الصحراوي . صغيرة الجسم كما يدل على ذلك اسمها الانجليزي Scrub .

(١) في كتاب طيور العالم لمؤلفه جيمس فيشر في صفحة ١٩٦٢ الملزمة رقم ٦ ما ياتي :- تبيض الأنثى في السنة مرتين في مايو آخره في العراق ومصر وفي يونيو في أسبانيا وشمال إفريقيا تضع الأنثى من ٤ : ٦ بيضات ومن ٣ : ٥ بيضات بيضاء مائلة للزرقة قليلا .

(٢) انظر الذيل في لوحة (٦٢)

التوالد : العش يبدأ في فبراير تحت شجرة وقد يلمس الأرض - بين الأشواك ، وهو كبير جدا بالنسبة لجسمه . البيض من ٤ : ٥ توضع في مارس أبيض به نقط حمراء . تبيض الأنثى مرة واحدة في العام .

جنس برنيا (Prinia)
المغنى الرشيق (أم فُسَايَة)
Graceful Warblers

يستوطن هذا المغنى الصغير الجسم ، إفريقيا وبلاد العرب والعراق وفارس والهند وجاوة وجنوب الصين . ووجوده محصور في الأقاليم الاستوائية اللهم إلا قليل منه في المناطق المعتدلة ولا يوجد في الصحارى بتاتا ، وهو ليس من الطيور القواطع بل يقيم طول السنة في مناطق توالده .

الذنب طويل نسبيا مكون من عشر ريشات تمتد وراء الجناح بشكل ملحوظ وهو متدرج كالمهرم المدرج وعليه شريط أسود ما عدا ريشته من الوسط ، وجناحه مستدير ، وطول أول قادمة ضعف طول أغطية القوادم .

المغنى الرشيق السوداني
Graceful Warbler (Sudan Form)
(Prinia gracilis gracilis)

الوصف : طوله ٤ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٢) شكل (٧)

الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في وادي النيل من الخرطوم إلى دنقلة . في مصر : يقيم طول السنة في الفيوم فقط .

مميزاته وعاداته : مولع بالحدائق ، والأراضي الزراعية وشبه الصحراوية ذات الأشواك والشجيرات والأعشاب الطويلة وكذلك المستنقعات ذات الأشجار الصغيرة مثل الطرفاء (الإنل) . ذيله دائما يكون منتصباً . صياحه دائم الصباح رغم صغر جسمه هكذا تقريبا (quick) يردده قدر خمس مرات أو ٦ تقريبا ثم يسكت قليلا ثم يعيد الكرة ثانية ، يردده مع تحريك الجناحين ، يسمح لغيره بالاقتراب منه . اسمه في رشيد (أم فُسَايَة) أول قادمة طوله أكثر من نصف طول الثانية . الجناح مستدير . الذيل طويل مسحوب يكون مستديرا تقريبا إذا نشير . رابع وخامس وسادس قادمة هي الأطول .

التوالد : العش في جذور النخل (العزيب) النخل الصغير المسمى بالنسائل أو في سياج شوكة أو في القصب ، يطن بالخضروات الضئيلة . البيض من ٣ : ٤ ، عادة ثلاث بيضات توضع في أوتل مارس . لونه قرنفلي شاحب به بقع بنية .

مغنى وادى النطرون الرشيق
Graceful Warbler (Wadi Natrun Form.)
(Prinia gracilis natronensis.)

الوصف : طوله ١/٤ ٤ بوصة تقريبا . انظر اللوحة (٢٢) شكل (٨)
الموطن : يقيم طول السنة حيث يتوالد في مصر في وادى النطرون فقط . الأجزاء العليا أغمق من
السودانى والمنقار أطول قليلا منه
مميزاته وطبائعه : كالسابق تماما . غير أن توالده في البيض هو من ٤ : ٥ بيضات . العش في قرار
القصب في مستنقعات وادى النطرون أو في الجفاف .

مغنى البحر الأحمر الرشيق
Graceful Warbler (Red Sea Form.)
(Prinia gracilis carlo)

الوصف : طوله حوالى ١/٤ ٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٢) شكل (٩)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة في شمال الصومال وأريتريا ، ومنطقة البحر الأحمر من
السودان ويمتدق مباشرة مصر عند جبل علة حيث حصل اسكرادار على ٢ منه في مارس سنة ١٩٢٨ م .
في مصر : عند جبل علة وقد سبق الكلام عليه .
مميزاته : كالسابق ولكن منقاره أصغر ، والخطوط في الأجزاء العليا أكثر وضوحا وأكثر اعتدالا .
كما أن جناحه أصغر . الباقي كالسابق في كل شيء .

مغنى الدلتا الرشيق
Graceful Warbler
(Delta Form.)
(Prinia gracilis deltoe.)

الوصف : طوله حوالى ١/٤ ٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٢) شكل (١٠)
الموطن : من الأوايد . يقيم طول السنة في دلتا النيل وشرقا إلى قنال السويس حيث يقابل شكل
فلسطين هناك . وجنوبا إلى الأقصر على الأقل .
مميزاته وطبائعه : كالسابق وأغمق من السودانى ولكن الأجزاء العليا خطوطها أعرض وهى
سوداء . الأجزاء السفلى عادة ليس بها خطوط وأحيانا بها خطوط قليلة . التوالد كالسابق .

مغنى فلسطين الرشيق
Gaceful Warbler (Palestine Form.)
(Prinia gracilis palestinoe.)

الوصف : طوله حوالى ١/٤ ٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٢) شكل (١١)
الموطن : من الأوايد . يقيم طول السنة من جنوب آسيا الصغرى إلى سوريا وفلسطين .

في مصر : حصل عليه من منطقة قنال السويس وكانت تغشى نبات الطرفاء .
المميزات : كالسابق ولكن الأجزاء العليا أكثر وضوحا في اللون البني الشاحب عن مغنى الدلتا .
التوالد كالسابق .

جنس سيستكولا

Genus (Cisticola.)

المغنى المروحي الذنب

يقطن هذا الجنس المناطق الاستوائية وخاصة في إفريقية وآسيا إلى الهند وجنوب الصين وفرموزا واليابان ، وسومطرة ، كما يوجد أيضا في جزيرة مدغشقر وسيلان وحوض البحر الأبيض المتوسط .
ويمتاز بحركاته العجيبة التي إن شاهدها الإنسان لأول مرة فلا يحيطه وهو أنه يقفز في الهواء في طيرانه إلى أعلى وإلى أسفل وكل قفزة إلى أعلى يصيح هكذا (Zib) أو (تْك) حتى إذا حط على مزارع البرسيم أو القمح وقف صوته وصمت في الحال . ذيله مكون من ١٢ ريشة وهو قصير كشكل المروحة إذا نشر ، وأجنحته مستديرة وأطول القوادم من الثالثة إلى السادسة ، ويبدل ريشه مرتين في العام . وأول قادمة ضعف طول أغطية القوادم أو تزيد . يوجد نوع واحد منه في مصر .

المغنى المروحي الذنب

Fan-tailed Warbler.

(Cisticola juncidis cisticola.)

الوصف : طوله حوالي ٣ بوصة . انظر لوحة (٢٠) رقم (١١)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة في كل الدلتا جنوبا إلى الأقصر على الأقل ، وكذلك في الفيوم . لا يوجد في الواحات الأخرى . شوهده في وادي النطرون في مارس ، لا يوجد غرب الإسكندرية ، ولكنه شائع عند قنال السويس .
ولم يشاهد في سيناء . يشاهد كذلك في جنوب أسبانيا وجزائر البليار ، والجزائر وتونس .
في مصر . سبق الكلام في أعلى عليه .
مميزاته وطبائعه : اقرأ الكلام عليه في أول صفحة ١١٨ حيث كله عليه . كذلك ، أول قادمة نصف طول الثانية . لونه أحمر ثعلبي عام في أعلاه . مولع بالمحاصيل الزراعية وكذلك الأعشاب كالقصب الخ .
توالده : العش نظيف ومرتب للغاية يتخذ قرب سطح الأرض وسط المحاصيل الخضراء والبيض من ٢ : ٥ عادة ٣ بيضات توضع من مارس إلى أوائل يونيو وتبيض الأنثى مرتين في السنة . بعض البيض أبيض رائق وبعضه به نقط لونها بني أو خطوط برتقالية .

جنس كراتيروبوس (الثرثرة)

Genus (Crateropus) = (Babblers.)

طيور هذا الجنس في حجم الزرزور أو الدج ولكن ذيلها أطول ومقارها أقوى ، وهي تقفز كثيرا وهي على الأرض ، وطيورها كطيور الصقور وأجنحتها مستديرة للغاية ، والموجود كله في العالم منه هو ٢٥٨ نوعا . وتتناول طعامها على سطح الأرض مباشرة ، ويبيضها أزرق لامع وصوتها متقطع وليس موسيقيا . والأقدام متوسطة الطول مزودة بمخالب حادة قوية مقوسة وأطول ريش الجناح هي القادمة الرابعة والخامسة والسادسة وعلى خط واحد والذيل إذا نشر كان مستديرا وهي تشبه في شكلها عققا صغيرا غير أن ليس بها سواد وبياض كالعقق ، وهي لا تجيد الطيران وقلبا ترتفع عن الأرض مختارة وحتى عندما يخلق بها الخطر فإنها لا تطير إلى مسافة بعيدة . الذيل من ١٢ ريشة يمتد كثيرا خلف الجناح . لا يهاجر منها شيء ، حيث تقيم في المناطق الجافة وشبه الصحراوية من إفريقيا وآسيا شرقا إلى الهند . تكون في جماعات عائلية من ٥ : ٨ تقريبا ولذا فإن اسمها أيضا (الأخوات السبعة) (Seven sisters.) كذلك في الهند وسيلان وإيران وفلسطين . وأما العائلة Family Timalunae فهي تشمل ٥٧ جنسا ، يعرف منها ٢٥٨ نوعا وهي الموجودة كذلك حاليا .

ثرثرة وادي النيل المصرية

Egyptian Bush Babbler (Nile Valley Form.)

(Crateropus fulvus acacioe.)

الوصف : طولها حوالي ١ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٠) شكل (١٢) الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة وتتوالد في وادي النيل من أسوان (نادرا) إلى وادي حلفا ، وفي الخرطوم ومنطقة البحر الأحمر في السودان وتصل إلى جبل علبة حيث هي شائعة هناك . في مصر : سبق الكلام كما ذكر أعلاه .
مميزاتها وطبائعها : كما قيل عنها في الجنس في صفحة ١١٩ . وهي كذلك مزعجة كثيرة الصباح ولذا سميت (ثرثرة) : تظهر للرائي كأنها فرحة مسرورة ، تحرك ذيلها الطويل إلى أعلى وإلى أسفل ومن جانب لآخر ، تكون غالبا في جموع صغيرة . يسمع صوتها فلا يخطئه السامع هكذا تقريبا hee-hu . طعامها الحشرات .

توالدها : العش في قلب نخلة وفي الأشجار الشوكية وأدغال الحشائش وسياج القصب إلخ والعش قريب جدا من الأرض على علوه أقدام تقريبا من سطح الأرض ، والعش من السيقان الرفيعة وبدون تبطين وعلى شكل فنجان . البيض من ٤ : ٥ توضع في وادي حلفا في آخر إبريل .

ثرثرة فلسطين

Palestine Babbler

(crateropus squamiceps aquamiceps.)

الوصف : طولها حوالي ١٠ بوصة . انظر اللوحة (٢٠) شكل (١٣) الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة في وادي نهر الأردن ومنخفض البحر الميت جنوبا إلى العقبة . تتسلق الجبال على علو أكثر من ٢٠٠٠ قدم في بطرة وفي بلاد العرب . كذلك في الغبدرات .

في مصر : توجد في الجبال في الغيدرات في سينا وفي وادي العريش وعلى مسافة عشرة أميال جنوب العريش . لا توجد في الوديان جنوب سينا .
 مميزات : كالمسابقة غير أن الأجزاء العليا بنى رمادي وریش الجبهة والقنة به نقط من وسطه .
 ريش الوشاح وسطه بنى غامق أغمق من لون الأرض . الردف وغطاء الذيل من أعلاه رمادي بنى .
 الذيل والجنح كالظهر . الذقن والزور مائلان للبياض . بقية الأجزاء السفلى رمادية مائلة للون البنى .
 ريش وسط الصدر غامق شديد يعطى شكلا أرقط . الذكر كالأنثى .
 التوالد : البيض عادة خمسة وأحيانا يصل إلى ٩ بيضات على قمة شجرة سنط على ارتفاع حوالى ١٥ قدما . يوضع في إبريل .

جنس توردوس (الدج والشحور)

Genus (Turdus)

(Thrushes and Blackbirds.)

Thrush Family.

يشمل هذا الجنس الدج والشحور ، متوسط الجسم ، القوام عشر ريشات ، والذيل من ١٢ ريشة ، بعض الأنواع مثل جنس توركوس لها ١٤ ريشة ، المنقار متوسط القوة منحني قليلا من طرفه .
 الجناح مثلث الشكل في الدج ومستدير في الشحارير . موطنه كل الدنيا وكذلك جزر المحيطات . العش عميق الغور قريب من سطح الأرض أو مرتفع عنها قد يبطن أحيانا بالطين ، والبيض أرقط لونه أزرق أو مائل للخضرة . صياح مقلق وخاص في فصل التزاوج وإذا خاف . الجنس على ١٥ نوعا . قد تكون القادمة الأولى أطول من غطائيات القوام وأحيانا تكون أقصر وقد يتشابه الذكر والأنثى في الألوان وقد يختلفان . يبنى البعض أعشاشه داخل أعشاش الكراكي . البيض من ٤ : ٥ بيضات . وصنف الدج Thrushes (Turdidae) وعائلة مكونة من حوالى ما يزيد على ٣٠٠ نوع توجد في كل الدنيا ماعدا مناطق القطب الجنوبي .

طعامها الحشرات والديدان والقواقع والتوت . عددها بالضبط ٣٠١ نوعا والجنس ٤١ جنسا طيور أرضية وشجرية ، تجرى على الأرض بقفزات سريعة ملحوظة .

دُجَّةُ الحَقُول

Fieldfare.

Turdus Pilaris.

الوصف : طولها حوالى ١٠ بوصة . انظر اللوحة (٢٣) شكل (١)
 الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في الغابات الصنوبرية في شمال أوروبا وشمال شرقها وغرب سيبيريا إلى لينا . تقضى الشتاء في جنوب ووسط أوروبا وآسيا الصغرى والجزائر وفلسطين ونادرة في شمال غرب الهند .
 في مصر : تشاهد شتاء ولكن بقلّة وأكثر ما تكون هي في الدلتا من ديسمبر إلى أوائل فبراير ، لا تشاهد في مصر العليا أو الفيوم .

مميزاتها وطبائعها : كبيرة الجسم نوعا ما ، رأسها رمادية وكذلك ردفها ، وظهرها أحمر بلون الصدا ، طيرانها متوسط . تأكل التوت كما أنها تتناول طعامها أيضا على سطح الأرض وطيرانها في استقامة واحدة ببسط وقبض الأجنحة مثل طيران الزرزور . تأوى إلى الأراضي الزراعية بجوار الحقول . والذكر كالأُنثى

دجة الدبق

Meissel = Mistle Thrush

(Turdus viscivorus)

الوصف : الذكر كالأُنثى : طولها حوالى ١١ بوصة . انظر لوحة (٢٣) رقم (٢)
الموطن : هذه الدجة تعددت أجناسها ومنها ما يختص بالجزائر وفيها الآسيوية ومنها القورسقية ومنها التركستانية ومنها القزوينية ومنها ما يختص بشرق أوروبا ، ومنها الأوروبية الأصلية . Turdus. v. Viscivorus وهي التي تتوالد صيفا في كل أوروبا تقريبا شرقا إلى جبال أورال وجنوبا إلى البحر الأبيض المتوسط وآسيا الصغرى وتقضى الشتاء في جنوب أوروبا وشمال إفريقية . وهي من القواطع .

في مصر : قليلة المشاهدة في مصر شتاء من ديسمبر إلى آخر يناير وأوائل فبراير . وشاهدت بنفسى واحدة عند مدينة (بور فؤاد) تجاه بور سعيد وهي ترعى في الحديقة العمومية حوالى سنة ١٩٤٠ م في مارس .

مميزاتها : أكبر أنواع الدج الذى نراه ، الأجزاء السفلى بها نقط بنية كبيرة تقف على الأشجار والنخيل . الباقي كسابقتها ، (١) .

الدُّجَّةُ المغنّية

Song Thrush

(Turdus philomelos philomelos)

الوصف : الذكر كالأُنثى : طولها حوالى ٨ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٣) شكل (٢)
الموطن : تتوالد صيفا (من القواطع) في كل أوروبا ما عدا أقصى جنوبها (ألبيريا وإيطاليا واليونان) - كذلك تمتد في توالد شرقا إلى بحيرة بيكال في روسيا وجنوبا إلى القوقاز . تقضى الشتاء في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقية والسودان وميسوتاميا وفلسطين .
في مصر : تزورها شتاء من أول نوفمبر إلى آخر مارس حيث تكون شائعة وخاصة في الدلتا وسينا وعلى طول الساحل بين الاسكندرية والسلوم ، ولا تشاهد في مصر العليا أو الفيوم .

(١) تغذى على ثمار الدبق فتلتصق البذور اللزجة بمنقارها ثم تمككه بعد الأكل على فروع الأشجار .

مميزاتها وطياتها : مولعة بالحدائق وأحراش النخيل وكل مكان مكتظ بالأشجار ، وخاصة الحدائق العامة وسط المدن مثل حديقة الحيوان بالإسكندرية وحدائق الحيوان والأورمان بالجيزة الخ .
تختبئ بدهاء في قلب الأشجار . هي أكثر الدج وجودا في مصر شتاء . إذا طارت عملت صوتا أحيانا هكذا وهو (تك) (tic) . باطن الجناح غطاؤه كريمي اللون . طعامها على الأرض وهي تقفز على الأرض سريعة الطيران . طعامها الحشرات والتوت كذلك . لها خطوط ونقط كبيرة بنية غامقة . في أجزائها السفلى . ظهرها بني .


دُجّة حمراء الجناح Redwing
(*Turdus musicus musicus* .)

Thrush Family


الوصف : الذكر كالأُنثى : طولها حوالي ٨ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٣) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شبه جزيرة اسكندناوة وشمال غرب آسيا وتقضى الشتاء في جنوب وسط أوروبا وفارس .
في مصر : في بعض السنين تظهر وبعضها يختفى شتاء وحصل يقول عليها من الدلتا بين ١١ يناير ، ١٨ مارس وربما لم يلاحظها شئ وقال ذلك من باب الظن والتخمين .
مميزاتها وطياتها : أصغر قليلا من سابقتها ، لها خط أبيض حاجبي فوق العين ، الخاصرة حمراء بلون الطوب . الباقي كالسابقة .

دجة سوداء الزور
Black - throated Ouzel
(*Turdus ruficollis atrogularis*)
Thrush Family


الوصف : الذكر كالأُنثى : طولها حوالي ٩ ١/٤ بوصة .
انظر اللوحة (٢٣) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في غرب سيبيريا جنوبا إلى جبال التاي ، وشرقا إلى ينيسي . تقضى الشتاء في أسراب كبيرة في شمال الهند وفارس وجنوب بلاد العرب وقد تتجول في أنحاء مختلفة من أوروبا .
في مصر : أحضر الدكتور ج . هندبرج واحدة من سينا وأرسلت في سنة ١٨٣٥ م إلى متحف استوكولم حيث توجد بها للآن
مميزاتها : تشبه الدجة المطوقة الآتي ذكرها . وطياتها كالشحرور . إذا وقفت رفعت ذيلها بمجرد وقوفها . تحتشد دائيا في أسراب . يميزها عن كل الدج زورها الغامق وكذلك صدرها الغامق المظلم . المنقار والقدم بني غامق .




Fieldfare




Mistle = Missel (Thrush)




Song Thrush




Ring Ouzel (Alpine)
ذكر بالغ في الربيع



Redwing.
ص ١٢٨



Black throated
Ouzel
ص ١٢٨



Ring Ouzel (Caucasian)
ص ١٢٩

دَجَّة الألب المطوقة
Ring Ouzel (Alpine Form)
(Turdus torquatus alpestris)

الوصف : الأنثى أفتح لوناً من الذكر ، والدقن والزور - أبيض بهما خطوط سوداء . طولها حوالى ٩ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٢٣) شكل (٤) .

الموطن : تتوالد صيفاً (من القواطع) فى الأقاليم الجبلية من وسط وجنوب أوروبا وخاصة جبال الألب كما يدل اسمها عليها من لفظ (Alpine) لا تتوالد فى جبال اليونان ولا كريد ولا قبرص ولا لبنان . تقضى الشتاء فى حوض البحر الأبيض المتوسط وسهول منخفض البرانس .

فى مصر : نادرة المشاهدة شتاء فى مصر ، ورغم ذلك لم تشاهد إلا فى سيناء فقد شوهدت فى حدائق سانت كاترين بين ٢٩ فبراير ، ٤ مارس شاهدها مينرتزهاجن وحصل على كثير منها . وحصل نيقول على ذكر عند الجيزة فى ٩ ديسمبر سنة ١٩٠٦ م .

مميزاتها وطبائعها : تأوى إلى الجبال ، ترفع ذيلها بمجرد وقوفها على الأرض ، تأكل على الأرض والأشجار ولكن الأشجار نادراً . للذكر طوق أبيض واضح . المنقار أصفر فى الربيع فى الذكر البالغ .

دجة القوقاز المطوقة
Ring Ouzel (Caucasian Form)
(Turdus torquatus amicornum)

الوصف : طولها حوالى ٩ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٢٣) شكل (٧) الأنثى تشبه أنثى دجة الألب المطوقة السابقة .

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفاً فى القوقاز ويحتمل كذلك فى جبال البرز فى شمال إيران .

فى مصر : حصل مينرتزهاجن على اثنين من سرب كبير مختلط مع دج الحقول والدج الألبى المطوق فى حدائق دير سانت كاترين فى ٣ مارس سنة ١٩٢٨ وهذان هما التسجيلان الوحيدان له فى جمهورية مصر .

مميزاته وطبائعه : كالسابق ، غير أن الذكر حروف ريش الأجزاء السفلى أضيئ ولا يعطى شكلاً رخامياً أى هو كما فى دجة الألب المطوقة الأوروبية ولكن حروف ريش القوام والخوافى كما فى دجة الألب المطوقة السابقة .

الشحور Blackbird
(*Turdus merula merula*)
Thrush Family

الوصف : طوله حوالى ١٠ بوصة . انظر اللوحة (٢٤) شكل (١٠) الذكر كله أسود لامع ، والأنثى عموما بنى غامق مع فروق ضئيلة .

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا شمال اسكتلندا وأسبانيا والبلقان . يقضى الشتاء في الجنوب وشوهد شتاء على المرتفعات التي تزيد على ١٣٠٠ قدم في أوروبا . وأدخل في استراليا حيث يقيم بها طول السنة .

في مصر : يهاجر شتاء إلى مصر وخاصة شمال الدلتا ، وصدته أنا بنفسى في يناير من حدائق رشيد ، وعلى العموم هو قليل المشاهدة ، وشوهد كذلك في حدائق بجوار مرسى مطروح . وشاهدته في يناير سنة ١٩٤٢ وصدت ذكرا منه من غرب رشيد .

مميزاته وطبائعه : جبان جدا يطير من بعيد . وبمهارة فائقة يتسلل في الهروب ، يسمع صوته من بعيد ، مولع بالحدائق . أجنحة قصيرة مستديرة وذيله طويل نسبيا . طعامه الفواكه والحشرات ، إذا وقف رفع ذيله إلى أعلى ومن جانب لآخر ، ويقفز في مشيته .

شحور سوري (Syrian Form) Blackbird
(*Turdus merula syriacus*)

الوصف : طوله حوالى ٩ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٤) شكل (٢)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في سوريا وفلسطين وجنوب آسيا الصغرى وجنوب فارس يهاجر شتاء إلى العراق وفلسطين وسينا ومصر .

في مصر : شائع شتاء في الدلتا بين ٢٥ نوفمبر ، ٢٥ فبراير أو نقول من نوفمبر إلى مارس . شائع كذلك في سيناء في نوفمبر وديسمبر في حدائق رفح والعريش ، ولا يوجد في مصر العليا أو الواحات .

مميزاته : طبائعه كالسابق تماما ، ويمتاز عن السابق بأن السواد فيه أخف قليلا من السابق . والعلامات الرخامية في الصدر في السابق يحل محلها في السوري بقع عادة . وهو أصغر قليلا ومنقاره كذلك أقصر وأرفع من السابق .

جنس متكولا Genus Monticola
السكلة (دج الصخور Rock - thrushes)

يقطن هذا الجنس المناطق المعتدلة من أوروبا وإفريقية ، وكذلك الاستوائية من إفريقية مثل الحبشة والمعتدلة حتى مدينة الكاب ، وكذلك في آسيا المعتدلة حتى فورموزا واليابان ، على أنها لا توجد في أمريكا الشمالية ولا الجنوبية ولا في استراليا .

وهي تشبه المسويدة chats والأبلق wheatears في عاداتها من حركاتها واهتزازها وزوغانها في طيرانها وأثناء طعامها . وهي تتناول طعامها دائما على سطح الأرض . وأجسام هذا الجنس رشيقة

والمقار مدبب متوسط القوة مقوس قليلا من طرفه وقدمه متوسط الطول ، وللاصابع مخالب عادية والجنح مثلث الشكل أشبه . بجناح الزرزور والصغير . أطول قوادمها الثالثة . تبنى العش على سطح الأرض أو قريبا منها في أماكن مهجورة يصعب على الباحث وجدها ما لم يُرَ الطائر بنفسه . في ثقب الجدران وشقوق الصخور أو بين كثيف الأدغال المنخفضة ، والعش من السيقان الرفيعة والحشائش الخشنة والأعشاب ويطن بالصوف والشعر ، والبيض أزرق وبه أحيانا علامات غير منتظمة خفيفة جدا . وهو في المناطق الجبلية يأوى إلى الجبال ولذلك سمي بهذا الاسم .

دجّة الصخّور Rock Thrush (Monticola saxatilis)

الوصف : طولها حوالي ٧/٨ : ٨ بوصة . انظر اللوحة (٢٤) شكل (٣) .

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شبه جزيرة أيبيريا والبلقان ووسط وشمال إيطاليا . (في جبال وسط وجنوب أوروبا) وجبال شمال غرب إفريقيا والقوقاز وفلسطين ، وشرقا إلى جنوب سيبيريا وشمال الصين . كذلك في جبال آسيا الصغرى وعلى جبال لبنان وتلال فارس وشمال بلوخستان ، وشمال غرب منغوليا إلى شمال الصين ولا كذلك في هملايا .

تقضى الشتاء في افريقية الاستوائية وجنوب آسيا وبلاد العرب قرب عدن ، وفي الشتاء تزور نيجيريا وساحل الذهب وكينيا وتنجانيقا والحيشة . ولا توجد شتاء لا في الهند ولا في الصين .

في مصر : تمر على مصر في هجرتها في الربيع فتبدأ الهجرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبي من ٢٣ مارس وتستمر حتى آخر إبريل وتكثر في النصف الأخير من إبريل ، وفي هذه الفترة تمر كذلك على سينا ، وأحيانا تكثر في النصف الأول من إبريل .

وهي تمر شمالا فوق الصحارى الغربية في غرب إفريقيا خصوصا أثناء أول أسبوع من إبريل .

أما في الخريف في مصر فهي تشاهد فيها طول شهر سبتمبر وهي تكون في الخريف أكثر شيوعا من الربيع عكس ما يقول مينرتزهاجن بأنها في الربيع أكثر من الخريف ، وأنها في الخريف أقل ملاحظة ، مع أنها شائعة في سبتمبر وخاصة يصيدها الصيادون بالدينق (المخيط) من سواحل الدلتا الشمالية (بور سعيد والبرلس ودمياط ورشيد والإسكندرية) وتباع ضمن العاصفير النيلية في ذلك الميعاد ، واسمها الشهير هو (دجّة)

طبائعها ومميزاتها : يمتاز الذكر فيها بردفه الأبيض ورأسه الأزرق وذيله البرتقالي وكذلك الأجزاء السفلى البرتقالية ، والذكر في الربيع أجمل منه في الخريف . أما الأنثى فإن لونها عموما هو بني فاتح ، وأجزاءها السفلى بها خطوط متعرجة وتكاد تكون متوازية .

أما حركاتها فإنها تنموذج في طيرانها وأحيانا تنتج في استقامة واحدة ، وهي تلعب في الهواء في طيرانها كما يفعل الأبلق Wheatear الذي سيأتى ذكره إن شاء الله ، وهي في حجم الزرزور ، مغرمة بالوقوف على الصخور أو الحجارة الصغيرة أو حجرة كبيرة منفردة على الأرض فنجدتها تقف عليها ومن

ذلك اشتق اسمها وذلك في الصحراء أو الموطن شبه الصحراوية ، على أنها أيضا تغشى الحدائق والأحراش ، كذلك تقف على المقابر في وسط الرمال والأراضي الزراعية ولا تقف على سطوح المنازل مثلما تفعل دجة الصخر الزرقاء الآن ذكرها ، أما في القرى فهي تقف أحيانا على حواف المنازل الريفية ، كما أنها تقف أيضا على النخيل والأشجار . طعامها الحشرات والديدان والقواقع . تقف أحيانا على أعمدة البرق (لا على أسلاكه) صوتها لا يسمع في مصر .

دجة الصخور الزرقاء الغربية

Blue - Rock - Thrush (Western Form)
(Monticola solitarius Solitarius)

الوصف : طولها حوالي ٨ بوصة . انظر اللوحة (٢٤) شكل (٤)


الموطن والتوزيع : من القواطع ، وربما كانت أفراد منها من الأوبد تبقى وتتوالد . وهي تتوالد في جنوب غرب أوروبا (اليونان ، وإيطاليا وصقلية وسردينيا وقورسика وشبه جزيرة أيبيريا) وذلك صيفا على الجبال مثل جبال البرانس والألب وجبال أبيتين وجزائر البليار والأيونيان وكريد وقبرص وآسيا الصغرى وجبال طوروس وجبال أطلس وفلسطين .

تهاجر شتاء إلى الصحراء الكبرى الإفريقية وإلى السودان وبلاد الحبشة والصومال وربما مصر العليا وسينا .

في مصر : ليس موثوقا من إقامتها الدائمة لها ، ولكنها تُرى وتشاهد فيها في أواخر الخريف وأوائل الربيع وخاصة في الدلتا وتشاهد ولكن بقلّة ويندر أن ترى شتاء . وربما تتوالد في أسراب صغيرة على الأهرام وخاصة الهرم الأكبر .


وهجرة الربيع هي من ١٠ مارس إلى ١٤ إبريل ، على أنى رأيها في رشيد في أواخر فبراير ، وهجرة الخريف هي من ١٨ أكتوبر إلى ١٩ نوفمبر . وحصل عليها من سينا بين أول أكتوبر ، ١٤ منه ، وفي الربيع بين ١٥ مارس ، ١١ إبريل . وشوهدت أفراد منها قرب العريش في يناير وفي وادي فيران في ٢ مارس .

مميزاتها وطبائعها : الذكر كله أزرق غامق بلمعان ، الأنثى عموما لونها بني وأجزاءها السفلى بها خطوط مثل أنثى دجة الصخر السابقة . وهي مغرمة بالوقوف على الصخور والأراضي الصخرية أو التي بها أحجار مبعثرة والمواطن الجبلية صيفا . حركاتها وعاداتها كالسابقة غير أنها تلاحظ تماما في المدن الساحلية مثل رشيد والإسكندرية وبور سعيد ودمياط وهي تقف على شفا جرف سطوح المنازل في فبراير ، ومارس في الربيع ، وفي نوفمبر وأكتوبر في الخريف كأن ذلك إنذار منها بحلول الشتاء وانقضاء فصل الخريف ، كذلك في الأول تبشر بقدوم الربيع . والذكر في لونه من بعيد بحسبه الرائي كأنها زرزورة غير أنه إذا اقترب منها لم يجد البقع والنقط البرتقالية والغبراء التي في الزرزور لم يجد ذلك بها . كذلك لا يقف الزرزور على سطوح المنازل . طيراتها مستقيم في اتجاه واحد ، ومتوسط القوة .




Blackbird

ص ١٣٠




Blackbird (Syrian)

ص ١٣٠




Rock-thrush

ص ١٣١



ص ١٣٢



Blue-rock Thrush (Eastern.)

ص ١٣٢

طعامها القواقع والحشرات والديدان والفرشات ، وأحيانا في أواخر الشتاء تنتقى الحشرات وبعض اليرقات من سطوح المنازل القديمة في رشيد وأمناها أو من فوق سطوح المنازل والمباني الأثرية التي سطوحها ملانة بالتراب ومكتظة بالنباتات مثل الخبازى . ودائما تكون مثنى أو منفردة كما يدل على ذلك اسمها العلمى وهو Solitarius

دجة الصخور الزرقاء الشرقية

Blue- rock- Theush (Eastern Form)
(Monticola solitarius longirostris)

الوصف : طولها حوالى ٨ بوصة . انظر اللوحة (٢٤) شكل (٥)

الموطن : من القواطع ومتجولة أحيانا : تتوالد صيفا محليا في شمال العراق وفي جبال إيران وكردستان ومنطقة بحر قزوين ، وربما كذلك في شمال غرب بلاد العرب وسينا ومصر . تقضى الشتاء في السند وأفغانستان وبلوخستان ومكران وجنوب بلاد العرب والسودان والصومال والحبشة وفلسطين .

في مصر : يحتمل أن يكون وجودها في مصر أكثر من دجة الصخور الزرقاء الغربية السابقة وذلك في الربيع . لم تسجل من سيناء في الحريف . وحصل على كثير منها من مصر ذاتها بين ١٠ مارس ، ٦ أبريل من الدلتا ومن حافة الصحراء ، كذلك حصل على واحدة في الحريف من الهرم الأكبر في الجيزة في ٩ نوفمبر ، وعلى أخرى من السلوم في ٢١ يناير سنة ١٩٢٠ م وحصل على ثلاثة منها في الربيع بين ١٥ مارس ، ٤ أبريل بالقرب من العريش ودير سانت كاترين .

مميزاتها وطبائعها : الذكر في لونه كالأغربية السابقة ولكن الجسم أفتح منه لونا في زرقته خصوصا على الذقن والجبهة ، كذلك الأنثى فهي أفتح لونا من أنثى الغربية وتميل قليلا للون الرمادى الطابع مثل دجة الصخور الزرقاء الغربية في كل شيء .

(Wheatears) & chats

البقير = الأبلق

جنس أنانثى Genus Oenanthe
Thrush family

يشمل هذا الجنس الأبلق Wheatear ، والمسودة chat وهو يقطن بأنواعه المتعددة الإقليم البلياركتك من أوروبا وآسيا وإفريقية لغاية الكاب . ويحل نوع واحد منه في جرينلاند وفي أمريكا الشمالية في ألسكا .

وهو يحب الأماكن الخلوية المكشوفة وخاصة الرملية ، حيث تكثر الصخور ومتناثر الحجارة وتقل المزروعات ، وإن كان المكان محاطا بالغابات والأشجار وهو مكشوف فلا مانع عنده من ارتياده ، والجناح مثلث الشكل تقريبا وكذلك الذنب مستدير تقريبا وقواعد ريشه بيضاء ، والردف غالبا ما يكون

أبيض اللون أو أفتح لونا من باقى ريش الجسم وهذه ميزة يختص بها تظهر بوضوح فيه أثناء طيرانه . له شارب . الناهض أرقط به نقط . ويختلف الشقان غالبا في لونها ويندر أن يتقاربا في لونها ويتحد . وهو يهز ذيله ورأسه بمجرد وقوفه على الأرض أو الحجارة ، نشيط الحركة ، طعامه الخاص هو الحشرات واليرقات والفراش يتناول كل ذلك إما على الأرض أو على جناح الهواء . العش في الكهوف وبين شقوق الجدران وفي حفرة في الأرض ، ولون البيض غالبا ما يكون أزرق مائلا للخضرة وبه نقط ويندر أن يكون أبيض اللون ١٩ جنسا منه في مصر .

جميل المنظر في أكثر أجناسه . يجب العزلة والانفراد ، ولا يكون محتشدا اللهم إلا عند التزاوج فيلازم الذكر أثناء ويتعاون معها في إطعام الأولاد .

**الأبلق الأوروبي (Wheatear (European Form)
(Oenanthe oenanthe oenanthe)
Thruash Family**

الوصف : انظر اللوحة (٢٦) شكل (١)
طوله حوالى ٥,٧٥ بوصة .

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا من أقصى شمالها إلى جنوبها في حوض البحر الأبيض المتوسط ما عدا جزيرة سردينيا كذلك يصل في توالده شرقا إلى أواسط وشمال آسيا وشمال السكا ، ولا كذلك في قبرص والنوع الذى في كريت يختلف عنه . كذلك يتوالد في منغوليا وآسيا الصغرى . يقضى الشتاء في إفريقيا الاستوائية والجنوبية وبلاد العرب وفي جنوب آسيا في الهند .

في مصر : كثير في مصر في الربيع والخريف وكذلك في سينا . فيبدأ ظهوره في الربيع من منتصف مارس ويبقى حتى منتصف إبريل ، والخريف من ٢١ أغسطس إلى ٢١ أكتوبر . ويكون في الربيع أكثر منه في الخريف ، ويكثر عندئذ في مصر السفلى والعليا والواحات الداخلة والخارجة والقيوم ووادي النطرون والسلوم وسينا والبحر الأحمر جنوبا إلى جبل علة . والهجرة تتخذ طريقها إلى الجنوب عن طريق وادي النيل كدليل ومرشد له .

مميزاته وطياته : يمتاز الذكر بأجزائه العليا الرمادية في الربيع ورفه الأبيض الناصع ، وجناحه الأسود الفاحم ، وفي الخريف تكون الأجزاء العليا بنية ، والسفل شاحبة ، مع ردف أبيض وهو يجب الأماكن المكشوفة الخ ما في ذلك من خصائص الجنس الذى في صفحة ١٣٣ حيث كلها تنطبق عليه . أشهر أنواع الأبلق الذى يرى في مصر يصاد بكثرة بالدبق في مدن شمال الدلتا في الخريف .

الأبلىق الرملى
Isabelline Wheatear
(*Oenanthe isabellina*)

الوصف : طوله حوالى ٦ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) شكل (٢)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب شرق روسيا ، ووسط آسيا ، وآسيا الصغرى وسوريا ويحتل في جنوب فلسطين وشمال سينا . كذلك يتوالد في التركستان وبلوخستان وهضبة التبت ومنغوليا وفارس وخلال سيبيريا إلى شمال غرب الصين . يقضى الشتاء في إفريقيا الاستوائية وبلاد العرب والسودان وشمال غرب الهند ومصر وسينا والحيشة والصومال وكينيا وتنزانيا .

في مصر : شائع في مصر وسينا في الربيع والخريف والشتاء ، فيشاهد في الخريف من آخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر والبعض يبقى بها شتاء ويرى بقلة في مصر العليا وعلى حواف الدلتا المطللة على الصحراء . ويشاهد في الربيع من وسط مارس إلى منتصف إبريل . ويشاهد في القيوم ووادي النطرون والواحات الداخلة في الاعتدالين ويصعب رؤيته في غرب الإسكندرية .

مميزاته وطبائعه : الذكر كالأنثى في لونه تقريبا في كل الفصول . لونه العام أحر رملى . يميل إلى المواطن المهجورة والرملية والوعرة والصخرية أكثر من سابقه . يقف قائما منتصباً . حروف أطراف الذيل رملية برتقالية وهو أسود .

أبلىق الصحراء المصرى
Desert Wheatear (Egyptian Form)
(*Oenanthe deserti deserti*)

الوصف : طوله حوالى ٥ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) رقم ٣ (١)

الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة في الصحارى المصرية ، حيث يتوالد في شرق وادي النيل وفي سيناء ووادي حلفا وشمال غرب بلاد العرب .


في مصر : كما في أعلى ؛ ويشاهد في طريق السويس - القاهرة ، كما أنه شائع الوجود في الهضبة الشمالية من سينا .

مميزاته وطبائعه : الذكر في الخريف نجد أجزاءه العليا رملية فاتحة ، الجبهة في غاية البياض بها حاجب واضح مائل للبياض ، الردف وأعلا الذيل رملى شاحب (٢) . الأنثى أجزاءها العليا مائلة للرمادى أكثر .

وهو طائر صحراوى بحث ، ظهره بلون الصحراء أصفر أبيضابلى ، الزور في الذكر أسود والعجز أبيض والذيل أسود من أى أبلىق آخر ، ولا يسمع صوته إلا في الربيع . نشيط جدا وجبان لعدم اقترابه

(١) انظر كذلك الذيل في لوحة ٢٥ شكل (٢) .

(٢) وهو الأبلىق الوحيد الذى ذيله كله أسود .



من العمران ، لا يستقر في مكان ويطيّر إلى مسافة أكثر وأبعد من زملائه . يقف على الأشجار الصغيرة المنخفضة في الصحارى ويفضلها على صخور الصحراء .

توالده : تتخذ الأنثى عشها تحت الحجارة وفي الجدران أو في ثقب في الأرض مثل غيره من زملائه . البيض من ٣ : ٥ أزرق مائل للخضرة به بقع برتقالية .

أبلق الصحراء الآسيوي

Desert Wheatear (central Asiatic Form)

(Oenanthe deserti atrogularis)

الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) شكل (٤)

الموطن : من القواطع : يتوالد في صحارى وسهول وسط آسيا من حوض بحر قزوين إلى كوكونور . يقضي الشتاء في بلاد العرب وسو مطرة والسودان .

في مصر : حصل ميترتراجن على ذكرين وأنثى من الواحات الداخلة في ٢٧ مارس سنة ١٩٢٨ وربما كانت مهاجرة في الربيع .

مميزاته وطبائعه : كالسابق ولكنه أعمق قليلاً وأكبر لوناً بنياً ، وأكثر منه قليلاً وأكثر منه ميلاً للرمادي في عموم ريشه . الطبائع كالسابق . أكبر قليلاً من السابق .

أبلق الصحراء الكبرى الإفريقي

Desert Wheatear (Saharan Form)

الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) شكل (٥)

الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة في مصر غرب نهر النيل إلى مراكش . والطيور التي من السلوم هي من أنواع غرب الصحراء الكبرى أما التي من وادي النظرون فهي ليست من هذه الأنواع . وهو كثير في الصحارى .

في مصر : كما ذكر وأيضاً هو كثير في الصحارى حول سيوة شتاء ، ولكن ليس في الصحراء حول الفيوم أو الواحات الداخلة أو الخارجة .

مميزاته : قريب الشبه جداً من المصري وأجزاءه العليا أكثر حمرة قرنفلية وأقل في الرمادي . طبائعه كالمصري .

أبلق أسود الأذن شرقي
Black - eared Wheatear (Eastern Form)
(Oenanthe hispanica melanoleuca)

الوصف : طوله حوالى ٥ ٣/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) شكل (٦) ، (١)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كرميا وبلغاريا ودملاشيا وآسيا الصغرى وفلسطين وغرب بلاد فارس . لا يتوالد لا في قبرص ولا في كريد .

يقضى الشتاء في السودان وجنوب مصر وسينا والحبشة وساحل البحر الأحمر وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية وشمال غرب إفريقيا .

في مصر : يشاهد في مصر وسينا في الربيع أكثر من الخريف . وتبدأ هجرة الخريف له من أوائل سبتمبر ثم يغادر جميعه البلاد في أوائل أكتوبر أما في الربيع فيشاهد من ٥ مارس إلى ٢٢ في مصر وسينا على السواء ويبلغ منتهى كثرته في الدلتا في الأسبوع الأخير من مارس إلى ثاني أسبوع من ابريل . ويحتمل أن قليلا منه يأتى شتاء في مصر العليا لأنه شوهد في وادى حلفا وأسوان في أوائل فبراير . ويشاهد كذلك في الربيع في الفيوم ووادي النطرون والواحات الداخلة والخارجة وله هجرة كذلك في أعالي غرب شاطئ البحر الأحمر .

مميزاته : الذكر في الربيع أجمل منه في الخريف فيكون كأنه مكون من لونين : أبيض وأسود وذلك من بعيد . يغطي المساحات الزراعية من الدلتا ، وأكثر بياضه هو في الذيل . ويظهر ظهره في الصحارى في الربيع وفي الأراضي الزراعية كأنه أبيض . جبان يطير من بعيد يقف على أسلاك البرق والأرض .

الأبلق الحزين المصرى
Mourning chat (Egyptian Form)
(Oenanthe lugens lugens)
Thrush Family

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) شكل (٧)

الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في فلسطين ومنطقة بحر قزوين وشمالا في سوريا إلى قرب بيت المقدس وجنوبا إلى بطرة .

في مصر : يقيم طول السنة في جنوب سيناء وجنوب مصر شرق النيل وفي طريق البحر الأحمر إلى القصير وفي النيل إلى أسوان . وهو نادر الوجود في غرب ضفة النيل الغربية . ويحل في ضواحي الفيوم ولا كذلك حول وادى النطرون . ويندر وجوده بالقرب من أهرام الجيزة وسقارة وهو لا يوجد في واحة سيوة أو أى مكان في الصحراء الغربية (ليبيا) أو في غرب الإسكندرية .

(١) ولوحة ٢٥ شكل (٣) ولوحة (٥٣)

مميزاته : يتجول شتاء ويجمع حول حافة الأراضي الزراعية ووسط المقابر ولكنه لا يقرب المحاصيل مطلقا . طائر صحراوي بحث ، يأوى إلى الأماكن الصخرية ، طعامه الديدان والحشرات الخ . يمتاز بالسواد ما بين الرقبة والكتف هادى وقد يكون أحيانا في غاية الألفة والاطمئنان . والأنثى كالذكر في لونه ، وأهم ما يميزه هو اللون الرملى الأحمر الخفيف في غطاء أسفل الذيل وأطراف ريش الذيل البيضاء شكل (٤) لوحة (٢٥)

التوالد : العش في فجوة عميقة في صخرة أو تحتها . البيض من ٤ : ٥ توضع من فبراير إلى يونيو وتبيض الأنثى مرتين في السنة والبيض مائل للخضرة أو الزرقة الشاحبة به نقط بنية وبنفسجية .

الأبلق الحزين الفارسى
Mourning Chat (Persian Form)
(Oenanthe lugens persica)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) شكل (٨)
الموطن : من القواطع : يتوالد في جنوب وشرق فارس ، بلوخرستان الفارسية . حصل عليه من السودان .
في مصر : حصل مينرتزهاجن على أنثى من القصير في ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٨ . يوجد في المتحف البريطاني ٧ منه عليها ورق مكتوب فيه أنها من مصر بدون ذكر التاريخ .
مميزاته : عاداته كالسابق . يختلف عن الحزين المصرى بأن قننه أغمق وأكثر لونا بنيا ، وغطاء أسفل الذيل أصفر جلدى أغمق ، والنسيج الداخلى (النصل الأنسى) للخواقي أبيض .

أبلق الصحراء الكبرى الحزين
Mourning Chat (Saharan Form)
Oenanthe Chat (Saharan Form)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر الصورة (٢٦) شكل (٩)
الموطن : من الأوايد ومتجول أحيانا . يتوالد ويقم في شمال تونس والجزائر في الصحراء الكبرى حولها ، وكذلك حول طرابلس وسيرينكا .
في مصر : ليس موثوقا من وجوده في مصر ويحتمل أنه يتجول فيها شتاء فقد حصل : يقول على ذكر قرب الجيزة في ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١ م ، وأنثى عند أبى رولش (قرب الجيزة) في ٢٤ فبراير سنة ١٩٠٩ ، وحصل مينرتزهاجن على اثنين عند طيبة (الأقصر) في ١٨ فبراير سنة ١٩٢٨ .
مميزاته وطبائعه : الذكر مثل المصرى ولكن البياض في النصل الأنسى لا يصل للسهم غطاء أسفل الذيل أكثر بياضا . الأنثى تختلف عن الذكر .

الأبلق الأبقع الآسيوى (پلستشانكا)
Pied Chat (Asiatic Form) = Pleschanka's Chat
(OEnanthe pleschanka pleschanka)

الوصف : طوله حوالى ٥ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) شكل (١٠)

الموطن : من القواطع ومتجول أيضا : يتوالد في جنوب روسيا ، وأقصى شمال غرب الهند ، ومنغوليا . يقضى الشتاء في بلاد العرب والصومال وكينيا وأوغندة والسودان .

في مصر : قد يتجول أحيانا لمصر ولكن ذلك نادر فقد حصل مينرتزهاجن على ذكر بالغ منه عند الهرم الأكبر في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٩ . وسجل من سيناء في ٧ إبريل سنة ١٩١١ م من وادى هيران .

مميزاته وطبائعه : ليس طائرا صحراويا بحثا فقد يغشى الحدائق وأغلب ما يكون في السهول العشبية . يقف على الأشجار .

يميزه في الذكر ظهره الأسود ، يميزه هذا عن النوع الأسود الزور . وهو صغير الجسم بالنسبة لزملائه . الصدر والبطن ليستا رائقتين أبدا في بياضهما .

أبلق قبرص الأبقع
Pied Chat (Cyprus Form)
(OEnanthe pleschanka Cypriaca)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) رقم (١١)

الموطن : من القواطع أحيانا ، ومن الأوابد الخاصة بجزيرة قبرص ، حيث يقيم فيها طول السنة ويتوالد فيها وقد تجول شتاء في فلسطين .







في مصر : حصل روعلى أنثى عند أبى زعبل في ٥ نوفمبر سنة ١٩١٧ م وكذلك على اثنين آخرين في أكتوبر ونوفمبر في السنة التى تليها ، الأول بالمتحف الحيوانى . بالجيزة . وحصل اسكرادار على اثنين عند الطور من سيناء في أكتوبر سنة ١٩١١ م .

مميزاته وطبائعه : هو مثل الأبقع الآسيوى ولكن سواده أشد في الذيل ، وأجزاءه السفلى ليست بيضاء للغاية ، وهو أكثر حمرة رميلة .

أبلق فنش العربى
Finsch's or Arabian Chat
(OEnanthe finschu finschu)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٦) رقم (١٢)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وشمال بلاد العرب إلى العراق وشمال غرب فارس .



في مصر : قليل منه يزور مصر وسينا شتاء ! وشوهد في إنشاص في يناير وفي أب زعبل في فبراير وفي الإسماعيلية في يناير ، ويمكن رؤيته عادة على تلال المقطم خلف القاهرة وقرب حلوان شتاء وربما كان يتوالد في هذه المواطن .

مميزاته وطبائعه : طائر صحراوي قح ، ولكنه أحيانا يغشى المناطق المنزرعة في فلسطين . وهو في مصر يغشى المواطن الصحراوية أو شبه صحراوية ولكنه لا يبعد كثيرا عن المقابر وما أشبهها . قننة بيضاء أو مائلة للبياض وكذلك الظهر والردف وذلك في الذكر .

وهو في حجم أبلق كبير ، وهو نشيط جدا للغاية ، وهو عادة أليف ولكنه يصبح في غابة الجبن إذا خاف سمع صوته في الربيع فقط وهو لذيق السمع قصير المدى .

أبلق الصحراء الكبرى أحمر العجز

Red - rumped Chat (Saharan Form)

(OEnanthe moesta moesta)

الوصف : طوله حوالي ٥ ¼ بوصة . انظر اللوحة (١)

الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في الصحراء الكبرى الإفريقية من جنوب الجزائر إلى سيرنيكا وأقصى غرب مصر .

في مصر : يتوالد في مصر من السلوم إلى مسافة ١٢ ميلاً شرق الضبعة .

مميزاته وطبائعه : خاص بالصحراء ذات الأشجار القصيرة المبعثرة فيها قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط طيرانه إلى مسافة قصيرة و متموج للغاية يشبه طيران الفراش (أبو الدقيق) وهو ليس جباناً إلا عند الشك والارتياح . كبير الجسم بالنسبة لزملائه ، وذيله به قليل من البياض ، وغطاء اعلاه ليس رائقاً في بياضه . يقف على الأشجار الصغيرة المنخفضة وأعشاب الصحراء ويندر أن يبعد عن مثل هذه المناطق . صوته عذب يردده غالباً في الربيع على جناح الهواء .

توالده : عثر عش له قرب مرسى مطروح ، يحتوي على بيضتين في ١٥ مارس ، وكان عبارة عن فجوة في تنوء على سطح الأرض يبلغ غورها حوالي قدمين ، وكان مبنياً من القش الخشن ومبطناً بالشعر والزغب ، وكان البيض أزرق مائلاً للاخضرار ، باهتا للغاية وبه نقط ويقع بنية مائلة للحمرة قليلاً .

الأبلق العربي الأحمر العجز

Red - rumped Chat (Arabian Form)

(OEnanthe moesta brooksbanki)

الوصف : طوله حوالي ٥ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) ، رقم (٢)

الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في صحراء سوريا وبلاد العرب .

في مصر : يقيم فيها طول السنة حيث يتوالد في هضبة سينا الشمالية ، ولكن ليس بكثرة فيها ، كما أنه يقيم على الأهداب الصحراوية ذات الأشجار المنخفضة ، وجمعت أنواع منه بالقرب من الطور في ديسمبر وفي يناير .

مميزاته وطيائمه : يغشى الصحراء ذات الحصى والخصباء أكثر من ذوات الأشجار المتفرقة ، على أنه قد يتردد أحيانا على الأشجار وهو يشبه أبلق الصحراء الكبرى الأحمر العجز ولكن لونه الأحمر الرملي ليس شديدا للغاية ، وهو أكبر منه . والأنثى أقل لونا رمليا من أنثى السابق ، وقد يصل المنقار إلى ٢١ مم

توالده : العش به ٤ بيضات عثر عليها على بعد ١٥ ميلا جنوب شرق العريش في ١٢ مارس سنة ١٩٢٨ م .

أبلق فارسي أحمر الذيل

Red - tailed Chat (Persian Form)

(Oenanthe xanthopyrmyna Xanthopyrmyna)

الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (٣) .

الموطن : من القواطع : ولا يعرف عن توالده إلا القليل ، فقد حصل سارودن على تسعة منه في مارس وإبريل من نهر قروم قرب ديسفول وشسيت من جنوب غرب فارس حيث يحتفل أن يتوالد هناك . وكذلك حصل تشيزمان على ذكر قرب بغداد في ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٢٠ ، كما أن مينرتزهاجن حصل أيضا على أنثى من شمال بلاد العرب في ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٢ م ، وآخر من غرب سينا في ٥ مارس سنة ١٩٢٨ م .

في مصر : حصل مينرتزهاجن عليه من سينا في مارس كما هو مذكور ، وعلى اثنين آخرين بالقرب من القصير في ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٨ م ويوجد في المتحف البريطاني ثلاثة منه مكتوب أوراقها بأنها حصل عليها من مصر في فبراير ومارس ، كما أن هناك أفراد أخرى من بور سودان في ديسمبر وفبراير .

ولا يعلم شيء عن طبائع أو توالده هذا الأبلق .

مميزاته : الأجزاء العليا بنى مائل للرمادي ، أكثر شحوبا على الجبهة ، يوجد خط مائل للبياض من الصدغ إلى خلف العين . الذيل بنى غامق ، أطراف الذيل بها نقط مائلة للبياض . كل هذه الأوصاف هي للذكر في الخريف .

أبلق شمال إفريقية الأسود

Black Wheatear (Northern African Form)

(Oenanthe leucura syenitica)

الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (٤)

الموطن : من الأوبد : يتوالد صيفا في مراكش وجنوب الجزائر ، وتونس وطرابلس .

في مصر : حصل مينرتزهاجن على اثنين منه على مسافة ١٢ ميلا غرب السلوم ، ومن ليبيا في ٢٨ يناير سنة ١٩٢٨ م . وهذان هما التسجيلان الوحيدان له داخل الأراضي المصرية .

طباعه ومميزاته : ليس له أى بياض في القنة . الأنثى كلها بنى غامق وبيضاء لا يخطئها أحد في تمييزها عن كل الأبلق المصري . موطنه الصحراء ذات الصخور الكبيرة أو المناطق شبه الصحراوية جسمه كله أسود ما عدا الردف فهو أبيض - الذيل أبيض يشقه سواد على حرف T من طرفه ووسطه .

مسويده إفريقية بيضاء الردف
White - rumped Black Chat (African Form)
(Oenanthe leucopyga leucopyga)

الوصف : طولها حوالي ٦ بوصه . انظر اللوحة (٢٧) شكل (٥)
الموطن : من الأوابد : تقيم طول السنة حيث تتوالد من الصحراء الكبرى نواحي الجزائر ، جنوبا إلى إقليم الطوارج ، وشرقا إلى دار فور وواى النيل شمالا إلى الخرطوم .
في مصر : يتوالد في الواحات الداخلة وسيوة ، والطبور التي من أسوان والأقصر ومصر العليا هي وسط بين هذه المسويده وبين شكل سيناء .

مميزاتها وطبائعها : تمتاز بأن كل ريشها أسود ما عدا الردف وأغطية أعلى وأسفل الذيل .
القنة تارة سوداء زرقاء أو بيضاء راتقة ، وكل الذيل - إلا ريشنا الوسط - معظمه أبيض وهي كبيرة الجسم ومحصور وجودها في وادى النيل في الوديان العميقة المقفرة وهي لا تقرب الأراضي الزراعية مطلقا . نجدها في واحة سيوة والواحات الداخلة تغشى المنازل وتخترق المناطق المنزرعة فيها . وهي أليفة ، وصوتها للذيد يسر السامع ، وأغلب ما يسمع صوتها في الغسق (أول الليل) وعند الغلس (آخر الليل بعد الفجر)

توالدها : تتوالد في شقوق الصخور والثقوب في سدود الأرض وفي البنيان كل ذلك في الصحراء في الواحات الغربية . والبيض من ٣ : ٤ بيضات بيضاء مائلة للزرقة ، بها علامات ونقط غير منتظمة قليلة جدا بنية مائلة للحمرة . العش يبطن بالشعر أو الصوف أو بها معا . في الواحات الداخلة عثر على البيض في آخر مارس ، وأما في وادى حوف قرب حلوان فقد عثر على كتكوت عمره خمسة أيام في ٢٢ إبريل ، في حين أن هذا الكتكوت لم يكن مكتملا في ريشه .

مسويده سيناء البيضاء الردف
White - rumped Black Chat (Sinai Form)
(Oenanthe leucopyga ernesti)

الوصف : طولها حوالي ٦ بوصه . انظر اللوحة (٢٧) شكل (٦)
الموطن : من الأوابد : تتوالد وتقيم طول السنة في فلسطين في منخفض البحر الميت ، وجنوبا إلى العقبة .

في مصر : تتوالد وتقيم في العقبة وكل الأقاليم الجبلية من جنوب سيناء ، وفي جبل علية في أقصى جنوب شرق مصر . وحصل على ذكر من وادى فيران من سيناء في أول مارس سنة ١٩٢٨ هو الآن في مجموعة مينرتزهاجن .

مميزاتها : هي مثل المسويده الإفريقية السابقة ولكن منقارها أطول ، وهي أكثر لمعانا منها ، وريشها يميل للزرقة أكثر منها أيضا ، وهذا في الذكور .

مسويذة معتمة Hooded Chat
(*Oenanthe monacha*)

الوصف : طولها حوالي ٥٢/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (٧)

الموطن : من الأوابد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في ساحل البحر الأحمر جنوبا إلى سواكن ، وفي منخفض البحر الميت ولكنه لا يظهر كثيرا في شمال جيركو . كذلك يتوالد في بلاد العرب (بلاد البحرين) ، وفي شرق فارس ومعظم الأجزاء المقفرة من غرب فارس ، وبلوخستان وأفغانستان وفي الحدود الغربية من نهر السند . وهناك شك في إقامته طول السنة في جزيرة قبرص .

في مصر : تقيم طول السنة حيث تتوالد في ضفة النيل الشرقية على التلال خلف القاهرة إلى قرب حلوان ، وجنوبا إلى الأقصر وأسوان وأحضر زوج منها شتاء بين وادي حلفا والحفرطوم . وهي تشاهد في طريق قنا والقصير ، ولا كذلك في طريق القاهرة - السويس .

مميزاتها وعاداتها : تغشى الوديان المقفرة ولا تقرب الأماكن الزراعية أو الأهلة بالسكان مطلقا ، ولا تميل أيضا إلى أية ناحية بها أشجار أو أعشاب خضراء متناثرة أو مجتمعة ، بل تفضل الوديان الخلوية المقفرة ذات التلال ذوات السفوح الوعرة والمنحدرة أنحدارا فجائيا ، وربما يخطئ الإنسان في تمييزها عن غيرها ، ووجودها قليل ، ويندر العثور على الأنثى ، وسمع صوتها في الربيع في القصير عند الفجر وكان عذبا للغاية . ويلاحظ في الذكر أن الجبهة والفقا والقنة ، كل ذلك لونه أبيض ، وشاحه وكفنه لونها أسود وحروف الريش فيها بني فاتح ، وأسفل الظهر والردف أبيض ، وجناحه أسود اللون والأجزاء السفلى بيضاء ، وفي الربيع نجد أن اللون البني والفقا يكونان أبيض رائقا ، والوشاح أسود رائقا .


أما الأنثى فلونها العام بني تصبح رملية كرمية شاحية في أسفل الظهر والردف وغطاء أعلى الذيل . الذيل كرمي رملي وقواعده مائلة للبياض ، ريشه الخارجى يغشاه في اطرافه لون بني ، والزور رملي مائل للبياض .

توالدها : لم يعلم شيء عن توالدها ، وقد لاحظ روائتين من البيض ، وثلاثة كتاكيت بها زغب قرب حلوان وكان ذلك في ٢ يونيو .

جنس سرُكَمَلَا (Genus (Cercomela
مسويد الصمخور Rock Chat

يقطن هذا الجنس المواطن الصخرية والشبيهة بالصحراوية من جنوب غرب بلاد العرب . وكذلك في فلسطين والهند ، كما أنه يوجد في البيئات التي تلائمه من إفريقية .

هو يشبه إلى حد بعيد جنس الأبلق (*Oenanthe*) ولكن جناحه أكثر استدارة منه ، على أن قادمته الأولى أيضا أطول من الثانية ، كما أن ريشه أنعم وألطف منه . والشقان (الذكر والأنثى)



لا يختلفان كثيرا في لونهما عن بعضهما . والبيض مثل بيض الأبلق ، وذيله يتذبذب فيتألأ ببريق أمام الرائي ، كما أن هذا الذيل فيه خاصية ليست في الأبلق السابق بأنواعه ، ولا في المسويذة السابقة بأنواعها أيضا ، وهو أن ذيله يحركه يمينا وشمالا عكس الأنواع السابقة التي تحرك ذيلها حركة علوية سفلية بمجرد وقوفها على الأرض ، والبالغ نجد لونه يميل للون الرمادي أو اللون البني .
يوجد منه في مصر نوع واحد على شكلين مختلفين .

مسويذة صخرية سوداء الذنب فلسطينية
Black - tailed Rock Chat (Palestine Form) = Blackstart
(Cercomela melanura melanura)

الوصف : طولها حوالي ٤ ٣/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (٨)
الموطن : من الأوابد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في منخفض البحر الميت جنوب جيريكو .
في مصر : تقيم طول السنة حيث تتوالد من جنوب جيريكو في منخفض البحر الميت ، جنوبا إلى العقبة ، كذلك في معظم الوديان الأكثر اقترارا من جنوب سيناء والغردقة . وهي كثيرة خصوصا في وادي فيران في سيناء ولكنها لا تغطي المرتفعات عادة أكثر من ٣٥٠٠ قدم .

وذكر نيقول في كتابه صفحة ٦ بأنه شاهدها بنفسه عند الجزيرة في ٩ أكتوبر سنة ١٩٠٧ ، ومن الصعب تصديق ذلك فإن هذا احتمال بعيد الحصول ، وإن من العجيب أن توجد هذه المسويذة في مثل هذه المنطقة .

مميزاتها : تمتاز بريشها المعتم ، وذيلها الأسود ، أما الردف فليس أبيض اللون ، وعاداتها هي مثل عادات الأبلق في كل شيء تقريبا ، على أنها أيضا تعمل حركات الفستقة Stonechat أكثر من حركات الأبلق ، وهي تحرك ذيلها حركات أكثر من غيرها ، كما أنها تقف على الأشجار . وهي محصورة في وجودها في المناطق شبه الصحراوية ولكنها لا تمتاز أبدا بالمناطق المزروعة . صوتها يسمع في الربيع وهو لا بأس به ، يردد غالبا على جناح الهواء ويعمل الذكر هذا بوجود أنثاه كي يتقرب إليها ويتودد لها ، فنجد أن الذكر يلعب في الهواء ويظهر إلى أعلى ويدور في طيرانه (يرفرف في طيرانه) ويحوم ثم يبط على أنثاه من عليها سمائه وجناحه ممتدان مصفوفان ، ناشرا ذيله .

توالده : العش تحت صخور كبيرة أو في ثقب في سد جانبي ، ولكن غوره لا يبعد كثيرا كما في الأبلق ، وتضع الأنثى به من ٣ : ٤ بيضات ، تضعها حوالي آخر شهر إبريل ، ولون البيض أزرق شاحب للغاية ، وبه بعض العلامات والنقط والتعاريخ الواضحة .

مسويده البحر الأحمر صخرية سوداء الذنب

Black - tailed Rock Chat (Red Sea Form)

(Cercomela melanura lypura)

الوصف : طولها حوالى ٤ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (٩)

الموطن : من الأوبد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في الصومال وأرتيريا قرب ببيوتل .

في مصر : تقيم طول السنة وتتوالد في منطقة البحر الأحمر من السودان وتخترق مصر عند جبل علية ، حيث حصل اسكردادار على أنواع منها في مارس وإبريل سنة ١٩٢٨ .

مميزاتها : كل أجزائها العليا بنى رمادى ، والسفلى بنى رمادى شاحب ، تصبح مائلة للبياض في أسفل البطن وصفراء جلدية شاحبة نحو أسفل الخاصرة . والردف والذيل أسود . طبائعا كالسابقة .
توالدها : كالسابقة .

Whinchats & Stonechats

جنس ساكسيكولا (Saxicola)

(القليعى = سمان القصب ، والفسقه)

Thrush Family

يستوطن هذا الجنس أوروبا وآسيا وإفريقيا وجزيرة مدغشقر ، وجزيرة ريونين (Reunion) جزيرة في المحيط الهندي شرق مدغشقر بجوار جزيرة موريتيوس - تقابل خط عرض ٢١° جنوبا ، وخط طول ٥٤° شرق جرينيتش) تقريبا ، وكذلك في غينيا الجديدة . وهو متعدد الألوان ، صغير الجسم ، أطول قوادم الجناح الثالثة ، العش فوق سطح الأرض يكون مختفيا بين الأعشاب الطويلة الشجيرات ، والبيض أزرق به غالبا بقع ، له شارب قائم . قاعدة المنقار مسطحة مثل منقار صياد الذباب (Flycatcher) الشقان لونهما متحدان تقريبا وليس بينهما فروق ملحوظة كبيرة . أربعة أجناس منه في مصر . ييز الذيل وينشره أثناء الوقوف على الفروع وأسلاك البرق والصخور ، والطيران منخفض بدون نظام منقطع بارتفاع وانخفاض . يبيت ليله على الأرض بين الحشائش والشجيرات .

القليعى الغربى

Whinchat (Western Form)

(Saxicola rubetra rubetra)

الوصف : طول حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (١٠)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا جنوبها المطل على البحر الأبيض المتوسط (اليونان وإيطاليا وإيبيريا : . كذلك يتوالد في جبال أورال . يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية .

في مصر : يهاجر إلى مصر في الربيع طول شهر إبريل ، وكذلك في الخريف طول شهر سبتمبر ، وهو في الخريف أكثر من الربيع ويصاد بكثرة في مدن شمال الدلتا بالدبق ويباع مع العصافير . ولم يشاهد في سيناء .

مميزاته : شكل الذكر عموما بلون السماء ولكنه يختلف عنها في طبائعه وتكوين جسمها ولذلك يطلق عليها أهالي رشيد (سمانة القصب) ، ويشاهد في الدلتا بكثرة وكذلك في وادي النطرون والفيوم وبين الإسكندرية والسليم . صوته منخفض هكذا تقريبا (a—tic) يردد عدة مرات وخاصة في الربيع - يغشى المساحات الرملية والطينية ذات الأعشاب الطويلة والأشجار القصيرة ويفضلها على الحدائق والغابات ، ويندر أن يقف على النخيل ، كذلك يشاهد في الأراضي المكشوفة ذات الأشواك الرملية مثل العلقم (شوك صحراوي) . العصفور له حاجب أبيض ، وللذيل بياض جانبي .

القليعي الشرقي Whinchat (Eastern Form) (Saxicola rubetra spatzi)

الوصف : طوله حوالي ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (١١)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في بعض جهات دلتا شبراخيت ؛ ويقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والصومال ومستعمرة كينيا وأوغندا وتنجانيقا .

في مصر : لا يزورها في الخريف ، وإنما يزورها في جموع كبيرة في الربيع في شهر إبريل بطوله ، وهو يهاجر إلى سيناء في نفس الوقت .

مميزاته وطبائعه : كالأوروبي الغربي ولكن النصل الوحشي في الأجزاء العليا أكثر وضوحا ولعانا ذهبيا وأقل لونا بنيا رمليا وهذا ما يلاحظ في أفراد الخريف ، أما في الربيع فتجد أن هذه الحروف (النصل الوحشي) الشاحبة تعطيه لونا مائلا للرمادي عموما . الباقي كالغربي .

الفسقة الأوروبية Stonechat (European Form) (Saxicola torquata rubicola) Thyush Family

الوصف : طولها حوالي ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (١٢)

الموطن : تتوالد صيفا حيث هي من القواطع - في أوروبا جنوب بحر البلطيق ، والجزائر ومراكش وتونس وكريد وفي قبرص وجزائر سردينيا وصقلية ، ولا تتوالد في شمال غرب أوروبا . وهي تقضى الشتاء في قبرص وسوريا وفلسطين وشمال إفريقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ولا تتجول كثيرا في قلب إفريقية بحيث أنها لا تصل إلى السودان .

في مصر : تزور مصر شتاء من أقصى شمالها (في الدلتا) إلى طرفها الجنوبي عند وادي حلفا ، ما عدا المناطق الصحراوية ، وأول ما ترى - وخاصة في الدلتا - هو في الأسبوع الأخير من أكتوبر وتبقى طول الشتاء ثم تغادر البلاد نهائيا في منتصف مارس . وهي نادرة في مصر العليا ، وكلما بعد الإنسان عن الدلتا إلى الجنوب كلما قل وجودها وعزت رؤيتها ، ولم يمكن الحصول عليها عند الأقصر . تشاهد كذلك بكثرة في الفيوم ووادي النطرون وسيوة والواحات الداخلة والخارجة ، كذلك على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط من السلوم إلى العريش ، وشوهدت كذلك في سيناء في الشتاء على ساحلها الشمالي .

مميزاتها : يمتاز الذكر برأسه البني المائل للسواد ، والبياض في رقبته وصدرها البني القسطل . نشاهد بكثرة على أشواك الرمال والثابتة من خلال حصى السكة الحديدية ، وعلى الأسلاك الشائكة في الأراضي المكشوفة وأسلاك البرق أحيانا ، وتارة على أسلاك أعمدة البرق (السلك الجانبى المائل الذي يثبت عمود البرق) ويندر أن ترى في الحدائق أو الغابات . تردد صوتها طول الشتاء هكذا يردده عدة مرات $a-tic-a-tic$ أو هكذا وهو الأقرب ($kec-at$) وهذا الصوت يشبه حشرة صوت الحصى والحجارة الصغيرة ومن هذا اشتق اسمها . طعامها الحشرات والفراش والديدان على الأرض وأحيانا على جناح الهواء .

فستقة القوقاز

Stonechat (Caucasian Form)

(*Saxicola torquata maura*)

الوصف : طولها حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٧) شكل (١٣)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في وسط وجنوب جبال أورال حيث تتقابل مع جنس (انديكا) ، وفي استراخان وشمال القوقاز وجنوب غرب فارس . تقضى الشتاء في السودان وبلاد العرب والحبشة والصومال وجنوب العراق . لم تسجل في فلسطين .

في مصر : سجلها اهنبج ، وآخر موجود بالمتحف الحيوانى بالجيزة .

مميزاته وطبائعه : كالسابق ولكنه في الحقل يظهر كأنه شاحب ورمادى للغاية ويظهر فيه بياض الذيل . حروف ريش الأجزاء العليا مائلة للشحوب عن السابق ، وغطاء أعلى الذيل أبيض مع قليل من الشحوب في حروف الريش وليس به خطوط بني كما في السابقة . النصف القاعدى لكل ريش الذيل الخارجى أبيض . النسيج الخارجى أحيانا كله أبيض وهو في شكله العام يعطى لونا رماديا .

جنس فونيكوروس (الحميراء)

Genus (Phoenicurus) = Redstarts .

Thrus Family

يستوطن هذا الجنس أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط وآسيا ، حيث هو موله بالمناطق الجبلية . رشيق الجسم ، دقيق المنقار ، أطول قوامه الثالثة ، ذنبه دائيا أحمر قسطنطيني ، ما عدا نوعين في آسيا لا يأتیان إلى مصر . ذو شارب معتدل ظاهر ، ذيله مكون من ١٢ ريشه ومستدير قليلا ، الشقان مختلفان . الناهض أزرق اللون تفضل المواطن العالية جدا القارسة البرد . ويعرف في الحقل بحركة الذيل الاهتزازية ، قد يغشى الحدائق أيضا . في مصر منه ٦ أنواع .

الحميراء الغربي

Common Redstart (Western Form)

(Phoenicurus phoenicurus phoenicurus)

الوصف : طولها حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) رقم (١)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا ايرلندا واليونان ونصف إيطاليا الجنوبي والبرتغال) ويصل في توالده شرقا إلى نهر لينا . .

يهاجر شتاء إلى جنوب بلاد العرب الغربي وجنوب فلسطين وأوغندا والسودان ولكنه لا يصل إلى خط الاستواء . يمر في هجرته على ميسوبوتاميا وشمال شرق وشمال غرب إفريقيا وقناريا .

في مصر : يزور مصر في الخريف فيرى فيها من آخر أسبوع في سبتمبر إلى منتصف أكتوبر ، كذلك في الربيع من ١٥ مارس إلى ١٠ مايو ويكون شائعا في الدلتا والفيوم ووادي النطرون ، وكذلك يكون شائعا في الاعتدالين في سيناء .

مميزاته : يمتاز الذكر بظهوره الرمادي وجبهته البيضاء وذيله الأحمر المصدى وكذلك بطنه وصدره الحمراوي البنين ، وزوره الأسود وهو يميز ذيله باستمرار مع صوت يحدثه . يغشى الجدران والمباني الخربة والأطلال ، كثير الحركة . يغشى كذلك الغابات وشواطئ الأنهار ذوات الأشجار . يستريح بقلب الشجرة وعلى كراتيف النخيل . طعامه الحشرات الطائرة كلها من الفراش والجنادب وأبي الدقيق والذباب والبعوض الخ وكذلك الديدان . اسمه في رشيد (أبو حمرة) .

الحميراء الشرقي

Common Redstart (Eastern Form)

(Phoenicurus phoenicurus mesoleuca)

الوصف : طولها حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (٤)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب روسيا والقوقاز ، وآسيا الصغرى وفارس ومنطقة بحر قزوين وفلسطين .

في مصر : شائع في سيناء في الخريف طول سبتمبر وأكتوبر ، وكذلك في الربيع وهو هناك أكثر منه في الخريف وموعده من نصف مارس إلى آخر إبريل . على أنه نادر في مصر كلها في الربيع أو الخريف ، وأحضر ثلاثة منه في أوائل إبريل قرب القاهرة مودعة الآن بالمتحف الحيواني بالجيزة .

مميزاته : يمتاز الذكر بأن له بقعة بيضاء في جناحه يمكن رؤيتها بسهولة وهو في الحقل ، وحروف ريش الخواقي بيضاء أعرض من الغري ، وحروف ريش النسيج الداخلى للقوادم أبيض أصبغ من الغري ، والكل يعطى له شكلا كأن له بقعة بيضاء على الجناح وهو في الحقل .
طباعته كالسابق .

الحميراء الأسود الفارسي
Black Redstart (Persian Form)
(*Phoenicurus ochruros ochruros*)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في آسيا الصغرى وأرمينيا وشمال غرب فارس في منطقة القوقاز الجبلية . قليل منه يحل في فلسطين شتاء ، على أنه شائع في هذا الفصل في العراق .
وحصل على ثلاثة من جنوب السودان هي الآن بالمتحف البريطانى .
في مصر : حصل ميترتزهاجن على ذكر عند خزانات الدلتا في ٢٤ مارس سنة ١٩٢٣ م ولا يوجد تسجيل له في سيناء .

مميزاته : يعرف بالبياض في الجناح الذى يكون في غاية الوضوح .

الحميراء الأسود الأوروى
Black Redstart (European Form)
(*Phoenicurus Ochruros gibraltariensis*)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في أوروبا من بحر البلطيق شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط جنوبا ، وشرقا إلى شبه جزيرة البلقان يقضى الشتاء في حوض البحر الأبيض المتوسط ولكنه لا يتعدى الصحراء الكبرى . لا يتوالد في جنوب إيطاليا ولا ثلثي الجزائر البريطانية الشمالى ولا في اسكندناوة .
في مصر : قليل في هجرته في الدلتا ولكنه لم يسجل من جنوبها أو من الفيوم ، وليس شائعا غرب قنال السويس ، على أنه شائع في سيناء من آخر أكتوبر إلى مارس ، وشوهد في القوسيمات والفيدرات ودير سانت كاتارين في مارس على علو ٦٠٠٠ قدم وهو شائع شتاء بين السلوم والإسكندرية ، وحصل على أنواع منه قرب القاهرة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢١ مارس .
مميزاته : ليس للذكر لون بني في أجزائه السفلى . كثير الحركة الخ .
الباقى كالسابق .

الحميراء الأسود الهندي
Black Redstart (Indian Form)
(Phoenicurus Ochruros phoenicuroides)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جبال وسط آسيا ، ويقضى الشتاء في سهول الهند والعراق وجنوب بلاد العرب والصومال والحبشة .
في مصر : حصل نيقول على ذكر عند الجزيرة في ١٦ فبراير سنة ١٩٠١ ولم يسجل بعد من سيناء .
مميزاته : يمتاز باللون البني الممتد على الصدر وهو أهم ميزة فيه .

الحميراء الأسود السوري
Black Redstart (Syrian Form)
(Phoenicurus Ochruros semirufa)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جبال وتلال سوريا وفلسطين . كثير منه يقضى الشتاء في فلسطين . يزور قبرص شتاء وكذلك أعالي وادي الفرات .
في مصر : حل مرة صدفة في مصر .
مميزاته وطبائعه : مثل الهندي ولكن السواد يصل أبعد تحت الصدر . كل أسفل الصدر والبطن قسطل . ريش الإبط قسطل . القفا والظهر أسود يصل للردف .
الباقى في الطبائع مثل الهندي والأوروبي السابقين .

جنس لوسينييا (الهزار والحسينى)
Genus Luscinia (Nightingale & Bluethroat)
Thrush Family

يستوطن هذا الجنس كل أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط ، وهي طيور مستديرة الأذناب ، مرتفعة الأقدام ، والذيل غالبا ما يكون منتصبا لأعلى وأحيانا يحركه حركة علوية سفلية بهدوء ، وهذا الجنس يقف على الأرض كثيرا حيث يبني عشه قريبا منها في خضرة عشبية كثيفة أو على مكعب كرم ، وقد يختلف الشقان وقد يتشابهان ، والبيض بنى مزرق زيتونى وليس أزرق صافيا كالأبلق به نقط ، وهو إما على غلط واحد أو به نقط ، له شارب معتدل قائم .
ولهذا الجنس شهرة واسعة في عالم الأدب والفن والموسيقى ، حيث أن المغنى العذب الصوت يشبه الناس صوته بهذا الهزار ، الذى يندر أن يسمع في مصر ، ولا يسمع إلا في الربيع أمام أنثاه .
٦ أجناس منه في مصر .

الهزار الأوروبي
Nightingale (European Form)
(Luscinia megarhynchos megarhynchos)
Thrush Family

الوصف : طوله حوالي ٦ ¼ بوصة . انظر لوحة (٢٨) رقم (٧)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا شمال بريطانيا وأيرلندا وماعدا اسكتلندا وممالك بحر البلطيق . كذلك يتوالد في جزائر البحر الأبيض المتوسط ، وشرقا إلى العراق والبحر الأسود ، وفي شمال غرب إفريقية (تونس والجزائر ومراكش) وفي قبرص وآسيا الصغرى وكريد وفلسطين .

يقضى الشتاء في الصحراء الكبرى والأقاليم الجنوبية لها ولكن لا يصل إلى خط الاستواء .

في مصر : يحل في مصر في الربيع والحريف ، ويشاهد في الدلتا والفيوم ووادي النطرون ومنطقة قناة السويس ، فيشاهد طول شهر إبريل ، وفي الحريف من آخر أسبوع في أغسطس إلى أواخر سبتمبر .

مميزاته : الذكر كالأنثى في لونها . يرفع الذيل غالبا مع حركة خفيفة ، لونه العام رملي باهت والذيل تسطلي ، يصعب أن يراه الإنسان لأنه دائما ما يكون مخبئا بين أوراق وأغصان الأشجار ، له عدة أصوات مختلفة وأشهر الصوت المشهور وهو هكذا تقريبا (Cresendo) لا يسمع إلا في الربيع فقط في الصباح المبكر عند شروق الشمس . من عشاق الحدائق والبساتين والغابات ، والصوت يسمع كذلك ليلا وخاصة في ضوء القمر الهادئ وهو أنسب وقت له (٦٠)


طعامه الحشرات والتوت في الأماكن الرطبة أو الجافة .


العندليب (الهزار الشرقي)
Sprosser = Thrush Nightingale = Eastern Nightingale
(Luscinia luscini)

الوصف : طوله حوالي ٦ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (٨)

الموطن : من القواطع : يتوالد في نصف أوروبا الشمالي الشرقي وحوض بحر البلطيق شرقا إلى جبال أورالي وغاليسيا وترانسافانيا ورومانيا وروسيا جنوبا إلى كرميا واستراخان) كذلك في الدغمارك وجنوب السويد وفنلندة وشمال ألمانيا وغرب سيبيريا إلى جبال التاي) . يقضى الشتاء في جنوب بلاد العرب والصومال وكينيا وأوغندا ، ويوجد في السودان في الحريف فقط .


(٦٠) سمعته بنفسى في مزرعة البوصيل برشيد عند طلوع الشمس إذ لا يغي إذا كان مأسورا في القفص . سمعته في إبريل . وهو ميل للاختباء في النباتات الكثيفة القريبة من سطح الأرض .





ص ١٥٧


Dipper
(South European.)



(٢)


ص ١٥٨

Swallow
European



ص ١٥٩


Swallow
(Palestine.)



(٥)

ص ١٦٠

Red-rumped
Swallow
(Western Asiatic)



(٤)

ص ١٦١

House-Martin (Western)



(٧)

ص ١٦٠


Swallow
(Egyptian)



(٦)

ص ١٦١


Crag Martin (Upland)



(٨)

ص ١٦٢

Crag
Martin (Red Sea)



(٩)

ص ١٦٢


Crag Martin
(Lowland)



(١١)

ص ١٦٣

Sand-Martin (European)



(١٠)

ص ١٦٣

Sand-Martin
(Cental Asiatic)



(١٢)

ص ١٦٤

Sand-Martin (Egyptian)

في مصر : ليس شائعا فيها ولا في سينا لا في الربيع ولا في الخريف . والتي فحصت من الدلتا كانت بين ٢٣ أغسطس وأوائل نوفمبر ، وفي بعض السنين يكون كثيرا وهو في الربيع أكثر من في الخريف ، فيرى من أواخر مارس إلى أوائل إبريل وتارة لآخر إبريل .

مميزاته : من الصعب تمييزه عن الأوروبي وهو في الحقل ، لأن الفرق ضئيل ، حيث أن صدره به نقط قليلة واللون البني في ذيله أفتح وأضعف من الأوروبي .
صوته أفخر من صوت الأوروبي وأصغر منه قريب الشبه من صلصلة الجرس أكثر من غيره ، يسمع غالبا خلال النهار وليس محدودا بسماعه ليلا أو عند الفجر أو الغسق كالسابق . باقي عاداته كالسابق .

الحسبي اللابلاندي
Blue-throat (Lapland Form)
(Luscini svecica svecica.)
Thrush Family

الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٥٠) شكل (١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في قلب أوروبا ووسط آيسيريا وأقصى شمال غرب اسكتلندا في التندرا وشمال روسيا إلى نهر ينيس . يهاجر إلى الهند والعراق وفارس وفلسطين وحوض البحر الأبيض المتوسط .

في مصر : يهاجر إلى مصر في الشتاء . وهو أكثر أنواع الحسبي شيوعا في مصر وسينا في فصل في منتصف أكتوبر ويبقى بها حتى آخر مارس . وهو يكون عندئذ شائع في الدلتا والفيوم ووادي النطرون ، ولكنه نادر على الساحل بين الإسكندرية والسلوم ، كذلك هو شائع في منطقة قناة السويس .

مميزاته : يغشى المواطن النباتية الكثيفة كالذرة وقصب السكر ، والسمار والقصب وخاصة التي تطل على المواطن الرطبة والمستنقعات ، كذلك يشاهد في قرار الجداول المائية الجافة بين الأراضي الزراعية حيث بها غذاؤه من البعوض والدود والحشرات ، وكذلك في الخضرة الكثيفة التي تحف الترع ذات المياه الراكدة ، وقد يشاهد وهو يجرى في قلب البرك والقنوات الصغيرة الجافة التي تشق الحقول ، فيشاهد على الأرض دائما ولا يرى على الأشجار مطلقا ، ويكون ذيله منتصبا دائما وخاصة إذا وقف معتدلا . له بقعة كبيرة زرقاء على الزور يتوسطها بقعة بنية . لا يطير إلى مسافة بعيدة إذا خاف ، بل يحاول الاختفاء بين قرار المزروعات مثل ما تفعل الفئران . له صوت مرتفع قليلا قلما يسمع في مصر وهو (tak) .

حسينى جنوب روسيا
Bluethroat (Southern Russian Form)
(Luscinia svecica occidentalis.)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٨ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (١٠)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في سهول وسط روسيا شمالا إلى حوالى موسكو ، وشرقا إلى غرب منطقة بحر قزوين . يزور العراق وقبرص وفلسطين وسينا ومصر كل ذلك شتاء .
في مصر : شائع فيها وفي سيناء شتاء من ١٨ نوفمبر إلى ٢٢ مارس .
مميزاته : لون الذكر كالسابق ولكن البقعة الحمراء الطوبية على الزور الأزرق ، يحل محلها اللون الأبيض ، وأحيانا لون أحمر حافظه بيضاء أو حمراء ناصعة .

حسينى ببقة بيضاء في الصدر
Bluethroat (White spotted Form.)
(Luscinia Svecica syanecula.)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٨ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (١٢)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط أوروبا من فرنسا إلى غرب روسيا . يقضى الشتاء في افريقيا الشمالية والاستوائية .
في مصر : أقل الأجناس ظهورا فيها ، حصل على تسعة منه من الدلتا والفيوم ووادي النطرون بين ٥ يناير ، ٢٨ فبراير .
مميزاته : له نقط بيضاء على الزور بهيئة النجمة والزور طبعا أزرق ، ويصعب رؤية النقط وهو في الحقل من بعيد . طباعته كالسابق .

الحسينى الفارسي
Bluethroat (Persian Form.)
(Luscinia svecica magna.)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٨ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (١٥)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في فارس ، ويزور العراق شتاء في مصر : ينذر العثور عليه .
مميزاته : ليس له بقعة بيضاء في زوره ، واللون الأحمر في الصدر لا يحده أى لون أسود .

جنس إرثاكوس (أبو الحناء)
Genus Erithacus (Robin.)
Thrush Family.

يشبه هذا الجنس الهزار في تكوين الجسم والسلوك إلى حد بعيد يوجب وضعهما تحت جنس واحد ، خصوصا وأن هذا الجنس لا يشمل إلا نوعا واحدا ، وكان هذا أدعى إلى ضمه إلى جنس الهزار .

ويقطن هذا الجنس أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط . والشقان متشابهان ، والبعض أبيض كريمي أو أبيض قرنفلي . ونوع واحد منه يحل بمصر ، وهو على أشكال مختلفة تحمل في غرب الإقليم البلياركتك .

أبو الحناء الأوروبي

Robin (Continental Form.)
(Erithacus Rubecula Rubecula.)

الوصف : طوله حوالي ٥ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٢٨) شكل (١١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا أقصى شمال الترويج ، كذلك شرقا إلى غرب آسيا . يقضى الشتاء في فارس وفلسطين وحوض البحر الأبيض المتوسط ، وفي الصحراء الكبرى الإفريقية .

في مصر : شائع فيها بكثرة شتاء وخاصة في الدلتا ، ولكن لم يشاهد بعد في الفيوم أو وادي النطرون . كما أنه هو شائع الوجود بين الإسكندرية والسلم ، وميعاد الشتاء هو من ٢٥ أكتوبر إلى منتصف مارس . وهو شائع أيضا على ساحل سينا الشمالي .

مميزاته : يختفى دائما في قلب الأشجار ، ويسمع صوته فقط من داخلها هكذا تقريبا (tic—tic—tic) وبه يعرف . يغشى الحدائق أيا كانت سواء في المدن أو القرى أو الحقول . أحر الصدر وهي أكبر ميزة له . طعامه الحشرات يتناولها من على سطح الأرض ثم يطير ثانية غتبا بقلب الشجرة كما أنه يأكل التوت في أوروبا .

فصيلة أكستروريداي (ضائوك)^(١) (عصافير الشوك)

Family (Accentroridae). (Dunnock or Hedge Sparrow)^(٢)
Accentor Family = Dunnock Family

تشمل هذه الفصيلة عصافير الأشواك أو الضائوك ، وهي عصافير أشبه في مظهرها العام بالعصافير البيوتية House-Sparrows في طبائعها وعاداتها غير أنها لا تألف الإنسان ، كثير منها في الإقليم البلياركتك ، وإحداها في جنوب بلاد العرب ، ولا توجد في إفريقية الحيشة إلا وقت الهجرة . والمنقار دقيق رفيع . وهو جنس واحد وهو (برونلا)

جنس برونلا (ضائوك — أو عصفور الشوك)

Genus (Prunella) = Dunnock or Hedge-sparrow
Accentor Family

وهذا الجنس يشبه العصفور البيوتي في مظهره العام في أجزائه العليا ، أما الفصيلة (Prunellidae) فهي تستوطن الإقليم البلياركتك في آسيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط . وتغشى عادة الجبال

(١) تحتوي هذه الفصيلة على جنس واحد يشمل ١٢ جنسا مرسومة ومعروف واسم الفصيلة أيضا Prunellidae

(٢) يقول بعض العلماء إن تسمية هذا العصفور باسم Dunnock تسمية خاطئة .

حيث تفضل البقاء على الأرض وتقفز قفزات سريعة قصيرة كما يلاحظ عليها ، ويدخل كذلك مع هذه الفصيلة متسلق الألب وهو اسمه (Alpine Accentor (Prunella Collaris) ، وتأكل وهي على الأرض من حشرات وديدان الخ وكذلك الحبوب من جذران الأشجار ، وكذلك بعض الثمار . ومن الغريب أنها في الشتاء تشتت في قرار الجبال والبعض يهاجر إلى الجنوب . أطول القوادم هي الثالثة ، العش قريب من سطح الأرض بين كثيف الأغصان يتخذ من الأعشاب الجافة ويطن بأوراق الأشجار ، والبيض من ٤ : ٦ بيضات وتبيض الأنثى مرتين في السنة ، مرة في ابريل وأخرى في يوليو . والبيض أزرق رائق . وهذه الميزات هي تطبيق تماما على جنس (برونلا) .

عصفور الشوك (ضأنوك)

Hedge - Sparrow (continental Form) = Dunnock.

(Prunella modularis modularis.)

Accentor Family.

الوصف : طوله حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٧٨) شكل (١٥)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل قارة أوروبا ماعدا البرتغال وجنوب إيطاليا واليونان . يقضى الشتاء في جنوب شرق أوروبا ، وشمال إفريقيا الساحل وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين .
في مصر : شاهده هيجلن مرة في مصر ، وحصل نيتول على ذكر منه عند الجزيرة في ٢٦ فبراير سنة ١٩١٧ م . وهو عموما نادر في مصر شتاء .
مميزاته . هي نفس مميزات الفصيلة تماما السابقة . وهو فضولي يشبه فأرة المنازل في شكله وحركاته .

فصيلة طرغولوس (Trogodytidae) Family

الرن (Wrens .)

Wren Family

تستوطن هذه الفصيلة كل المناطق الحارة من الدنيا الجديدة ولا يوجد منها إلا أنواع قليلة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، ولا وجود لها في إفريقيا مع استثناء جبال الأطلس ، كما لا توجد في استراليا ولا في نيوزيلنده .

وهي تأوى إلى المناطق المكتظة بالأشجار والماء (الفياض) التي تتيح لها الاختفاء فيها ونهىء لها غذاءها من البعوض والحشرات الطائرة الأخرى ، ولا توجد في العراء ، وهي نشطة دائمة الحركة ولا تطير إلا مسافات قصيرة لأنها لا تحسن الطيران . أجنتها مستديرة ، القادمة الأولى ضامرة ولكنها ظاهرة ، والثالثة والرابعة هما أطول القوادم ، والذنب قصير مستدير . تغير ريشها مرة في العام . العش كبير نسبيا ، كروي الشكل البيض أبيض به نقط بنية .

تحتوى عائلتها على حوالي ٦٣ نوعا . وهي قريبة الشبه بالدج . العش مستدير له فتحة جانبية ، وتتعاون الآباء وأولادها في إطعام أحفادها فمثلا أولاد أول فقسمة بعد أن تكبر تطعم أخوانها من ثان فقسمة ، وهي تغنى طول السنة من الذكور والإناث عكس الطيور الأخرى فإن الذكور هي الوحيدة التي تغنى عند دخول الربيع والصيف . أما هذه فتغنى حتى في الشتاء .

الطر وغلوس (الرن) Wren

Troglodytes troglodytes

الوصف : طوله حوالى ٣ ¼ بوصة انظر اللوحة (٢٨) رقم (١٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا شمال اسكتلندا .
في مصر : يقال بأنه شوهد في مصر وليس لدينا إثبات بذلك .
مميزاته : صغير الجسم جدا . قصير الذيل ، يأكل على الأرض ، سريع الطيران في استقامة واحدة لونه العام بني .

جنس سنكلوس (شحور الماء)^(١)

Genus (Cinclus) = Dipper

Dipper Family

فصيلة هذا الطائر مكونة من أنواع توجد في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والمكسيك .

لقد أكسبت البيئة المائية هذا الطائر بعض سمات تلائم حياته ، فهو الطائر الوحيد في العالم^(٢) الذى يستطيع أن يغطس تحت الماء رغم أن أصابع قدميه ليس بها أغشية مثل البط والأوز ، فهو طائر برمائي ، وریش صدره كريش صدور طيور الماء يتكون من طبقة فوقية تحتها طبقة من الزغب ، كما أن الغدة الزيتية كبيرة ، وفتحة الأنف عبارة عن شق صغير ذى غشاء رقيق ليتسنى له فتحها وقلعها ، كما أن العين أكثر شبها بعيون الحيوانات المائية كالأسمك إذ القرنية فيها منبسطة والعدسة كروية . ولقد وجد بعض الذين قاموا بفحص هذه الطيور - هواء في تجويف بعض عظام الرأس مما يساعد على الغطس تحت الماء كما هو الحال في الأسماك ذات المثانة الهوائية . تقطن كل نصف الكرة الشمالي .

شحور أوروبا المائى

Dipper (South European Form)

(Cinclus Cinclus meridionalis)

الوصف : طوله حوالى ٧ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (١)
الموطن : من الأوايد ، ويندر أن يتجول : يقيم طول السنة في كل أوروبا ما عدا سواحلها عند بحر البلطيق وبحر الشمال وكذلك ما عدا جنوب غرب أسبانيا .
في مصر : يوجد بالمتحف بالجيزة واحد مكتوب عليه بأنه إحدى خمسة حصل عليها حية من الإسكندرية في سنة ١٩١٣ والباقي فقد ، وربما كانت متجولة لمصر . وقال آخر بأنه شاهده على سواحل مصر الغربية سنة ١٩١٦ م .

(١) يوجد منه ٤ أنواع تقطن أوراسيا والأمريكتين يشبه (الرن) الحواجب مكسوة بريش .

(٢) أى الطائر الوحيد من الجوارثم أى التى تقف على الأرض والاشجار وأرجلها مهيأة لذلك - وهو الوحيد الذى يسبح ويغوص ويمشى تحت أطباق الماء كما يمشى أى طائر آخر على سطح الأرض .

مميزاته : مثل ما للجنس منميزات تماما . وأعجب ما فيه أن يمكنه أن يغوص تحت الماء ويسير على الأرض في القاع كما يسير أى طائر على سطح الأرض العادية ثم ينقى من بين شقوق الصخور الطفيليات المائية وما شابهها الخ . وهو يوجد في مجارى الشلالات والمنحدرات المائية بين شاهق الصخور والوديان . يقف على الصخور وليس له شأن بالأشجار نباتا . سريع الطيران وفي استقامة واحدة ، وهو في حجم الزرزور ويزدنيه إلى أعلى وإلى أسفل إذا خاف . وهو يهتز باستمرار أثناء وقوفه إلى أعلى وإلى أسفل دون انقطاع .

الفصيلة الخطافية (Hirundinidae)

Swallows + Martins

الخطاف والسنونو

Swallow Family

تتكون هذه الفصيلة من حوالى ٧٩ نوع^(١) تسكن جميع العالم ما عدا الأقاليم القطبية ونيوزيلند . طعامها الحشرات كلية ، تلتهمها على جناح الهواء من أى مكان من على سطح الأرض مباشرة أو سطح الماء أو سفوح الجبال أو جوانب التلال أو سطوح المنازل أو مباني المصانع ومضارب الأرز والقمح أو شوارع المدن أو الصحارى والقرى والحقول ، ويمكنها أن تشرب وتستحم وهي على جناح الهواء . وهي أليفة فمعظمها يسكن بالقرب من الإنسان ويعيش بجواره في سفوف المنازل أو سطوح المباني أو الكنائس والمساجد والخوانيت والبعض يتوالد في ثقب في سيقان الأشجار ، والبعض يعيش في رؤس المداخن ، ومنها أبداً ومهاجرات ، فالمهاجرات هي التي تقطن أماكن ذات فرق كبير بين درجة حرارة الصيف والشتاء ، أما وإن كانت الفروق ضئيلة فهي تكون أبداً لا تترح أمكنتها ولكنها قد تنجول أحيانا بعيدة عن مواطن إقامتها . وهي سريعة الطيران للغاية ولا تحسن السير على الأرجل العن من الطين يلصق بلعابها اللزج . المنقار مثلث ، والقوائم ٩ ريشات ، الأول في غاية الصغر ، والذنب عادة مشقوق بهيئة الخطاف ومنه اشتق اسمه . ٤ أنواع منه في مصر .

الخطاف الأوروبي

Swallow (European Form)

(Hirundo rustica rustica)

الوصف : طوله حوالى ٧ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (٢) الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا شمال النرويج كذلك في غرب آسيا كشمير وبلوخستان وفي أرمينيا وقبرص والعراق وكريد . يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية كذلك في الهند لذلك سماه العرب (زوار الهند) (انظر كتاب حياة الحيوان للدميري وكتاب نهاية الأرب)

(١) المعروف منها ٨٠ ، والجنس ٢٠

في مصر : كثير في مصر في الاعتدالين من ٤ مارس إلى ١٩ مايو ، وقد يشاهد في الصيف في شمال الدلتا ، والحريف من ٣ سبتمبر إلى ١٨ نوفمبر وقد يبقى البعض بها شتاء .

مميزاته : أجزاءه العليا زرقاء لامعة والسفلى بيضاء قذرة ، قد يقف على الأرض ليشرب أو لجمع الطين . له عادات وطبائع الفصيلة المتقدمة .

يشاهد دائما وهو يطير في كل مكان هنا وهناك مرتفعا تارة ومنخفضا أخرى والريشة الجانبية الأولى في الناضج ليست طويلة مثل ريشة البالغ الجانبية ، وهو يخترق شوارع المدن والمصانع والقرى والحقول وكل ذلك بحثا عن الحشرات الطائرة التي أهمها السوس والبعوض والذباب ، كما أننا نلاحظه يكون في صحبة الخطاف المصري واقفا أحيانا على أسلاك البرق ، أو أسلاك الكهرباء وسط المدن وفي الأسواق العامة ، وقد يطير في الجو على ارتفاع يبلغ ٩٥٠٠ قدم . صوته إذا نادى أو خاف أو حذر هو هكذا تقريبا (featafeat) يردده مرتين أو ثلاثا أو هكذا (Swallow) ومنه أخذ الاسم الانجليزي . وهو جرى للغاية يطير وسط شوارع المدن ويروغ من السيارات والقطارات وأي وسيلة للنقل تكون في طريق طيرانه فهو أمام أعيننا في كل مكان في الاعتدالين . الشقان متماثلان .

الخطاف الفلسطيني

Swallow (Palestine Form)

(Hirundo rustica transitiva)

الوصف : طوله حوالي ٧ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (٣)

الموطن : من القواطع : يتوالد ويقوم في فلسطين ومن لبنان إلى جنوب تلك الجبال . وحصل عليه شتاء من إفريقية الاستوائية .

في مصر : حصل عليه من الدلتا في ٧ يناير ، ٥ أبريل ، ٢١ يوليو ، ٢١ ديسمبر ومن وادي النطرون في ١٥ إبريل ، ومن سيناء في ١٣ إبريل .

مميزاته : يرافق الأوروبي في فلسطين في حي جاليل . يشبه الأوروبي ولكن الأجزاء السفلى صفراء جلدية مائلة للحمرة شاحبة وهو وسط في لونه بين المصري الأحمر البطن ، والأوروبي الأبيض الصدر والبطن . الشقان متماثلان .

الخطاف المصري^(١)

Swallow (Egyptian Form)

(Hirundo rustica savigni)

الوصف : طوله حوالى ٧ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) رقم (٧)

الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في أوراسيا وأمريكا الشمالية وفي مصر وخاصة الدلتا ولو أنه لا يصل أبعد من غرب الإسكندرية . كذلك في منطقة قناة السويس والفيوم ، أما في مصر العليا فلا يبعد عن الأقصر جنوبا ، وشوهد في سيناء متجولا فيها فقط لا متوالدا . لا يوجد في الواحات ولا خارج الحدود المصرية ، وهو يختفى من مصر من سبتمبر إلى مارس (طول الشتاء) من مدنها فقط لا حدودها .

مميزاته : شكله العام أسود من أعلاه بلمعان أزرق وأحمر طوى من أسفله غامق . أثناء اختفائه يحتشد شتاء قرب البحيرات والمستنقعات والأراضي الزراعية الرطبة ويتجول فوق سطوح المياه وأراضي الأرز الخ لجمع الحشرات الطائرة على جناحها لهواء . يخالط الأوروبي ، وستونو الرمال المصري الخ . باقى طبائعه كالأوروبي تماما .

الده : العش يتخذ في سقف منزل أو دكان تحت رافد خشبي يكوم حوله الطين ويجعل العش فيه وله فتحة ، وذلك في المدن والقرى وفي أى مكان حتى في المقاهي والمصانع ، ويجمع الطين بأن يقف على حرف بركة مائية يجمع الطين بمنقاره شتاء الخ . ثم يلصق الطين في السقف على مسمار جانبي فيه وقد يتابع عربة المجالس التي ترش الشوارع فينزل على الأرض التي تغمرها العربة بالماء لجمع قطعة من الطين صالحة للعش ، ثم يضيف إلى العش القش مع لعبه اللزج ويطنه بالزغب والصوف .

البيض يوضع بين مارس ومايو وعدده من ٣ : ٥ بيضات ، عادة ٤ بيضات بها أحيانا نقط بنية ، وتبيض الأنثى مرتين في السنة .

خطاف غرب آسيا أحمر العجز

Red - rumped Swallow (Western Asiatic Form)

(Hirundo durica rufula)

الوصف : طوله حوالى ٧ ١/٢ . انظر اللوحة (٢٩) شكل (٥)


الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في اليونان وأقصى جنوب أسبانيا وفي دلاشيا وآسيا الصغرى وقبرص وسوريا وفلسطين ، وشرقا إلى بلوخستان والتركستان وميسوتاميا وفارس وأفغانستان .

يقضى الشتاء في جنوب بلاد العرب ويندر أن يزور السودان أو الحبشة شتاء .

في مصر : يمر عليها في الربيع بين ١٠ مارس ، إلى آخر إبريل ، وشوهد في الحريف في سبتمبر . شوهد في وادي النطرون ، وفي الفيوم في ١٥ يناير صدفة .

مميزاته : ردفه الأحمر البني . يكون ممتزجا مع الخطاطيف الأخرى ، الباقي من الطوائع مثل الأوروبي تماما .

(١) اسمه في أمريكا الشمالية Barnswallow وكذلك في استراليا .



جنس دليشون (سنونو البيت)
Genus Delichon (House - martin)
Swallow Family .

يشمل سنونو المنزل . يمتاز بأن الساق عليها زغب ناعم كالقطن كثيف وكذلك أصابع القدم .
الذيل شوكي (مشقوق) ولكن ليس مثل الخطاف ، أبيض الردف ، الظهر أسود بلمعان أزرق .
نوعان كلاهما في الإقليم البلياركتك

سنونو المنزل الغربي
House - Martin (Western Form)
(Delichon urbica urbica)

الوصف : طوله حوالى ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (٤)

الموطن : يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا جزيرة صقلية . كذلك في جزيرة قبرص وكريد وآسيا
الصغرى وسوريا وفلسطين والقوقاز وشرقا إلى التركستان . يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية
والهند .

في مصر : يمر عليها وعلى سينا في الحريف من آخر أغسطس إلى منتصف سبتمبر ، وكذلك في
الربيع في مارس وإبريل وأحيانا في مايو : يوجد في كل مكان في الواحات الداخلة والخارجة ووادي
النطرون . والدلتا ومصر العليا وهو في الربيع أكثر منه بكثير عن الحريف .

مميزاته : صغير الجسم عن زملائه من الخطاطيف ، ظهره أسود لامع أزرق ، يحرم في طيرانه فوق
الحقول ليأكل الحشرات الطائرة على جناح الهواء في أى مكان يترأى له ما عدا المدن والعمران .

جنس رِبَارِيَا (سنونو الرمال والشواحق)
Genus (Riparia) = Sand & crag - Martins
Swallow Family

يشمل هذا الجنس سنونو الرمال وسنونو الشواحق . ويوجد في مصر منه ٧ أنواع ويستوطن
أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط ، والحبشة وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا . الأجنحة طويلة
ومدببة والذنب مقعر وليس مشقوقا كثيرا كالخطاطيف ، الأجزاء العليا ترابية اللون شاحبة أو معتمة .
القدم خالية من الزغب الدقيق وليس مثل سنونو المنازل . البيض أرقط أو به نقط متفاوتة . العش إما في
الصخور الشاهقة والمرتفعات أو في ثقوب السلود .

سنونو الشواحق الصخرى
Crag - martin (upland Form)
(Riparia rupestris rupestris)

الوصف : طوله حوالى ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (٦)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب أوروبا المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط
(أيبيريا وإيطاليا بجزائرها في البحر المتوسط ، واليونان) كذلك في شمال غرب أفريقية وآسيا الصغرى

وسوريا وفلسطين وأرمينيا وكردستان وفارس وأفغانستان وشمال بلوختستان وشمال غرب الهملايا إلى التبت ومنغوليا وكانو . قليل الهجرة شتاء .

في مصر : حصل عليه منها شتاء من وادي النيل من حلوان والجيزة في يناير وفبراير على جناح الهواء . تظهر في ذيله بقع مستطيلة بيضاء أثناء طيرانه .

سنونو السهول الصخرى ^(١)

Crag - martin (Lowland Form)

(*Riparia rupestris obsoleta*)

الوصف : طولته حوالي ٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (٩) .

الموطن : من الأوابد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في مصر والسودان وسينا ومنخفض البحر الميت ، كذلك في بلاد العرب وجنوب غرب فارس .

في مصر : يقيم طول السنة فيها قرب أهرام الجيزة في الأماكن الخلوية جنوبا إلى ضفة النيل اليسرى إلى الأقصر على الأقل ، وهو أكثر من ذلك على الضفة اليمنى من النيل عند القاهرة وتلال المقطم جنوبا إلى حلوان والأقصر وأسوان ووادي حلفا ومنطقة البحر الأحمر من السودان . كذلك في سينا . لا يوجد في وادي النظرون ، ولكنه يقيم طول السنة في الواحات الداخلة والخارجة والفيوم ولا كذلك في سيوة .

مميزاته : أصغر من سافقه ومن زملائه ، لونه أفتح منها ، ينقصه الذقن الرقطاء ، والخطوط السهمية الغامقة على الصدر ^(٢) . يزحف في طيرانه على الأرض (يسف في طيرانه) وكذلك على طول المرتفعات ، يكون مثنى دائيا ويندر أن يكون ثلاثي العدد ، ولا يشاهد مطلقا فوق الأراضي الزراعية .

التوالد : العش من القش والطين أو الطين خاصة يلصقة على تنوء في صخرة قائمة أو عمودية أو في سقف مسجد مهجور أو كنيسة عتيقة وآثار مندرسة البيض عادة ٣ بيضات بها بقع برتقالية توضع في فبراير ومارس وتبيض الأنثى مرة واحدة في السنة .

سنونو البحر الأحمر الصخرى

Crag Martin (Red Sea Form)

(*Riparia rupestris arabica*)

الوصف : طولته حوالي ٥ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (٨) .

الموطن : من الأوابد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في عدن والصومال ومنطقة السودان المطلة على البحر الأحمر .

في مصر : حصل اسكرادار على واحد منه من جبل علية .

مميزاته : كالسابق ولكنه أعمق بكثير منه . له خطوط سهمية ضعيفة على الأجزاء السفلى .
الطباع كالسابق .

(١) بسميه الأمريكان Bank Swallow

(٢) . يقع بيضاء في باطن الذيل قرب الطرف . اغطية باطن الجناح غامقة للغاية

سنونو الرمال الأوروبي
Sand – Martin (European Form)
(Riparia riparia riparia)

الوصف : طوله حوالى ٤ ٢/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (١١)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا بأجمعها وكذلك جزائر البحر الأبيض المتوسط كلها ، وشرقا إلى أورال وسيبيريا ، كذلك في أمريكا الشمالية ، ويقلة في شمال غرب إفريقيا وآسيا الصغرى وفلسطين وميسوريوتاميا . يقضى الشتاء في إفريقيا الشرقية والاسنوائية والجنوبية وجنوب آسيا وفي أمريكا الجنوبية .

في مصر : كثير جدا في مصر في الاعتدالين ، وهجرة الخريف هي من آخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر ، والربيع من أواسط مارس إلى أواسط إبريل . كثير عندئذ في الواحات الداخلة والخارجة ووادي النطرون والقيوم .

مميزاته : أصغر أنواع الخطاطيف والسنونو التي ترى في مصر ، ذيله مقعر وليس شوكيا (مشقوقاً) . يميزه الخط العرضي البنى الفاتح في صدره (١) يرى في أسراب هائلة في الخلاء والرمال ويقف على أسلاك البرق في جماعات كبيرة ، يقضى معظم وقته سابحا في الهواء يشرب من فوق سطح الماء وهو في طيرانه وكذلك يحوم على المحاصيل كل ذلك من أجل طعامه المحبوب وهو الحشرات الطائرة كالسوس والبعوض الخ . يبيت ليله في القصب النامى وسط الماء والمستنقعات .

سنونو الرمال الإسيوى
Sand Martin (Central Asiatic Form)
(Riparia riparia diluta)

الوصف : طوله حوالى ٤ ٢/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) شكل (١٠)

الموطن : من القواطع : يتوالد في التركستان الروسية والصينية ، وفي أفغانستان . يقضى الشتاء في جموع كبيرة في شمال غرب الهند .

في مصر : حصل على واحد منه في ٢٤ سبتمبر قرب القاهرة وعلى غيره أيضا من نفس المكان ومن وادى النطرون في ٩ مارس . لم يسجل من سيناء .

مميزاته وطبائعه : كسابقه والأجزاء العليا أكثر شحوبا من الأوروبي والمثلل في الحزمة الصدرية .

(١) أجزؤه السفلى بيضاء .

سنونو الرمال المصري
Sand Martin (Egyptian Form)
(Riparia riparia shelleyi)

الوصف : طوله حوالى ٤ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٢٩) رقم (١٢)

الموطن : من القواطع : يتوالد في مصر صيفا فقط ويأتى لها من أجل هذا الغرض ، وأكثر ما يشاهد هو في الدلتا وقد يبقى منه القليل فيها شتاء ، كذلك يرى في الفيوم ومنطقة قنال السويس ووادى النطرون ولا يعرف بأنه يتوالد في سيناء أو أية واحة أخرى ، كذلك لا يشاهد في غرب الإسكندرية . يصل إلى مصر في الأسبوع الثانى من فبراير ، ولكنه لا يكثر قبل منتصف مارس ، ويبقى للتوالد طول الصيف ثم يغادر البلاد ثانية في الأسبوع الثانى من سبتمبر متجها إلى جنوب مصر حيث يقضى الشتاء في السودان .

مميزاته : هو مثل الأوروبي ولكنه أصغر منه بكثير ، وحزمته الصدرية أضيق وأكثر منه شحوبا . يميزه عن كل ما سبق صغر حجمه فهو أصغرها كلها .

التوالد : يبدأ في حفر الأعشاش في البقع الرملية عند وصولها في ثقب على سطح الأرض المستوية أو في تربة على ضفاف الأنهار أو البحار في بعض الأحيان يكون العش بعيد الغور جدا وقد يبلغ غوره ١٢ بوصة ، تضع الأنثى به من ٣ : ٥ بيضات (عادة ٤) بيضاء رقيقة توضع في الدلتا في شهر مارس .

السنونو الصغير
Little Martin
(Riparia riparia minor)

الوصف : طوله حوالى ٤ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٥٠) شكل (٧)

الموطن : من الأوباد : يقيم بين وادى حلفا والخرطوم ، ولا يتعدى الحدود المصرية ويندر رؤيته داخل حدودها .

مميزاته : الصدر بنى رمادى . ليس بالذيل بياض . الأجزاء العليا بنى ترابى . الباقي كثيره من السنونو .

رتبة السمائم
Order (Apodiformes)

تحتوى طيور هذه الرتبة على أكثر من ٤٠٠ عصفور وتشمل السمائم الأصلية والطنان وتوجد في كل العالم ما عدا استراليا فتوجد في طرفها الشمالى الشرقى ، وكلها قصيرة الأبدان بهيئة الأفزام ، وقد عوضها الله عن ذلك أجنحة في غاية الطول . وهى تقضى معظم نهارها سابحة في لجة الهواء لا تمل من الطيران تلتهم كل ما في طريقها سابحة في الهواء من الحشرات كالبعوض والفراش والذباب والسوس الخ حتى تعوضها عن مجهودها في طيرانها طول اليوم الذى لا تفتر عن الطيران فيه من شروق الشمس إلى غروبها وقد قيل بأن البعض منها ينام في طيرانه . يمتص بعضها رحيق الأزهار وهو ثابت في مكانه في الهواء كما يفعل ذلك الطنان .

يدخل ضمن تقسيم هذه الرتبة السمائم الأصلية (لفصيلة) والطيور الطنانة التى هى ليست موضوعنا .

فصيلة السمائم الأصلية

Order Apodiformes

(¹) Family (Apodidae = cypselidae)

Swift Family

تحتوى هذه الفصيلة على السمائم الأصلية True Swifts وهي تتكون من ثمانية أجناس عبارة عن ٦٩ نوعا هو المعروف منها ولكن الموجود منها حاليا هو ٦٥ نوعا فقط . وهي في مظهرها العام أشبه بالخطاطيف ، ولكن الذيل فيها أقصر من الخطاطيف . وهي تقطن كافة أنحاء العالم ماعدا مناطق القطبين ، وهي تكثر في المناطق الاستوائية . ضعيفة الأقدام مما يجعلها لا تحسن السير بها أو الجثوم على الأرض ولكنها يمكنها أن تتعلق جيدا بتوءات الصخور في الجبال والتلال أو سقف المنازل بمخالبها . ليست لها أهلاب . العش في فجوات في الجبال ، والبنيان والتلال ، وأحيانا في سقف المنازل المهجورة وتارة في المساجد كالمسجد الحرام في مكة المكرمة ، وفي المآذن المهجورة والكنائس وتارة في الأشجار البيض اثنان عادة ، تحضنها الأنثى بمفردها غير أن الذكر يتعاون معها في إطعام أولادها . تغادر الأولاد العش بعد ستة أسابيع الذيل ١٠ ريشات . الأقدام صغيرة مزودة بمخالب حادة . مأواها المناطق الجبلية التي تشرف على سواحل البحار وفي مناطق التلججات عند قنن الجبال وفي الغابات التي لا أشجار فيها ، ولكن أحب أماكنها هي مواطن توالدها في الجبال . بقية العادات مثل الرتبة .

جنس السمامة (Apus) = True Swift

تمتاز طيور هذا الجنس بالذيل القصير المشقوق ، والرسم القوي القصير ، والقدم المنضغط قليلا ، ويكسو الرسغ ريش كثيف .

الشفان متمثلان خمسة أنواع منها في مصر .

الباقى من العادات والمميزات والطباع والسلوك مثل الفصيلة .

سمامة الألب

Alpine Swift

(Apus melba)

الوصف : طولها حوالي ٨ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (١٠) شكل (١)

الموطن : من القواطع : تتوالد في جنوب أوروبا (أسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسردينيا وقورسقا وصقلية والبلقان) - وفي جبال أطلس وكريد وآسيا الصغرى وفلسطين وشرقا إلى وسط آسيا والهملايا تهاجر شتاء إلى الجنوب .

في مصر : شوهدت مصادفة سابحة في جوها على ارتفاع شاهق في الربيع والخريف ، كما شوهدت كذلك في طيرانها في ساء القيوم ولكن لم يحصل على أى واحدة منها .

(¹) Apodidae Order Apodiformes وهي رتبة تشمل Swifts ويوجد منها فصيلتان مختلفتان هما فصيلة التي يتفرع منها Swifts + فصيلة Troshilidne التي تكون الطيور الطنانة التي في الدنيا الجديدة فقط .

مميزاتها : سريعة الطيران للغاية . طعامها الحشرات تصيدها على جناح الهواء : تقضى طول نهارها سابحة في الهواء . امتداد جناحها حوالى ٢٤ بوصة . تمتاز كذلك ببطنها الأبيض والذقن الأبيض كذلك - بقية لونها بنى تقريبا . مولعة بالجبال ومن ذلك اشتق اسمها وهو *Alpine* أى نسبة إلى جبال الألب في شمال إيطاليا لها كل سميات الفصيلة السابقة عنها .

السمامة العادية

Common Swift

(*Apus apus*)

الوصف : طولها حوالى ٦ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٣٠) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا أقصى ، شمال النرويج . وهي في الشتاء تهاجر جنوب مواطن توأدها المذكورة .
في مصر : تشاهد في سماتها معلقة على ارتفاع عظيم في الربيع والخريف فوق الدلتا والفيوم وأحيانا في مصر العليا ولكن لم يحصل على شيء منها .
مميزاتها : كالسابقة غير أن لونها كله بنى غامق تقريبا . طول امتداد الجناحين حوالى ١٨ بوصة تقريبا . طبائعها كالسابقة .

سمامة دلاشيا

Swift (Dalmatian Form)

(*Apus Apus ilgricus*)

الوصف : طولها حوالى ٦ بوصة . انظر اللوحة ٣٠ شكل ٤
الموطن : من القواطع : تتوالد في شبه جزيرة البلقان في دلاشيا وشرق الإدياتيكا ، كذلك في جنوب فرنسا وأسبانيا .
في مصر : حصل ميترتزهاجن على واحدة أطلق عليها النار من سرب يهاجر عند السلم في ٢١ يناير سنة ١٩٢٠ .
مميزاتها : قريبة من السمامة المصرية التي سيأت ذكرها بعدها ولكنها أغمق منها . طبائعها كالسابقة .

السمامة المصرية

Swift (Egyptian Form)

(*Apus apus pallidus*)

الوصف : طولها حوالى ٦ بوصة . انظر اللوحة (٣٠) شكل (٥)
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة حيث توالد في مصر ، وفلسطين وفارس والسند وربما في سيناء في وادي فيران وسانت كتارين .

في مصر : تقيم فيها في الدلتا حول حلوان وفي الفيوم وأعلى النيل إلى الأقصر في الواحات الداخلة والخارجة ولا كذلك في سيوه .

مميزاتها : ريشها كله بني مائل للرمادي بدون أي لون مائل للسواد فيه أو مائل للزرقة . الأجزاء العليا والسفلى حروفها الريش أفتح لونا وضيقه ، والدقن والزور والجيبة - كل ذلك - مائل للبياض . المنقار والقدم أسود .

توالدها : لوحظت أعشاشها في القلعة في القاهرة ووادي حوف قرب حلوان وفي المرتفعات الأرضية في الواحات الداخلة . البيض ٢ لونها أبيض قلدر (أغبر) توضعان على رف أو نتوء في صخر أو بنيان ، وأخذ البيض في مارس ولابريل .

طبائعها كغيرها من السمائم .

سمامة رمادية صغيرة

Little Grey Swift

(Apus parvus parvus)

الوصف : طولها حوالي ٥ بوصة انظر اللوحة (٣٠) شكل (٣)

الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في شمال إفريقيا الاستوائية ، شمالا إلى مصر العليا عند أبي سمبل وقرب وادي حلفا ، وشوهد كثير منها في خور موسى قرب وادي حلفا في فبراير سنة ١٩٢٨ .

في مصر : سبق الكلام في أعلاه .

مميزاتها : صغيرة الجسم ؛ ذيلها كذنب الخطاف العادي . غالبا ما تحلق في الهواء بالقرب من النخيل ويندر أن تعلو في طيرانها السريع للغاية : صوتها (Sree)

توالدها : تتوالد بين مايو وأغسطس .. العش على شكل لبادة يتخذ ويلصق على سعف نخلة متموج . البيض ٢ لونها أبيض توضعان في قلب العش خوفا من وقوعها أثناء تموج السعف بفعل الرياح .

رتبة كبرى مُلجى Order (Caprimulgiformes) ^(١)

nightjar family رتبة (أبي النوم) . Nightjars السبديات

تشارك هذه الرتبة في أن العيون فيها كبيرة جدا ، وكذا الاشدق في غاية السعة ، ولها شارب طويل معتدل ، وذيلها مكون من عشر ريشات ، وريشها سهل الانتزاع ، والريش عموما أرقط اللون أبيض ، والبيض عادة ٢ ، تطير في الضوء والظلام . طعامها الحشرات . تغشى معظم بقاع العالم ، على أن معظمها طيور ليلية ، قصيرة المنقار مسطح من قاعدته ، وهذه الرتبة Caprimulgidae or Caprimulgi forms تشمل حوالي ١٠٠ (مائة) جنس من أنواع أبو فم ضفدعي المعروف Frogmouth وكذلك ماصص

(١) توجد في كل العالم ماعدا مناطق القطبين ونيوزيلند .

الماعز ^(١) Goatsucker وأيضاً أبو النوم البومى Owllet-nightjar وطيائر الزيت Oil-bird وهى بكافة أشكالها ^(٢) . نعم كل المعمورة ما عدا المناطق القطبية ، وأطول قوادمها الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، وريشها أشبه بريش البوم Owls واللواء Wryneck . والأنواع التى فى شمال الكرة الأرضية مهاجرات بانتظام ، أما التى تقطن المناطق الاستوائية فهى أبداً لا تترك أمكنتها ، ومنها ما يتحول . وهى لا تكون فى أسراب مطلقاً أثناء هجرتها ، وتكون مثنى وقت التزاوج ، والطيور التى تقطن المناطق الشمالية تكون وجلة حذرة لا تقترب من الناس ، أما التى فى الجنوب فهى على التقيض والعكس لا تخشى الإنسان بل تسكن بالقرب منه وفى القرى . وهى تقضى طول نهارها مستريحة فى قلب الأشجار على ساق ممهد لها تختارها بنفسها أو على كرنيف نخلة أشبه بالمهاد لها ، وإذا ما أرخى الليل أولى ستأثره فى الغلس نشطت من نومها وسعت طول الليل تطير هناك وهنا ، جادة فى البحث عن غذائها الرئيسى وهو الحشرات الطائرة كالبعوض والسوس والذباب وكل حشرة تصادفها فى طريق طيرانها ، كل ذلك على جناح الهواء فتدخل لحشرات بداخل أشداقها الذى هو أشبه بشدق الحوت ، ومتى شبت ، استراحت فترة من الليل ، ثم عود أدراجها قبل طلوع الشمس وبزوغ قرنها تجد فى البحث عن طعامها الذى يكثر فى الأحرار والمروج ^(٣) . والغابات ومتى ابتسمت الشمس وارتفعت قليلاً حطت على الشجرة لتقضى نهارها كله بالنوم . العش . على سطح الأرض مباشرة بدون قش أو تبطين وينحدر من هذه الرتبة الفصيلة النومية) وهى

الفصيلة النومية

Family (Caprimulgidae)

Nightjars ^(٤)

لهذه الفصيلة كل سمات ما للرتبة السابقة ، وهى إذا نامت تلتصق بطنها وتلبد بالأرض أو الغصن فى وضع أفقى بحيث يظهر للرأى أنها جزء مما تستريح عليه . البيض عادة ٢ فى مصر منها ٦ أنواع .

أبو النوم الأوروبي الشمالى

European Nightjar (Northern Form)

(Caprimulgus europaeus europaeus)

الوصف : طوله حوالى ١٠/٧ بوصة . انظر اللوحة (٣٠) شكل (٦)


الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً فى كل أوروبا ما عدا ساحل النرويج الغربى ، وثلاثى اسكتلندا الشمالى ، وما عدا فنلندة ، ويتوالد فى اسكتلندا وجنوب خط عرض ٥٤° شمالاً وفى روسيا


(١) أما جنس أبو النوم فقط Caprimulgidae (Nightjars) فيوجد منه ٦٩ نوعاً ، الجنس يقطن كل الدنيا ما عدا شمال كندا وسيبيريا وبلاد العرب وغرب الصحراء الكبرى الإفريقية .

(٢) معناها باللاتينى Caprimulgus التى أخذت منه ومعناه الوصفى المعزاة أو البقرة .

(٣) فى بورما يراه المسافرين والسائرون بالسيارات ليلاً جاثماً على الطرق الطينية وفى أراضي الزراعة والرمال وإذا سلطت عليه الأنوار الكشافات للسيارة لمعت عينها كالجمهر الملهب .

(٤) اسمها فى أمريكا الشمالية Night-hawk وكذلك Goatsucker





ص ١٧٦

Roller (European Form.)

جنوب هذا الخط بكثير وشرقا إلى شرق جبال أوران : يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية .
في مصر : هو شائع في مصر في هجرته في الخريف وأقل منه في الربيع ، وشاهد كذلك في الدلتا
بين ٢٠ أغسطس ، ٢ نوفمبر ، كذلك في الربيع بين ٤ إبريل ، ٩ مايو : ولم يعثر عليه من الواحات
المصرية أو مصر العليا أو سينا

مميزاته : ريشه أشبه بلون ريش اللواء الأفي ذكره ، له مميزات كل الفصيلة والرتبة غير أنه يطير
ليلا ويستريح نهارا . طعامه الحشرات له صوت لا يسمع .

في مصر . له بقع بيضاء في ذيله . يصيده أهالي سواحل البحر الأبيض المتوسط . بالشنيطة
المعروفة في رشيد . البقع البيضاء في الذيل والجناح في القوام في الذكر فقط^(١)

أبو النوم البحر الأبيض المتوسط الأوروبي

European nightjar (Mediterranean Form.)

(Caprimulgus europaeus meridionalis.)

الوصف : طوله حوالي ٩ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٣٠) شكل (٧)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط الى القوقاز ،
وكذلك في كريد .

في مصر : شائع في الربيع طول شهر إبريل ، وفي الخريف طول شهر سبتمبر وأكتوبر ، ويحتمل
أن قليلا منه يقضى الشتاء فيها رغم أنه لم يسجل فيها في يناير أو فبراير . وهو في الخريف أكثر منه في
الربيع .

مميزاته : في أوائل الشتاء نجده يختفي في قرار البرسيم وتحت ظل الأشجار ، تظهر في طيرانه البقع
البيضاء في ذيله وأجنحته في الذكر . هو أصغر من السابق ، والأجزاء العليا قد تكون شاحبة للغاية ،
اللون الأبيض في ثاني قادمة أطول وأكثر اتساعا من الأوروبي السابق .

أبو النوم الآسيوي الأوروبي

European nightjar (Central Asiatic Form)

(Caprimulgus europaeus sarudnyi)

الوصف : طوله حوالي ١٠ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٣٠) شكل (٨)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا شمال وسط آسيا ، شرقا إلى بحيرة بيكال . ولكنه لا يبعد
جنوبا أكثر من التبت أو التركستان الصينية . يمر في هجرته على العراق وفارس وفلسطين إلى مصر (لم
يسجل من السودان) إلى بعض الأحياء التي يشتوبها في إفريقيا ولا نعلمها .

في مصر : نادر رؤيته فيها ، شوهد صدفة في مصر وحصل عليه في ٤ سبتمبر ، ١٠ منه ، ٤
أكتوبر ، ٢ مايو ، وحصل كذلك على ذكر وأنثى في ١٦ إبريل من وادي النطرون . لم يسجل من سينا .

(١) في كل ريشة من الثلاث ريشات الأولى من القوام في النصل الأنسي قرب الطرف بقعة كبيرة بيضاء قبل
الطرف وبالريشتين الخارجيتين أطرافهما بها بقع بيضاء وكذلك بالجانب الآخر من الذيل .

مميزاته : مثل الأوروبي الشمالى فى الحجم واللون ولكن البقعة البيضاء فى النسيج الداخلى لثانى وأول قادمة دائيا تصل الخط السهمى ودائيا تمتد إلى النسيج الخارجى لثانى قادمة ويندر جدا أن تصل إلى النسيج الخارجى لأول قادمة . الأنثى كأنثى الأوروبي الشمالى .

أبو النوم أوروبى شاحب
European nightjar (Pale Form.)
(Caprimulgus europaeus unwini.)

الوصف : طوله حوالى ١٠ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٣٠) رقم (٩)
الموطن : من القواطع : يتوالد فى الأقاليم الجافة من وسط آسيا والصين والتركستان وأفغانستان وبلوخستان وكشمير والتبت . يقضى الشتاء فى جنوب إفريقيا .

فى مصر : نادر جدا فى مصر ، وحصل ميترتز هاجن على واحد من بور سعيد فى ٣٠ مايو سنة ١٩١٠

مميزاته : هو مثل الأوروبي الشمالى ، ولكنه أفتح منه لونا والأجزاء العليا مائلة للرمادى عنه مع لون رملى . البقعة البيضاء فى النسيج الداخلى لأول قادمة فى الذكر دائيا تصل إلى السهم والبقعة على ثانى قادمة تمتد إلى النسيج الداخلى حيث تكون خط عريضا أبيض .

أبو النوم المصرى الأسبوى
Egyptian nightjar (Asiatic Form.)
(Caprimulgus oegyptius agiptinus.)

الوصف : طوله حوالى ١٠ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٣٠) شكل (١٠)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا على الأراضى الرملية من مصر والنوبة وميسوبرتاميا ، وفارس وأفغانستان والتركستان وجنوب غرب آسيا وشمال شرق إفريقيا وفى صحراء بلوخستان والعراق ، ولا كذلك فى فلسطين . سجل شتاء فى السودان بين ديسمبر ومارس . يقضى الشتاء فى شرق السودان .

فى مصر : يزورها فى الربيع ويمكث بها حتى آخر الخريف حيث يتوالد بها ، والبعض يبقى بها شتاء . وهو نادر رؤيته فى مصر ولكن معظمه يرحل إلى الجنوب فى السودان . وهو كثير فى شرق الدلتا طول سبتمبر ، وحصل عليه فى ديسمبر ، وشوهد فى الفيوم ووادى النطرون فى مارس .

توالده : عثر على بيضه فى ٢٥ مايو فى هوامش الدلتا . البيض ذو بقع فاتحة بنية . عارية على سطح الأرض مباشرة بدون تبطين على وجه الرمال .

مميزاته وطبائعه : محصور وجوده فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية من مصر . القوادم بها بقع بيضاء كثيرة وصغيرة . اللون رملى فاتح . ليس بذيله بقع بيضاء فى الذكر أو الأنثى . لا يأوى الأشجار بل يرقد على سطح الرمال فى ظل نخلة أو شجرة . له خط أبيض يشق أسفل الزور . القوادم بنية معتمة بها نقط مصغرة فى الفصل الوحشى ، وأخرى بيضاء النصل الأنسى . الأجزاء السفلى رملية ، مصغرة رمادية على الذقن والزور والصدر يشاهد بالقرب من مميزات البدو فى الصحراء .

أبو النوم صحراوي إفريقي مصري
Egyptian nightjar (Saharan Form.)
(Caprimulgus oegyptius saharoe.)

الوصف : حوالى ١٠ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٣٠) رقم (١١)
الموطن : من الأوايد ومتجول : يقيم طول السنة حيث يتوالد في الصحراء الكبرى الإفريقية من الجزائر إلى النيل ، وخاصة من غرب النيل ، وحصل على واحد منه عند هيلوبليس (مصر الجديدة) في ٢١ يناير سنة ١٩٢٨ م كما حصل على ستة منه من وادى النطرون (في مارس ومايو ويونيو) وغيرها من تلال المقطم في ٢٧ مايو سنة ١٩١٧ ، وحصل على واحد من القيوم في ١٧ مارس ، وكذلك ١١ واحدا من غرب الدلتا على حافة الصحراء وعند الأهرام في فبراير ومارس وإبريل ومايو وأكتوبر .

مميزاته : كالسابق غير أنه يغلب اللون الرمل فيه عن السابق ويقل عن الرمادى .
توالده : حصل على بيضتين له بالقرب من جرجا في ٢٩ مارس سنة ١٩١٣ هما الآن بالمتحف الحيوانى بالجيزة .

رتبة الضموضيات (Order (Coracuformes)

يلحق بهذه الرتبة الوروار (فصيلة الوروار (Bee-eaters (Merops وكذلك صياد السمك (Alcedines = Kingfishers ، والهداهد ، والغربان الزيتونية ، وكذلك طيور غير مصرية مثل التودى (Todi) الذى يقطن الدنيا القديمة ، و (التموت Motmot) الأمريكى ، وكذلك أن أبى قرن Hornbill ، والكورول Leourol . والأخيل الأرضى Ground-roller أهم ما يميزها في بعضها مثل صيادى السمك والوروار نرى أن أصابع القدم ملتحمة من قواعدها في ثنائى وثالث أصبع أشبه ذلك بأصابع أقدام السمامة وأبى النوم ، إلا الهدهد فإن إصابعه معتادة . كذلك نرى المنقار فيها بطول الرأس أو أطول منه ، وأن أغلب طيور هذه الرتبة جميلة الألوان جذابة ؛ البيض أبيض أو معتم ، يوضع في ثقب ، وتولد الأولاد عمياء ماعدا الهدهد فإن الأولاد فيه يكسوها الزغب بعد الفقس مباشرة ، أما الأولاد الأخرى فتولد عارية . غذاؤها جميعا المواد الحيوانية كالحشرات والديدان والزواحف والأسماك .

فصيلة الوروار (ميروبيداى)

Family (Meropidae) Bee-eaters.

Bee-eater Family.

تحتوى طيور هذه الفصيلة على حوالى ٢٥ نوعا متفرعة من ستة أجناس ، متفاوتة الأحجام والألوان ، فمنها ما هوى حجم الخطاف (Swallow) ، ومنها ما هوى حجم الدج Thrush ، عريضة المنقار قليلا من قاعدته ، مسحوب رفيع من طرفه ، وهو أطول قليلا من الرأس ، مستطيلة الأجسام ، صغيرة الأقدام قصيرتها ، وتلتحم فيها الأصبع الخارجى بالوسطى ، ثم الوسطى بالداخلية ، وبذلك يبدو بطن القدم عريضا ، الجناح مثلث الشكل ومستطيل ومدبب غالبا ، نحيلة الأجسام ، وأغلب ألوانها هو اللون الأخضر ، وألوانها جميلة جذابة لامعة ، الذيل طويل عدد ريشاته من ١٠ : ١٢ ريشة ، وغالبا ما يزيد طول الريشتين الوسطيتين قليلا عن باقى ريش الذيل زيادة ملحوظة ، وقد لا توجد هذه

الزيادة ويكون حافة الذيل بمستوى واحد ، ومنها ما هو ذيله بهيئة ذيل الخطاف أى مقعر ومشقوق قليلا أو أكثر وهذا فى بعض أنواعها . وهى تقطن أوروبا وآسيا وإفريقية ، وتعرف فى استراليا باسم قوس قزح (Rainbow) . وأمكنتها هى المواطن والأقاليم الاستوائية والمعتدلة طعامها الحشرات كلية وخاصة الطيارة منها تلتهمها على جناح الهواء مثل الجراد والجنادب والدراجون الرعاش والقراش والبعوض والذباب والنحل ويرقاته . مغرمة بالوقوف على أسلاك البرق وأسلاك المصابيح الكهربائية التى تشق وتمتدق الأراضي المزروعة كالقطن مثلا كذلك فى الجبال الشجرى والوديان ، كذلك تقف على الأشجار عند المبيت فى جماعات ، وكذلك على سقف النخيل ، وأكثر ما تجبه من الحشرات هورقات النحل ومنه سمى أكل النحل (Bee-eater) ، ولدغة النحلة تقتلها لأنها لا تتنزع منها الاير ، وإذا التهمت الحشرة عادت إلى مكانها ثانية ، كما أنها تكون عادة فى أسراب فى طيرانها ووقوفها ونومها ، وقُل أن تجد واحدة بمفردها إلا إذا كانت ضالة ، ورغم ذلك فإن كانت فى طيرانها صرخت تنادى وتبحث عن زميلاتها والتى فى الشمال مهاجرات والتى فى الجنوب متجولات .

تتوالد فى مستعمرات على السدود (١) حيث تحفر الحنادق الصغيرة البعيدة الغور فى سدّ فى ضفة نهر ، والحندق تحفره بمنقارها (٢) . والشقان (أى الذكر والأنثى) حادة فى لونها إلا اختلافا ضئيلا يكاد لا يظهر والتى تقطن الشمال تكون مهاجرات بانتظام ، بينما أخواتها فى الجنوب فهى أبدات متجولات . وينحدر من هذه الفصيلة الجنس الآتى :—

جنس الوروار (Merops.)

Bee-eater. أكل النحل

لهذا الجنس كل سمات الفصيلة ويزيد عليه أن القوام مكون من ١١ ريشة والأولى قصيرة جدا ، والذيل به ١٢ ريشة ، وريش الوسط أطول من باقيه . له شارب قائم قصير معتدل غير واضح . المنقار طويل منحني قليلا . اللون أخضر ، التوالد فى السدود ، البيض بدون بقع ، الكتكوت أعمى . ٤ أجناس فى مصر . لا يوجد فى الدنيا الجديدة .

الوروار الأوروبي (European Bee-eater)

(Merops apiaster)

الوصف : طوله حوالى ١١ بوصة . انظر اللوحة (٣١) شكل (١) و لوحة (٤٧) رقم (٣) و لوحة

(٧٤) شكل (١)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا فى أوروبا فى أيبيريا وجنوب فرنسا وسردينيا وقورسика وإيطاليا وصقلية والبلقان كلها ، وجنوب روسيا إلى موسكو . وفى شمال غرب إفريقيا وآسيا الصغرى ، وغرب آسيا إلى كشمير ، وفى قبرص . يهاجر شتاء إلى جنوب آسيا وإفريقية الاستوائية والجنوبية وفى جنوب بلاد العرب .

(١) جوانب الأنهار والترع الكبيرة .

(٢) غوره حوالى ٥ أقدام ولا يضع البيض على القش بل على الأرض مباشرة وهو أبيض بدون علامات

في مصر : شائع جدا في الربيع والخريف ولكنه في الربيع أكثر ، كذلك شائع في سينا ، وميعاده عموما هو من إبريل إلى منتصف مايو ، ومن آخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر .

مميزاته : الذكر بلون الأنثى ، جميل المنظر جدا ، يشاهد طائرا في سماء كل مكان أثناء هجرته حتى المدن كالقاهرة مثلا . مغرم بالوقوف على أسلاك البرق وأسلاك مشاريع الكهرباء وسط المزارع . يعرف بصوته من بعيد هكذا (Werr) الذي منه اشتق اسمه وهو الوروار . طعامه الحشرات الخ كما ذكرنا في الفصيلة على جناح الهواء . يسمع صوته ليلا كذلك في الليلة المقمرة التي يسقط البدر فيه بنوره الباسم . الشقان متماثلان .

وروار أزرق الخد (عراقي)

Blue-checked Bee-eater. (١)

(Merops superciliosus persicus.)

الوصف : طوله حوالي ١١ ٣/٤ بوصة . انظر صورته في اللوحة (٣١) شكل (٢) الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في المناطق الجافة من غرب آسيا الوسطى وجنوبها الغربي ، ومن حوض بحر قزوين إلى الهند وفلسطين . يقضي الشتاء في جنوب إفريقيا . في مصر : يزور مصر صيفا للتوالد فيها فيأتى إليها ابتداء من أوائل إبريل ويبقى بها حتى آخر سبتمبر ثم يغادر البلاد إلى الجنوب . مميزاته : لونه العام أخضر غامق جذاب ، والشقان لا يختلفان ، ويشاهد في الحقل في كل مكان كالسابق تماما .

التوالد : شوهد توالده في شمال قناطر الدلتا ، ولو أن شل يقول بأنه لا يتوالد في مصر ، وليس لديه إثبات بذلك إلا عدم رؤيته أعشاش له . العش في فجوة في الأرض أو سد على صفة نهر أو ترعة ، يحفر الثقب بنفسه الذي يبلغ غوره من ٢ : ٤ أقدام . البيض من ٤ : ٦ أبيض رائق يوضع في وسط مايو ، مستدير الشكل ، والشقان يشتركان في إطعام أولادهما .

وروار صغير مصري

Little green Bee-eater (Egyptian Form.)

(Merops orientalis cleopatra.)

الوصف : طوله حوالي ٧ ١/٤ بوصة . انظر اللوحة (٣١) شكل (٣) الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في مصر على طول وادي النيل بين حلوان وأسوان ، كذلك في الجزيرة والفيوم والقاهرة ولسنا متأكدين من توالده في وسط الدلتا . ولقد شاهدته مرارا في يناير بالقرب من كفر الزيات . ويذكر مينرتزهاجن بأنه لا يفشى الدلتا وربما فاتته هذه الملاحظة .

طباعته ومميزاته : كسابقة من زملائه . الشقان متماثلان . التوالد : الجحر كالسابق . البيض من ٤ : ٧ ، عادة ٥ بيضات . ومرة واحدة في السنة .

(١) اسمه في الهند كذلك Large Green Bee-eater

وروار سوداني
Little Green Bee-eater (Sudan Form.)
(Merops orientalis Viridissimus.)

الوصف : طوله حوالى ٨ بوصة . انظر اللوحة (٣١) رقم (٤)
الموطن : من الأوبد ومتجول أحيانا : يتوالد ويقوم في إفريقية الاستوائية من السنغال وغمبيا إلى السودان والحبيشة .
في مصر : حصل اسكردار على اثنين منه عند جبل علية في إبريل سنة ١٩٢٨ .
مميزاته : لونه كالسابق المصرى ولكنه يميل قليلا للصفرة عن السابق ، وهو أصغر قليلا من السابق .
مميزاته وطبائعه : كالسابق .


الفصيلة الهدهدية (يوبوبيداي)
Family (Upupidae) = (Hoopoes.)

Hoopoe Family.

تستوطن هذه العائلة الأجزاء الدافئة من أوروبا وآسيا وإفريقية ، وهو جنس واحد وتختص بمناقيرها الطويلة وتاجها فوق قنتها تنشره وتطويه بإرادتها ، ولا توجد في الصحارى الإفريقية أو مناطق غابات الكونغو وهي آمنة تقترب من الإنسان وخاصة في القرى حيث لا يتعرض لها الناس بالأذى لعلمهم بأنها لا تؤكل ولا اعتقادهم فيها بنواحى دينية خرافية ، وهي تأكل الحشرات وأهمها الديدان ، ولا يمكنها أن تتلعم الحشرة إلا في وضع طولى يتمشى مع طول المنقار ، فإذا كانت الحشرة بالعرض قذف الهدهد بها ثانية في الهواء حتى تعود إلى وضع طولى يمكنه من أن يتلعمها ، وقد تكرر هذه العملية حتى تقع الحشرة في وضع طولى . وعاداتها (الفصيلة) تبعث في الناس الاشمئزاز والكراهية لها حيث هي تنقب في براز الإنسان وروث البهائم ورجيع السباع وخشى البقر كل ذلك بحثا عند الديدان والطفيليات وخاصة الدودة الوحيدة التي يمزقها ويأكلها وبذلك يقضى على هذا النوع المؤذى المنتشر في الشرق والحبيشة خاصة . وتبنى الأنثى عشها في فجوات الأشجار أو في شقوق الجدران أو في أمكنة خافية فوق سطوح المنازل أو أى مكان صالح ماعدا سطح الأرض وتكون رائحة العش بالغة الفظارة إذ لا تعنى الكبار بإبعاد براز الصغار ولا تبعد الأنثى برازا أيضا من عشها ، وقد ثبت أن الأنثى تفرز مادة زيتية هي مصدر هذه الرائحة الكريهة كي تحمى صغارها من الحيوانات كالفأرة وابن عرس وجوارح الطير والقطط كي لا تقرب العش وخاصة القطط . ويطعم الذكر أولاده في فترة الحضانة . يوجد في مصر منه ٢ (جنسان) . ليس له شارب

الهدهد الأوروبي
Hoopoe (European Form.)
(Upupa epops epops.)

الوصف : طوله حوالى ١١ بوصة . انظر اللوحة (٣١) شكل (٥) ، و لوحة (٧٤) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا (الجزائر البريطانية واسكندناوة والدغمارك وهولندا وشمال غرب أيبيريا) . كذلك يتوالد في شمال غرب إفريقية وفي غرب آسيا وفي البحر الأسود وآسيا الصغرى وغرب سيبيريا إلى شمال غرب الهند . متجول أحيانا في غير هذه المناطق .



يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية وشرقا إلى جنوب الهند . يتوالد كذلك في قبرص وكريد والبعض يتجول للجزائر البريطانية ويتوالد فيها .

في مصر : كثير فيها في الاعتدالين وخاصة في الحريف طول شهر سبتمبر ، والربيع في مارس وإبريل وقد يبكر في الحريف من منتصف أغسطس ولكن ذلك نادر فيه . يشاهد كذلك في هذين الفصلين في سيناء والواحات الداخلة والخارجة والفيوم ووادي النطرون .

مميزاته : هي نفس ما للفصيلة فيه منميزات التي في صفحة ١٩٢ ، وأيضا طيرانه متموج ليس في استقامة واحدة ، يمشى على الأرض بعجب وخيلاء كأنه يقول : من مثل أنا الملك المتوج . طعامه الحشرات . صوته هكذا hoop-hoop ومنه أخذ اسمه الانجليزي ، وكذلك في العربي هوذ هود ومنه أخذ الاسم العربي وصوته اسمه (المَهْمَلَة) يصاد في مدن سواحل الدلتا الشمالية في الحريف مع الدقائيس . له تاج معروف به . الشقان متمائلان .

المهدهد المصري (الأوروبي الأصل)

European Hoopoe (Egyptian Form.)

(Upupa epops major.)

الوصف : طوله حوالي ١٢ بوصة . انظر اللوحة (٣١) شكل (٦)
الموطن : من الأوابد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في مصر وخاصة في الدلتا وأعلى النيل حتى وادي حلفا . كذلك في الفيوم . وحصل عليه أيضا من وادي النطرون ، لا يوجد في غرب الإسكندرية أو سيناء أو قتال السويس

في مصر : ذكر أعلاه . وهو النوع الوحيد من جنسه في العالم ولكن أنواع أخرى حوالي ١٩٢ تحمل اسمه .

مميزاته كالسابق في كل شيء غير أنه يألف الناس ويتردد على المنازل الخربة وفي أفنية الديار التي تحوى روث البهائم والدجاج المنزل الخ كذلك يشاهد في القرى حول الحظائر وفي الرمال . صوته كالسابق يردد في الصباح في يناير وفبراير . هو أغمق من الأوروبي وأشد منه في اللون الحمري . البطن أقل في البياض وأكثر في الخطوط السوداء ، وهي قلرة اللون . البياض العرضي في الذيل أصبغ من الأوروبي . الرأس أغمق . يمتاز الذكر عن الأنثى بأن الخطوط البنية المعتمة على الخاصرة أكثر منها في الأنثى

الفصيلة الأخيلية (كوراسيداي)

Family (Coracidae.) = Rollers.

Roller Family.

تحتوى طيور هذه الفصيلة على حوالي ١٥ نوعا معروفة متفرعة من جنسين ، ولكن الموجود منها حاليا هو ١١ نوعا فقط أغلبها إفريقية وخاصة الاستوائية منها ، كما أن منها ما يقطن المناطق المعتدلة ، فتوجد في إفريقية وفي آسيا (الهند وبنشوريا وشمال الصين ، وفي أوروبا نوع واحد منها فقط ، ومنها ما يقطن جنوب استراليا تمتاز بقوة المنقار المتوسط الطول ، وعرضتها مؤلة ، قصيرة الأقدام ، مختلفة

الأذناب ولكن غالبية الأذناب متوسطة الطول ، وهي إما مستديرة أو مشقوقة قليلا أو كثيرا . وهي تفضل ارتياد الغابات للاستراحة والمبيت بها وخاصة ما إذا كانت على حافة المساحات المكشوفة وشبه الصحراوية كي ترعى قوتها من الخنافس والجعارين والجراد وباقي الحشرات والديدان ، تراقبها وهي على بعض الأشجار المتناثرة فتعيط إلى الأرض لاقتناص الفريسة ثم تعود للجثوم على الأشجار ، وخاصة هل ذرا أفنانها كي تكشف ما يحيط بها .

تبيض الأنثى من ٤ : ٥ بيضات ، والقوادم عشر ريشات ، والذيل ١٢ ريشة . وهي جميلة المنظر بحق كما هو ملحوظ من اسمها إذ ألوانها تتخايل فيها العين ، ولا يضارعهما في جمالها من الطيور المهاجرة لمصر إلا ذكر الصغير . وهي شبيهة بالغراب في تركيب أجسامها ولا يميزها عنه إلا جمال ألوانها وصغر أحجامها . يتخذ العش في فجوات في الصخور والأشجار ، وأحيانا في عش طائر آخر مهجور . وهي تتوالد في جماعات ومستعمرات ، ويأخذ الذكر والأنثى كلاهما بنصيبه في الحضنة ، كما يشتركان معا في إطعام الأولاد وامدادهما بالغذاء في جمهورية مصر منه نوعان فقط .

جنس الأخيل (Genus (Coracias


يقطن طيور هذا الجنس المناطق الاستوائية من آسيا وإفريقية ، والمعتدلة في أوروبا . وأهم ما يميزها هو أن طول الذيل يزيد على نصف طول الجناح ، الباقي من المميزات والطبائع مثل الفصيلة .

الأخيل الغربي (Roller (Western Form.) (Coracias garrulus garrulus.)

الوصف : الطول حوالي ١٢ بوصة . انظر اللوحة رقم (٣٢) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في النصف الشرقي من أوروبا إلى القوقاز وفي إيطاليا وصقلية وسردينيا والنصف الشرقي من ايبيريا وفي قبرص وفلسطين والسويد والنرويج لغاية خط ٦١ ° شمالا عند ليننجراد ، ولكنه نادر في منطقة البلطيق والدنمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا . كذلك يتوالد في آسيا الصغرى وميسوبوتاميا وشمال غرب إفريقية ؛ يقضى الشتاء في إفريقية الجنوبية والاستوائية وجنوب آسيا .

في مصر : كثير في الحريف من آخر أسبوع في أغسطس إلى أواخر سبتمبر ، كذلك في الربيع من آخر أسبوع في إبريل إلى منتصف مايو (ولكنه في الربيع قليل جدا) يشاهد بكثرة في الدلتا والفيوم ووادي النطرون والواحات الداخلة والخارجة وفي سيناء في الحريف في نفس المواعيد السابقة .

مميزاته : يطير ويحتشد في جماعات ، وتارة مثنى أو فرادى . اسمه في رشيد (غراب أخضر) . جميل المنظر للغاية . يختص بكل مميزات الفصيلة السابق ذكرها . يقف على ذرا أفنان الأشجار يرب من فوقها فريسته على الأرض ، كذلك يجثم على كرائيف النخيل وخاصة ما ارتفع منها . طعمه السحالي والجراد والجعارين والخنافس وصغار الضفادع وأى حشرة يعثر عليها . يجثم كذلك على أسلاك البرق أحيانا . يصاد في رشيد بالدينق (المخيط) مع بقية الطيور المهاجرة في الحريف .



الأخيل الحبشي
Abyssinian Roller.
(Coracias abyssinicus abyssinicus.)

الوصف : طوله حوالى ١٥ بوصة . انظر اللوحة (٣١) رقم (٨)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في السودان والحشة وشمال أوغندة وكينيا وجنوب غرب بلاد العرب .

في مصر : قليل منه يقيم طول السنة في أقصى جنوب مصر عند حدودها في وادى حلفا .
مميزاته : أهم ما يميزه ذيله المشقوق بشكل ذيل الخطاف ، كما أن لونه أزهى وأكثر جاذبية من الأوروبي . طبائعه كالأوروبي السابق تماما .

الفصيلة السماكية (هَلْكِيُونِيْدَايْ) = صيادى السمك
Family (Halcyonidae) = Kingfishers.
Kingfisher family.

تحتوى هذه الفصيلة أو العائلة على حوالى ٨٦ نوعا يقطن السواد الأعظم منها المناطق الاستوائية (١) حيث تلائمها الطقوس من الرطوبة والأمطار والحرارة والغابات والبرك المائية ، وليست متساوية التوزيع فإن معظمها يقطن الإقليم (الهندى - الأسترالى) . وهى مختلفة الأحجام فمنها ما هو فى حجم العصفور البيوت (House-sparrow) ومنها ما هو فى حجم الدج (Thrush) ومنها ما هو فى حجم الغراب (Crow) وهى قصيرة العنق ، طويلة المنقار ، جلوبة الألوان ، نحيلة الأجسام ، ضخمة الرؤوس ، قصيرة الأقدام والأصبع الثالثة والرابعة ملتصقتان جزئيا ، مستديرة الأجنحة مع القصير ، والذيل فى غاية الاستدارة ، القوادم ١١ ريشة والذيل ١٠ أو ١٢ ريشة . ماواها المفضل هى الأشجار والحشائش المظلة على المياه ، وأحيانا الحجارة أو نتوء أو عمود خشبي مشرف على الماء ، أو أسلاك البرق فوق الماء كترعة أو جدول أو بحيرة أو نهر أو غدير ، وتارة تقطن فى قلب الغابة وسط الماء والأشجار ، بعضها تأكل الحشرات والسحالي وصغار القوارص كالقتران الصغيرة ، على أن غذاءها الرئيسى المفضل هو الأسماك ، تأكل كل ذلك وتنقض عليه ثم تعود إلى مكانها ثانية ، وإن لم تجد فيه غذاءها رحلت إلى مكان آخر مشرف على الماء ، وتأكل السمكة بطريقة خاصة وهى أن تقذف بالسمكة بعد اقتناصها - فى الهواء ثم تلتقطها قبل سقوطها وتبدأ بأن تبتلعها طوليا من رأسها . والبعض يخلق فوق الماء مثل الخرشنة (Tern) ثم يبيط على السمكة كما يفعل السمك الأبقع المشهور (Pied Kingfisher) . وهى تستطيع السباحة والغوص ولكن بطريقة خاصة من بين بقية الطيور .

والتي تأكل السمك تحفر أعشاشها بمناقيرها فى ضفة نهر فتعمل حفرا طولية بعيدة الغور بهيئة النفق بجوار الماء طبعاً فى سد طيني غالباً قد يصل الغور إلى ثلاثة أقدام ويكون نهاية أشبه بالغرفة متسعاً يوضع فيه البيض ويبطن جيدا خوفاً عليه من البلبل ، والبيض من ٣ : ٥ بيضات مستديرة بيضاء اللون .

(١) وهى عالمية ما عدا شمال كندا واسكندناوة وشمال آسيا البارد والصحراء الأفريقية الكبرى . وهى ١٢ جنسا لأنها لا توجد بها مياه ولأن الشمال منطقة جليدية .

أما التي تتوالد في ثقب الأشجار كثقوب النصار مثلاً فهي السمك الذي يأكل السحالي والحشرات التي تكون في الأراضي الشجرية . وهي جميعاً عالمية التوزيع وخاصة في المناطق الاستوائية كما ذكرنا . في مصر منها ثلاثة أنواع .

جنس السمك الأبقع (سيريل) Genus Ceryle = Pied Kingfisher.

يقطن هذا الجنس جميع أنحاء العالم ، ويشتمل على أنواع متعددة ، في مصر منها نوع واحد فقط ، ويتميز باستطالة ريش القنة الذي يكون شبه تاج . والذنب قصير ولكنه بطول قليلاً عن المنقار . وغذاءه قاصر على الأسماك .

السمك الأبقع = صياد السمك الأبقع « القِرْلَى » Pied Kingfisher. (Ceryle rudis rudis.)

الوصف : طوله حوالي ١٠ ½ بوصة . انظر اللوحة (٣١) رقم (٧)
الموطن : من الأوابد : يقيم طول السنة ويتوالد في كل أنحاء إفريقيا ، كذلك في قبرص وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين والعراق حيث هو كثير على طول ضفتي نهر دجلة والفرات وكذلك نهر النيل . لا يوجد في الجزائر أو مراكش

في مصر : يقيم بها طول السنة على ضفاف الأنهار والبحيرات والمساحات المائية وذلك في الدلتا والفيوم وأعلى النيل إلى وادي حلفا وفي منطقة قنال السويس وترعة الإبراهيمية وبحيرة إدكو والمنزلة والبرلس وقارون . لا يوجد في وادي النطرون أو الواحات الغربية أو سينا .

مميزاته : يشاهد في كل مكان يغشاها الماء وخاصة إذا كان به أعشاب نامية فنراه يقف على أي مكان كصخرة أو أسلاك البرق أو عصا نائية من الماء يراقب السمك منها ، كما أنه يحلق فوق الماء من أجل البحث عن السمك حتى إذا وجد السمكة هبط فجأة وأخذ السمكة وأحدث رشاشاً في الماء . وجسمه به بقع سوداء وبيضاء فقط . حذر بعض الشيء يطير عند أي شك . ولون الذكر بلون الأنثى غير أن السواد في الصدر في الذكر أكثر من الأنثى . الذكر له خطان عرضيان على صدره والأنثى لها خط واحد فقط .

توالده : العنش على ضفاف الأنهار داخل الأعشاب لمسافة كبيرة . البيض من ٣ : ٥ ، توضع من آخر مارس إلى أوائل إبريل . أبيض اللون مستدير .

جنس (ألسيدو) Genus (Alcedo.)

(القاوند الأخضر)

تستوطن طيور هذا الجنس أوروبا وآسيا الوسطى واليابان ، وتتميز بأن الفكين في المنقار ينطبقان على بعضهما تمام الانطباق . القدم صغير ، أصبعاه الخارجى والأوسط ملتحمتان حتى المفصل الثانى ، والوسطى والداخلية ملتحمتان حتى المفصل الأول ، والأصبع الخلفية فى غاية الصغر . الجناح قصير مستدير وأطول قوادهم الثلاثة ، ويتكون الذنب من ١٢ ريشة قصيرة . والريش جميل المنظر للغاية ، وريشات مؤخر الرأس تطول قليلا وتكون شبه تاج . لا يختلف الشقان غالبا . نوع واحد منه فى مصر .

القاوند الأخضر الأوروبى (شكل البحر الأبيض المتوسط)

European Kingfisher (Mediterranean Form.)

(Alcedo atthis atthis.)

الوصف : طوله حوالى ٦ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٣١) رقم (٩)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا فى كل أوروبا والجزائر البريطانية ، ماعدا شبه جزيرة اسكندناوة . كذلك يتوالد فى شمال غرب إفريقيا .

فى مصر : يهاجر إلى مصر وسينا فى الربيع والخريف وبعضه يملك الصيف فى مصر حتى أوائل الخريف . ويبدأ ظهوره وتكاثره فى الخريف فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس ، وشوهد فى سيوة ولكن ليس فى الواحات الداخلة أو الخارجة كما أنه لا يشاهد جنوبا أبعد من بنى سويف ويشاهد فى السودان فى أواخر مارس وربما كان يتوالد فى الدلتا المصرية حيث هو يشاهد فيها طول السنة تقريبا

مميزاته : أصغر قاوند ، يمتاز بسهولة بلمعانه الأزرق فى أجزائه العليا مع الخضرة ، وذقنه البيضاء والبقعة البيضاء على الرقبة ، والحدود القسطلية مع الأجزاء السفلى مع منقار طويل يشبه الخنجر . يلازم المياه على ضفاف الأنهار والترع ذات الأعشاب والصخور التى يتخذها مقرا لمراقبة السمك حيث يشرف عليه منها . إذا كان مفزوعا سمع له صوت موسيقى . وعادة يقف على غصن مطل على الماء أو صخرة مشرفة عليه أو ما شابه ذلك لصيد السمك .

توالده : العش فى جانب ضفة نهر رملية أو طينية ، فى فجوة بعيدة الغور ثم تنتهى إلى غرفة صغيرة ، ثم يوضع البيض فى الغرفة وعدده من ٦ : ٧ عادة ، لونه أبيض به مسحة برتقالية خفيفة .

جنس (هالكين) Genus (Halcyon.)

(القاوند الأزرق)

يمتاز بأن المنقار فيه عريض عند القاعدة ولا ينطبق الفكك تماما على بعضهما من نهايتها ، والجناح أكثر استدارة من القاوند الأخضر ، وأطول القوادم هى الثلاثة . طعامه البحث هو السمك . بعض الأفراد تغشى الأراضي الشجرية والجافة والبعض يأكل الحشرات والسحالي . كبير الجسم . محصور الوجود من آسيا الاستوائية إلى استراليا ، وكثير منه يغشى إفريقيا الاستوائية والجنوبية . نوع واحد منه يرى فى مصر كمتجول لها .

القائند الأزرق اسميرنا (الشكل الغربى)

Smyrna Kingfisher (Western Form.)

White breasted Kingfisher

(Halcyon smyrnensis smyrnensis.)

الوصف : طوله حوالى ١٠ بوصة . انظر اللوحة (٣١) رقم (١٠)
الموطن : من الأوابد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في آسيا الصغرى وسوريا والعراق وفلسطين
وفارس وقبرص . محصور في وادى نهر الأردن في فلسطين وعلى الشاطئ عند يافا . وهو قليل في غزة ،
وشاهد في سيناء متجولا ،

في مصر : شوهده متجولا في سيناء والدلتا .

مميزاته : يمتاز برأسه البنى وزوره الأبيض ، وجناحه الأزرق اللامع ، والخط العرضى الأبيض
الذى تحت الجناح ويظهر في طيرانه ، ومنقاره الأحمر . يشاهد غالبا في الحدائق الجافة وكذلك يقف على
الصخور قرب الشواطئ . طعامه السرطان الصغير وأبو جلمبو والسحالي والضفادع ، وهو لا ينفطس
في الماء طلبا للأسماك ولا يتردد بقرب الماء أو يحوم حوله ولكنه يهوى إلى الأرض مباشرة من مكان وقوفه
ويضرب بفريسته الأرض حتى تموت ثم يأكلها . صوته كالسابق مرتفع قليلا عنه . يندر أن يعثر
الإنسان عليه .

رتبة بيكيفوزم Order (Piciformes.) = Pici

ناقر الخشب (Woodpecker.)

تشمل هذه الرتبة طيور ذات طبائع خاصة عدد أجناسها هو ٤٧ جنسا وهى تستوطن كل العالم ،
وتمتاز بوقاب قوية العضلات أغلبها طويلة ورفيعة ، ومنقارها قوى مستقيم وتحت الأنف توجدان قرب
القاعدة وهما مستديرتان ، والساق قصيرة بها صفائح ترسية وأهم ما فيها أن اللسان طويل للغاية يستطيع
الطائر أن يمدده للخارج لأكثر من ضعف طول المنقار نفسه ، وذلك لالتقاط الحشرات به من تقبوس
الخشب التى يحفرها بمنقاره ، كما أن هذا اللسان به سن مدبب كالإبرة يلسع بها الحشرة ويعدده شعيرات
لزجة دقيقة جانبية بهذا الشكل تقريبا تمكنه من جذب الحشرة من داخل ثقب الشجرة إلى الخارج .
البيض مستدير أبيض اللون .

عائلة بيكيداي Family (Picidae)

ناقر الخشب Woodpeckers

لهذه العائلة أو الفصيلة ما للرتبة من طبائع ومميزات ، وهى تحتوى على أكثر من ٢٠٠ نوع ^(١)
مختلفة الأحجام والأشكال من حجم المصفر الببوق إلى أن تصبح في حجم الغراب تقريبا ، وكلها من
قطان الغابات في العالم ماعدا استراليا ومدغشقر . بعضها مضر بالإنسان يأكل الحبوب والصنوبر (con-
eased) ويعمل ثقوبا في سيقان الأشجار وفروعها ولكن عموما نفعه أكثر من ضرره . وهى تتسلق

(١) المعروف منها هو ٢١٣ نوعا والموجود حاليا ٢٠٩ متفرعة من ٣٦ جنسا

الأشجار من جذوعها في دوائر حلزونية مستخدمة ذيلها القصير الجاف في تثبيتها . صوتها حاد ومرتعج وخاصة عند التوالد وخاصة من الذكور بما تحدته من نقر مسموع كالطبل على سيقان الأشجار ويمكن أن تنقسم هذه الفصيلة إلى تابعين لها (Subfamilies.) وهما : نقار الخشب الأصلي True Woodpecker وهو الذي يقيم طول السنة في مكانه لا يبرحه ، والثاني هو : (Wrynek) أى اللواء – وهو الذى يهاجر من وإلى المناطق الأخرى ، (واللواء) نشاهده في مصر في الاعتدالين .

عشيرة جنجيناى Family (Jynginae)

اللواء (Wrynek.)

Woodpeker Family.

تتماز هذه الفصيلة أو العائلة أو العشيرة بنعومة ريشها ، كما أن ريش أذناها ليس سهل القصف وأطراف ريش الذنب ليست مسننة وهي جنس واحد على ثلاثة أنواع موطنها إفريقية وآسيا فقط . أطول قوادمها الثالثة ، وريشها سهل الانتزاع ، وجزء من فتحة الأنف مغطى بغشاء . الأرجل قوية وأصابع القدم عبارة عن أصبعين خلفيتين ، وآخرين أماميين .

جنس جنكس Genus (Jynx.)

Wrynek.

لهذا الجنس ما للفصيلة من خواص وميزات ، والشقان لا يختلفان ، وبالأجزاء العليا علامات مختلفة من السواد والأصفر الرمل والكرمى تعطيه شكلا يقارب لون الأشجار والغابات التي يأويها فتحمله وتحجبه عن الأنظار . نوع واحد منه يهاجر إلى مصر في الاعتدالين أو على الأصح يمر على مصر أثناء هجرته من الشمال ومن الجنوب .

اللواء الأوروبي European Wrynek

(Jynx torquilla torquilla.)

الوصف : طوله حوالى ٦ ¼ بوصة . انظر لوحة (٤٧) رقم (٢)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا شمال النرويج وشمال الجزائر البريطانية وماعدا أيبيريا وشبه جزيرة البلقان . كذلك يتوالد في القوقاز وآسيا الصغرى وغرب سيبيريا وشرقا إلى شمال آسيا وكذلك في قبرص وفلسطين . ويمر في هجرته على العراق وشمال إفريقية في طريقه إلى السودان وشمال خط الاستواء . كذلك يمر في هجرته على الهند وسيام (تايلاند) وجنوب بلاد العرب والصومال .

في مصر : يشاهد فيها في الربيع من ١٠ مارس إلى ٢٠ إبريل ، وفي الخريف من ٤ سبتمبر إلى أول أسبوع من أكتوبر ، والبعض يبقى شتاء بمصر وقد صدت واحدة منه من الدلتا في نوفمبر . وشوهدت أسراب منه في سيناء في آخر أسبوع من مارس . وشوهدت هجرته في كل الواحات وفي الفيوم ووادي النطرون .

مميزاته : يسمح للإنسان بالاقتراب منه . لونه كلون أبي النوم تقريبا . يقف على سيقان الأشجار والنخيل وينقى النمل بلسانه الطويل من ثغوب الأخشاب إذا قبض عليه الإنسان حيا حرك رقبته ذات اليمين وذات الشمال ^(١) ويسميه أهل رشيد (نُونِيَّة) يفسى الغابات والأشجار يصاد مع العصافير في الحريف في رشيد ودمياط وبور سعيد . لا صوت له .

رتبة (كوكو ليفورم Order (Cuculiformes الكوكيات louculi

تشتمل هذه الرتبة على آكل الموز Plantain - eater وجنس الكوكو (cuckoos) والتوراكو Touracos والآخر المذكور يوضع أحيانا في رتبة منفصلة . .

وتتكون هذه الرتبة كلها من حوالي ١٥٠ نوعا ، أصابع القدم فيها اثنتان أماميتان واثنتان خلفيتان وأن الجفن عار من الريش . الجلد مثل نسيج الورق . والقوادم مكونة من ١٠ ريشات وكذلك الذيل يحتوي على ١٠ ريشات . وهي تستوطن العالم كله ، وتعتبر الحيشة والهند وجزيرة مدغشقر أغنى البقاع بهذه الطيور . مناقيرها بها شيء قليل من الانحناء ، وأجنحتها طويلة تقريبا ومعدبة والذنب غروصي الشكل . قد يكون الذيل مكون من ٨ ريشات . وتنقسم هذه الرتبة إلى عائلتين ، الأولى تشمل آكل الموز مع التوراكو كما ذكر والعائلة الثانية تشمل الكوكو الأصل True cuckoo الذي سنتكلم عنه .

فصيلة الكوكيات Family (Cuculidae.) ^(٢) الكوكو الأصلي True Cuckoo. Cuckoo Family.

لهذه الفصيلة ما للرتبة من خواص ، وكلها متطفلة في تولدها أى تضع بيضها في عش غيرها وتخلص نفسها من الحضانة وتربية الأولاد ، بل تلقى حملها على عاتق غيرها . وأهم ما في هذه الفصيلة هي هو مظهر أصابعها المتسلقة مع أصبعين أماميتين من أصابع القدم ، واثنتين خلفيتين ، وتتكون هذه الكوكيات من حوالي ١٢٥ نوعا توجد خاصة في الأقاليم الاستوائية ، ويجب أن يفهم أن السواد الأعظم منها تبني أعشاشها بنفسها وترى أولادها أيضا بنفسها ، وهي ٣٤ جنسا ، وعدد المتطفل من الكوكو هو (٤٢) جنسا فقط وتنقسم هذه العائلة إلى الكوكيات الخاصة بالأشجار ، والكوكيات آكلة الفواكه ، وثالثها الكوكيات الخاصة بالنبات (بالأنيس anis) ورابعها الكوكيات الأرضية ، وخامسها الكوكال .

وكل الكوكيات الشجرية متطفلة أى تضع بيضها في أعشاش غيرها من طيور لا من نوعها ولا من فصيلتها أو من رتبته أيضا ، فتضع الأنثى بمفردها بيضة واحدة بعد ما تبيضها على الأرض ، ثم تحملها بمنقارها وتبحث عن عش طائر آخر يقارب لون بيضه لون البيضة التي تحملها بمنقارها ، ثم تراقب غياب الطائر الآخر عن عشه ثم تأتى إلى عشه وتضع بيضتها في عش هذا الطائر ثم تأخذ من العش بيضة أخرى من بيض صاحبه الشرعى وتلقى بها على الأرض ثم تعمل هذه الحركة مع عدة أعشاش حسب عدد

(١) ومن هذه الحركة اشتق اسمه اللواء لأنه يلوى رقبته كما ذكر .

(٢) هذا العدد هو ما تحويه أيضا العائلة Cuculidae وهي في كل الدنيا ماعدا شمال كندا وسيبيريا وبلاد العرب والصحراء الكبرى الإفريقية وغرب أمريكا الجنوبية وطردها الجنوبي .

بيضا . وعندما يفقس البيض في عش الطائر الشرعى ، فإن فقست بيضة الكوكو وكانت أول بيضة مثلا فقست وعادة بيضة الكوكو قبل بيض صاحب العش الشرعى نجد الغريزة القهرية تتمثل في الكوكو الصغير الأعمى عقب خروجه ، ونجده يتحسس ما بالعش من بيض أو غيره مثل الأولاد للشرعى ثم يحاول أن يدخل نفسه تحت البيضة أو الكتكوت ثم يقذفها خارج العش ، ويفعل هذا مع باقى العش . وإن خرج الكتكوت الكوكو بعد خروج أولاد العش الشرعيين ، فعل معها مثل ما يفعل مع البيض تماما حتى يبقى العش بنفسه كى يستحوذ على كل الغذاء ويكون فيه بمفرده ، ومن العجيب أن الأم الشرعية للعش لا تفعل معه شيئا وتظنه ابنا لها خرج شاذا من شذوذ الطبيعة وتطعمه حتى تكبر ويفارقها .^(١) والطعام هو الحشرات والديدان واليرقات .

إن بعض الكوكيات تأكل الثعابين الصغيرة والضفادع والسحالي وصغار الطيور مثل الكوكال وكذلك بيض غيرها من الطيور . يوجد منها في مصر خمسة منها . وهى عالمية المناطق الجليدية من شمال آسيا وكندا ولا توجد في الصحارى .

جنس كتر وبوس (Genus Centropus) الكوكال coucal

يستوطن هذا الجنس جميع البقاع الاستوائية الحارة من آسيا وإفريقية ، وهو قوى المنقار ، منحني قليلا من طرفه ، وفتحة المنخر كشق مستطيل ، للأصبع الخلفية غلب حاد مستقيم تقريبا ، الجناح قصير مستدير ، طويل الذنب ، به عشر ريشات ، الريش شوكة الملمس في مناطق الرأس والعنق والظهر تقريبا . الشقان لا يختلفان . لا يكتسى لبالغ بريش البلوغ إلا في الثالثة من عمره .

تتميز الذكور في هذا الجنس بأن جهازها التناسلى نجد فيه أن الخصية اليمنى هى الكاملة النمو والصالحة للإخصاب ، واليسرى ضعيفة ضامرة وذلك عكس ما هو معروف في الطيور . غذاؤها الحشرات والبيض وصغار الطيور وتهاجم الأعشاش الصغيرة . ليست متطفلة بل تبنى عشها بنفسها . من طبائعها القفز . جنس واحد منه في مصر .

الكوكال المصرى . Egyptian Coucal. Lark - heeled cuckoo (Egyptian Form) (Centropus senegalensis aegyptius.)

الوصف : طوله من ١٤ - ١٧ بوصة . انظر اللوحة (٣٣) شكل (٣)
الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في معظم الدلتا من شمالها إلى الجيزة وخاصة في رشيد ودسوق وكفر الشيخ ويولاق في القاهرة والفيوم) لا يعرف في سيناء أو الواحات الأخرى أو مصر العليا .

(١) أحيانا بعدما يكبر لا يسهه العش لضخامة جسمه فيخرج ويقف عليه من الخارج ويظل يتعلم الطيران ويتناول الطعام من أصحاب العش الشرعيين حتى يصير قادرا على الهجرة وحتى حين ذلك يخرج ويقف على فرع شجرة قريبة ويظل يصرخ ويصيح فاتحا فاه معلنا عن جوعه فتمر عليه طيور الغابة وتطعمه رغم كبره عنها بكثير - غريزة الطيور في التعاون .

مميزاته : سهل المعرفة يعرف بمجرد رؤيته ، طويل الذيل ، نحاسي اللون ، بطيء الطيران ، سريع العدو على الأرض والقفز ، يتسلق الشجرة من أسفل إلى أعلى ثم يطير منحدرًا إلى أية شجرة أخرى . يشاهد في القرى والأرياف ويصيح في الصباح وعند الغروب وقت التزاوج بصوته هكذا (كوكو كوكو) اسمه في رشيد (عرق البوص) . طعامه السحالي والخنافس والديدان وباقي الحشرات وصغار الضفادع . يطمئن للإنسان ولا يخشى منه أذى . قد يحدث صوتا أحيانا مثل اللقطة هكا (لقي لقي) يردده بسرعة . الشقان متماثلان

توالده : العش في القصب النامي على شاطئ ترعة أو جدول (في قلب القصب ، وهو على هيئة قبو يبني من القش والعصى الرفيعة ، وقد يكون العش بقلب سعف النخلة أو الشجرة . البيض من ٣ : ٥ في حجم بيض الحمام يوضع من إبريل إلى مايو) . أبيض اللون .

جنس كوكولوس Genus Cuculus

الكوكو (١) Cuckoos

يستوطن هذا الجنس بأنواعه كل الدنيا القديمة وأستراليا . يوجد في الدنيا الجديدة ما يحمل اسمه الانجليزي فقط ، رشيق الجسم ، منقاره متوسط الطول وبه شيء قليل من الانحناء ، وفتحتا المنخر مستديرتان ، طويل الجناح مدببه ، طويل الذنب كالترس . قصير الأقدام يغطي الريش ٢/٣ الساق فيها ، ليس له قنزعة ، وثالث قادمة في الجناح هي الأطول . لا يسمع صوته في مصر بل في فصل التوالد في أوروبا فقط متطفل في معيشته أى يضع بيضه في عش الطيور الأخرى بالطريقة التي في صفحة (٢٠٥) . نوع واحد منه يمر على مصر في هجرته وهو على شكلين ولوين .

الكوكو الأوروبي

cuckoo (European Form.)

(cuculus canorus canorus.)


الوصف طوله حوالى ١٣ بوصة . انظر لوحة (٣٤) شكل (١ - ٦)



الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا أيسلندا وأسبانيا وشرق القوقاز . يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية وجنوب آسيا مثل غنيا الجديدة .

في مصر : يمر عليها وعلى سيناء في الربيع طول شهر إبريل ومايو ، وفي الخريف طول شهر أغسطس وسبتمبر ، وأكثر ما يلاحظ رؤيته هو في شمال الدلتا ، ويشاهد كذلك في الفيوم ووادي النطرون .

مميزاته وطبائعه : تشاهد الذكور البالغة الزرقاء في الخريف قبل النوااض ، الأجزاء السفلى في البالغ الأزرق بها خطوط متعرجة قليلا عرضية تشبه خطوط الباشق Sparrow—hawk أما في الشكل الأحمر فإن هذه الخطوط تكون في كل الجسم . يحب الغابات ويأوى إلى الأشجار الضخمة ويستقر بداخلها .

(١) لم نجد أفضل من هذه الكلمة حسب النطق الإنجليزي والعلمى والفرنسى ومعظم اللغات وحيث يتلاءم مع التسمية حسب الصوت ولم نقل الككم ولا الحمام الوقواق .





طيرانه في استقامة واحدة إلا إذا طورد وخاف . اسمه في رشيد (سقساق) . لا يقف على الأرض أو يرى مكشوفاً في أى مكان إلا على كرانييف النخيل وسط الحقول فقط . متطفل في توالده في أوروبا صيفاً . (انظر ص ٢٠٦ عن تطفله)

الكوكو الآسيوى

Cuckoo (Asiatic Form.)

(Cuculus canorus telephonus.)

الوصف : طوله حوالى ١٣ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٣٤) شكل (٧)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً في شمال آسيا جنوباً إلى حدّ الهملايا وليس جنوبها . يقضى الشتاء في جنوب آسيا وجنوب بلاد العرب ، وكينيا والصومال . شائع في هجرته لسوريا وفلسطين .
في مصر : فحصت أنواع منه من رفح وكان ذلك صدفة .
مميزاته : كسابقه . متطفل أيضاً . أفتح لونا بكثير في أعلاه من الأوروبي وخاصة على الرأس .

جنس كلاماتور (Clamator)

جنس الكوكو الأرقط

(Spotted Cuckoo)

يستوطن هذا الجنس بأنواعه إفريقية وآسيا الاستوائية ، وشرق وجنوب أوروبا ، له قنزعة (تاج) . ثالث ورابع قادمة هما أطول الريش في الجناح . الجناح مدبب ، أشبه في طيرانه بطيران الوروار . Bee-eater. الذيل أطول من الجسم كله . متطفل كالسابق أيضاً . أرقط الجسم . نوع واحد منه في مصر .

كوكو أرقط كبير

Great spotted cuckoo.

(Clamator glandarius.)

الوصف : طوله حوالى ١٥ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٣٣) شكل (١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً في اسبانيا والبرتغال وشمال غرب افريقية وآسيا الصغرى وفارس وسوريا وفلسطين ومصر .
يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية .

في مصر : يزور مصر صيفاً حيث يتوالد فيها ويبقى بها طول الصيف من مايو إلى أوائل سبتمبر ثم يرحل إلى الجنوب لقضاء الشتاء في مصر العليا وإفريقية الاستوائية والجنوبية . وأكثر ظهوره في الدلتا ولا يلاحظ في أى مكان غيرها صيفاً إلا نادراً .

مميزاته : أرقط ذو نقط بيضاوى له قنزعة ، صوته مرتفع هكذا تقريباً Ki-oo يقف على الأشجار يتربص منها الحشرات فيطير خلفها ويلتهمها ثم يعود إلى مكانه ثانية وطيرانه وحركاته عندئذ أشبه بالوروار

توالده : متطفل كالأوروبي السابق ، البيض يوضع في عش غراب أو عقق ، البيض من ٤ : ٨ بيضات خضراء شاحبة ذوات خطوط ونقط معتمة . في مصر يوضع البيض في عش الغراب الأورق عادة .

رتبة بستا كيفورم (الببغاوات)

إن رتبة الببغاوات محدودة الوجود في المناطق الاستوائية ، وتحتوي عائلتها أو فصيلتها على حوالي ٣١٧ نوعاً^(١) . قاعدة المنقار مغطاة بجلد عار ، ويمكن أن يستخدم المنقار مثل كسّارة البندق لقوته وكذلك مثل مبرد خشبى لأن الفك السفلى يمكنه أن يحركه إلى الأمام والخلف عكس الطيور التي تحركه إلى أعلى وإلى أسفل ، وجوانب المنقار مزودة بقشرة قرنية صلبة قوية لهذا الغرض ، واللسان لحمى غليظ خشن^(٢) . والببغاوات كلها ماهرة في التسلق للأشجار وتستخدم مناقيرها مع الأرجل في هذه العملية ؛ وأن أصابع القدم هي اثنتان أماميتان واثنتان خلفيتان وتقوم القدم مقام اليد للإنسان حيث يمسك بها الببغاء غاؤه ويقدمه لفمه . كبيرة الرأس نسبياً ، أكثر ذكاء من غيرها من الطيور . يمكنها أن تتكلم فهي مثلاً يمكنها أن تقول (نهارك سعيد) في الصباح ولا تقولها في الليل لأن الصوت انطبع في ذاكرتها مصحوباً بضوء النهار تماماً كما تتعلم الأطفال الكلام أول الأمر ، والفارق أن الطفل ينمو وينمو معه الإدراك فلا يلبث أن يدرك ويسمع ويعبر عما يريد ، ولكن الببغاء لا يعي ما يقول ، فلا مانع أن نسمعه أن يقول مثلاً (صباح الخير) في الصباح والظهر وبعد الظهر ، لأنه علم أنها تقول نهاراً فحسب .

ريش القوادس عشر ريشات ، الجناح مدبب ، الذيل ١٢ ريشة . ألوانها زاهية جذابة جميلة برّاقة ، صغارها تلازم العش . لون البيض أبيض . موطنها إفريقية وآسيا وأستراليا والأمريكتان ، ولكن السواد الأعظم منها يقطن الإقليم الأسترالى^(٣) (في أستراليا وحدها ٥٠ نوعاً) كما أن أغلبها يعيش بين الأشجار والغابات وتتجمع في أسراب ضخمة وتصيح بصوت مرتفع يكاد يصم الأذان من صراخها . منها ما يقطن الجبال على ارتفاع حوالى ١٦٠٠ متر فوق سطح البحر . طعامها البذور والحبوب والفواكه ومنها ما يأكل الحشرات ومنها ما يهاجم الماشية الصغيرة كالضأن في أستراليا ، وهي تخرج إلى الحدائق نهاراً والحقول ثم تعود مع غروب الشمس لتقضى الليل فوق الأشجار التي تزدهم بها حتى لتكاد تنوء بحملها الأغصان ، كما أنها قد تلجأ إلى فجوات في جذوع الدوحات حتى تمتلئ بها ويسهل صيدها فيها خصوصاً وهي تبارحها فرادى في الصباح .

الكتكوت خال من الريش .

(١) المعروف منها هو ٣٤٠ نوعاً ، والموجود حالياً هو ٣١٧ نوعاً متفرعة من ٦٩ جنساً .

وهذا في الفصيلة Psittacidae الأتى ذكرها .

(٢) طرفه قرن صلب

(٣) تقطن المناطق الاستوائية من أمريكا الجنوبية والوسطى وجزائر الهند الغربية والشرقية ونيوزيلند والهند الصينية ومعظم إفريقية جنوب الصحراء الكبرى ومدغشقر وتحتوى العائلة Psittacidae على ٣١٧ نوعاً الآن وكان المعروف منها هو ٣٤٠ .

فصيلة الببغاوات (Psittacidae) Family
Parakeets. + (بستاكيدي) Tlorikeets
Parrot Family

لهذه الفصيلة أو العائلة أو العشيرة ما للرتبة من خصائص ومميزات .

جنس بستاكولا (الدرة)
Genus (Psittacula)

يستوطن هذا الجنس جنوب آسيا ويمتد شرقاً إلى إستراليا ، وجنوباً إلى إفريقية الاستوائية . تمتاز بمناقير قصيرة وبأذنان طويلة وخاصة في ريشتها من الوسط . وقد أدخل منه نوع واحد في مصر وتوطن فيها .

باراكيت بطوق أحمر
Rose - ringed Paroquet.
(Psittacula Krameri.)

الوصف : طوله حوالي ٩ بوصه . انظر اللوحة (٣٣) شكل (٢)
الموطن : من الأوبد : يقيم ويتوالد في إفريقية الاستوائية والسودان والهند وسيلان وبورما وهو في جميع المناطق على أشكال مختلفة .
أدخل في الدلتا المصرية حوالي سنة ١٩١٢ م وهو الآن يقيم فيها طول السنة . حول الجزيرة وحدائق الحيوان والأورمان ولا يتعدى ذلك إلا نادراً .
توالده : العش في ثقب بنيان أو ثقب شجرة . البيض يوضع في إبريل ومايو وهو ٥ بيضات . ويمتاز بلمونه الأخضر كلية وبطوقه الأحمر والأسود .

رتبة (استريجيفورم) (البوم)
Order (Strigiformes.) = Owls.
Owl Family.

تتكون هذه الرتبة من حوالي ١٥٠ نوعاً^(١) . تقطن جميع أنحاء الدنيا ما عدا مناطق القطب الجنوبي وهي شبيهة بالطيور الجارحة وقد تقطن الجبال التي يصل ارتفاعها إلى خمسة آلاف متراً . وهي تختلف في الأحجام والأشكال ، فمنها ما هو في حجم العصفور البيوق Sparrow ومنها ما يصل حجمه إلى حجم العقاب . العيون في مقدم الرأس مثل الإنسان وليست في الجوانب كباقي الطير ، وهذه العيون مهيأة للرؤية في الظلام . فتحة الأذن كبيرة ، وقوة السمع عندها أقوى من أي طائر آخر ، تصيد ليلاً ومنها ما يصيد نهاراً ولكن نادراً ، طعامها الحشرات والفئران خاصة ، والسحالي والزواحف وصغار

(١) تحتوي الفصيلة Strigidae على ١٢١ نوعاً تقطن كل العالم ما عدا جرينلند وهي تحوي عدة فصائل مثل فصيلة protostrigidae وهي غير موجودة الآن ، وتوجد أيضاً فصيلة Tytonidae وهي بومة الأجران الموجودة منها حالياً في العالم ١١ نوعاً ، وأما الموجود بمصر فهو جنس Bubo أي Owl Eagle و جنس Asio أي البومة ذات الأذنين وكذلك جنس Otus أي Owl Scops + جنس Athene أي البوم الصغير + جنس Strix أي Tawny + Tyto السابقة .

الطيور والحيوانات . العش في فجوة في ساق شجرة أو في شق في بستان أو عش طائر آخر مهجور . البيض أبيض مستدير وتبدأ الحضانة عند وضع أول بيضة . العينان واسعتان بكل منها هالة من ريش منتصب ، الأجنحة عريضة مستديرة الأطراف . القوائم أولاها ضامرة ، والثالثة والرابعة أطول ريش الجناح . منه ما يصيد السمك . المنقار مقوس أشبه بمنقار الصقور . يكسو الريش الأقدام إلى المخالب التي هي قوية جدا ومقوسة وحادة ، الذيل من ١٢ ريشة . لون الريش عادة يلائم لون البيئة التي تعيش فيها . العين واسعة حادة النظر محدبة القرنية إلى حد بعيد ليتسنى للطائر أن تتسع وتضيق في سهولة فهي مهيأة لليل ، ورغم ذلك فإنها تستطيع أن ترى في النهار ، وعما يلاحظ على العين أن الجفن العلوي ينسدل إلى أسفل كي يغطي العين وذلك عكس ما هو معروف عن بقية الطيور إذ يرتفع الجفن الأسفل ليغطي العين .

ويوجد قبيل فتحة الأذن غطاء جلدي هلال الشكل يختلف الارتفاع له بطانة من الريش تزيد ارتفاعا وهو يتحرك حسب الإرادة ، كما أنه رغم شدوذ وضعه مكافئا لصيوان الأذن في الثدييات ، وترفع البومة هذا الصيوان عندما تطير بطيئة فتستطيع أن تسمع الأصوات الصادرة من خلفها ، أما إذا أرادت الإسراع فإنها تبادر بقبض الصيوانين فلا تقل السرعة بسبب مقاومة الهواء أثناء الاندفاع ، ولها بذلك خاصية سماع أقل حركة تصدر عن فريستها ، بل هي أحيانا لا ترى الفأر فتتم فوقه ، فإذا بدرت منه حركة مهما كانت صغيرة سجلها سمعها على الفور فتعود أدراجها إليه . طعامها صغار الثدييات غالبا ، ولكن الكبير منها يهاجم الثدييات الكبيرة تبعا لأحجامها ، بل وتطاردها غيرها من الطير كما تفعل الصقور . البعض منها يتغذى على الزواحف والأسماك والبعض منها يكون ضارا بمصالح الإنسان ، أما الغالب فهو نافع وكفى بذلك هلاكها للفئران ولذا أطلق عليها (القطعة الطائرة) . قد يكون العش على سطوح المنازل أو أوكار الحيوانات الغائرة في الأرض . البيض من ٢ : ١٠ تظهر في ضوء الشمس كأنها بيضاء مصفرة أو محمرة . الأنثى تحضن بيضها نهارا ويشارك الذكر مع أنثاه في إطعام الأولاد التي تبقى طويلا في العشاش وغلا الليل بصراخها المشنوم وهو يشاء منها بدون سبب إلا أنه في مجرى العادة وهي بريئة من هذا لكل عاداته ، وهذا من الجهل وضعف الإيمان ، وجريا على تقليد سنة العرب القديمة الرذيلة . وتحتوي الرتبة على فصيلتين وهما : (Barn Owl) والثانية هي البومة الأصلية (True Owl) .

فصيلة استريمجيداي (البوم) Family (Strigidae)

لهذه الفصيلة ما للرتبة من خصائص ومميزات .

جنس البوبو (البوم الكبير) (Bubo) (Eagle Owls)

يحتوي هذا الجنس على مجموعة من البوم الكبير ، له زوائد ريشية في الرأس على هيئة القرون ، ويسهل رؤية الأذن فيه ، وللقدم والساق ريش يكسوها مع الأصابع ، وأطول قادمة تكون أطول من الخواقي . يقطن العالم كله ما عدا استراليا ونيوزيلند . تمتاز بضخامة أجسامها . نوع واحد منه في مصر .

بعفة الصحراء الغامقة المعتمة

Eagle Owl (Dark Desert Form.)

(Bubo bubo ascalaphus)

الوصف : طولها حوالي ٢٧ بوصة - انظر اللوحة (٣٥) شكل (١) .

الوطن : من الأوبد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في صحراء شمال إفريقيا من مراكش إلى مصر ، كذلك في صحراء سيناء وفلسطين وجنوب صحراء سوريا وشمال السودان ، كذلك في أهرام الجيزة وأطلال الآثار المصرية وبعض الواحات المصرية مثل سيوة والخارجة وفي وادي حوف قرب حلوان في جبال المقطم وبالقرب من دير سانت كاترين في سيناء .

مميزاتها وطبائعها : أكبر أنواع اليوم يشاهد في مصر بل وفي أوروبا كلها . صوتها تقريبا هكذا (U - hu) بصوت عميق يخرج الضم من أعماق الحنجرة . تستريح نهارا في مكان ظليل أو مظلم ولا تجرؤ أن تطير في الضوء . طيرانه بدون صوت . طعامها الأرانب الجبلية والطيور الصغيرة التي في حجم الحجل وكذلك الحيوانات القارضة كالفتران . الذكر كالأنثى .

توالدها : العش من رفيع الأغصان ويقايا النباتات ، توضع فوق صخرة أو على الأرض في كهف صغير أو حفرة مظلمة . البيض من ٢ : ٣ غبراء اللون توضع من فبراير إلى آخر إبريل .

بعفة الصحراء الشاحبة

Eagle Owl (Pale Desert Form.)

(Bubo bubo desertorum)

الوصف : طولها حوالي ٢٧ بوصة . انظر اللوحة (٣٥) شكل (٢)

الوطن : من الأوبد : تقيم طول السنة في الصحراء الكبرى الإفريقية شرقا إلى وادي النيل وجنوبا إلى السودان ، كذلك في جنوب فلسطين ووسط بلاد العرب . طبائعها ومميزاتها وتوالدها كالسابقة تماما . غير أنها أفصح لونا منها ، والأجزاء السفلى بها كثير من البياض مع خطوط كثيرة رفيعة منكسرة .

بعفة فلسطين

Eagle Owl (Palestine Form.)

(Bubo bubo aharoni.)

الوصف : طولها حوالي ٢٧ بوصة . انظر اللوحة (٣٥) شكل (٣) .

الوطن : من الأوبد : تقيم طول السنة في مناطق فلسطين وسوريا الشبه صحراوية . حصل على واحدة من العريش في ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨ ، هي الآن بالمتحف الحيواني بالجيزة ، كما حصل على اثنين منها قرب القاهرة .

مميزاتها : كالسابقة تماما . ومغمرة بالمناطق نصف الصحراوية المغشاة بشيء من النباتات الصحراوية كالأشواك وغيرها . تستريح نهارا على الأشجار . طعامها الشنار والأرانب الجبلية . الرأس وجوانب الرقبة بها خطوط معتمة بنية أكثر من البعفة المعتمة . مظهرها العام أغمق وأكثر علامات من السابقتين . لا توجد في الصحراء الحرة . لونها وسط بين الغامقة والشاحبة .

جنس (أوتوس) (Genus (Otus.)
(Scops Owl.) (الشبح) = (بوم الأشجار)

أجناس هذا الجنس كلها صغيرة الأجسام ، ولها زوائد ريشية على جانبي الأذان ولكنها ليست بارزة ، والأذن صغيرة نسبيا بيضاوية . لا يعم الريش كل الأرجل والسيقان بل البعض منها ، والأنواع المصرية فيها عارية تماما من الريش اثنان منه في مصر .

بومة الأشجار المخططة

Striated Scops Owl .

(Otus brucei.)

الوصف : طولها حوالي ٨ بوصة . انظر الصورة لوحة ٣٥ شكل ٤
الموطن : من الأوبد ومتجولة : تتوالد وتقيم في المواطن الوعرة من التركستان وبلوخستان إلى سوريا وكذلك في عرب الهند ويحتل في سينا .
مميزاتها وطياتها : بومة صغيرة لها زوائد ريشية على جانبي الأذنين ليستا واضحتين إلا إذا رفعها الطائر . تجلس معتدلة نهارا بقلب الأشجار والنباتات الزاحفة وغالبا بعكس الفرع التي هي عليه بحيث يصعب جدا رؤيتها . تطير عند الظلام لصيد الحشرات الخ . كل ريشها خطوط متكرسة نوعان في مصر .

بومة الأشجار المخططة الأوروبية

Scops Owl (European Form)

(Otus scops scops.)

الوصف : طولها حوالي ٧ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٣٥) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في جبال شمال غرب إفريقيا وجبال جنوب ووسط أوروبا وآسيا الصغرى وفلسطين . تقضى الشتاء في الحشوة والسودان وشرق إفريقيا والسنغال وغينيا .
في مصر : تشاهد في مصر في الربيع فقط بين ١٠ إبريل ، ٢ مايو . وقُل من يلاحظها لاختفائها نهارا بقلب الأشجار ولا تلاحظ إلا عند طيراتها . وشوهد قدر ١٤ واحدة واقفة على شجرة في وادي النطرون في ١ إبريل سنة ١٩٢٣ ، وكانت تدخل ليلا من شبابيك الفنادق في مصر ، واصطدمت بالمنارة قرب بور سودان في ٢٦ أكتوبر ، ولم تعرف بعد في سينا أو في غير هذه الأماكن .
مميزاتها : أصغر اليوم الذي يرى في مصر . تختفى نهارا واقفة بين أغصان الأشجار قرب الساق وتجلس معتدلة ويظهر قرناها . صوتها هكذا (hee-oo) طعامها الحشرات وصغار الفئران .

جنس آسيو (البوم المتوسط) الأقرن

Genus (Asio.) = (Eared Owl.)

هو بوم متوسط الحجم ، له زوائد ريشية على جانبي الرأس أشبه بالقرون ، أحيانا ترى وأحيانا لا تلاحظ . الأذن كبيرة . الجناح كبير نسبيا وطويل يمتد قليلا خلف الذيل أو يحاذي طرفه . أول قادمة تساوي السادسة أو أطول . ريش أصابع القدم ليس كثيفا يوجد منها حوالي ١٥ نوعا موزعة على أنحاء العالم وكذلك في جزائر المحيطات . تقطن الغابات وتعيش جماعات أو فرادى في غير فترات التزاوج .

تنام نهارا نوما عميقا وخاصة في عشاشها التي لا تفارقها إلا مرغمة وبعد عدة مرات من التهديد والإزعاج . صيدها ليلا . البيض في أى عش تجده دون بنائه ، وعدده ٤ عادة تحضنه الأنثى بمفردها ، بينما يعولها الذكر حتى تنتهي الحضانة ، ويجرس الذكر العش ويدافع عنه لدرجة الموت أحيانا . الشقان لا يختلفان . نوعان منه في مصر .

البومة القرناء الأوروبية

Long-eared Owl (European Form.)

(Asio Otus Otus.)

الوصف : طولها حوالى ١٤ بوصة . انظر لوحة (٣٥) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا النرويج وسردينيا وقورسيكا والبرتغال ، بل في كل الدنيا القديمة من الجزائر البريطانية إلى اليابان وشمال البحر الأبيض المتوسط .
وهي في جنوب أوروبا أكثر شتاء منها صيفا .
في مصر : تهاجر إليها شتاء ولكنها قليلة الملاحظة .

مميزاتها وطبائعها : تغشى مناطق الأشجار وخاصة الصنوبرية في شمال أوروبا وآسيا . لها زائدتان طويلتان من الريش ظاهرتان على جانبي الرأس . الأجزاء العليا بها خطوط رفيعة مكسرة تميزها عن الصمعاء الألى ذكرها بعدها . نحيلة الجسم للغاية . تجلس معتدلة قائمة . صوتها هكذا تقريبا (oo-oo) طيراتها ملتو للغاية أشبه بطيران الشنقب . الشقان متماثلان .

البومة الصمعاء الأوروبية

Short-eared Owl (European Form.)

(Asio Flammeus flammeus.)

الوصف : طولها حوالى ١٤,٥ بوصة . انظر لوحة (٣٥) شكل (٧)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا البلقان وقورسيقا وسردينيا وأيبيريا وأيرلندة وجنوب بريطانيا وشمال إيطاليا وشمال البلقان في منطقة جبال الألب . على أنها قد تتجول مصادفة إلى هذه الأماكن .
في مصر : شائعة في مصر في الاعتدالين وقليل منها يبقى بها لقضاء فصل الشتاء بها . فتشاهد من سبتمبر إلى أوائل إبريل وذلك في الفيوم ، وشوهدت في وادى النطرون في يناير ومارس وإبريل ، وتشاهد في الدلتا في مارس وإبريل .

مميزاتها وطبائعها : لها قرنان صغيران من الريش . مولعة بالأقاليم الخلوية ، المكشوفة والتلال وحتى الحدائق وأحيانا تتوارى نهارا بين أدغال نبات البطاطا والقطن وتقف على الأرض . وتشاهد بكثرة على شجرة السنط ، وإذا طوردت طارت من شجرة لأخرى . لونها العام أحمر رملى ، وهي في هجرتها فوق الماء تطير على علو شاهق ، فإذا ما رأت الأرض هبطت وطارت قريبة من سطحها . طعامها القوارض كالفتران والطيور الضعيفة والخنافس كغيرها . الأجزاء السفلى صفراء جلدية ليس بها خطوط بنية غامقة وليس بالريش خطوط رفيعة متكسرة . القرون صغيرة لا تظهر إلا عند الفزع . الذقن والجهة أصفر جلدى وليستايضاءتا اللون . وهي في هجرتها تحوم حول المنارات في الليلة المظلمة التي بها ضباب وتتحين الفرص لأكل ما يمكن أكله من بغاث الطير الذى يصطدم بالمنارات . الشقان متماثلان .

جنس (أثين) (اليوم الصغير)
Genus (Athene.)= (Little Owl.)

هو بوم صغير ليس له أى زوائد ريشية على جوانب الرأس ، صغير الأذن ، مستدير الجناح للغاية ، وساقه مغطى بالريش ، ومعظم أصابع القدم تارة مغطاة بشعر وأحيانا تكون عارية بدونه . وهو على ثلاثة أنواع في أشكال كثيرة منتشرة في معظم أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا جنوبا إلى الصومال والمناطق الشرقية والجنوبية من الصحراء الكبرى الإفريقية ، في مصر منه نوع واحد على شكلين مختلفين قليلا . قصير الجناح لا يصل لأكثر من ثلث ذنبه المستدير . وأطول قوادمه الثالثة . تتفادى الغابات الكبيرة ولكنها تؤم القرى المكتظة بأشجار الفاكهة ؛ كما أنها تتخذ لها مساكن في أعلى المنازل أو في المباني الخربة ، وهي جريئة لا تهاب الإنسان ولكنها لا تقترب منهم نهرا ، ومن الغريب أن الناس يخافونها ويتجنبون رؤيتها أو سماع صوتها ليلا إذ يعتبرون هذا الطائر البريء الجميل نذير شر وموت في أوروبا ومصر على السواء . وعما يدعو إلى الأسف أن بعض الأمم لم ترتق في تفكيرها ولم تتحول عن عقائد أسلافهم من أقدم العصور إذ تسيطر على عقولهم وتفكيرهم مثل هذه الشائعات والأساطير الخرافية المخترعة من قديم الأزل . فكثيرا ما نسمع في أوروبا - للأسف - وهي بلاد متحضرة - أقاصيص طريفة مخترعة من أن أناسا رأوا بعيونهم هذه الطيور وسمعوها وهي تدعو المرضى في منازلهم أو المستشفيات ليلا لتصحبهم إلى مقابرهم جثا هامة ، ولذلك اعتقد الناس في هذه الطيور البريئة المتهمة أنها دليل الخراب ونذير الموت ، والحقيقة أن غرف المرضى تكون عادة مضاعة والضوء يجذب طول الليل هذه الطيور إلى النوافذ التي يشع منها الصوت فتصطدم بها أو تقف على حافاتها وقد تصبح مصادفة في مواقعها هذه من النوافذ بضع صيحات ، فيترجم الناس أصواتها إلى ألفاظ من اللغة تنسق مع هذه الصيحات في الرنين ، ومع ذلك ورغم انتشار هذه الشائعة الواسعة المدى ، فهناك أقوام وبلدان عرفوا هذه الطيور فضلها فأحبوها وشملوها بالعناية والرعاية ، وأبعدوا عنها الأذى مثل اليونان وإيطاليا .

وهي تنظر نائمة طول النهار ولا تفارق مكانها إلا عند الغروب ، ونومها خفيف إذ يوقظها أية حركة فتفر في الحال . طعامها الفئران الصغيرة التي هي غذاؤها الرئيسي ، كذلك الجراد والحشرات فهي من أنفع الطيور للإنسان .

بومة شمال إفريقية الصغيرة
Little Owl (North African Form.)
(Athene noctua glaux.)

الوصف : طولها حوالي ٨/٧ بوصة . انظر اللوحة (٣٥) شكل (٨)
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة حيث تتوالد من مصر إلى شمال تونس (لم تشاهد في سيرينيكيا) ، كذلك تتوالد في شمال الجزائر وشمال ووسط مراكش .
في مصر : تقيم فيها طول العام داخل حدودها في الدلتا ووادي النيل بين المناطق الزراعية أو على حدودها ، كذلك في أعالي النيل حتى أسوان ولم تسجل في السودان . وهي كثيرة في الفيوم وشبهدت في الواحات الخارجة .



مميزاتها وصفاتها : لون الأجزاء العليا بنى شاحب ، والنقط على جوانب الرقبة تعمل طوقا . أجزاءها السفلى بنية مائلة للصفرة الخفيفة وإلى البياض على البطن . تشاهد بكثرة في الدلتا ووادي النيل وغالبا ما ترى واقفة على السدود وشواطئ المياه وأعمدة البرق أو الجدران أو الأشجار كالنخيل . تحصل على طعامها نهارا والبعض منها يسعى ليلا ، وإذا وقفت كان ارتفاعها حوالي ٨ بوصة من مكان وقوفها . وإذا خافت تمايلت أولا في طيرانها إلى أعلى وإلى أسفل ثم طارت إما إلى أعلى أو تحتفى في جحر . صوتها هكذا (hew) (هيو) . طيرانها متموج للغاية . طعامها السحالي والفراش وصغار العصافير والحيوانات الثديية الصغيرة وأولاد الطيور وقتلت مرة فقسمة كاملة لكنناكيت صقر الجراد (Kestrel) . الشقان متمائلان .

التوالد : تتوالد في فجوات الصخور والأحجار وثقوب جدران المنازل أو في قرار سدود العيون المائية أو الأشجار وضاف الأناجر . البيض من ٤ : ٧ لونها أبيض توضع من إبريل إلى يونيو .

بومة الصحراء الإفريقية الصغيرة

Little Owl (Saharan Form.)

(Athene noctua saharoe.)

الوصف : طولها حوالي ٨ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٣٥) شكل (٩)
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في منطقة الصحراء الكبرى من شمال إفريقيا قرب الساحل على البحر الأبيض المتوسط ، (من أعالي نهر الفرات إلى سوريا وفلسطين ومصر وتونس والجزائر ومراكش وجنوبا إلى إقليم الطوارح في الصحراء الكبرى الإفريقية
في مصر : تقيم من السلوم شرقا إلى مرسى مطروح ووادي النطرون ، وفي طريق القاهرة – السويس – وتلال المقطم ووادي خوف عند حلوان ، والواحات الداخلة وعند رفع قرب حدود فلسطين . وهي نادرة في سيناء .
مميزاتها : أفتح في لونها من سابقتها ، وأجزاءها العليا أشد في اللون الأحمر الرمل .

جنس استركس (الخيل)

Genus (strix) = Tawny Owl.

يمتاز بكبر جسمه أو يكون متوسط الجسم ، مستدير الرأس للغاية وكبيرة ليس له زوائد ريشية . الأذن اليمنى فيه أكبر بكثير من اليسرى ، مستدير الذنب والجناح ، أطول القوائم الثالثة . الأصابع مكسوة بالريش ماعدا نهاية أطرافها . ليلية تعيش فوق الأشجار ، مفيدة للإنسان حيث تأكل الفئران والحشرات الكبيرة وتصيد الواحدة منها كل ليلة أكثر من ١٥ فأرا مما يدل على عظم منافعها وخاصة للفلاحين والمزارعين ، وتطير أزواجا في فترات التزاوج ولا تبنى عشا بل تكفيها فجوة في جدار أو شجرة أو بين الحجارة لتضع فيها البيض المستطيل الذي يتراوح عدده من ٥ إلى ٧ بيضات . النقب مثلث الشكل ، وهي نموذج لليوم الصياع . هذا الجنس حوالي ٢٠ نوعا تمتد فوق كل الإقليم البلياركتك جنوبا إلى جنوب الصين وفوموزا وإلى أمريكا ولكن لا يوجد في جزائر المحيطات . نوع واحد منه في مصر .

البومة النحاسية (الحبل) Hume's Tawny Owl
(*Strix butleri*.)

الوصف : طولها حوالي ١٥ بوصة . انظر اللوحة (٣٦) شكل (١)
الموطن : من الأوبد : تقيم طول السنة في جنوب فلسطين ولكن ذلك نادر .
في مصر : من الأوبد . . تقيم طول السنة في سيناء وواحاتها خصوصا في وادي فيران ولكن ذلك نادر والعتور عليها يعتبر نادرا أيضا .
مميزاتها وطياتها : شاحبة اللون ، هي شكل البومة الأصحمية (Tawny Owl) ولكنها أفتح منها لونا وخطوط الأجزاء السفلى أقل من الأصحمية . طيراتها في اتجاه واحد وتظهر كأنها منهكة في شيء .
صوتها تقريبا هكذا هو (hue) تردده طول الليل تقف على الأشجار والأشواك الغليظة . متوسطة الحجم . ليس لها زوائد ريشية . تغشى كذلك المباني الضخمة . أجزاؤها العليا أحمر نحاسي ، لها خطوط وعلامات متعرجة بنية غامقة وأجزاؤها السفلى نحاسية أو رمادية ذات خطوط سوداء كثيرة . الشقان متمائلان .

جنس تيتو^(١) (يوم الأجران = اليوم الأبيض)

Genus Tyto = Barn or White Owl.

Barn Owl Family.

تعرف في مصر باسم (المصاصة) من صوتها كأنها تمص الماء كما يفعل الإنسان . متوسطة الحجم والحجم ، النقب مكتمل واضح ليس لها زوائد ريشية ، العيون صغيرة نسبيا ، طويلة الجناح ، والأصابع مغطاة بأهلاب خشنة . ليلية بحتة . عاداتها مثل غيرها من اليوم . تستريح نهارا على الأشجار بداخلها وفي فجوة مظلمة في المباني أو الصخور . عالمية الوجود ، نوع واحد منه في مصر على شكلين .

مصاصة البحر الأبيض المتوسط

Barn or White Owl (Mediterranean Form.)

or Screech Owl. (Tyto alba alba.)

اسمها كذلك (Screech Owl.) أي البومة الصارخة لأنها تصرخ ليلا بصوت كثيب يتشاهم منه الناس .

الوصف : طولها حوالي ١٣ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٣٦) شكل (٢)
الموطن : من الأوبد : تقيم طول السنة حول حوض البحر الأبيض المتوسط في كل شمال إفريقيا وكل أوروبا وغرب آسيا وجنوب شرقها والأمريكتين وأستراليا

في مصر : تقيم طول السنة فيها من أقصى شمالها إلى وادي حلفا ، كذلك في سيناء ، وتكثر في المنطقة الساحلية بين الإسكندرية والسلوم وشمال الدلتا وكل الواحات ووادي النطرون والفيوم . نادرة الإقامة في سيناء .

(١) تشمل العائلة Tytonidae على ١١ نوعا . تقطن كل العالم ماعدا كندا ، وتوجد في آسيا في الهند والهند الصينية فقط . وفي أوروبا كلها ماعدا اسكتلندا . المعروف هو ١٧ نوعا متفرعة من جنسين .

مميزاتها وعاداتها : ليلية بحتة ، لا يسمع لها صوت في طيرانها ، لها شهيق كما يحس الإنسان رحيق القصب يسمع ذلك ليلا وخاصة في فصل التوالد من الأولاد وذلك في المباني الخربة والمهجورة . هي أشهر البوم الذي يرى في مصر . اسمها كذلك البومة البيضاء لأنها أكثر البوم ميلا للبياض وخاصة في أجزائها السفلى ، وهي على شكلين ، الفاتح والمعتم ، واسمها كذلك بومة الأجران لأنها غالبا ما تقوم ليلا حول أجران الفلاحين تصيد منها الفئران والسحالي وابن عرس وصغار الدواجن . تختبئ نهارا بداخل شجرة أو في فجوة في المباني القديمة أو الحديثة . تصرخ ليلا بصراخ يتشام منه السامع هكذا تقريبا (Screech) ولذا تسمى أيضا البومة الصارخة . الشقان متمثلان .
التوالد : العش يتخذ في فجوة في أى مكان خرب مهجور ، وتضع الأنثى فيه بيضها مباشرة بدون عصى أو قش أو إجراء لعملية البناء ، عدده عادة هو ٥ بيضات ، يقف بعد حضانة شهر تقريبا .

المصاصة الإفريقية

(Barn or white Owl (African Form.)

(Tyto alba affinis.)

الوصف : طولها حوالي ١٨ بوصة . انظر اللوحة (٣٦) شكل (٣)
الموطن : من الأوابد : تقيم طول السنة في كل إفريقية من مستعمرة الرأس (كيتون) إلى السودان .

في مصر : نادرة الرؤية فيها .
مميزاتها وعاداتها : كالسابقة تماما إلا أن أجزائها العليا أشد عتيا من السابقة . أما السفلى فهي مغطاة بلون ذهبي يندران يميل إلى البياض ، وبه نقط . وهي أكبر قليلا من السابقة ، وساقها أطول ، وهي أقل من السابقة في الشعر في ساقها .

رتبة أكبترس (جوارح الطير) الصقريات

Order Accipitres = Falcons. = Falconiformes

Family (Accitridae) = Vultures & Hawks & Eagles & Harrers.

(Hawk Family)

تشتمل هذه الرتبة على كافة أنواع جوارح الطير ، وهي متوسطة الأحجام من بزة وصقور ومزرات وشواهين وبيادق ويؤيؤ ولزيق وحداة وباشق وكل ما هو قريب منها في جسمها ويحير على سلوكها وطباعها . وهي تقريبا عالمية التوزيع إذ يبلغ عددها في العالم من الصقور والنسور ٢٠٨ نوعا (١) ، وهي تصيدها نهارا ، قوية المنقار الذي هو قصير ويحتوي طرفه على سن معقوف حاد في الفك العلوى وينطبق على تجويف مقابل له في طرف الفك السفلى ، يملكه من تمزيق فريسته . وهي طيور مكنتزة باللحم ، كبيرة الرؤوس ، قصيرة الرقاب أو طويلة قليلا ، طويلة الأجنحة مدببتها ، أو قصيرة

(١) تحتوي الفصيلة Accipitridae و Hawks & Eagles على ٢٠٨ جارحا موجودة حاليا المعروف منها كله هو ٢٨٥ متفرعة من ٥٨ جنسا .

مستديرة في بعضها ، سريعة الطيران عند الحاجة ، صيادة ماهرة تستطيع أن تصيب فريستها إما على سطح الأرض أو فوق ظهر الماء أو وهي سابحة في جو الفضاء ، أو على متن الهواء ، على حد سواء ، وكذلك بين الغابات والأدغال أو في العراء ، وهي لا تأكل إلا ما تصيدها بنفسها ، جمّة الحذر ، لاتباب غيرها من الجوارح ، تهاجم الطيور الصغيرة والثدييات الضعيفة ، والبعض يُستخدَم كرياضة محبوبة . والكثير منها لا يبني عشه ، بل يتخذ أى مكان صالح ملائم كماوى يوضع فيه البيض الذى ترقد عليه الأنثى وذلك في مكان مرتفع على سطحه مثل صخرة مطلة على الأرض أو تنوء مشرف من حافة جبل أو تل ، أو في برج كنيسة أو في فجوة في مثذنة ، أو في أدراج عمارة عالية ، وتارة في الأدغال أو بين فروع الأشجار الكثيفة . ومتى تسنى لها البناء ، فإنها تستخدمه عدة سنين متوالية . والعش يبطن عادة بالأعواد اللينة ورفيع الأغصان والشعر وبعض زغب الإناث ، ويساهم الزوجان في إطعام الأولاد بينما ترقد الأنثى وحدها على البيض ، وهي أيضا تمزق بنفسها الفريسة للأولاد كي يتسنى لها تناولها ، ومن المعلوم أن الأم إذا ماتت ، نفق الأولاد وهلكوا جوعا على رغم وفرة الغذاء حولها في العش . وقد يختلف الشقان في اللون ، والأنثى عادة أكبر حجما من الذكر .

والقير موجود وظاهر الوضوح وبه فتحنا المنخر ، والبيض مائل للبياض أو الزرقة الشاحبة وبه نقط أو بدونها ، وهي طيور طويلة الساق ، والمنخر إما مستدير أو بيضاوى تغطيه أهلاب مقوسة .

(١) جنس الصقور الأصلية

Genus (Falco)

البزاة Falcon Falaks Family

لهذا الجنس ماللرتبة من خواص البزاة ومزايا ، وهي تمتاز أيضا بأن أطول قوامها الثانية أو الثالثة مع الثانية ، وعلى النصل الأنسى للأولى أو للأولى والثانية لطعة (بقعة) واضحة قرب طرفه . وهي توجد في موطنها في كل مكان من ساحل البحر إلى أعالي الجبال ، والغابات الكثيفة والمناطق الصخرية الجرداء ، كذلك في البرارى والمدن التي تعج بالسكان . وهي من الطيور المهاجرة والبعيدة التجوال ، ولا تتغذى هذه الطيور العالمية إلا على ما تصيده بنفسها من الحيوان وهي تفوق غيرها من جوارح الصيد مهارة في الصيد وسرعة الطيران وحذا في إصابة الهدف ، حتى إن بعضها لا يصيد الطيور والحشرات إلا وهو سابح في لجة الهواء ، وعلى متن الفضاء وهي تمثل في ذلك أشراف الطير بمنزلة أشراف الإنسان أصحاب العزة والسعادة ، والبعض منها يأكل الحشرات ، وبعضها لا تصيب فريستها إلا في الجو إذ لا تستطيع أن تحطط طيرا واقفا على الأرض ، وهي تعاف الجيف ولا تقر بها إلا إذا اشتد بها الجوع مثل عليّة القوم من الإنسان ، وهي قلما تأكل الفريسة في مكان صيدها ، ولكنها تحملها إلى مكان آخر ملائم . وهي تخرج للصيد في الصباح والمساء ، وعند الظهيرة تكون معدتها قد امتلأت من الطعام فتلجأ إلى مكان منعزل آمن تستريح فيه وتنام نوما خفيفا تقوم المدة أثناء بهضم ما فيها . وهي تستغرق ساعات طويلة في نومها أكثر من غيرها ولو أن ذلك يكون متأخرا ، لأنها كثيرا ما ترى في الجوف ساعات الغسق وعند دخول أول الليل . وهي تتجمع مع غيرها من الطيور أثناء الرحيل ، وتعيش أزواجا في فترات التزاوج تحمي أعشاشها من أى دخيل من غيرها أو من جنسها ، كما أنها تفضل أن

(١) تحتوي فصيلتها على ٥٨ نوعا Falconidae عالمية الوجود وذلك من ٧١ نوعا معروفة متفرعة من ١٢ جنسا وتسمى (البزاة) .

تغصب أعشاش غيرها من الطيور الكبيرة مثل الغربان وتحتلها ، وهي لا تعنى ببناء أعشاشها ، وتضع الأنثى البيض من ٣ : ٧ بيضات مستديرة الشكل ، حراء بنية ذات نقط صغيرة داكنة من نفس لونها ، وتقوم الأنثى وحدها بالحضانة ويعولها الذكر في تلك الأونة ونعدها يقوم الزوجان بإطعام الأولاد إلى أن تكبر ثم تدرب على تعلم الطيران . ومنذ أقدم العصور استخدم الإنسان الصقور في الصيد وكانت مضرب الأمثال ، والمفاخرة بين الملوك والأمراء ، بل ولها في الأدب مكان فسيح لم يأخذ الناس في الانصراف عن هذه الهواية إلا منذ القرن الثامن عشر ، ولا يسمح بالمجال في التوسع عن هذه الرياضة التي أخذها العرب ضمن ما أخذ من الشرق ، وحتى كانت رياضة الملوك والأمراء والنخبة الممتازة من الشعوب . وذكرت الكتب الكيفية التي كانت تدرب بها هذه الطيور ونقلها لك في اقتضاب من كتاب

طيور مصر تأليف النجومي والدكتور المنيرى وحسين فرج ومصطفى فايد صفحة ٣١٤ وهي :-
كان يدرّب الطائر أولا على أن يقف على قبضة صاحبه ويأكل وهو واقف فوقها ، وكان ذلك يقتضى أن يوضع قناع على رأس الطائر يحجب بصره ويمنع عنه الطعام مدة يوم كامل يأخذه بعده صاحبه فوق قبضة يده ويقدم له طائرا صغيرا ليأكله في هذا الوضع ، فإن لم يفعل ، أعيد القناع إلى رأسه ومنع عن الطعام يوما آخر ، وهكذا حتى يتعلم أن يأكل على يد المدرب ، ثم يدرّب بعد ذلك على أن ينتقل من أماكن قريبة طائرا لينزل على يد صاحبه ، وفي كل مرة يعطى طعاما وهو واقف على قبضة المدرب ، وبعد أن يتقن هذه العملية الأولى يؤخذ ليدرّب على عمليات الصيد ذاتها ، وذلك بأن يقذف المدرب في الجو طيرا صغيرا فينطلق وراءه الصقر - وقد ثبتت قبل ذلك في قدميه حلقة متصلة بخيط رفيع ليحال بينه وبين الفرار ، ولما يعود بالطائر إلى يد الرجل يدعه يأكل من صيده قليلا ثم يؤخذ منه ويعطى بدله طعاما آخر يأكله في مكانه من يد صاحبه ، ثم بعد ذلك يؤخذ منه الطائر الذي يعود به ولا يسمح له بأكل شيء منه ويقدم له بدله طائرا غيره حتى يألف أن يعود إلى صاحبه دون أن يمزق الصيد ، وتكرر هذه العملية حتى يألفها الطائر ويحذقها ، ثم يألف العود إلى يد الفارس وهو على صهوة جواده ، ويألف رؤية الرجال والخيول والصيد ويطمئن ويعتاد بمجرد رؤية طائر آخر أن ينطلق كالسهم من مكانه فوق يد الفارس الذي يتبعه بجواده ولا يلبث أن يعود إليه حاملا الطير بين مخالبه إن كان طائرا صغيرا ، أو يهوى معه على الأرض إن كان طائرا كبيرا كالعنز مثلا ، فيقدم الصياد ويمسك بالصقر ويمنحه طعاما شهيا مكافأة له .
أهـ (١) .

نعود إلى كلامنا : ويشتمل هذا الجنس على الشواهين الحقيقية وصقور الجراد الخ ، وهي عالمية التوزيع . يرى في مصر منها حوالي ١٤ جنسا . ومنها المهاجر ومنها المقيم .

(١) وفي كتاب (الرياضة البدنية عند العرب) لمحمد كامل علوي ص (١١) ما نصه : كان يمسك الباز بوضع شبكة على ارتفاع قليل من الأرض ثم يؤتى بيمامة صغيرة أو بطائر مماثلها يربط بالأرض تحت الشبكة ، فلا يكاد الباز يلمح اليمامة حتى ينقض عليها كالبرق الخاطف ، ولكن سرعان ما يتعرقل في الشبكة ويقع في الشرك . وعندئذ يخرج الصياد من مخبئه القريب من الشبكة ويبادر بتغطية رأس الباز برفراف من الجلد ليمنعه من الرؤية ثم يربطه في إحدى رجليه برباط من الجلد وبعد ذلك يضعه في غرفة مظلمة ويجمّعه أياما يعطيه بعدها قطعة من اللحم ويعوده تدريجيا على أن هذا اللحم لا يعطاه إلا بعد أن يسمع صوتا معينا يكون سماعه قبل تناول الطعام ، ويجوز أن يبقى الباز في النور مادام رأسه مغطى ، ولكن يتم تدريب الباز ، يؤتى به في الفضاء ويوثق حبل بالرباط الجلدي الذي في رجليه ثم يطلقه وراء حمامة بعد أن يرفع الغطاء عن رأسه ، وعندما يمسك الحمامة ، يدعوه صاحبه فيعود ، فإن عاد إليه فيها ، وإلا فإن صاحبه يشد الحبل الموثق به ، ويعطيه قطعة من اللحم ليأكلها . وبهذه الطريقة كان يدرّب الباز على عدم تمزيق الفريسة . وعند الصيد يحمل مطيع الباز ، ويقفه بكفوف من الحديد ليس فيها مواضع إلا للإبهام وللباقى الأصابع معا ، ويظل رأسه مغطى حتى إذا ما أراد صاحبه أن يطلقه للصيد رفع الغطاء عن رأسه فقط .

الشاهين الأوروبي^(١)
Peregrine Falcon (European Form.)
(Falco peregrinus peregrinus.)
Falcon Family

الوصف : طوله حوالى ١٥ بوصة في الذكر ، ١٨ بوصة في الأنثى . انظر اللوحة (٣٦) شكل (٤)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا حتى الجزائر البريطانية ، ولا يتوالد في أيسلندا .
في مصر : يشاهد فيها شتاء من أكتوبر إلى أوائل ابريل .

مميزاته وطبائعه : منزلته بين الطيور الجارحة كمنزلة أشرف الناس وعلية القوم بين زملائهم من عامة الشعب ، مديب الأجنحة ، غرور على الجسم ، أزرق اللون إردوازي في أعلاه ، أما أسفله فهو أبيض به خطوط متكسرة سوداء ، وصدرة مشرب بحمرة خفيفة في الذكر ، له خدان أسودان ، طيرانه سريع في اتجاه واحد تزداد سرعته عند الصيد فينطلق وراء فريسته كالسهم في الهواء حتى إذا أصابها لفقها قبل أن تقع على الأرض ثم ذهب بها إلى مكان آمن مطمئن لأكلها ، يحول في طيرانه في الهواء باحثا عن الصيد ولذا سمّاه الإنجليز (الصقر الجوال) (Peregrine Falcon) . صوته تقريبا هكذا (ek,ek,ek) يسمع من مسافة بعيدة . إذا مرّ فوق سطح الماء ورآه البط ، غطس البط في الحال سواء كان سابحا أم كان طائرا هبط إلى الماء ثم غطس خوفا منه أن يقتلها على جناح الهواء وكثيرا ما تؤول هذه المحاولة منه بالفشل . إذا جلس على أى مكان اتكا على أقدامه الخلفية وجلس منتصبا . الأنثى أكبر قليلا من الذكر وأقل في الخطوط .

شاهين سيبيريا
Peregrine Falcon (Siberian Form.)
(Falco peregrinus calidus.)

الوصف : طول الذكر حوالى ١٩ بوصة ، والأنثى ٢٠ بوصة تقريبا انظر اللوحة (٣٦) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شمال آسيا من غرب سيبيريا إلى كامتشاتكا ، ويقضى الشتاء جنوب المناطق المذكورة وفي مناطق أوسع من السابقة ، وحصل عليه شتاء من سيلان والملايو وفرموزا وغينيا الجديدة ، وفي إفريقية من مراكش والكمرون والسودان .
في مصر : حصل عليه صدقة من ضواحي القاهرة . ٢٧ يناير سنة ١٩٠٣ ومن العريش في سيناء في ٣ نوفمبر سنة ١٩١٨ م . وكذلك من بحيرة المنزلة .
مميزاته وطبائعه : الخد الأسود فيه أضيق من السابق ، وهو أكبر منه جسما ، والخد الأبيض يزداد في أعلاه ناحية العين إلى حوالى ١٠ مم زيادة أعلاه أكثر شحوبا ، وأسفله أقل في الخطوط . الباقي وطبائعه كالسابق .

(١) يسميه الأمريكان Duck hawk

الشاهين المغربي
Peregrine Falcon (Barbary Falcon) North African Form
(Falco peregrinus pelegrinoides.)

الوصف : طول الذكر حوالي ١٣,٥ بوصة . والأنثى حوالي ١٥,٨ بوصة . انظر اللوحة (٣٦) شكل (٦)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل شمال إفريقية شمال الصحراء الكبرى إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ، ومن مصر إلى بلاد المغرب غربا . يحل كذلك صيفا وشتاء على هضاب الصومال وإريتريا .

في مصر : يتوالد فيها صيفا وكذلك في قبرص وفلسطين . يتوالد قرب القاهرة وحلوان والأقصر ولا كذلك على الهرم الأكبر الذي يتوالد فيه الحر (Lanner Falcon) وربما توالد في الواحات الداخلة بميزاته : أصغر بكثير من الشاهين الأوروبي وهو صورة مصغرة له غير أن أجزائه السفلى أقل تقيعا من الأوروبي لونه بني رملي في قاعدة القنة والقفا ، والأجزاء السفلى برتقالية بها نقط خفيفة وخطوط متعرجة وهو قوي للغاية بالنسبة لصغر جسمه إذ يصيد الطيور الصغيرة والكبيرة مثل الحمام على جناح الهواء كالسابق .

توالده : يتوالد على الصخور ، العش من العصى الرفيعة بدون تبطين ، البيض عادة ٣ بيضات توضع في مارس ، والبيض به نقط بنية كثيرة يصعب رؤيتها وهي على الصخور . أحيانا يكون البيض ٤ بيضات

شاهين وسط آسيا

Beregrine Falcon (Central Asiatic Form.)
(Falco Peregrinus babylonicus.)

الوصف : طول حوالى ١٣ بوصة في الذكر ، أما الأنثى فهي حوالى ١٥ بوصة . انظر اللوحة (٣٦) شكل ٧

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في التركستان و صحراء جوى وشرق فارس وشمال غرب الهند . يقضى الشتاء في العراق والهند ، ونادرا في شمال شرق إفريقيا .

في مصر : يندر رؤيته فيها في هجرته شتاء لها أو تجواله .

مميزاته وطبائعه : يختلف عن المغربي بأن الحدود السوداء أضيق من المغربي ، والأجزاء السفلى أكثر شحوبا منه . رأسه أشد حمرة من المغربي . الباقي كالمغربي .

الحر النوبي

Lanner Falcon (Nubian Form.)
(Falco biarnicus tanypterus.)

الوصف : طول حوالى ١٧ بوصة . انظر اللوحة (٣٦) شكل (٨)

الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في مصر والسودان شرقا إلى ميسوبوتاميا وبلاد العرب وفلسطين وسينا . نادر في السودان .

في مصر : يقيم بها طول السنة حيث يتوالد فيها ، ولا يوجد غرب الاسكندرية أو واحات الصحراء الغربية ، على أنه يتوالد على سفوح الأهرام وقرب حلوان وتلال المقطم وقلعة محمد على والغديرات في سيناء .
مميزاته وطبائعه : أقل سرعة في طيرانه من الشاهين المغربي ، ولكنه يماثله في تركيب الجسم .
القنة صفراء قمحية (جلدية) . يندر أن يهاجم الطيور التي في حجمه بل يهاجم ما هو أصغر منه كالقبرة والأبلاق الخ . شديد الولوع بصيد الهداهد لأنها بطيئة الطيران ، أسهل من غيرها في صيدها . الشقان متماثلان .
توالده : تبيض الأنثى عادة ٤ بيضات بلون بيض المغربي تقريبا . ويبني العش في مارس وإبريل ويوضع به البيض .

صقر الغزال الغربي
Saker Falcon (Western Form.)
(Falco cherrug cherrug.)

الوصف : طوله حوالي ١٧ بوصة في الذكر ، أما الأنثى فطولها حوالي ٢٠ بوصة . انظر اللوحة (٣٦) شكل (٩)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شرق أوروبا وغرب آسيا . يقضى الشتاء في العراق وفلسطين وسوريا ومصر والسودان والحبشة .
في مصر : يشاهد شتاء ولكن بقلّة جدا من أواخر نوفمبر إلى أواخر فبراير .
مميزاته : هذا هو الصقر الذي يستخدمه البدو في الصيد . أهم ما يميزه رأسه المائل للبياض ذو الخطوط البنية ، وكذلك ظهره الأحمر الرمل . يغطي غالبا الصحارى والمناطق شبه الصحراوية ، ويتجنب الأشجار ويفضل أعمدة البرق وأسلاكه للوقوف عليها . يأكل كل شيء من حيوانات ثديية صغيرة وحشرات وطيور صغيرة . شجاع يهاجم الخبازي الكبيرة والأرانب الجبلية ، ويدخله الهنود في بلادهم إلى الغزال والكركي والحدأة والأوزة والبشون . الشقان متماثلان .

الصقر البهيم (صقر الغروب)
(Sooty Falcon.)
(Falco concolor.)

الوصف : طوله حوالي ١٢ بوصة في الذكر . انظر اللوحة (٣٦) شكل (١٠)
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة على سواحل البحر الأحمر وجزائره ، والصومال جنوبا إلى موزمبيق ومدغشقر ، كذلك في وادي النيل من دنقلة إلى الدلتا .
في مصر : يقيم فيها طول السنة في أزواج (الذكر في صحبة الأنثى) على طول الوادي من وادي حلفا إلى القاهرة وضواحيها كالجيزة والمعادي وحلوان والهرم ، ولكنه رغم وجوده نادر الرؤية ومشكوك في إقامته في مصر .
مميزاته : صغير الجسم ، في حجم صقر الجراد ولكنه أفتح لونا منه . يغطي الصخور العالية التي تطل على شواطئ جنوب البحر الأحمر في يوليو وأغسطس . يشاهد مثني عادة ، وتارة في جموع تتراوح

(١)



ص ٢٠٢

Merlin
(Central Asiatic F.)

(٢)



ص ٢٠٢

Merlin
(European)

(٣)



ص ٢٠٣

Red-footed Falcon (Western)

(٤)



ص ٢٠٤

Kestrel (European)
نادر جداً في هجرته لمصر

(٥)



ص ٢٠٣

Kestrel
(Egyptian)

(٦)



ص ٢٠٤

Lesser Kestrel
(Western)

(٧)



ص ٢٠٤

Lesser Kestrel
(Eastern)


(٨)



ص ٢٠٥

Golden Eagle (North African Form)

(٩)



ص ٢٠٦

Imperial Eagle (Eurasian Form)



Tawny Eagle (Abyssinian)

ص ٢٠٧



Steppe Eagle (Eastern.)

ص ٢٠٧



ص ٢٠٧

Greater Spotted Eagle.


نامض



ص ٢٠٨

Lesser Spotted Eagle

نامض



ص ٢٠٨

Verreaux's Eagle.

من ٢ : ٦ وأحياناً تصل إلى عشرة ، تحتشد على جزيرة صغيرة صخرية . به نقط بنية فاتحة . صوته كصوت صقر الجراد تقريبا ، وطيانه أشبه بطيران الشاهين . يخلق أحيانا فوق الكثبان الرملية لصيد الحشرات والفئران والسحالي . ينشط عند الغسق وأول الليل ولذا سمى (صقر الغروب) . شوهد وهو يصيد الخفافش على جناح الهواء . ويمكن رؤيته عند أولد فورت عند ممبسا في فصل التوالد مساء عند غروب الشمس في صحبة أنثاه وهما يطاردان الخفافش ويصيدانه بسهولة ثم يعودان إلى نتوء في بنيان لالتهام الفريسة وأكلها أشبهه في ذلك بالحوام الذي يقطن إفريقية الاستوائية والجنوبية (ماعدا مستعمرة الرأس) والمسمى (حوام أكل الخفافش) (Bat-eating Buzzard) . طيرانه أشبه بطيران البيدق (Hobby.)

توالده : يتوالد بين الصخور ، فيوضع البيض على قاعدة رملية بين شقوق صخرية على ساحل البحر الأحمر ، وعدده من ٢ : ٣ بيضات لونها كلون بيض صقر الجراد . الشقان متماثلان .

صقر اليونورا

(Eleonora Falcon.)

(Falco eleonorae.)

الوصف : طول الذكر حوالي ١٢ بوصة ، والأنثى حوالي ١٥ بوصة . انظر اللوحة (٥٠) شكل

(٣)

الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في جزائر البحر الأبيض المتوسط شرقا إلى كريد وقبرص وسواحل سوريا وآسيا الصغرى .

في مصر : شوهد مصادفة على سواحلها وفي سيناء .

مميزاته : أكبر من صقر الغروب ، لونه كله رمادي غامق مسود (١) ، ذقنه مائلة للبياض .

البيدق الأوروبي

Hobby (European Form.)

(Falco subbuteo subbuteo.)

Falcon Family.

الوصف : طول الذكر حوالي ١٢ بوصة ، والأنثى حوالي ١٤ بوصة . انظر اللوحة (٣٦) شكل

(١١)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شمال ووسط أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط وجزائره والقوقاز ، وشرقا إلى جبال أورال وغرب آسيا . يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية ، كذلك في الهند واليابان .

في مصر : شائع في الربيع من أوائل إبريل إلى منتصف مايو وخاصة في شمال الدلتا عند رشيد ، وكذلك في الحريف من ٢٠ أغسطس إلى أوائل أكتوبر ، ويكون في سيناء عند الطور في هذا الفصل أكثر من الربيع ، أما في الدلتا فيكون في الربيع أعم من الحريف .

(١) هو نوعان : نوع كله بني مسود ، وأرجله صفراء . ونوع آخر صورة مصغرة من البيدق Hobby غير أن ظهره غامق وليس مائلا للزرقة .

مميزاته وطبائعه : سريع الطيران للغاية إذا كان منهمكا في اقتناص فريسة على جناح الهواء مثل العصفائر الصغيرة ، وكذلك الحشرات كالجراد بأنواعه . أما في طيرانه المعتاد فيكون كباقي الطيور لا يسرع في طيرانه ويظنه من يراه أنه شاهين أوروبي ولكنه يميزه عنه لأول نظرة في طيرانه طول أجنحته وطوقه الأبيض . يتناول طعامه قبل غروب الشمس وبعد شروقها بقليل ، أما أثناء النهار فنجدته يستظل بفضة نخلة عالية في رأسها لهضم ما أكله في الصباح بين الغابات . ملء بالقمل الطويل مثل الحداة . صوته تقريبا هكذا (quii-ic) يسمع بصراخ إذا وقع مجروحا في قبضة الصياد . أهم ما يميزه وهو يبد المرء ، فخذاه ذواتا اللون الأحمر الطوي (كالأجر) ، وظهر ذيله الذي كله أزرق إردوازي بدون أية علامات فيه .

يؤيؤ وسط آسيا^(١)

(Merlin Central Asiatic Form.)

(Falco oesalon insignis.)

Falcon Family.

الوصف : طوله حوالي ١١,٥ بوصة . انظر اللوحة (٣٧) شكل (١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط آسيا إلى الصين واليابان يقضى الشتاء في قبرص وآسيا الصغرى وفلسطين ومصر وجنوب الهند وجنوب الصين .
في مصر : يرى فيها شتاء ، ولم يشاهد جنوبا أبعد من السودان ، ويرى من حوالي ١٦ نوفمبر إلى منتصف إبريل . لا يعرف في سينا .
مميزاته : هو أصغر شاهين مصري . طيرانه منخفض ولكنه في غاية السرعة والاندفاع . في كتاب الحيوان للدوميري يقول : (اليؤيؤ) كنيته (أبوريح) وربما كانت هذه التسمية لسرعته في طيرانه . يمتاز الذكر عن الأنثى بظهره الأزرق ، أما الأنثى فهي قريبة الشبه من أنثى صقر الجراد (Kestrel) . في غاية الشجاعة إذ يهاجم الدج الكبير ، والبكاشينة وأبا ظفر (Spur-winged Plover) أي القطقاط البلدي ، ولكنه عادة يأكل العصفائر كالفتاح والصعوزيعة على ما يأكله من حشرات . أطول قوادمه الثانية والرابعة وهما متساويتا الطول . له خط عرضي أسود قبل نهاية الذيل ، أما طرفه فيحتوي على خط أبيض . الذكر يخالف قليلا الأنثى .

اليؤيؤ الأوروبي

Merlin (European Form.)

(Falco oesalon aesalon.)

الوصف : طول الذكر حوالي ١١ بوصة . والأنثى حوالي ١٢ بوصة . انظر اللوحة (٣٧) شكل (٢)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شمال أوروبا شرقا إلى غرب سيبيريا ، كذلك في الجزائر البريطانية . يهاجر جنوبا شتاء .
في مصر : يزورها شتاء ولكن رؤيته فيها عندئذ نادرة .
مميزاته : أعظم بكثير من سابقه ويصعب التمييز بينهما في الحقل .
باقي طبائعه كالسابق .

(١) يسميه الأمريكان Pigeon Hawk واسمه العلمي Falco columbarius

الليزيق الغربى
Red - Footed Falcon (Western Form.)
(Falco vespertinus vespertinus.)

الوصف : طوله حوالى ١١,٥ بوصة . انظر اللوحة (٣٧) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شرق أوروبا (من شمال البلقان شمالا إلى حوالى خط عرض ٦٥° شمالا في فنلندا وروسيا) . يقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية جنوبا إلى داما رالاند .
في مصر : يزورها في الربيع بين ١١ ، ٢٩ مايو ، وفي الخريف بين ٧ ، ٢٨ أكتوبر ، وذلك في الدلتا ووادي النطرون ، على أنه رغم ذلك قليل المشاهدة ، ولم يعرف بعد في مصر العليا أو واحات مصر . على أنه شائع في الخريف في سيناء بين ٧ أغسطس ، ٢١ ديسمبر ، ولم يشاهد هناك في الربيع .
مميزاته : يشبه صقر الجراد ولكنه لا يجلق كثيرا في الفضاء مثله ، يميل إلى الطيران عند الغسق أكثر من زملائه من الصقور . يشاهد في أسراب متفرقة أثناء هجرته . طعامه السحالي والفرثان والحشرات . صوته كصوت صقر الجراد تقريبا هكذا ki, ki.. لون الذكر كله أزرق إردوازي وأرجله حمراء دموية . أنثاه شبيهة بأنثى صقر الجراد غير أن قنتها حمراء تقريبا كلون الطوب الأحمر أو البرتقال المحمر ، وأجزاءها السفلى حمراء رملية كلها على خط واحد ، وظهرها به خطوط رمادية .

صقر الجراد المصرى
Kestrel (Egyptian Form.)
(Falco tinnunculus tinnunculus.)
Falcon Family

الوصف : طوله حوالى ١٣ بوصة . انظر اللوحة (٣٧) شكل (٥)
الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة ويتوالد في كل أنحاء جمهورية مصر - من أقصى شمال الدلتا إلى وادى حلفا وشمال السودان ، كذلك في واحاتها الداخلة والخارجة والقيوم ووادي النطرون وفي سيناء . وهو كثير في مدينة دمهور . كذلك في جنوب بلاد العرب وشمال الصومال . وشوهد متجولا في جزيرة كريد وسردينيا ووادي نهر الأردن والسلوم وسنار وسوقطرة ومراكش .
في مصر : كلها كما ذكر .

مميزاته وعاداته : أشهر الصقور التي ترى في مصر أمام أعيننا على الإطلاق في كل مكان في المدن ، في القرى ، في الواحات - ما عدا الصحارى ، بالقرب من السواحل - يشاهد طول العام . وأكثر ما يرى هو في مدينة دمهور - واسم هذه المدينة هو اسم قديم هيروغلوفى مكون من مقطعين وهما (دمن - هور) ومعناها : دمن : أى بلد ، و(هور) أى الإله (حور - أو حوريس) وهو الصقر (إله السماء عند قدماء المصريين الذين لاحظوا كثرة في هذه البلدة ، فسموها على أنها بلده ، ويتوالى الأيام صارت ، (دمهور) إلى وقتنا هذا . يشاهد في أسراب صغيرة أحيانا عند بلدة بنى مزار تصيد الجراد الذى هو أهم طعامها والذى سمي باسمها ، وكذلك السحالي والفرثان الصغيرة بعد حصد الفلاحين لقصب السكر . وهو أليف ما لم يطارده أحد . يقف على النخيل والأشجار والمبانى وأسلاك البرق وأعمدتها . يخلق في الجو عادة ثابتا في مكانه على ارتفاع حوالى ٥٠ مترا يراقب فريسته على الأرض ، فإن وجدها هبط عليها ، وإن لم يجدها واصل طيرانه إلى مكان آخر . يأكل كذلك الضفادع وبعض الجيف . كثيرا ما يقف على رؤوس المآذن وأبراج الكنائس .

توالده : يتخذ العش في فجوات المآذن والكنائس والمصانع والمباني القديمة والحديثة وعلى الصخور وكل مكان ما عدا الأشجار . البيض من ٣ : ٥ عادة ٤ بيضات توضع من آخر مارس إلى أوائل مايو .
لونه به بقع بنية متفاوتة الحجم .
هذا الطائر عالمي التوزيع يوجد في كل الدنيا ما عدا الأمريكتين .

صقر الجراد الغربي الصغير
Lesser Kestrel (Western Form.)
(Falco naumanni naumanni.)

الوصف : طوله حوالي ١٢ بوصة . انظر لوحة (٣٧) شكل (٦) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في معظم انحاء الأقاليم المحيطة بشرق البحر الأبيض المتوسط (آسيا الصغرى وفلسطين وفارس والتركستان وجنوب روسيا) كذلك في أسبانيا والبرتغال (حيث هو كثير جدا في جنوب أسبانيا) . كذلك يتوالد في شمال غرب إفريقيا ، يقضى الشتاء في إفريقيا الاستوائية والجنوبية ، وقليل منه يبقى في مناطق توالده بدون هجرة .
في مصر : يشاهد في مصر وسينا في الربيع من أول مارس إلى أوائل مايو ، وعندئذ يمر شمالا في أسراب كبيرة فوق الواحات الداخلة والخارجة والقيوم ووادي النطرون وسينا والدلتا التي يبلغ فيها منتهى كثرتة من منتصف مارس إلى أواسط إبريل ، وشوهدت مئات منه عند قوسيا في ٩ مارس وكذلك في العريش في ٢ مارس ، وهو يكثر في الأيام الحارة من مارس وإبريل ، أما في الخريف فإنه يشاهد من آخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر ولكنه قليل الملاحظة ويندرؤ يته .
مميزاته : يشبه صقر الجراد السابق إلى حد كبير ولكنه أصغر منه يعوزه النقط السوداء التي في ظهر صقر الجراد المصري وذلك في الذكر . يشاهد في الحقول بكثرة في الأيام الحارة أيام تذكير (تلقيح) النخل في زمن (الدكار) ولذا يسمى عند أهالي رشيد (صقر الدكار) طعامه كالسابق .

صقر الجراد الشرقي الصغير
Lesser Kestrel (Eastern Form.)
(Falco naumanni pekinensis.)

الوصف : طوله حوالي ١٢ بوصة . انظر اللوحة (٣٧) شكل (٧) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في الهند وكينيا ، ويهاجر شتاء إلى جنوب إفريقيا والحبشة وإفريقية الاستوائية .
في مصر : نادر الوجود في هجرته أو تحواله .
مميزاته : اللون الأزرق في الجناح أكثر امتدادا من الغربي السابق .

جنس أكويلا (العقبان) العقابية
Genus (Aquila) = Egales.

Hawk Family.

يشتمل هذا الجنس على حوالي ١٤ نوعا منتشرة في كل قارات العالم ، وهي طيور ضخمة الأجسام ، بيضاوية المنخر أو مستديرتها ، قوية المنقار ، الذي في طرفه سنّة مسطحة ولكنها ليست حادة ، ولا يقابلها تجويف في طرف الفك السفلي مثل البزاة والشواهين والصقور السابقة . أول قادمة أقصر بكثير من الثانية ، والرابعة والخامسة غالبا هما الأطول ، وتوجد بقع كبيرة قرب أطراف الخمس

قوادم الأولى أو الست منها في التصل الأنسى . والريش في الساق يصل إلى أصابع القدم ، والذيل مستدير .

تغشى العقاب الجبال والصخور العالية والبرارى والغابات وتحوم فوق المناطق شبه الصحراوية أحيانا وتارة التي بجوار البحار أو المياه عموما ، وهى لا تغير مكانها إلا بعد أن يكمل غوها في مكانها وحتى تستطيع أن تنتقل إلى غيره من الأمكنة إذا اقتضى الأمر من قلة المؤونة مثلا فيه فعندئذ تتجول إلى مسافات شاسعة باحثه عن غيره إذ هى تتبع الرعاة أينما اتجهوا يقطعانهم . وتبلغ العقاب أوج عظمتها عندما تكون جائمة على عرش صخرة مشرفة ببصرها على الفضاء أو عندما تكون منتظية صهوة الجوى شاخصة ببصرها إلى الأرض إذ تبدو عليها بحق إمارات الملك وعظمة الأباطرة ولا غرابة في ذلك فقد سُميت (بملك الطير) كالأسد بين الحيوانات . أما سيرها على الأرض فهى لا تحسن السير عليها في نقل قدميها ، وإذا كانت طائرة وأبصرت فريسة عملت أولا دوائر في طيرانها في الهواء قبل نزولها عليها ثم هبطت بعد كسر جناحيها ثم أنشبت مغالبها في الفريسة وضربت بإحدى قبضتيها على رأسها ثم غرست برائتها في عينيها أولا كي تعمى حتى لا تستطيع دفاعا وذلك في الأرباب الجبلية والحملان الصغيرة بل الأطفال أحيانا ، وقد تهاجم ذوات الأنياب أحيانا مثل الكلاب والثعالب وغالبا ما يكون مصيرها الفشل في مثل هذا الهجوم ، وأقوى العقاب عادة هى عقاب البحر Sea-eagle التى تصبح بعد الانتصار صبيحة الظفر معلنة عن قوتها ثم أخذت فريستها من السمك مثلا وطارت بها إلى مكان حرز حيث تبدأ في أكلها من رأسها ، والطيور الكبيرة إذا وقعت في قبضة العقاب نرى أن العقاب لا تترك منها غير مناقيرها وفى أثناء تناولها الطعام نجدها جمة الحذر تتطلع حواليتها باستمرار ، ومن العجيب أنها تبتلع الطائر بريشه .

والأعشاش كبيرة تناسب أحجامها ، توجد إما فوق الصخور ، أو على رؤوس الأشجار الضخمة بين الغابات ، ويكون العش من العصى ، كبير الحجم ، قوى البنيان بحيث يحمل الأسرة كلها ، ويبلغ عرضه حوالى مترين وطوله حوالى ثلاثة أمتار ، وارتفاعه حوالى متر ، والبيض عدده بيضتان وغالبا بيضة واحدة ، وتقوم الأنثى بالحضانة التى تستغرق حوالى 40 يوما ولا تستطيع الصغار الطيران قبل ثلاثة أشهر .

العقاب الذهبية (شكل شمال إفريقية)

Golden Eagle (North African Form.)

(Aquila chrysaetos occidentalis.)

Hawk Family.

الوصف : طوله من ٣٢ إلى ٣٦ بوصة . الذكر أصغر من الأنثى .

انظر اللوحة (٣٧) شكل (٨)

الموطن : تقيم طول السنة حيث تتوالد في البرانس والجزائر ومراكش وتونس ومصر وسينا . (من الأوابد) .

في مصر : تقيم بها طول السنة ، وحصل عليها من تلال المقطم خلف حلوان في ديسمبر ويناير ، كذلك تقيم طول السنة في جبال سينا (جبل موسى وجبل كتارينا) .

مميزاتها : كبيرة الجسم ولكن الرخم Vulture أكبر منها حجما وهو النسر ، ولكنها أقوى منه بالنسبة لمخالبها ومقارها وشجاعته ، فهي بمنزلة الأسد بين الحيوان . - ريش الذيل في الناهض ثلثاه من أعلاه أبيض ومن الطرف بنى مسود معتم ، تأكل من صيدها لا من صيدها عادة ، وقد يضطرها الجوع إلى أن تأكل الجيف بمفردها ، أو بصحبة النسر والرخم . أشهى طعامها الأرناب الجبلية ، وقد تصيد الشنار والحجل على جناح الهواء بسرعة فائقة تشهد لها بالقوة وبراعة الصيد ، وهي في سينا تهاجم الحملان الصغيرة وتركلها بمخيلها الخلفى ، كما يعرف عنها أنها تخطف الكلب الصغير خارج خيمة البدوى . عظيمة الافتراس ، قد تسرق الأطفال أحيانا . تسبح في الهواء بعظمة الملوك وتظهر فيها أوائل القوادم أشبه بالأصابع المنفرجة . حاسة الشم عندها قوية للغاية حتى أنها لتشم رائحة الماشية من بعيد ثم تأتي محلقة فوقها كي تفترسها . ليس لها صوت تردده ، وقد يردد في أوقات مناسبة . لونها كله بنى ورأسها بنى ذهبي لامع وكذا الفقا والأكتاف ومن ذلك سميت بالعقاب الذهبية .

توالدها : في الجبال والتلال وتارة في الأشجار . البيض من ١ : ٢ لونه أبيض ، ويكون العش على حافة جبل بعيد جدا يصعب مناله ، ولأنثى أحيانا عشان أو ثلاثة تغير كل عام واحدا منها مع إضافة عصى إلى العش الذى تبيض فيه في عامة وقد يصل غور العش إلى ١٦ بوصة . والبيض مرة واحدة في العام .
في الناهض أثناء طيرانها يظهر بياض في قواعد باطن ريش الطيران في القوادم ، ويظهر كذلك بياض الذيل الداخلى .

ملك العقبان الأوراسي Imperial Eagle (Eurasian Form.) (Aquila heliaca heliaca.)

الوصف : طوله من ٣١ إلى ٣٣ بوصة . انظر اللوحة (٣٧) شكل (٩)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب شرق أوروبا ، وفي آسيا الصغرى ، ونادرا في قبرص - وشرقا إلى وسط آسيا وبحيرة بيكال . يقضى الشتاء في قورسيفيا والهند والعراق وسينا ومصر والسودان والحبيشة .

في مصر : يزورها شتاء من أواخر نوفمبر إلى أواخر مارس وأكثر ما يرى هو في الوجه البحرى والدلتا أما في جنوب القاهرة فهو نادر الرؤية . وشوهد في سينا قرب حدودها فقط . كما أنه يشاهد في فلسطين في معظم شهور السنة .

مميزاته : لونه كله بنى ويمتاز بالبقع البيضاء على الأكتاف في الجناحين في البالغ . ثقل الطيران . لا يتورع عن أكل الجيف رغم اسمه (ملك العقبان) الذى أخذ من عظمتته وهو سابع في لجة الجو ، ومع ذلك فنجد أنه يهرب من مطاردة غراب له أو حداة . يأكل كذلك الأرناب الجبلية . الذكر كالأنثى . الذكر يظهر فيه بياض أكثر في الرأس والأكتاف عن الأنثى .

العقاب الأصحمية الحبشية
Tawny Eagle (Abyssinian Form.)
(Aquila rapax raptor.)

الوصف : طولها حوالى ٢٥ بوصة . انظر اللوحة (٣٨) شكل (١)
الموطن : من الأوايد : تتوالد صيفا فى الحبشة والسودان وأرتيريا غربا إلى كردفان وشمال نيجيريا شرقا إلى الصومال وجنوب غرب بلاد العرب ، ويحتمل أنها نادرة الإقامة طول العام فى فلسطين .
فى مصر : تتجول أحيانا لها شتاء ولكن ذلك نادر .
مميزاتها : عقاب صغيرة ، تأكل الجيف ، لونها كله بنى بدون علامات .

عقاب السهول الشرقية
Steppe Eagle (Eastern Form.)
(Aquila nipalensis nipalensis.)

الوصف : طولها حوالى ٢٦ بوصة . انظر اللوحة (٣٨) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا خلال وسط آسيا والمغلايا وشمال غرب الهند ، تقضى الشتاء فى الهند والصين ، وفى إفريقية فى الحبشة وكينيا .
فى مصر : صيدت صدفة من دمياط فى ٢٠ إبريل سنة ١٩٢٨ .
مميزاتها : تأكل الجيف كالسابقة . لونها كلون السابقة تماما غير أن الذيل به خطوط عرضية ليست واضحة . أكبر قليلا من الأصحمية . تجتم غالبا على الأرض ويندر أن تصل فى طيرانها إلى مسافة عالية .

العقاب الرقطاء الكبرى
Greater Spotted Eagle
(Aquila Clanga.)

الوصف : طولها حوالى ٢٨ بوصة . انظر اللوحة (٣٨) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا فى شرق وسط أوروبا شرقا إلى فلسطين وتركستان والهند ومنشوريا . تقضى الشتاء فى شمال شرق إفريقية وجنوب آسيا .
فى مصر : هى أكثر العقاب المهاجرة شيوعا فى مصر حيث تشاهد شتاء فى الدلتا والفيوم فى أسراب ، وشوهدت منها حوالى ١١ عقابا فى ٤ مارس سنة ١٩٢٠ فى رشيد ، وحصل عليها كذلك قرب القاهرة ، والجيزة والطور فى سيناء .
مميزاتها : تأكل الضفادع والجراد الكبير والزواحف والسماك والطيور الصغيرة والحيوانات الثديية الصغيرة . ذات صوت مرتفع ترده وهى على جناح الهواء . البالغ لونه بنى ، والناهض به نقط بيضاء كبيرة ، لونها أكثر عتيا من الأصحمية وعقاب السهول ، وهى أصغر من العقاب الذهبية وملك العقاب . والردف أبيض بخلاف الصغرى فليس ردفها أبيض . الذيل قصير نسبيا .

العقاب الرقطاء الصغيرى

Lesser Spotted Eagle.

(Aquila Pomarina Pomarina.)

الوصف : طولها من ٢٤ - ٢٦ بوصة . انظر اللوحة (٣٨) شكل (٤)
الموطن : من القواطع : يتوالد في النصف الشرقى من أوروبا تقريبا لغاية آسيا الصغرى والقوقاز . يزور السودان شتاء ، وأحيانا فلسطين وسوريا وقبرص في نفس الفصل .
في مصر : تزورها شتاء من نوفمبر إلى فبراير ولكن بقلّة جدا . لم يعثر عليها في سيناء .
مميزاتها : كالسابقة تماما . أصغر قليلا من السابقة . أقل تبقيعا في النقط البيضاء من السابقة .
ثالث قادمة بطول الرابعة أو الخامسة تقريبا . وهي أفتح لونا من السابقة .

العقاب السوداء

Verreaux's Eagle.



(Aquila verreauxi.)

طولها حوالى ٣١ بوصة . انظر اللوحة (٣٨) شكل (٥)
الذكر حوالى ٣٠ ١/٢ والأُنثى حوالى ٣٢ ١/٢ بوصة .
الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في الحيشة والصومال وعلى طول الساحل من جبال البحر الأحمر لغاية جنوب إفريقية ، كذلك في السودان وإفريقية الاستوائية .
في مصر : صيدت واحدة من جبل عثاق في منطقة قنال السويس سنة ١٩١٦ . وتشاهد في سيناء أحيانا . وهي عموما قليلة الرؤيا في مصر .
مميزاتها : تغشى الجبال الشاهقة التي يتراوح ارتفاعها من ٤ : ٧ آلاف قدم وتحلق فوقها : جبلة اللون كلها سوداء لامعة ، ما عدا الردف فهو أبيض . طعامها الأرناب الجبلية وتبتل الصخر ، وهما طعامها الأساسى الذى يكثر في الصومال ، كذلك تفترس صغار الحملان ، بل والقردة الصغيرة ، وشوهدت وهي على ارتفاع حوالى ١٢٠٠٠ قدم .
التوالد : البيض ٢ عادة توضع على سطح صخرة عالية جدا منحدره صعب الوصول إليها ، عمق العش حوالى ٤ أقدام وقد يزيد على ذلك ، يطن بالعصى الرفيعة والمواد الناعمة الأخرى ويضاف إليه كل عام مواد جديدة . يبني العش عادة في الصومال في نوفمبر وديسمبر .

جنس (هيراتوس) (عقاب بونلى والمسيرة)

Genus (Hieraetus) = Bonelli & Booted Eagles

هذا الجنس قريب الشبه بدرجة كبيرة من جنس Aquila . تستوطن بكافة أنواعها القليلة أوروبا وآسيا وإفريقية . فتحت المنخر مستطيلتان دائمتا ، قصيرة المنقار . الأصابع والمخالب كبيرة بالنسبة لجسمها . قوية للغاية ، تتغذى على ما تصيده بنفسها ولا تقرب الجيف إلا نادرا ، وفيما عدا ذلك لا تختلف عن غيرها من العقاب في الطباع والعادات والصفات . اثنان منه مهاجران تزوران مصر في هجرتها لها .



عقاب بونلي البلياركتكية
Bonelli's Eagle (Palearctic Form.)
(Hieraetus fasciatus fasciatus.)

الوصف : طولها من ٢٦ : ٢٩ بوصة . انظر اللوحة (٣٩) شكل (١)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في جنوب شرق أوروبا ، وشمال غرب إفريقيا ، وكثير من جزائر البحر الأبيض المتوسط شرقا إلى آسيا الصغرى وفلسطين والهملايا والصين . تتجول في جنوب غرب أوروبا وسيلان وجنوب الهند والصومال .

في مصر : تزورها شتاء من سبتمبر إلى مارس ولكن بقلّة .
مميزاتها : تغشى الأشجار المنفردة في وسط فسيح الوديان والأراضي المكشوفة ، وكذلك تغشى التلال الصخرية والمستنقعات . وهي سفّاحة في غاية الشجاعة فقد شوهدت وهي تهاجم ذكرا من الدجاج الرومي ، تصيد كذلك الأسماك والزواحف والأرانب الجبلية . أنشط عقاب معروفة . يظهر في طيرانها بياض باطن الجناح وأجزاءها السفلى ، وتحدث صوتها من حفيف الأجنحة إذا انقضت من علوها على فريستها على الأرض ويخيل للرائي أنها ستتحطم من شدة سرعة هجومها . لها خطوط صغيرة في الأجزاء السفلى والصدر وريش الفخذ . تهاجم غيرها من العقبان وتبعدها عن طعامها ثم تستولى هي عليه . لونها عموما بني ، ومعظم القوادم لونها أسود . خط عرضي أسود في طرف الذيل مع خط أبيض صيق .

العقاب المسيرة (المتعلقة)

Booted Eagle.

(Hieraetus Pennatus.)

الوصف : طولها من ١٨ : ٢١ بوصة . انظر لوحة (٣٩) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شمال غرب إفريقيا وجنوب شرق أوروبا ، وفي آسيا الصغرى وغرب الهملايا وسيبيريا ويحتمل في فلسطين . تقضى الشتاء في جنوب إفريقيا .
في مصر : تزورها شتاء من سبتمبر إلى مارس وإبريل .

مميزاتها : هي أشبه بالحوام Buzzard منها بغيره ، طويلة الذيل ، وليس به علامات ، وعلى شكلين : نوع فاتح اللون ، وآخر غامق . صغيرة الجسم ، الشكل الفاتح نجد أجزاءها السفلى أغشية باطن الجناح كله أبيض ، أما النوع الغامق فكله بني تقريبا ماعدا الذيل فهو يميل إلى البياض قليلا (١) . قل أن تفارق الأشجار التي تترقب فريستها من فوقها مثل الحمام واليمام والدواجن كما أنها أيضا تصيد فريستها على جناح الهواء . الريش يكسو السيقان إلى قرب الأقدام ومن ذلك أخذ اسمها (المتعلقة) أي لابسة النعل أو الحذاء طيرانها سريع وخفيف إذا كان جائئا يظهر لون أبيض على الجناحين معا يكون حرف V

(١) أهم ما يميزه هو أن الذيل مثل ذيل حوام النحل به ثلاث خطوط عرضية غامقة .

جنس بُتُو (الحَوَام) والصقر الجراح

Genus Buteo = Buzzard.

Hawk Family.

أخذ هذا الاسم أى (الحَوَام) من عادته أنه يحوم في طيرانه حول الشئ . (انظر الملاحظات في صفحة (٣٩ - ١))
يستوطن هذا الجنس بكافة أنواعه كل أنحاء العالم ماعدا جزر الملايو وجزر المحيطات وكذلك استراليا .

تمتاز هذه الطيور بصغر المنقار البادى النقوس ويقصر مخالبها وتخلو ساقها (رستها) من الريش ، كما أن ذيلها قصير مستدير يغطيه الجناح عند انطباعه عليه ، عريضة الأجنحة ، أطول قوائمها الثالثة والرابعة والخامسة كما أنها أيضا كلها متساوية الطول ، وهي تحوم وتدور في الهواء في دوائر غير منتظمة كما تفعل بعض العقبان ، ثقيلة الطيران إذ همت به ، ولكنها لا تتردد أن تطير عندما يساورها الخوف أو القلق من أى مخلوق تشك فيه أنه يؤذيها ، وهي تجلس عادة قائمة وتقف على رجل واحدة قابضة الأخرى وذلك إما فوق صخرة أو على عمود البرق وسط الصحراء ، أو غصن في شجرة مكشوف يستطيع أن يشرف منها على المحيط الذى هي فيه . تطير ولا يسمع صوت لطيرانها ، تنقض على الفريسة من سماء علوها وتنشب مخالبها في الفريسة . وهي لا ترتفع في الجو إلا في فترات التزاوج ، وفي نهاية إبريل يأخذ الطائر في بناء عشه أو يلجأ إلى وكرك قديم ويحتله بعد إضافة مواد أخرى له من لوازم البناء . ويكون الوكر عادة فوق الأشجار أو في الغابات قريبا من سطح الأرض أو مرتفع ، والبيض من ٣ : ٤ مائلة للخضرة ذات بقع بنية فاتحة ، وتقوم الإناث وحدها بالحضانة ولكن الذكر تساهم معها في إطعام الأولاد .

طعامها الفئران والحشرات والديدان والأفاعى أحيانا وتهاجم كذلك الطيور المنزلية إن وجدت .
ليس للساق ريش مطلقا ماعدا في الحَوَام المسرول Rough-legged Buzzard
ثلاثة أنواع منها في مصر ، إحداها يقيم فيها طول السنة .

الصقر الجراح الغربى (Long-legged Buzzard (Western Form)

(Buteo ferox ferox.)

Hawk Family.

الوصف : طول الذكر حوالى ٢٤ بوصة ، والأنثى حوالى ٢٦ بوصة انظر اللوحة (٣٩) شكل (٤)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في أقصى جنوب شرق أوروبا إلى التركستان ومنغوليا والهند وشمال غرب الهملايا .
يقضى الشتاء في إفريقية الشرقية الشمالية وسهول الهند وجنوب بلاد العرب وشمال السودان من دارفور شرقا إلى النيل الأزرق ، وفي أريتريا وحدود الحبشة .
في مصر : يشاهد شتاء فيها وفي سيناء في أسراب لا تزيد على ٧ ، ٨ ، وحصل عليه من الدلتا والفيوم بين نوفمبر وأوائل مصر ، وفي سيناء في نوفمبر إلى فبراير .

مميزاته : له اسم علمي آخر حديث وهو (Buteo-rufinus) ، ثقیل الطيران ، شكله كشكل العقیان ، ولكنه بالطبع أصغر منها ، ذيله كله أحمر رملي على نمط واحد بدون أية علامات ، لونه أبيض ناصع تحت الجناح . لا يعمل زاوية في طيرانه مثل مزرة البطائح (Narsk Hanier) ينلر أن يطارد فريسته ولكنه يباغتها فجأة وينقض عليها بسرعة . طعامه صغار الطيور المزلية وأولاد الأرناب الجبلية والحشرات ويجمع بالعشرات على الحملان الميتة ويأكل ديدان الأرض والجيف والطيور المجرحة . سيقانه عارية من الريش وتظهر كأنها طويلة ولذا يسميه الإنجليز الحوام أبو سيقان طويلة كما هو في العنوان .

صقر شمال إفريقية الجراح Long-legged Buzzard (North African Form.) (Buteo Ferox cirtensis.)

الوصف : طوله حوالي ٢٢ بوصة ، في الذكر ، والأنثى حوالي ٢٤ بوصة . انظر لوحة (٣٩) شكل (٥)
الموطن : من الأوابد : يقيم طول السنة ويتوالد في مراكش والجزائر وتونس وسيرينكا ومصر إلى شمال الصحراء الكبرى الإفريقية .
في مصر : يقيم بها ويتوالد فيها وفي سينا ولكن قل من يعثر عليه .
مميزاته : هو صورة مصغرة للصقر الجراح الغربى . أجزاؤه السفلى شاحبة والذيل أكثر بياضا .
طبائعه كالسابق .
توالده : العش يتخذ على حافة صخرة عالية ، حجمه كبير ، البيض ٢ به علامات رملية وأحيانا بدونها . يوضع في مارس . عثر على كتكتين في ٤ إبريل سنة ١٩٢٣ على بعد ٢٥ ميلا شرق القاهرة وجمهما الكولونيل مينر تزهاجن .

الحوام المعتاد الآسيوي common Buzzard = Steppe Buzzard. (Central Asiatic Form.) (Buteo buteo vulpinus.)

الوصف : طوله حوالي ٢١ بوصة . انظر اللوحة (٣٩) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط آسيا وغرب سيبيريا ، ومن جنوب شرق روسيا إلى آسيا الصغرى وبلاد العرب وفارس والقوقاز ، أما في جنوب شرق إفريقية في السودان والحبشة جنوبا إلى الكاب فإنه يقضى الشتاء فيها وكذلك يشتر في بلاد العرب والهند .
في مصر : يشاهد فيها وفي سينا في الاعتدالين وأكثر ما يكون موجودا في الربيع في إبريل ، أما في الحريف فيكثر في سبتمبر . وشوهد صدفة شتاء في مصر ولو أن ذلك غير موثوق به .
مميزاته : هو الحوام المعتاد الذي نراه في الحقول والمزارع سابحا في الفضاء بمحوم في طيرانه على مسافة عالية ، ويرى فيه عندئذ بياض باطن الأجنحة من داخل القوادم . ذيله به خطوط كثيرة عرضية ، وله في طرف الذيل خط عرضي أسود كبير (انظر الذيل في صفحة ٣٩ أ.)

الحوام المسرول
Rough-legged Buzzard.
(Buteo lagopus lagopus.)
اسمه في أمريكا الشمالية
Rough-legged Hawk

الوصف : طول الذكر حوالى ٢٣ بوصة . والأنثى حوالى ٢٦ بوصة .
الموطن : من القواطع : يتوالد في شمال أوروبا وآسيا ، ويمر في هجرته جنوبا شتاء حتى يصل إلى
ممالك شمال البحر الأبيض المتوسط ولا يبعد عن ذلك جنوبا . انظر لوحة (٤٠) شكل
في مصر : يذكر نيقول في كتابه بأنه يشاهد في مصر في الاعتدالين ولم نجد ما يثبت ذلك . وهو
نفس الأمريكى المسمى Rough-legged hawk
مميزاته : يعرف لأول نظرة بساقه المكسوة بالريش الناعم الشعرى وكذلك بالبقعة البنية السوداء الكبرى
التي تغطي نصف أجزائه السفلى تقريبا . وباقي الذيل أبيض ليس به خطوط أو نقط وطرفه الخارجى
أسود عريض . وأطراف ريش الطيران أسود . كذلك بطرف ذيله بقعة فاتحة عريضة غامقة قليلا ،
وعلى باطن الكوع في الجناحين - كل كوع له بقعتان معتمتان عريضتان .

(١) جنس كِرْكُس (المزرات)

Genus (Circus) = Harriers.

Hawk Family.

أهم ما يميز هذا الجنس هو أن الوجه مستدير مثل وجه البوم ويرزمنه قليلا ريش ناعم ، يعمل
دائرة حول الوجه قليلة الوضوح وليس جسم المزرات غليظا مثل الحوام بل نحيل قليلا عنه . مستطيل
المنخر المغطى بشعر (أهلاب) ، طويل الساق رفيعة ، مسحوب الذيل ، العش على الأرض مباشرة ،
والبيض إما صافى اللون أو به بقع ضعيفة ، الأنثى طويلة الأجنحة والذيل ، تغشى المستنقعات
والبطائح الفسيحة وترى في أى وقت من النهار وهي تحوم فوق المروج الخضراء والأعشاب والمستنقعات
العشبية على ارتفاع حوالى ٢٠ قدما أو ما يقاربه ويحيل لمن يراها أنها حداة من بعيد ، إلا أن الفرق في
الذيل يميزها عن الحداة ، تأخذ فريستها من فوق سطح الماء أو الأرض ثم تأكلها وهي جاثمة على
الأرض . دائمة التحليق وتعمل في تحليقها زاوية منفرجة من جناحيها مع تدلى الأرجل .

طعامها الطيور المجروحة وصغار الثدييات والزواحف والحشرات ، والأسماك وكذلك السمك
الطيار كما شوهد ذلك في البحر الأحمر . على التوزيع ماعدا مناطق القطبين وجزر المحيط الهادى
ونيوزيلند .

ثلاثة منه في مصر .

(١) في المناطق القطبية من شمال أوروبا وأمريكا في الأطراف الشمالية صيفا .

والخط العرضى في طرف الذيل ، لا يوجد بعده خطوط عرضية رفيعة في باقى باطن ريش الذيل مثل الحوام
العارى (انظر صفحة ٣٩ - أ)
(لمنى) فنظر فوارق القوادم في لوحة ٤٧ - توجد في كل الدنيا ماعدا المناطق القطبية

مزرة البطائح الأوروبية
Marsh Harrier (European Form.)
(Circus oeruginosus oeruginosus.)

الوصف : الذكر طوله من ٢١ : ٢٢ بوصة . والأنثى طولها حوالي ٢٤ بوصة . انظر اللوحة (٤٠) شكل (٤)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا أقصى شمالها مثل شبه جزيرة اسكتلندا وأيسلند وأيرلندة والنصف الشمالي من بريطانيا تقريبا . البعض منها يقيم في جنوب أوروبا طول السنة وهي كثيرة في مستنقعات دلتا نهر الرون وشبه جزيرة أيبيريا . في مصر : تزورها شتاء من سبتمبر إلى آخر إبريل .

مميزاتها : تغشى البحيرات العشبية ذات القصب وتظل طول النهار سابحة فوق الماء ترتقب طيرا من طيور الماء مجروحا أو مصابا أفلت من الصيد فتراقبه حتى تظفر به ، مثل المراعى rails والغرابيط ، ويسمونها أهل البحيرات المصرية تسمية خاطئة باسم (حوام) ، وقد يظنها الصيادون أنها حداة ، مع أن الفرق بينها وبين الحداة ، أن ذيل الحداة مشقوق يعمل زاوية من وسطه منفرجة ، أما ذيل هذه المزرة فهو منحن قليلا . في أوائل شهر إبريل نجد البعض منها يغشى حقول القمح والبرسيم لصيد السماني المجروحة أو العصفور الأسباني المجروح أو المصاب . ليست شائعة في سينا لعدم وجود بحيرات أو مياه ، أما هي في البرلس وإدكو ، والمنزلة وباقي بحيرات مصر وكذلك في مياه الواحات والقيوم فتكون ملائمة لها . قد تأكل السمك .

ملاحظة : تقضى هذه المزرة الشتاء كذلك في الحبشة والسودان جنوبا إلى الترنسفال وفي الهند وسيلان وبورما والملايو .

مزرة الدجاج الأوروبية^(١)
Hen Harrier (European Form.) = Ring-tail.
(Circus cyaneus cyaneus.)

الوصف : طول الذكر ١٩ بوصة ، والأنثى ٢١ بوصة . انظر اللوحة (٤٠) شكل (٢)

الموطن : تتوالد في الصيف في معظم أوروبا (كلها ماعدا البلقان وإيطاليا وجنوب شرق أيبيريا والجزائر البريطانية) . وهي من القواطع ، ومتجولة أحيانا . تتوالد كذلك في اسكتلندة . تقضى الشتاء في إقليم البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى إلى السودان ، في شمال الهند والصين واليابان .

في مصر : تزورها شتاء وكذلك سينا ، فتصل في سبتمبر ثم تغادر البلاد في أوائل إبريل ، وهي قليلة الوجود .

مميزاتها : يمتاز الذكر بردفه الأبيض ولونه الرمادي الفاتح ، وقوامه السوداء ، أما الأنثى فردفها أبيض ، والبياض في الشقين في الردف أكثر من أى بياض آخر من غيره مثل أنثى مونتاج والمزرة البغشاء التي ردفها به قليل من الخطوط العرضية . باقى طبائعها مثل مزرة البطائح السابقة تماما . الأرجل صفراء .

(١) اسمها في أمريكا الشمالية Marsh Hawk أو Marsh Harrier وكذلك من اسمائها harrier Ring-tail

المزرة البغشاء

Pallid Harrier = Pale Harrier.

(Circus macrourus.)

الوصف : الطول من ١٧ : ١٩ بوصة . انظر لوحة (٤٠) شكل (٣)
الموطن : تتوالد صيفا في شرق أوروبا شرقا إلى آسيا الوسطى . تقضي الشتاء في كل إفريقيا حتى
الكاب .

في مصر : تزورها في جوع في الخريف ابتداء من أوائل سبتمبر ، ويبقى القليل منها شتاء فيها
والباقي يتم هجرته إلى بقية قارة أفريقيا حتى الكاب ، ثم تعود ثانية من الجنوب وترحل من مصر مع
من بقى من الأفراد في الربيع في أواخر إبريل ولا يبقى بعد ذلك شيء منها . وشهدت صدفة في يونيو
ويوليو ولكن لا راتبات بتوالدها في مصر . وهي كثيرة في الفيوم ووادي النطرون والواحات الداخلة
والخارجة . كما شهدت أيضا في سيناء .

مميزاتها : الذكر أفتح لونا من ذكر مزرة الدجاج السابقة كما يمتاز عنه بيباض صدره وليس رماديا
كمزرة الدجاج . ليس في جناحه خط عرضي أسود مثل مزرة مونتاج . والأنثى لا تفرق عن أنثى
مونتاج في الحقل غير أن طرف ذيلها أبيض واضح . طبائعها كغيرها من المزرات .

مزرة مونتاجو

Montagu's Harrier.

Circus Pygargus.

الوصف : الطول من ١٦ : ١٨ بوصة . انظر لوحة (٤٠) شكل ٥
الموطن : تتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا شبه جزيرة اسكندنافيا واسكتلندا وأيرلندا والبلقان
وإيطاليا وسردينيا وقورسика وصقلية .

تقضي الشتاء في كل إفريقيا من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها في الكاب وفي الهند .
في مصر : تشاهد فيها شتاء ولكن بقلّة جدا حيث هي أندر المزرات رؤية في أي مكان تهاجر إليه
أو تتوالد فيه . تأتي إلى مصر ابتداء من شهر سبتمبر ثم تغادر البلاد في أوائل إبريل .
مميزاتها : أنحل المزرات جسما . يمتاز الذكر بالخط الأسود في عرض الحوافي في الجناح ، وأجزاء
العليا رمادية غامقة عن زملائه وأجزاء السفلى بها خطوط بنية عسلية اللون . والأنثى لا تفرق عن أنثى
البغشاء وأنثى الدجاج . باقي الطباع والعادات كباقي المزرات السابقة .

جنس صقور الطيور (العصافير)

(Bird's Hawks)

Genus (Accipiter) (أكسيبيتر)

لهذا الجنس معظم المميزات التي لهذه الرتبة التي في صفحة ٢٢٦ حيث هي فرع من رتبة Acci-
pitres.

يشتمل هذا الجنس على الباز والباشق وهي صقور تصيد الطيور ، وهي تستوطن كل أنحاء العالم
تقريبا . وتتميز بأجسام نحيلة مستطيلة وبمناقير قصيرة بادية التقوس عارية من الأسنان والفجوات

المقابلة لها على الجانب الأسفل . ويكسو الريش فيها جانبي الرأس الصغير ، كما أن أهم مميزاتا قصر أجنحتها واستدارتها وطول الذنب نسبيا ، وكذلك طول الساقين وضعف الأقدام ولكن غالبها حادة ، وفتحات مناخرها مستديرة أو بيضاوية تغطيها الأهداب (الشعر) المقوسة . والبيض به بقع أو نقط كثيرة .
يوجد من هذا الجنس في كل أنحاء العالم حوالى مائة جنس . ثلاثة منها تشاهد في مصر .

الباز الأوروبي
Goshawk (European Form.)
(Accipiter gentilis gentilis)

الوصف : طول الذكر حوالى ٢٠ بوصة ، والأنثى حوالى ٢٣ بوصة ، انظر اللوحة (٤٠) شكل (٦) .
الموطن : يتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا الجزائر البريطانية والساحل الغربى لشبه جزيرة أيبيريا . شائع في غابات اسكتلندا وروسيا .
في مصر : يقضى الشتاء فيها ، وصيد منها في مارس .
مميزاته : هو صورة مكبرة للباشق الآتى ذكره ، أجزاء السفلى بها خطوط متوازية تقريبا ، وحدوده بنية ، وله خط أبيض جانبي واضح والظهر بى . وهذا في البالغ . أما الناضج فهو أفتح منه ولونا والخطوط في الأجزاء السفلى طويلة وليست عرضية ، تشق اللون الأصفر الشاحب . مغرم بالوقوف على الأشجار ، يصيد صغار الطيور كالعصافير عموما ، في غاية القوة حيث يصيد الأرناب الجبلية الكبيرة أيضا وهي تجرى بغاية السرعة على الأرض حيث يغرس المخلب الكبير في رقبة الأرنب ويقبض بالباقي على جسم الفريسة ثم يأكلها على الشجرة .

الباشق الأوروبي
Sparrow-hawk (European Form.)
(Accipiter nisus nisus.)

الوصف : طول الذكر حوالى ١٢ بوصة ، والأنثى حوالى ١٥ بوصة . انظر اللوحة (٤٠) شكل (٧) .
الموطن : يتوالد صيفا في كل أوروبا شرقا إلى غرب آسيا وآسيا الصغرى وفلسطين وسوريا . يقضى الشتاء في شمال إفريقيا وميسوبوتاميا وبلاد العرب ونادرا في السودان .
في مصر : شائع فيها طول فصل الشتاء وكذلك في سينا ، حيث يبدأ في هجرته لها من آخر أسبوع في سبتمبر ويبقى بها حتى آخر أسبوع في إبريل .
مميزاته : هو صورة مصغرة للباذ السابق ذكره . يختلف الذكر عن الأنثى اختلافا كبيرا ، إذ الذكر أجزاء العليا رمادية غامقة ، والسفلى عبارة عن خطوط عرضية كثيفة من اللون البرتقالى والأبيض . وذقنه بيضاء . والأنثى لها خط حاجبي أبيض لا يوجد في الذكر ، وهي أكبر منه ، وظهرها رمادى معتم ، وأجزاءها السفلى بيضاء بها خطوط عرضية معتمة تميل للسواد . يشاهد في أماكن الأشجار

والمستنقعات ذات الأدغال . وطياته كالسابق تماما . مغرم بصيد العصافير الصغيرة ، وإذا سمعت العصافير الدورية house-sparrows أو أحست بقدومه وكانت تصبح سكنت في الحال . قد يصيد الطيور الكبيرة مثل الحمام والبط والقطقاط الشامى . يطير قريبا من سطح الأرض وتارة يخلق في الجو ويعمل دوائر فيه .

الباشق الآسيوى

Sparrow-hawk (Asiatic Form.)

(Accipiter nisus nisosimilis.)

الوصف : طول الذكر حوالى ١٤ بوصة والأنثى حوالى ١٧ بوصة . انظر اللوحة (٤٠) شكل (٨) .
الموطن : يتوالد صيفا في سيبيريا من التركستان إلى مصب نهر أمور . يقضى الشتاء في الهند وجنوب الصين .
في مصر : نادر الوجود ، حصل عليه مينرتز هاجن عند جبل علبة في ١١ إبريل سنة ١٩٢٨ م وهو التسجيل الوحيد له في إفريقيا .
مميزاته : أكبر قليلا من السابق ، وهو يشبهه تماما غير أنه أكثر شحوبا (أفتح لونا) في أجزائه العليا في الذكر والأنثى .

باشق ليفانت

Levant Sparrow- hawk.

(Accipiter badius brevipes.)

الوصف : طول الذكر حوالى ١٠ بوصة . والأنثى حوالى ١٢ بوصة . انظر اللوحة (٤٠) شكل (٩)
الموطن : يتوالد صيفا في شبه جزيرة البلقان وجنوب روسيا والقوقاز وأرمينيا وآسيا الصغرى وشمال غرب فارس . يقضى الشتاء في جنوب غرب فارس ، وسوريا وفلسطين ومصر وسينا .
في مصر : يشاهد فيها شتاء ولكن بقلّة ، وحصل عليه من وادى النطرون في ٢٨ إبريل ، ومن الجزيرة في ١٨ سبتمبر ، وعند الأهرام في ١٩ مارس . وهو أكثر شيوعا في سيناء من مصر .
مميزاته : الأنثى أجزاؤها العليا أغمق من سوابقها ، والباقي أكثر شحوبا بالذكر . أما الذكر فهو أصغر من سوابقه ، وذيله أقصر . وأجزاؤه العليا رمادية دكناء والقوادم أطرافها سوداء ، والحد به صبغة حمراء رمالية في الأوروي ، أما في هذا فهو رمادي والأجزاء السفلى بيضاء ، بها خطوط متفاوتة على الصدر عرضية ، والبطن والفخذ نجد أن اللون الرملى الأحمر فاتحا فيها . باقى طباعه كغيره من سابقه .



Rough-legged
Buzzard.



Hen Harrier
(European Form.)



ص ٢١٤
Pallid Harrier.



ص ٢١٣
Marsh Harrier
(European Form.)



ص ٢١٤
Montagu's Harrier



ص ٢١٥
Goshawk (European)



ص ٢١٥
Sparrow-hawk



ص ٢١٦
Sparrow-hawk
(Asiatic Form.)



ص ٢١٦
Levant
Sparrow-hawk



ص ٢١٩
Black-winged kite



(١)

ص ٢١٨

Black-kite
(Egyptian)



(٢)

ص ٢١٧

Black-kite



(٣)

ص ٢٢٤


Osprey.
(Old World
Form.)



(٤)

ص ٢٢٦

Lammergeier or Bearded Vulture



(٥)

ص ٢٢٦

Egyptian Vulture
(African Form.)

جنس الحدأة (ملفوس)

Genus (Milvus.) = Kite.

Hawk Family.

هو جنس من الجوارح المتوسطة الأحجام التى فى حجم الحمام الكبير المألوف ، وفى حجم الحوام Buzzard غير أن ذيلها مشقوق يعمل فى وسطه زاوية ، كما أن أجنحتها أكثر تحديدا من الحوام . وبالفك العلوى سن مستديرة أو غير حادة ، كما أن منخرها ليس به شعر ومستطيل الشكل ، والساق قصيرة نسبيا يكسو الريش فيها إلى النصف تقريبا ، وأطول ريش القوام هما الثالثة والرابعة . وبيضها أبيض وهو من الطيور البطيئة الحركة البالغة فى الجبن مبلغا ملحوظا ، تحس الطيران وتستمر فيه إلى فترات كبيرة من النهار كما أنها ترى على ارتفاع شاهق وهى تتسنى قنة الجو ، ولكنها لا تحسن السير على الأرض ، كما أنها حادة البصر للغاية . طعامها الفضلات من الجيف وبما تراه ملقى على قواعد الطرق وأفنية الزرائب ، كما أنها تخطف كتاكيت الدجاج وتصيد الفئران إن تمكنت لها الظروف ، وبعضها يخطف أولاد الطيور ، وغيرها يحوم فوق سطح الماء فيخطف من فوقه الأسماك الطافية والضفادع ، كما أن البعض يأكل الحشرات والجراد والخنفسى والديدان وصغار الثعابين .

ويتخذ هذا الجنس عشه فى الأشجار عادة ، ولا يغيره كل عام بل يزيد عليه من مخلفات ما يجده من مواد البناء ، والبعض يتخذ على جانب كورنيش المنازل ، والبيض من ٢ : ٣ بيضاء مخضرة ذات بقع داكنة بنية ، وتحضن الأنثى البيض ويعولها الذكر حوالى أربعة أسابيع ، كما يشترك الاثنان بعد الفقس فى إطعام الأولاد .

ومن عجيب أمر الحدأة أنها إذا صيدت حية ووضعت بداخل قفص ، تصنع الموت فنجدها تنطرح على الأرض ساكنة لا حراك بها أو تقذف بنفسها - إذا كانت فى قفص كبير كالذى فى حدائق الحيوان - من مكان مرتفع قليلا إلى الأرض كي يتوهم الرائي أنها على شفا حفرة الموت ، ثم تكرر هذه العملية مرارا ، فإن لم تجد فائدة كفت عنها . أما إذا أخذت صغيرة فسرعان ما تعود حياة الأسر فى الأقفاس بل تألف صاحبها وأصدقائها . ويحل من هذا الجنس نوعان فقط فى الدنيا القديمة ، ويوجد منه فى مصر نوع واحد على شكلين مختلفين .

الحدأة السوداء الأوزوبية

Black Kite (European Form.)

(Milvus migrans migrans.)

الوصف : طولها من ٢٢ : ٢٤ بوصة . انظر اللوحة (٤١) شكل (٢)
الموطن : تتوالد صيفا فى كل أوروبا ما عدا الجزر البريطانية وشبه جزيرة اسكندناوة وشمال غرب فرنسا وهولندا وبلجيكا ، وما عدا كذلك جنوب اليونان بما فى ذلك شبه جزيرة المورة . وتتوالد كذلك فى شمال إفريقية شرقا إلى غرب آسيا وآسيا الصغرى والوسطى إلى بلوخستان وأفغانستان ، وتوالدها فى شمال إفريقية أوفى شمالها الغربى فقط .

وتهاجر شتاء إلى حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقية حتى خط الاستواء .

في مصر : تمر على مصر في أسراب قليلة في الربيع والخريف أثناء نزوحها إلى الجنوب .

مميزاتها : لونها بني غامق ، ويعمل ذيلها من وسطه زاوية متفرجة ، أعمق من الحدأة المصرية ، صوتها هكذا Whee عند الفرع ، وعند النداء (سبيى cyil) بذبذبة ، وتعرف بصوتها ، ومن الصعب تمييزها في الحقل من المصرية . المنقار أسود . تدوم في طيرانها وتصف ، طعامها الجيف وكتاكيت الأفراخ المنزلية وغيرها . جريئة فقد تخطف ما في يد الإنسان من لحوم إذا جاعت . بها قمل طويل الواحدة حوالي ١/٢ سم تقريبا يزحف على الإنسان إذا كانت بيده حية أو ميتة . تأكل كذلك الضفادع والجوزان وصغار الثعابين والسحالي وأحيانا السمك من فوق سطح الماء كما يشاهد ذلك في نهر النيل بالقاهرة . تبيت على الأشجار .

الحدأة السوداء المصرية

Black Kite (Egyptian Form .)

(*Milvus migrans Oegyptian.*)

الوصف : طولها من ٢١ : ٢٣ بوصة . انظر اللوحة (٤١) شكل (١)

الموطن : من الأوبد . ومتجولة أحيانا شتاء . تقيم طول السنة في مصر حيث تتوالد فيها ، وخاصة في الدلتا المصرية وفي منطقة قنال السويس ولا كذلك في غرب دمنهور . على أنها كثيرة في الفيوم وفي القاهرة ذاتها جنوبا حتى أسوان . ولا تشاهد في المدن الساحلية إلا متجولة مثل بورسعيد والإسكندرية ، على أنها شائعة الوجود في رشيد وضواحيها من القرى ، وشوهدت في وادي النطرون . وبعض الأفراد يتجول شتاء مهاجر إلى مستعمرة كينيا وبلاد العرب ، ثم تعود إلى مصر ثانية في الربيع للتوالد فيها . ولم يثر عليها في سيناء وربما تتجول إلى حوض نهر الأردن .

مميزاتها : في حجم الأوروبية تقريبا، وهي صورة منها طبق الأصل غير أنها ليست غامقة للغاية في أجزائها السفلى . والمنقار في البالغ أصفر اللون وليس أسود كالأوروبية ، أما في الناضج فلونه أسود . والخطوط السهمية على الضيق أضيق من الأوروبية حيث أن عرضها هو حوالي ٣ مم أو أقل ، أما في الأوروبية فيبلغ عرض هذه الخطوط ٥ مم تقريبا ، لونها العام مائل للحمرة البنية . الرأس ليس رمادي اللون للغاية .

توالدها : العش في أي مكان يراهي لها ، على حافة كورنيش منزل ، أو في رأس نخلة منعزلة ، ولكن غالبا ما يكون في الأشجار العالية مثل الكافور والكازوارين في قلب القرى والمدن ، وقد تحتل عشا مهجورا وتزيد في بنائه ، وفي شهر فبراير ومارس يطير الذكر والأنثى متتابعين متلاحقين في أعلى الهواء راسمين دوائر كبيرة القطر على شكل حلزوني مع ثبات الأجنحة استعدادا للتزاوج . العش يبني من العصي الرفيعة ، والبيض من ٢ : ٥ ، وعادة بيضتان أو ثلاث بيضات لونها أبيض أغبر بها بقع بنية غير منتظمة ، ويوضع البيض من فبراير إلى يونيو وتبيض الأنثى مرة واحدة في السنة ، والحضانة من ٢٤ : ٢١ يوما .

جنس إلانوس (الحداة سوداء الجناح) (الكوهية)

Genus (Elanus.) Black winged Kite

هو جنس من الجوارح أقرب شيها للصقور منه إلى الحداد ، غير أنها أكبر قليلا من صقر الجراد Kestrel وأصغر من الحداة . بيضاوية المنخر المغطى بشعر معتدل قائم لأعلى . قصيرة المنقار وبه انحناء قليل لأسفل ، وش الفك العلوى ليس حادا . أطول قوائم الجناح الثانية ، أما الرابعة فهي أقصر قليلا منها . مشقوقة الذيل . والشقان متشابهان . يكسو الريش أكثر من نصف الساق الأمامية . قوية أصابع القدم ، مزودة بمخالب بادية النقوش وحادة جدا . طويلة الجناح الذى يمتد خلف الذيل عند إنطباعه . ملساء الريش طوله . ريشات الذقن شعرية منتصبة تشبه الخصلة .

وهي في سلوكها وسط بين النسور واليوم ، فهي تنشط قبل شروق الشمس وبعد غروبها عندما تكون جوارح الطير قد آوته إلى أوكارها كما ترى أيضا في خلال وضح النهار . ترفع جناحيها بزاوية منفرجة في طيرانها على فترات عقب بضعة خفقات وتكرر ذلك باستمرار . ترى كثيرا واقفة فوق أعمدة الشواذيف في مصر وغيرها حتى هي مكانها المفضل للاستراحة عليها حتى أن بعض الفلاحين يدعونها (صقر الشادوف) . كما تشاهد كذلك فوق أعمدة البرق . تهبط من علوها أو مكانها على الفريسة ثم تعود بها إلى حيث كانت ، كما أنها تصيد الجراد في الجو وتأكله ، كما تأخذ أيضا الفئران من أماكنها وتأكلها في أعالي الأشجار وهي أهم غذائها ، كما أنها تأكل صغار الطير والسحالي . قليلة الوجود وقل أن تقترب من الإنسان . أعشاشها في مصر على أشجار الموالح والبرتقال خاصة وسط القرى ، ويتودد الذكر دائما لآنائه ويتعرض لمن يتصدى لها . البيض من ٣ : ٥ بيضات رمادية ذات بقع خضراء في الضوء . ومما يلاحظ عليها أنها إذا أخذت أفرانها وهي صغيرة وحسنت في الأقفاص فإنها تصبح اليفة كأي حيوان منزلي ويمكن للإنسان بعد ذلك أن يطعمها من يده . وهي على أربعة أنواع في إفريقية وجنوب آسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية . ويوجد في مصر منها نوع واحد فقط .

الكوهية (صقر الشادوف)

أو (الحداة سوداء الجناح)

Black - winged Kite . or

Black - shouldered Kite

(Elanus coeruleus Coeruleus)

الوصف : طولها حوالي ١٣ بوصة . انظر اللوحة (٤٠) شكل (١٠) .
الموطن : تتوالد صيفا في المساحات المزروعة ذات الأشجار المبعثرة في كل مكان أو حواف الغابات . وهي تقيم طول السنة في البرتغال . تتجول في غرب أوروبا شمالا إلى هولنده وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وفي أقاليم البحر الأبيض المتوسط . تقيم كذلك طول العام في كل أنحاء إفريقية وكذلك في الهند وسيلان وبورما .

في مصر : تقيم فيها طول السنة وخاصة الفريوم والدلتا جنوبا إلى أسوان .
مميزاتها وطباعها : هو نفس الكلام الذي قيل عنها في جنس الإنوس الذي في صفحة ٢٦٥ . وهي
لا تترك المناطق الزراعية مطلقا . أكتافها سوداء ، وأجزاءها العليا رمادية والسفل بيضاء والعين حمراء
قرمزية .

توالدها : العش عادة في أشجار الشوك على الأشجار المنخفضة يبنى من رفيع العصى ويطن
بالقش والحشيش اللطيف وتتل القطن . البيض عادة ٤ بيضات توضع عادة من آخر فبراير إلى إبريل .
وعثر على عشها في قناطر الدلتا والبيض به صبغة خضراء أو صفراء أو حمراء ثعلبية .

جنس الشميطة (عقاب بحر يبيض الذيل) هاياليايتوس

Genus Haliaeetus

يعد هذا الجنس من العقاب من أكبرهما جسما ، بل هي أكبرها على الإطلاق وأعظمها قوة ، تتميز
بقوة المنقار وضخامته وطرفه الحاد المدب ، وفتحنا المنخر يضاوq الشكل أو مستديرتان عاريتان من
الشعر ، ويمتانة الساق (الرسغ) المكسور بالريش إلى نصفه ، وبأصابعها المزودة بالمخالب الطويلة القوية
المقوسة كالمحاجن ، وبقوة الجناح العريض ، وأطول قوادمه فيه الثالثة ، وعند انطباق الجناح يصل
طرفاه إلى نهاية الذنب . الذيل متوسط الطول ، والريش مدب سهمي وخاصة على الرأس وأسفل
العنق . والذنب غالبا أبيض اللون وكذلك الرأس . والقوادم في الجناح أطول قليلا من الخواقي ، ومن
ثالث إلى خامس قادمة هي الأطول . الذيل قصير كشكل المروحة ، يوجد في الدنيا كلها ما عدا أمريكا
الجنوبية . واحد منه في مصر .

الشميطة^(١)

White - tailed Sea Eagle

(Haliaeetus albicilla .)

الوصف : طولها حوالي من ٢٧ : ٣٦ بوصة . انظر لوحة (٣٩) شكل (أ) . وطول الأنتى
حوالي ٤٠ بوصة .

الموطن : تتوالد صيفا في جرينلند وعلى طول الساحل الشمالي الغربي للنرويج وسواحل بحر
البلطيق ومالكة من جنوبه الشرقي ، كذلك في شبه جزيرة البلقان وسردينيا وقورسيقا . وقد تتجول
شتاء إلى سواحل وسط وجنوب أوروبا . تتوالد كذلك على سواحل البحر الأسود وشمال غرب أفريقية
وشمال آسيا وشمال الهند . وهي تزور أوروبا شتاء وشمال أفريقية الشرقية ، والهند واليابان .

في مصر : تزورها شتاء ولكن ذلك نادر ، وصيدت من وادي النطرون في ٢٨ فبراير سنة
١٩٢٨ م . ويمكن رؤيتها في بحيرات شمال الدلتا كالمنزلة وإدكو وقنال السويس والبرلس في ديسمبر
وفبراير ولكن ذلك قليل .

(١) يسميها الأمريكان Grey sea Eagle

مميزاتها : هي من الطيور الحاملة ولكنها بالغة القوة . وهي من طيور الشواطئ ولا تفارق الماء ، وترى داخل البلاد وعلى شواطئ الأنهار والبحار والبحيرات الكبرى الواسعة . وتقوم برحلات تطوف فيها العالم وقل من يراها لأنها تطير على ارتفاع شاهق ، أما الكبيرة البالغة فقلما تفارق مواطنها . تعيش جماعات في مستعمرات فوق صخرة مشرفة على الماء أو غابة نابتة من المياه ، وإذا اشتد القيظ عليها فإن جموعها تقضى الليل فوق الجزر الصغيرة على شواطئها وفي غاباتها وفوق أشجارها . وهي تصيد كل ما تستطيع قهره من حيوان كما أنها تصيد الأسماك غذاءها الرئيسى وتغوص وراء الماء إلى أعماق بعيدة من أجل هذا الغرض إذ هي تحسن الغوص والسباحة .

وأغلب الظن أن هذه الطيور تعقد زواجا يدوم العمر كله ، ورغم ذلك فإن على الزوج أن يدفع عن أنثاه هجوم الذكور الأخرى الأمر الذى يتطلب خوض معارك دامية ، فإن لم يتنصر الزوج فيها تعرض لفقد صاحبه . ويتخذ العش فوق صخرة ساحلية أو في الغابات النابتة وسط الماء ويكون العش فوق أعالي هذه الأشجار . وقطر العش كبير حوالى مترين وارتفاعه متر أو أكثر وتكون مهية لتأوى الزوجين سنين متعددة ويوالى الزوجان كل عام عملية إصلاح العش إذا دعت إلى ذلك الظروف . أما البيض فهو أبيض اللون كالجير (الجص) هما بيضتان توضعان في إبريل ، ويندر أن تبيض الأنثى ثلاث بيضات ، ولا يكمل نمو ريش الأولاد إلا بعد مرور ست سنين أو سبع سنوات حتى يصل الريش إلى قرب أصابع القدمين . ومدة الحضانة هي من ٣٥ : ٤٥ يوما . ومدة الإطعام هي ٥٠ يوما تقريبا . وتبيض الأنثى مرة في العام ، البالغ منها ذيله أبيض ، والناهض ذيله أسمر بني .

جنس برنيس (حوام النحل) Genus (Pernis) = Honey Buzzard

يتميز هذا الجنس من الحوامات بالثلاث خطوط العرضية السوداء في الذيل ، كما أن مقدم الوجه (الصدغ) ليس به شعر ، ومغطى بشبه ريش قصير . كما أن القير في غاية الطول يصل إلى معظم نصف المسافة على طول المنقار ، والمنخر عبارة عن شق مائل . أطول القواعد الثالثة والرابعة وهما متساويتان ، ويغطي الريش نصف الساق تقريبا . البيض كله مغطى بنقط واضحة حمراء . وهو جبان بطير من مسافة بعيدة ، ثقيل الطيران لا يعلو كثيرا عن سطح الأرض . وهو اسم على مسمى ، حيث أن النحل ويرقاته والزنابير والعسل أهم غذائه ، فهو لذلك يهاجم أعشاشها في الشجر ويفتك بها من بين الغصون . يأكل كذلك الحشرات وصغار الفريريات ، كما يأكل الثمار عند حارة القيظ (شدة الحر) وهو ينتزع شوكات النحل قبل ابتلاعها ويحميه ريشه الصلب وحراشيف أقدامه القوية من لدغات هذه الحشرات . يتخذ عشه في الغابات ويعمل الزوجان دوائر في الجو تمهيدا للترابح ، ويمكث الزوجان فترات طويلة في العش قبل أن تضع الأنثى بيضها . البيض عادة ٢ مستديرة مائلة للبياض بها بقع حمراء وبنية والحضانة من ٣٠ : ٣٥ يوما . والإطعام حوالى ٤٥ يوما موزع بأنواعه خلال أوروبا وإفريقيا ومدغشقر وآسيا عند المناطق الشمالية وكذلك اليابان وسيلان وجاوة وسومطرة . نوع واحد منه في مصر .

حوَام النحل الأوروبي
Honey Buzzard (European Form)
(Pernis apivorus apivorus)

الوصف : طولها حوالى من ٢٢ : ٢٥ بوصة . انظر اللوحة (٣٩) شكل (٦) ، وانظر الذيل في صفحة ٣٩ - أ بالمقارنة للعادى والمسروول .

الموطن : من القواطع : يتوالد في كل أوروبا ماعدا شمال اسكندناوة والجزر البريطانية وما عدا أيضا شمال غرب أيبيريا وجنوب شرقها وجنوب إيطاليا ، وما عدا صقلية وسردينيا وقورسيفيا . يقضى الشتاء في أفريقيا الاستوائية والجنوبية .

في مصر : يمر عليها في الربيع والخريف ، وحصل عليه من الدلتا في شهر يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر .

مميزاته : له كل المميزات التي في جنسه التي في الصفحة المقابلة (٢٧٠) وكذلك فإن أهم ما يميزه هو صغر رأسه ، وذيله أطول من ذيل أى حوَام آخر ، وتوجد بالذيل حزم عرضية سوداء واحدة قرب الطرف واثنان قرب القاعدة ومنقاره صغير بالنسبة لغيره من الجوارح : وهو على ٣ أشكال : شكل أصل به خطوط عرضية في أجزائه السفلى وهي بنية وصدره بني ، وشكل فاتح أبيض الصدر وله خطوط طولية قصيرة في أجزائه السفلى ، وشكل كله بني غامق . والخطوط العرضية السوداء في الذيل توجد في الثلاثة .

يحب الغابات ، أغلب طعامه وهو على الأرض ينذر أن يطير إلى مسافة بعيدة . صوته كالصغير يعمده مرارا . غالبا يمشى على الأرض ويجرى عليها وسبب تسميته أم النحل ان الصيادين رأوه وهو يهاجم خلايا نحل العسل ويمزقها كما أنه ينتزع منه يرقات النحل ويأكلها فظن الناس أنه يأكل العسل نفسه فسمى بذلك . يغشى الأدغال أطول من الحوام العادى .

جنس العقاب الصرارة (عقاب الثعبان)
كيركايتوس (عقاب قصيرة أصابع القدم)
Genus (Circaetus)

يتميز هذا الجنس من العقبان بأنها جوارح كبيرة الجسم ، عريضة الجبهة واسعة العينين ، بيضاوية المنخر ، عارية القسمة ، (الصدغ) من الريش ، ذات شعر مروحي الشكل قائم معتدل لأعلى وأسفل في مقدم وأمام العين ، طويلة الساق وعاريتها من جوانبه ومربعة في شبكته . ثالث ورابع قادمة متساويتان وهما الأطول ، طويلة الأجسام ، قصيرة الرقاب وهي على ٦ أنواع تستوطن أوروبا وآسيا وإفريقيا . ونوع واحد هو الذى يرى في مصر .

الصرارة (عقاب قصيرة الأصابع = عقاب الثعالب)
Short-toed Eagle = serpent Eagle (Mediterrean Sea form)
(circoetus gallicus gallicus)

الوصف : طولها حوالى ٢٥ : ٢٧ بوصة . انظر اللوحة (٤٣) شكل (١) ، (٣) اللوحة (٤) شكل (٨)

الموطن : من القواطع ، والبعض منها من الأوبد : وهى تتوالد صيفاً في ممالك البحر الأبيض المتوسط شرقاً إلى التركستان ومنغوليا وشمال الصين ، ومنها ما يهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان وأجزاء من بلاد العرب .

في مصر : يحتمل أنها تقيم طول السنة فيها وتتوالد بها ، على أن بعضها يمر عليها في الربيع كذلك ، وشوهدت في مارس في الواحات الخارجة والداخلية ، وعثر على عش لها في تلال المقطم خلف القاهرة في ٥ إبريل سنة ١٩٢٣ م به بيضة واحدة رآها مينرتزهاجن ، ويوجد بالمتحف الحيوانى بالجيزة أفراد منها صيدت من الفيوم ووادي النطرون ، وشوهدت كذلك قرب السلوم وشاهدتها في شمال رشيد قرب الفنار .

مميزاتها : يمكن رؤيتها غالباً في الصحراء أو الأقاليم شبه الصحراوية المحيطة بالدلتا والواحات . وهى أكبر من الحوام ، وتعرف لأول نظرة وهى في طيرانها من بياض باطن الأجنحة الذى يقابل دائماً الصدر من أعلاه الغامق المعتم ، كذلك بياض معظم أجزائها السفلى مثل العقاب النسارية . كما يرى كذلك الخط العرضى البنى المسود عند طرف الذيل ، (١) وكذلك أطراف القوائم السوداء ، والذقن البيضاء الواضحة ، كما أن بعض الأفراد تكون أجزاؤها السفلى بما فيها باطن الأجنحة - كلها بيضاء . للغاية بدون أى لون غامق في الصدر أو البطن . وهى تحب الاستحمام بحرية في الماء وتشرب منه ، ضخمة الرأس ، نظيفة الشكل ، حسنة الهندام ، أغلب طعامها الزواحف ، وخاصة الثعابين الصغيرة والحرياء ، وتطير من شجرة لأخرى حيث تمتطى قبتها ترأب منها غذاءها على الأرض وتارة تتوارى في ظل الأوراق كى تتجسس على فريستها التى تمسكها من بين الأغصان ، كما أنها تبتلع الثعابين الكبيرة من فوق سطح الأرض ، وشوهدت في سيناء وهى تهاجم السلحفاة . ساقها مربع الشبيكة وهو أهم ما يميزها ، تحب الغابات المنعزلة والبرارى البعيدة عن الشواطىء . وهى وجلة حذرة حول عشها ، كثيرة الصراخ وذلك في أوروبا ، أما في مصر وأفريقية فهى على النقيض لا يسمع لها صوت . لا ترى إلا في باكورة الصباح وعند الغسق فوق الأشجار ، وكثيراً ما تهاجم أضرابها من الجوارح لتسلبها ما في حوزتها من ثعابين وسحالي وضفادع وفئران ، كما أنها أيضاً تصيد الأسماك .

توالدها : تبنى عشها من العصى الرفيعة وتبطنه بالحشائش وأوراق الشجر ، والعش الوحيد الذى عثر عليه داخل الحدود المصرية كان على سفح جبل المقطم رآه مينرتزهاجن به بيضة واحدة ، وعادة يتخذ العش في الأشجار العالية وخاصة أشجار الصنوبر ، وتآوى إليه العقبان سنين متواصلة بعد ترميمه كل عام . وتضع الأنثى به بيضة واحدة تشوبها زرقة خفيفة ، ويساهم الزوجان في الحضانة التى تستمر ٢٨ يوم تقريباً .

(١) وبعده خيطان أسودان غير أنها ليسا ظاهرين مثل حوام النحل ولكن الذيل شبيه بذيل حوام النحل في ذلك .

جنس المنسور (العقاب النسارية)

بانديوم (Pandion) Gyenus

Osprey Family

(Osprey) = Fishing — hawk

هو الوحيد من نوعه في العالم ولا ثاني له في النوع الآخر يقطن هذا الجنس كل أنحاء الدنيا . قصير المنقار ، معقوف من مقدمته ، حاد التقوس مثل المحجن ، قوى الساق تكسوها الريش إلى نهايتها . الأقدام في منتهى القوة مكسوة بحراشيف شبكية قصيرة ، وأصابع القدم فيها هي أصبعان أماميان ، وأصبعان خلفيان - كما في البوم والساق قصيرة . وتكسو السطوح الداخلية من الأصابع طبقة قرنية خشنة ذات بروز صغيرة تستطيع أن تقبض بها على السمكة فلا تفلت منها . طويلة الأجنحة للغاية في هذه العقاب ، وأطول قوادمها الثالثة قصيرة الذنب بالنسبة للجناح . غزيرة الريش الأملس ، ضيقة المنخر ومائلته ، شبكية الساق مربعة وليست مستطيلة ، وبأصابع القدم بروزات شائكة جدا في أسفلها تغرسها في السمكة .

وهي عقاب واحدة على أشكال متعددة (١) تمتد من استراليا إلى بريطانيا ، ومن سيبيريا إلى رأس الرجاء الصالح ، وخلال أمريكا الشمالية والجنوبية وهي لا تقرب الجليف مادامت الأسماك موجودة وفي متناول يدها . وتحتوى العائلة Pandionidae على نوع واحد على شكلين ، يقطن كل الدنيا في قلب إفريقية في بحيرة فيكتوريا ونياسالاند ، ورأس الرجاء وسواحل البحر الأحمر وعدن وحضرموت وعمان وغينيا الجديدة وجزائرها . كذلك في آسيا وأمريكا .

المنسور = العقاب النسارية

(شكل الدنيا القديمة)




Osprey (Old World Form)

(Pandion haliaetus haliaetus)

الوصف : طولها حوالى من ٢٠ : ٢٣ بوصة . انظر اللوحة (٤١) شكل (٣) أو نقول طول الذكر حوالى ٢٢ بوصة والأنثى حوالى ٢٤ بوصة .
الموطن : من الأوايد : ومتجولة شتاء أحيانا : تتوالد في كل أوروبا وآسيا وإفريقية ، ولكن توالدها ووجودها بهذه القارات مقصور على وجود المياه من بحار وبحيرات ومحيطات ، مثل حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن وبحيرة فيكتوريا وأقصى شمال أوروبا من لابلاند وشمال روسيا جنوبا إلى أسبانيا وجزائر البليار ، وقورسيفيا وسردينيا واليونان وجنوب سواحل بلاد العرب إلى سيلان وفي جزائر سيليبس والفلبين .

في مصر : تقيم بها طول السنة حيث توالد بها ، فترى على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة ، كذلك في الفيوم ، ولكنها قليلا ما ترى في مياه شمال الدلتا مثل البرلس والمنزلة وإدكو ويندر أن ترى في نهر النيل .

(١) الفصيلة Pandionidae وهي تشمل جنسا واحدا على نوع واحد في العالم .



مميزاتها : من طباعها أنها تعيش عيشة منتظمة عائلية ، فهي تبارح الوكر متأخرة في الصباح ويتبع الذكر أنثاه في طريق المياه لصيد الأسماك ، ويقطع كلاهما من أجل ذلك مسافات طويلة وتكون هذه العقاب فوق مجال الصيد قرب وقت الظهيرة ، ومنى وثقت من الأمان أخذت تنخفض حتى تصبح على مسافة ٢٠ مترا تقريبا ترأقب عندئذ فريستها في الماء ، حتى إذا ما وقعت عينها على السمكة كسرت جناحيها وهبطت من علوها ، وقد تغطس تحت أطباق الأمواج لتطفو بعد فترة وقد أنشبت براثنها في جسم السمكة جاعلة معظم الثقل من ناحية رأس السمكة لحفظ توازنها وقد تلاقى أحيانا حثفها عند الغوص إذ تجذبها الأسماك الكبيرة إلى الأعماق ، ومن العجيب أن السمكة الطافية القريبة من سطح الماء إذا رأتها تستسلم لها ولا تخاف وتكون عندئذ ضحية لها وتأخذها برجليها فقط دون الغوص ، ويمجرد استحوادها على السمكة تذهب بها حالا إلى البر وتلقيها على الأرض أو مكان مرتفع فتختنق السمكة وتموت بطبيعتها وتقل مقاومتها للعقاب ، وعندئذ يسهل على العقاب أكلها . وإذا حلقت فوق الماء تستمر عادة من ٥ : ٢٠ ثانية تقريبا ، وبعد أخذ السمكة تحملها إلى شجرة عالية أو جبل أو كورنيش منزل مرتفع مثل ناطحات السحاب في الولايات المتحدة زيادة على الأرض . صوتها تقريبا هكذا (Killy) (كيلي) وهو صوتها المعتاد ، أما عند الغضب وحمولة السمكة فهو هكذا تقريبا (فش) (fish) ولو أنه لم يسمع في مصر . وهي تسمى في أمريكا (صقر السمك) (Fishing - Hawk) . وقد تهبط على السمكة من علو ٣٠٠ قدم أحيانا .

توالدها : العش عادة فوق الأشجار مكشوبا للسياة لتشرق منها على الفضاء وعادة يكون العش بجوار الماء ، وأحيانا يكون فوق الصخور العالية ، وقد يكون قطر العش حوالى مترا ويصل تجويفه إلى ٢ ¼ متر ، وتبيض الأنثى فيه واحدة كل يومين إلى أن يكمل ثلاث أو أربع بيضات ، وأحيانا بيضتين فقط . لون البيض أبيض بزرقة اردوازية أو بحمرة رملية أو قانية ، ويشترك الزوجان في الحضانه التي تتراوح بين ٢٢ ، ٢٦ يوما ، وقد يصل إلى ٣٥ يوما ، وإطعام الأولاد يستمر ستة أسابيع . وقد يسلط الله تعالى على عش هذه العقاب حيوان الولفرين Volverene المسمى أيضا Glutton الذى يجيد التسليق إلى أعلى قمة الشجرة ويلتهم الأولاد .

وحصل على بيضها من ساحل البحر الأحمر وجزائره في فبراير ومارس من الصخور العالية . وشوهد العش في زيلع وقد بلغ علوه عن الأرض بمقدار ٤ أقدام ، ويبعد العش عن الساحل بمقدار من ٣٠٠ : ٢٠٠٠ قدم .

جنس (العقاب الملتحية) جيبايتوس Genus (Gypaetus.) = Lammer geier. Hawk-Family

تمتاز هذه العقاب بأن المنخر فيها يضاوى الشكل مائل الوضع ومغطى بشعر كثيف ، وبالجبهة ريش أشبه بالشعر أو الزغب ، كما أن لحيتها طويلة تصل إلى ما تحت الفم أو طرف الفك العلوى . ومقارها قائم على الحافة العليا يكون غدة كبيرة أو صغيرة ، وجناحها في غاية الطول . وأطول قوادمها الثالثة ، وذيلها مروحي الشكل مسحوب . وهي عقاب قوية ولو أنها على كبر جسمها جبانة إلى حد ما . يتكون الذنب فيها من ١٢ ريشة ، وتحيط بقاعدة المقار خصل من الأهلاب متجهة إلى الأمام . وهي

عقبان جبلية لا تفارق الجبال ولا تبارحها حتى تصل إلى قممها التي تغطيها الثلوج ، وهي لا تخرج للصيد إلا بعد أن ترتفع الغزاة (الشمس) في وسط السماء (كبد) ثم تعود إلى عشها قبيل الغروب ، وقد يصحب الذكر أنثاه في هذا التجوال . طعامها الجيف ، كما أنها تكسر العظام كما يفهم ذلك من عادتها إذ تحمل العظام بأرجلها ثم تلقى بها على الجبال فتتكسر ثم تأكل ما بها من النخاع . وهي تستعمل العش سنوات عديدة . البيض واحدة وأحيانا بيضتان عكر اللون عليه بقع رمادية أو رمادية محمرة .

العقاب الملتحية

Lammergeier or Bearded Vulture .

(Gypaetus barbatus .)

الوصف : طولها حوالي من ٤٠ : ٤٥ بوصة . انظر اللوحة (٤١) شكل (٤)
الموطن : من الأوابد : تقطن وتتوالد في جبال جنوب أوروبا وجزائر البحر الأبيض المتوسط إلى شمال غرب إفريقية وآسيا الصغرى وفلسطين وفارس والهملايا إلى غرب الصين . كذلك في الحبشة ، وجنوب إفريقية ، حيث تقيم طول السنة في الأماكن المذكورة .
في مصر : نادرة الرؤية على تلال المقطم وجبال البحر الأحمر ، ولكنها أكثر رؤية على جبال شبه جزيرة سيناء .

مميزاتها : من أعظم الجوارح جسما ، إذ يبلغ امتداد الجناحين حوالي ثلاثة أمتار ويضع الستيمترات ، تحلق دائما على ارتفاع شاهق فوق الجبال ، الذيل وتدي (مخروطي) . تهاجم الحملان والماعز أحيانا ولكنها تكون في غابة الجبن في البر طعامها الجيف أيضا والثدييات الصغيرة التي تكسر عظامها بمنقاره الضخم ، أما العظام الكبيرة فتأخذها برجلها وتحلق بها على ارتفاع شاهق ثم ترميها على صخور الجبال ، لكسرها ثم تأكل نخاعها ، ولذلك تسمى أيضا «كاسرة العظام» وهي أليفة جدا حول معسكرات الجنود في الهملايا . وشوهدت وهي تحلق في الجو فوق قمة إفرست التي يبلغ ارتفاعها ٢٩٠٠٠ قدم حوالي ٨٨٨٢ مترا . تعرف كذلك بالشعر اللحي المتدلي من أعلى المنقار .

توالدها : العش على جانب سلسلة جبال صخرية في مكان يصعب الوصول إليه ، تضع الأنثى به من بيضة إلى بيضتين ، بيضاء رائقة أو بها علامات داكنة بنية .

جنس الرخمة المصرية

Genus Neophron. نيوفرون

Hawk Family

هي النوع الوحيد في العالم من جنسها تمتاز هذه الرخمة بأن منقارها طويل ورفيع تقريبا ، والقرير ملحوظ ، والمنخر مستطيل وليس مائلا وهو عار تماما ، والرأس وخاصة من مقدمها عارية من الريش ما عدا زغب قليل ينتشر لها ، وبالرقبة طوق من الريش الشعري طويل ملحوظ . أول قوادمها الثالثة . الذيل مسحوب ومكون من ١٤ ريشة . الذكر والأنثى متشابهان ، أما الناهض فهو معتم اللون مختلف .

يستوطن هذا الجنس بكافة أنواعه جنوب أوروبا ، وإفريقية وأواسط آسيا الغربية والهند .

نوع واحد منه في مصر .

الرخمة المصرية الإفريقية
Egyptian Vulture (African Form)
(Neophron percnopterus percnopterus)

الوصف : طولها حوالي ٢٦ بوصة . انظر اللوحة ٤١ شكل ٥ .
الموطن : من الأوابد ، والبعض منها من القواطع والبعض متجول : تتوالد صيفا في كل أفريقية شرقا إلى التركستان وشمال غرب الهند ، وفي جنوب أوروبا المطل على البحر الأبيض المتوسط حيث يهاجر بعضها له ، كما أن بعضها يتجول صيفا إلى وسط أوروبا وغربها ، وهي تقيم طول السنة في مواطن توالدها ، كما أنها تتوالد وتقيم أيضا في جزائر قناريا والرأس الأخضر وعلى طول سواحل البحر الأحمر من شرق أفريقية والحيشة وبلاد العرب ، وفي العراق ، ولكنها نادرة في شمال غرب أفريقية .

في مصر : تقيم طول السنة في القيوم ووادي النطرون والواحات الداخلة والخارجة وسيوه وحول الجيزة وجنوبها عند الحوامدية والبدرشين والمناطق الصحراوية الرملية والصخرية على طول وادي النيل إلى الجنوب ، وكذلك في سينا . وكانت قديما شائعة بكثرة في الأراضي الزراعية ولكنها الآن أصبحت نادرة الوجود فيها .

مميزاتها : تعرف بوجهها العاري من الريش ، وبالريش الكثيف خلف الرقبة ، ولون الذكر أبيض وكذلك الأنثى ، والقوادم والحواف في الجناح لونها أسود . أما الصغير الناهض فلونه كله بني معتم . تصف دائما في طيرانها (تنصبها) للرياح بدون تحريك ، وقد كانت هذه الرخمة في شبه جزيرة سينا تسبح في الهواء على علو خمسة آلاف قدم فوق جبالها والشمس تسطع على ريشها الأبيض ، وظنتها الجيوش طيارات العدو فصبوا إليها فوهات المدافع ولم يوقفهم عند هذا إلا صدفة تحريك أجنتها . الذيل وتدي (مخروطي)

طعامها الأساسي الجيف ، لا تهاجم الحيوانات الحية مطلقا ، ترى بكثرة في مذابح مكة أثناء الحج وتقرب من الحجاج فتتجمع على فضلات ودماء ما يذبح من الأغنام . أهم ما يميزها وجهها الأصفر وأقدامها الصفرة .

توالدها : كانت قديما تبني عشها في القاهرة والمقطم ولا كذلك الآن . تتخذ العش إما على الأشجار أو الصخور العالية ، يبني من العصي والزبالة ، تضع الأنثى بيضتين في مارس وإبريل ، لونها بيض قدر عليها بقع بنية ، والحضانة من الاثنين وفترتها ٤٢ يوما تقريبا .

جنس الرخمة السوداء (نكروسيرتس)

Genus (Necrosyrtes)

Hawk Family

لا يختلف جنس هذه الرخمة عن المصرية السابقة ، رفعة المنقار طويلته ، طويلة القير ، مستطيلة المنخر وليس مائلا وخال كلية من الريش والشعر . لها شعر قليل متفرق على الرأس والذور . ذات طوق على الوجه مثل المصري . الذيل مربع مكون من ١٢ ريشة هي نوع واحد على شكلين . محصورة الوجود في إفريقيا . ريش البالغ معتم اللون وليس أبيض مثل المصري ، كما أن الجناح فيها أعرض من السابقة والمنقار أقصر والأجزاء العارية أقل .

الرخمة السوداء
Hooded Vulture
(*Necrocyrtes monachus*)

الوصف : طولها حوالى ٢٨ بوصة . انظر اللوحة (٤٢) شكل (٢)
الموطن : من الأوايد ومتجولة . تقيم طول السنة بشكليها أحدهما في غرب إفريقيا ، والثاني في شرقها وجنوبها .

في مصر : يقال بأنها تجولت في مصر ، وهي نادرة الرؤية جدا فيها .
مميزاتها : الرأس مائل للحمرة أو اللون الأرجواني وليس أصفر كالسابقة ، الذيل مستدير قليلا وليس وتديا كالسابق . باقى طباعها كالمصرية السابقة .

جنس جيس (النسر)
Genus (Gyps)
Hawk Family

يمتاز هذا الجنس من النسور ، برقبة طويلة نسبيا تشبه في تلويها الثعالب أثناء استراحتة ، وهي عارية من الشعور والريش ولكنها لا تخلو من زغب قل أو كثر . ذات وسادة شعرية عند قاعدة الرقبة .
القرير يقل عن نصف قاعدة المنقار . المنقار عبارة عن شق مائل أو عمودى الشكل . الذيل مستدير ينذر أن يكون مسحوبا ، مكون من ١٤ ريشة . قصيرة الأقدام والسيقان ، وبها برائن ليست حادة ، تعرف الطيور الناهضة بريشها الطويل المتهدل وخاصة على العنق والذي يطرد في القصر مع أطراف في العمر حتى أن شعر العنق فيها يتخذ وسيلة لتقدير أعمارها ، فضلا عن أن لونها في الصغار بني باهت دائيا ، أما في الكبار فهو أبيض مصفر . الشقان متماثلان .

وهي جوارح كبيرة الجسم للغاية بل هي أكبرها حجما على الإطلاق بعد الكندور حاليا ، وهي ٤ أنواع ، تقطن آسيا وأوروبا وأفريقيا ، وفي مصر منها نوعان ، تقطن كل حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقية ما عدا مناطق الغابات ، بل توجد في المناطق الجبلية منها ومن آسيا كالهمليا مثلا . تطير على علو شاهق في دوريات استطلاعية بحثا عن الغذاء

نسر جريفون
Griffon Vulture (Palearctic Form)
(*Gyps fulvus fulvus*)

الوصف : طولها حوالى من ٤٢ : ٤٦ بوصة . انظر اللوحة (٤٢) شكل (١)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة في الأقاليم الجبلية من حوض البحر الأبيض المتوسط شرقا إلى الهمليا ، وكريد وقبرص وفي القوقاز وجبال أوروو وآسيا الصغرى وجبال البحر الأحمر والحبشة . وتجول في جبال وسط أوروبا وغربها .
في مصر : يقيم طول السنة فيها وفي سيناء حيث هو شائع الوجود حيثما وجدت الجيف بعيدة عن العمران في المناطق الجبلية والصحراوية على المقطم وحول حلوان وسيناء وجنوب غرب السويس وعلى طول النيل إلى أسوان جنوب القاهرة ، ومع كل ذلك فإن رؤيته قليلة .

مميزاته : ضخّم الجسم ، يمثل عظمة ملوك الطير ، فهو أضخم من العقاب وأقوى منه متقاراً ولكن العقاب أحدّ منه متقاراً ومخلباً ، يملق دائماً في الجو على ارتفاع شاهق قد يبلغ ألف متر وتري عندئذ أطراف القوادم كأصابع منفرجة وكذلك يشاهد ذيله القصير ، ويدخل رأسه ورقبته إلى الخلف ولا يمدها للأمام . لونه العام بني . يحتشد مع زملائه على الجيف . إذا أفرط في الأكل لم يستطع الطيران بل يثبت ويقفز على الأرض ويمكن عندئذ إمساكه وصيده حياً مع الاحتراس من عضته . تقدسه الهنود . في غاية الجبن ، يترك طعامه ويب مفزوعاً إذا فاجأه ضبع أو كلب أو ذئب ، وعندما يأكل يبدأ بأكل العينين والأجزاء الناعمة ثم يمزق بعد ذلك البطن . قد يحطف الحملان الصغيرة أو المذبوحة ويطير بها إلى الجبل لأكلها .

توالده : العش من العصي ، يتخذ فوق أعالي قمم الصخور والجبال ، في مكان صعب الوصول إليه . البيض عادة ٢ لونهما أبيض بهما بعض بقع معتمة ، وكثيراً ما توضع بيضة واحدة . يوضع في مارس وإبريل في مصر ولم يعثر على عشه فيها . والحضانة من ٥١ : ٥٢ يوماً . وتطعم الآباء أولادها حوالي ٣ شهور .

نسر روبل (الغربي) Ruppell's Vulture (Western Form) (Gyps ruppellii ruppellii)

الوصف : طولها حوالي من ٣٨ : ٤١ بوصة . انظر لوحة (٤٢) شكل (٤)
الموطن : من الأوباد ومنتجول : يقيم طول السنة حيث يتوالد في إفريقيا الاستوائية من السنغال وغينيا إلى مصر والسودان ، ولم يسجل من سينا ولم يحقق توالده في مصر أوسينا وربما توالد فيها .
في مصر : شوهد فيها صدفة كمنتجول وربما كان يتوالد فيها وسينا ، على أنه لم يتحقق منه في توالده ، وتحوّل في مصر العليا .

مميزاته : يتميز بلونه الرمادي والبقع السوداء في جسمه في البالغ . باقي عاداته وطباعه كنسر جريفون السابق .

جنس إجيبيوس (النسر الأسود) Genus (Aegyptius)

هو جنس كبير الجسم للغاية ، مربع المنخر مائله خال من الريش والشعر . وأذنه مغطاة بالريش . عميق المنقار للغاية ومقوس من طرفه في الفك العلوى . الرأس والرقبة عاريان من الريش ومغطيان بزغب . له وسادة ريشية ناعمة تحيط بالرقبة . الذيل من ١٢ ريشة ومستدير ، يندر أن يزيد طول الساق على طول إصبع القدم الوسطى . نصف الساق من أعلاه مكسو بالريش . نوع واحد منه يوجد من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط إلى الصين ويشاهد في مصر . وهو ضخّم الجسم للغاية ، يمشى بخطى وثيدة كباقي النسور مع وقار واتزان ، وفي نظراته ذكاء ومكر ، ولا يأكل من الفريسة إلا العضلات والأجزاء الطيبة ويندر أن يأكل غير ذلك إلا للضرورة ، كما أنه يأكل العظام أحياناً ويهاجم الحيوانات الفقيرة . عشه ضخّم يتخذ فوق الأشجار التي لا يزيد علوها عن الأرض عن أربعة أمتار

عادة ، ويبقى العش من العصي . وتبيض الأنثى بيضة واحدة بيضاء ذات بقع حمراء ، ولا ينهض الصغير للطيران إلا بعد أربعة أشهر على الأقل . والأنثى بها شيء من الجبن ، وهي على ضخامة جسمها ، لا تدافع عن عشها ولا تذود عن صغارها ولو أنها تظل حول العش بعيدة عنه ترافقه من بعيد . مظهره العام أسود اللون قبيح المنظر إذا كان قريباً من مرأى الإنسان ، ويجد صعوبة ما في ارتفاعه الهوائي وهو على الأرض ولكنه بعد ذلك يصف في طيرانه على ارتفاع شاهق . ويشاهد غالباً منفرداً شأن الملوكة في حب العزلة والانفراد عن الشعوب ، ويندر أن يشاهد بصحبة غيره من النسور ، نشيط للغاية وهو على الأرض ، والنسر المجروح سريع العدو للغاية ومن الصعب إمساكه .

النسر الأسود - أو - السنجاني

Black or cinereous Vulture

(Aegypius monachus)

الوصف : طوله حوالى من ٣٩ : ٤٢ بوصة . انظر اللوحة (٤٣) شكل . (٢) واللوحة (٤٢)

شكل (٥)

الموطن : من الأوابد ، ومتجول أحياناً : يقيم طول السنة حيث يتوالد من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى فلسطين وبلاد العرب ، وهو كثير في عدن وشرقاً إلى بلوختستان ومنغوليا وفورموزا وهناك شك في توالده في مصر وسينا والسودان ولو أنه يجلى في هذه البلاد في فترات . ويتوالد كذلك في وادى الأردن ومنخفض بحر الميت .

في مصر : شائع الوجود فيها ولو أنه يشاهد منفرداً بين نسور جريفن ، وأطلقت النيران على واحد عند المنصورة في ٤ مارس سنة ١٩١١ م هو الآن بالمتحف الحيوانى بالجيزة ، وشوهد في سيناء عند السويس في مارس ، وغيره بين النيل والواحات الخارجة في نفس الشهر ، كما أنه قد شوهد أيضاً في الفيوم .

مميزاته وعاداته : هو نفس ما قبل عنه من الجنس في صفحة ٢٨٤ (جنس إجيبيوس)

جنس تُرجوس (النسر الاجتماعى)

Genus (Torgos)

هذا الجنس من النسور قريب الشبه جداً من النسر السابق (إجيبيوس) غير أن منقاره أثقل منه وزناً ، وهو بيضاوى المنخر ، به بعض الزغب القليل على الرأس ، فتحة الأذن مكشوفة بادية واضحة ولذا يسمى كذلك (النسر الأذنون) . عريض الجناح للغاية . أطول قوامه الثانية والرابعة وهما متساويتان . يمتد الريش إلى أسفل أكثر من السابق (إجيبيوس) . ذيله مكون من ١٢ ريشه إذا طار بدا كأنه يصعب عليه الطيران ولكنه إذا ارتفع صعد إلى كبد السماء شأنه في ذلك شأن عمالقه الجواهلواء . يجتشد في جماعات ولذا يسمى (النسر الاجتماعى) يحسن المشى والعدو فوق الأرض .

النسر الأوزن - أو - الاجتماعي
Sociable Vulture = Lappet - faced Vulture (Northern Form)
(Torgos tracheliotus nubicus)

الوصف : طوله حوالى ٤٠ بوصة . انظر اللوحة (٤٢) شكل (٣)
الموطن : من الأوابد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في شمال شرق إفريقية وفي الحبشة والصومال والنوبة والسودان ومصر . كذلك في كردفان ومنطقة البحر الأحمر السودانية ، ولكنه لا يتوالد في سينا .

في مصر : يحتمل أن يكون هذا النسر أكثر النسور رؤية فيها ، ولو أنه لم يشاهد بعد في شمال القاهرة أو وادي النطرون . وأحيانا يشاهد في ماثات قرب حلوان ، وشوهد في أسراب كبيرة قرب الأقصر والقصر في مارس ، كما شوهد كذلك في الفيوم . وليس لدينا إثبات بتوالده في مصر أو سينا .

مميزاته : هو ما قيل عنه في جنس تروجوس على اليمين وزيادة على ذلك فإنه يختلف عن الذى في جنوب إفريقية بأن الأذن عارية من الريش ، رأسه أحمر يقف على الأشجار القديمة في كهف في قمة جبل . تبيض الأنثى بيضة واحدة بيضاء طباشيرية بها أحيانا بقع بنية أو برتقالية

Storks etc رتبة (جرسورس = سيكونيفورمس)
Order (Gressores = Ciconuformes)

« اللقليات »

تحتوى هذه الرتبة على جميع أنواع البلشون (سيكونيفورمس أو جرسورس) التى يتفرع منها العنز أو اللقلق (Stork) والرهو أو الجابير أو سرج Abiru or saddle-bill وأبو ملعقة Spoonbill والواق Bittern (١) ، ومالك الحزين Heron ، والنحام Flamingos ، ثم الـ Ibises أما الكراكي (جمع كركى) Crane ولو أنها تشبه هذه الطيور ، ومن ضمن هذه الرتبة إلا أنها تختلف كلية في بناء أجسامها ولذلك فهي تتبع فصيلة (الكترويس Alectorides) تشترك طيور هذه الرتبة في وجود أصبع القدم الخلفى ، وريش القوادم مكون من ١١ - ١٢ ريشة ، وبالغدة الزيتية ريش ، وهي عالمية التوزيع . نحيفة الرقاب بادية الطول ، والمقار فيها غالبا أطول من الرأس قليلا أو كثيرا ، وفي بعض أنواع منها يكون الوجه بل العنق والرأس عاريين من الريش - طويلة الساق والأصابع أيضا ، وغالبا ما تكون متصلة بغشاء جلدى عند القاعدة . الأجنحة متوسطة الطول وفي بعضها تكون طويلة مدبة . وقد توجد زوائد ريش تزينها على الرأس أو في أسفل الذقن أو على الكتفين أو أسفل الظهر .

تنخذ أعشاشها في الأشجار أو في الصخور أو فوق الأرض مباشرة أحيانا ، ويختلف عدد البيض بحسب أنواعها ، الذى لونه أبيض عادة .

وماوى هذه الرتبة المستنقعات الضحلة والمنخفضات ذوات المياه الجارية وشواطئ المياه من أنهار وبحار وترع ، وهي في رحلاتها البعيدة تحتشد في جماعات مسافرة بنظام مخصوص . طعامها الديدان والحشرات والحيوانات الرخوة المائية والفقرية والأسماك والزواحف والبرمائية

(١) ومعها أيضا spoonbills وهي بذلك كلها ٧ مجاميع

الفصيلة اللقلقية (سيكونييداي)

Family (Ciconudae)

(Storks and Tabirus)

تحتوى هذه الفصيلة على ١٧^(١) نوعا موزعة في المناطق الاستوائية والمعتدلة من الدنيا ، أما التي تتوالد في المناطق الباردة فهي مهاجرة ، وهي تشمل البلشون أو العنز بأنواعه ، وهي قريبة الشبه من مالك الحزين وأضرابه Heron والبلشون الأصل هو طائر كبير الجسم ، طويل الأرجل ، صامت أخرس ، ولكنه يستطيع أن يقطع بمنقاره ويحدث صوتا تقريبا هكذا (لُقْلُق) الذي اشتق اسمه من هذا الصوت . وهي تمد رقابها للأمام في طيرانها ، كما أنها تسحب أرجلها إلى الخلف وراءها . قوة المخالب وليست حادة أو مشطية الشكل أو ذات أسنان كالشط ، مربعة الشبيكة ، مليئة الأجسام نسبيا ، والمنقار طويل وغروطي الشكل وتارة يكون متقوسا قليلا ، عارية السيقان إلى ما فوق الركبة ، وأصابع القدم متصل بعضها ببعض من الأمام بأغشية ذات مخالب غليظة ولكنها قليلة . أطول قوائمها الثالثة والرابعة ، الذنب مكون من ١٢ ريشه مستديرة ، ريش الرأس إما مستطيل رفيع أو قصير غليظ وفي بعض الأنواع يصبح كالشعر أو كالصوف في نوعته . لا يختلف الشقان إلا في الجسم ، كما أن البالغ لا يختلف عن اليافع إلا في صفاء لونه وجاذبيته فقط . مواطنها الأماكن شبه الغابات ذات المياه أو المستنقعات ، والأنواع التي في المناطق الباردة مهاجرات بعيدة المدى أما التي في الجنوب فهي متجولة . إذا وقعت كان العنق على حرف S الانجليزية ، تخوض في الماء ويندر أن تسبح فيه ، تعيش في جماعات . جنس واحد منها في مصر .

جنس سيكونيا (اللقلق) = العنز


Genus (Ciconia) Stork

يختص هذا الجنس بمنقاره المخروطي الشكل المستقيم المكسو بأغشية قرنية ، ومنخره أفقي . الصدغ (وأجزاء من القسمة) عار بعض الشيء من الريش ، كما أن الذيل قصير ومستدير ، وهو يبدل ريشه مرة في العام ، طويل الأرجل عار من الريش إلى ما فوق الركبة ، وأصابع القدم الأمامية بها أغشية طويلة الأجنحة ، والقوائم من ثالث إلى خامس قادمة متساوية الطول وهي أطول الريش ، والذيل من ١٢ ريشة .

تستوطن أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومناطق بحر قزوين وفارس وجنوب روسيا ومنطقة البحر الأسود واليابان .

نوعان منه في مصر ، نوع أبيض ، والثاني أسود .

(١) يعرف منها ٣٧ نوعا ، متفرعة من ١٠ أجناس والذي على قيد الحياة الآن هو ١٧ نوعا فقط .




ص ٢٢٣

Short-toed Eagle



ص ٢٣٠

Black or
Cinereous Vulture.



Short-toed Eagle من أسفل
ملاحظة : ذيلة ايشيه بذيل حوام النحل



القادمتان الأولى
والثانية لأب النور
الاسيوي

(٥)



القادمة الأولى والثانية للذكر
أب النور أوروبى . لاحظ أن
البقعة البيضاء لا تصل إلى الساق

(٦)



Moustached
Warbler

(٤)

لاحظ البقعتين البيضاءتين في
القادمة الأولى تمتد إلى الساق ،
وفي الثانية تمتد إلى الساق والتصل
الوحشى معا .



Cettis Warbler
الذيل من أسفل .



Little Egrette
(Palaeartic)

ص ٢٤٣



White Heron

ص ٢٤٢



Reef Heron
(Red Sea Form.)

ص ٢٤٣



Buff-backed
Heron (Western)

ص ٢٤٤



Squacco
Heron

ص ٢٤٥



Squacco
Heron (Juv)

ص ٢٤٥



ص ٢٤٥



Night Heron

ص ٢٤٦



Night Heron (Juv)

ص ٢٤٦



Little Bittern
(Palaeartic Form.)

ص ٢٤٨



Common Bittern
(Palaeartic Form.)

ص ٢٤٩

اللقلق الأبيض = العنز الأبيض

White Stork (European Form)

(Ciconia ciconia ciconia)

الوصف : طوله من ٤٠ : ٤٦ بوصة . انظر اللوحة (٤٥) شكل (١)

الموطن : من القواطع : يتوالد في أوروبا صيفا من ساحل بحر البلطيق الجنوبي ، جنوبا إلى اليونان وفي وسط وشرق أوروبا ، ولكن لا يتوالد في الموره أو إيطاليا أو شبه جزيرة اسكندناوة أو الجزر البريطانية . أو فرنسا ، وربما يشاهد فيها متجولا . ويتوالد كذلك في شبه جزيرة أيبيريا . وهو شائع التوالد في النمسا وهنغاريا لأن الأهالي هناك يشجعونه على التوالد ، وذلك بأن يبنوا له الأعشاش فوق سطوح المنازل والكنائس وعلى الأبراج ولا يقربونه أو يمسه بأذى ، بل يحظرون على الأهالي صيده هناك ، وكان قديما شائعا في هولنده وألمانيا لهذا الغرض ولكنه برغم ذلك نادر التوالد وبدأ يتكاثر من جديد . يتوالد كذلك في شمال غرب أفريقية جنوبا إلى ساحل الذهب ، وفي العراق وسوريا وفي آسيا الصغرى ووسط وغرب آسيا ، ولا يتوالد في جزائر البحر الأبيض المتوسط .

وفي الشتاء في هجرته تخرق جموع كبيرة منه مصر في هجرتها في الربيع والخريف من وإلى أحيائها الشتوية في وسط وجنوب أفريقية ، وفي شرق أفريقية والحيشة ، وفي جنوب آسيا في الهند والهند الصينية وسيلان .

في مصر : يشاهد فيها في الربيع وخاصة في شهر إبريل ولكن الرؤية تكون قليلة وفي الأماكن الآمنة المحظور فيها الصيد مثل معدية رشيد وهي نقطة بين رشيد والإسكندرية في منتصف الطريق ، وكذلك في أي مكان آمن ، وربما يشاهد كذلك في مايو إلى منتصفه شاهده في ١١ منه ، وقد يبقى قليل منه صدفة صيفا في مصر أو شتاء ولكن لا يتوالد مطلقا بها . وذكر مينرتزهاجن كلمة عن هجرته في الاعتدالين نوجزها هنا .

في الخريف : التي تتوالد في الدانمارك تنج في هجرتها إلى الجنوب الشرقي نحو البلقان وآسيا الصغرى ، والتي من هنغاريا تنج إلى شمال سوريا حيث تظهر في الأسبوع الثالث من أغسطس وتمتد حتى منتصف سبتمبر على الأقل ولو أن القليل منه يعمل محطات استراحة في هجرته ، كما أن بعض الأفراد تجتاز شبه جزيرة سينا ولوحظت وهي تجتاز خليج السويس تجاه الطور في ٢٦ أغسطس ، وجنوب سينا في ٣ ، ٤ سبتمبر ومنه ما يتخذ وادي النيل دليلا ومرشدا في هجرته حتى يصل إلى أحيائه الشتوية في السودان وكينيا وتنجانيقا والحيشة وروديسيا إلى جنوب إفريقية حتى يصل هناك من أوائل أكتوبر فصاعدا .

في الربيع : تبدأ اللقائ التي في جنوب روديسيا تبدأ في الهجرة شمالا في وقت مبكر حوالي الأسبوع الأخير من فبراير متجهة إلى تنجانيقا وكينيا وبحيرة فيكتوريا ، ثم تهاجر معها الطيور التي في كينيا والسودان وتجه الجميع إلى جنوب فلسطين وسينا حوالي الأسبوع الأول من مايو أو في منتصفه وقد تسبح في الهواء في سماء خليج السويس في آلاف منها أثناء النصف الثاني من إبريل ، ويندر أن تلمس منطقة قتال السويس أو الدلتا بعد أن تجتاز سينا ، ويمر عندئذ كثير منها على أعلى وادي الأردن إلى دمشق حوالي آخر مارس وأوائل إبريل .

على أن هناك بعض أفراد تهاجر من شمال ووسط أوروبا إلى جنوب غربها ومنها إلى غرب إفريقيا ثم تعبر الصحراء الكبرى في طريقها إلى الجنوب ولكن ذلك قليل الحدوث .

مميزاته وطباعه : يعرف لأول نظرة برجليه الحمراء الطويل كذلك الأحمر الدموي ، كذلك فإنه يمد رقبته للأمام في طيرانه ، ويسحب رجليه للخلف أيضا بعكس باقي الرتبة والفصيلة من أنها تنثني رقابها على حرف S في طيرانها . طائر صامت . يطير عادة جماعة على ارتفاع عظيم وخاصة وقت الهجرة أما إذا كان منفردا فإنه يطير قريبا من سطح الأرض . في فصل التوالد عند قدوم زائر من نوعه عليه ، استقبله بثني رقبته للخلف وفرقة المتقار بصوت هكذا (لقلق لقلق) يردده مرارا . طعامه الضفادع والسحالي والسمك والحشرات وخاصة الجراد وقد يسمى لذلك باسم (طائر الجراد locust bird) البيض من ٣ : ٥ والحضانة ٣٠ يوما ، وإطعام الأولاد من ٥٣ : ٥٥ يوما ولكن الأولاد يطعمها الآباء لمدة أسبوعين أو أكثر بعد أول طيران . تقتل فريستها قبل أن تلتهمها كما تفعل مع السحالي والثعابين حتى السامة منها ، وإذا اشتد بها سورة النهم فإنها تبتلع ثعابين صغيرة حية قبل أن تقتلها فتضطرب هذه وسط عنقها وكثيرا ما تخرج الفريسة ثانية من فمها إذا ما انحنى الطائر إلى أكل فريسة أخرى ، وإذا ما ظفر الطائر بأفعى خطيرة راح يضربها بشدة على رأسها حتى تعمي ثم يبتلعها ولكن إذا خافه الحظ مرة وتمكنت من لدغه فإنه يمرض من جراء ذلك عدة أيام مرضا شديدا ويشفى بعد ذلك تماما . وقد يهاجم الطيور الصغيرة الأخرى في عشاشها بل وأحيانا يحمل عشا كاملا إلى صغاره .

في فترات التزاوج تعشش هذه الطيور في مستعمرات كبيرة العش فيها بالقرب من الآخر ولا تغيرها ، بل تعود إليها سنة بعد أخرى ، فهناك أعشاش استخدمها اللقالق لمائة عام لأن المعروف أن الطائر يعمر كثيرا ولكن لا يعرف عمره بالضبط ولذلك لا يتغير أصحاب العش ولا تنتقل ملكيته إلا نادرا . ويبادر الذكر إلى الظهور في موطنه قبل الأنثى بعدة أيام عادة ثم تأتي الأنثى بعده بقليل ويبدأ بعدئذ في تنسيق العش وتهذيبه ، وأحيانا يأتي الذكر إلى عشه فيجده محتلا بذكر آخر فتنتشب بينهما معركة حامية الوطيس قد تؤدي إلى موت أحدهما أو انهزامه في المعركة ، وعندئذ يبحث المنتصر عن شريكه حياة له ترافقه في بناء العش وتهذيبه ، وتقوم الأنثى عادة بعملية البناء وأدوات البناء هي الأغصان والفروع والحشائش وقطع الطين ، وأحيانا يساعد الذكر أخته في بناء العش حتى ينتهي منه في حوالي أسبوع تقريبا في بنائه ، أما ترميمه فلا يزيد على ثلاثة أيام . والأنثى هي التي تحضن وحدها بيضها ، ولا يقوم الوالدان بإطعام الصغار ، بل نجدهما إذا خرج الأولاد من البيض يجتهد الوالدان أن يجعلوا الأولاد يأكلان بأنفسهما وذلك بأن يمسك أحد الوالدين بمنقار أحد الأولاد ثم يجذبه إلى أسفل مشيرا إلى موضع الغذاء ويتكرر العملية يتعود الأولاد أن يأكلوا بأنفسهما ، وكذلك يحضر الأبوان للآباء من الماء معمولا في المرىء ثم يدفعه من منقاره أمام الصغار ، وفي الأيام الشديدة القَيْظ يرش الأبوان أولادهما بالماء وتحجبهما من أشعة الشمس ، كما أنها في أيام البرد القارس نجدهما يحوطان أولادهما بأجسامهما لتدفئتهما ، ثم تبدأ الصغار بعد شهرين في تجربة الطيران وذلك بأن تحرك أجنحتها وهي واقفة على حافة العش ثم تبدأ في الطيران إلى مسافة قصيرة وتكرر العملية ثم تعود إلى عشها للمبيت فيه ، ثم تبدأ في أن تصحب أبويها في رحلات قصيرة ، إلى أن تبدأ في الاستقلال بنفسها إلى باقي الرحلات .

وقبل بدء الرحلة (الهجرة) تأخذ جماعات اللقلق في الوصول إلى مكان معلوم أسرابا متفرقة تزداد يوما بعد يوم في مستنقع مثلا ، وفي أوائل يوليو عند اكتمال العدد تبدأ هذه الجموع في التحرك دفعة واحدة كلها مع بعضها وقبل النهوض للطيران تصبح بصنيحات صاخبة ثم تهب دفعة واحدة للسفر - وصيحاتها هي فرقة بمناقيرها .

ومن العجيب أن اللقلق يألف حياة الأسر ، وقد أخذت أفراد منه من العش صغيرة ثم أصبحت أليفة في المكان الذي تربت فيه بحيث أنها تفعل مثل الحمام فتقوم بجولاتها ثم تعود ثانية إلى مكانها . والقلق عموما ما يحب صديقه ويحييه بفرقة منقاره ، كما أنه يصادق غيره من كبار الحيوان ، ولكنه مع ذلك خطر على الحيوانات الصغيرة والأطفال .

الأنثى كالذكر في اللون
وفي أوغندة حتى الأمن متوفر له نجده يمشى في شوارعها في (كمبالا)

القلق الأسود - العنز الأسود

Black Stork

(Ciconia negra)

الوصف : طولها حوالي ٣٨ بوصة . انظر اللوحة (٤٥) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في نفس المواطن السابقة للقلق الأبيض ، كذلك يشتمل نفس المواطن التي يشتملها الأبيض .
في مصر : يشاهد صدفة في الدلتا في مارس وإبريل ، وكذلك في أغسطس وسبتمبر ، وشاهد صدفة في يناير ، كذلك يشاهد في أماكن أخرى ناحية المياه كالسويس .
مميزاته : هي نفس سمات اللقلق الأبيض السابق في كل شيء غير أنه لا يحتشد في أسراب بل يكون منفردا منعزلا ، ويندر جدا أن يرى في جموع محتشدة . كذلك يمتاز بريشه الأسود في أعلاه ، والأبيض في أسفله ، كذلك يفضل الأماكن الجافة عن الأبيض . الباقي كالأبيض
توالده : في أوروبا لا يعيش فوق المنازل مثل الأبيض ، بل يتخذ عشه في مكان بعيد عن العمران ، في البراري مثلا .

فصيلة (بليجديدائى = بلاتاليدائى)

Family (Plegadidae = Plataleidae)

(Ibises & Spoonbills)

spoonbill Family

أبو منجل و أبو ملعقة

تشتمل هذه العشيرة أو العائلة أو الفصيلة على أبى منجل وأبى ملعقة ، والمعروف منها فى العالم حوالى ٣٧ نوعا ، أما الباقي منها الآن حيا هو ٣٠ نوعا ، موزعة فى المناطق الجنوبية من المنطقة المعتدلة فى الدنيا القديمة والجديدة . وهى متفرعة من ٢٠ جنسا

وتمتاز طيور هذه الفصيلة بأن عظمة القص فيها هى خلفية وبها أربعة حزوز ، وليس لها بقع مسحوقية الزغب ، ومقارها طويل منحن كهية المنجل (الشرشرة) أو مسطح عريض عن طرفه كهية الملعة المفرطة . ومخالبها مدببة . لسانها فى منتهى الصخور حتى لقد أطلق على هذه الطيور قديما (ذات أنصاف الألسن)

جنس بلاتاليا (أبو ملعقة)

Genus (Platalea)

(Spoonbill)

يمتاز طائر هذا الجنس بالمنقار العريض المفرطح من طرفه الذى هو أشبه بملعقة مبططة ، وباستطالة المنخر وتقاربه منطقة الذقن والصدغ ومنطقة العين وأجزاء الجبهة ، كل ذلك عار من الريش . الفخذ نصف عار . ثانى قادمة هى الأطول ، أما الثالثة فهى أقصر قليلا منها .

أربعة أنواع منه فى الدنيا القديمة . وهو لا يوجد فى الدنيا الجديدة ، نوعان فى أفريقية ، وواحد منه فى مصر .

يوجد فى الدنيا الجديدة ما هو على تفصيله وشكله تماما غير أن اللون مختلف من الصفرة واللون الوردى والأبيض اسمه العلمى هو Ajaia ajaia واسمه الإنجليزى هو Roseate Spoonbill الأقدام طويلة ذات أغشية فى أصابعها الأمامية ، المخالب صغيرة قليلة ، كبيرة الأجنحة عريضتها . الذيل به ١٢ ريشة . الريش كثيف وقد يستطيل أحيانا عند مؤخرة الرأس إلى ما يشبه الشوشة . لا خلاف بين الشقين طول السنة .

أبو ملعقة الأوروبي

Spoonbill (European Form)

(Platalea leucorodia leucorodia)

الوصف : طوله حوالى ٣٥ بوصة . انظر اللوحة ٤٥ شكل ٥ ، ٦ ، الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا فى أوروبا فى جنوب غرب أسبانيا ، وفى شمال البلقان ، وشائع التوالد جنوب خط عرض ٥٦° شمالا خصوصا فى هولنده لأنها تحميه حيث يصل لها فى إبريل ويبقى بها حتى سبتمبر أو بعده بقليل . يتوالد كذلك على طول الدانوب وفى البحر الأسود ، كذلك فى غرب ووسط آسيا ، وربما كان يقيم طول السنة فى أجزاء من شمال شرق أفريقية ، ومعظم الأشكال الشمالية هى طيور مهاجرة تقضى الشتاء فى أفريقية الاستوائية والهند .

في مصر : يشاهد فيها ولكن بقلّة ، وخاصة في الربيع والخريف ، وتارة في الشتاء في شمال الدلتا .

مميزاته : يعرف بريشه الأبيض وطرف منقاره المفرطح ، يشاهد غالبا في أسراب صغيرة من ١٠ : ٢٠ واحدة تستريح على ضفاف الأنهار الرملية أو واقفة وسط المياه الضحلة في النيل أو البحيرات حيث يتناول طعامه من السمك والحيوانات الرخوة والصفادع والديدان والحشرات ، وفي المياه الضحلة يغمر منقاره فيها ، أما العميقة فيحرك منقاره في سطح الماء فقط بحثا عن البرقات المائية كما يفعل البط . طيرانه يطء وفي استقامة واحدة ويطير في جماعات ، يمد رقبته ورأسه للأمام في طيرانه ولا يلوى الرقبة مثل أبي قردان مثلا . قد يخالط غيره مثل النورس على سواحل المياه . يمد كذلك رجليه للخلف في طيرانه . يجب الخلاء والعراء ولا يتوارى في الغابات كغيره يمد رقبته للأمام أثناء الطيران . منقاره أسود ، والذي لم يكتمل نموه منقاره أصفر اللون .

العش يكون في مستعمرات أي جماعات في الأشجار وتارة في القصب النامي في المياه . والبيض من ٢ : ٣ عادة ويتبادل الزوجان الحضانة وإطعام الأولاد ثم يقودونها إلى المستنقعات ، ولا تفارقها إلا في ثالث عام عادة . وتارة يصل عدد البيض إلى ٦ بيضات توضع في أول إبريل ومايو ، والحضانة ٢١ يوما وتغادر الأولاد العش بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع ، والآخر هو الأغلب ، ولكن لا تطير ولا تحسن الطيران إلا بعد ثلاثة أسابيع .

أبو ملعقة الآسيوي

Spoonbill (Asiatic Form)

(Platalea Leucorodia major)

الوصف : طولها حوالي ٣٦ بوصة . وهو كالأوروبي تماما غير أنه أكبر منه
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في سوريا ووسط آسيا والهند إلى اليابان وشرق آسيا
في مصر : يظهر أنه مهاجر لمصر وسينا شتاء فقط من إبريل إلى يوليو .
مميزاته : هو صورة مكبرة للأوروبي السابق فحسب . باقى طباعه كالأوروبي .

جنس بليجاردس (أبو منجل)^(١)

Genus (Plegadis) = Ibis

spoonbill Family

يمتاز هذا الجنس بضيق ريش الرأس والرقبة في الأفراد البالغة ، ويمتاز بطويل منحن كالمنجل ، ويمتاز بمشقوق ، وبحراشيف كثيرة في الساق مستطيلة من الأمام ومربعة من الخلف . الأقدام طويلة رفيعة وكذلك أصابع القدم التي بها أغشية من أمامها وبها مخالب مقوسة قليلا الأجنحة كبيرة مستديرة وأطول قوادمها الثانية ، والذنب عريض مكون من ١٢ ريشة ، الريش كثيف متغير الألوان ، والشقان متمثلان . والأنواع التي تستوطن الشمال مهاجرة ، وغيرها طيور متجولة . مأواها المستنقعات والغياض . طيور نهاريه ولا تطير في الليالي القمرية ، وتمشي بخطوات متتدة ولا تعدو قط ، وتخوض في

(١) لفصيلة هي (Threskiornithidae) وأنواعها ٣٠ نوعا .

المياه حتى وسط أبدانها ، وتسبح متى شاءت أو يرغمها الخوف ودافع الخطر . تطير جماعات في صفوف مستقيمة أو على شكل زاوية (١) العش دائيا بين الأشجار النامية وسط الماء وهي إما تقيم بنفسها ، أو تقتصبه من غيرها ، والبيض من ٣ : ٦ زرقاء غالبا بحتة . أما الأنواع الأمريكية ، فعمل بيضها بقع حمرة بنية . الشقان يطعمان الأولاد . يألف الأسر ويصادق من يراه حوله . الحضانة للبيض ٢١ يوما . عدد أنواعها ٣٠ نوعا في الفصيلة ، يوجد في الدنيا القديمة والجديدة . نوع واحد منه في مصر .

أبو منجل الأسود

Glossy Ibis (Palaearctic Form)

(Plegadis Falcinellus falcinellus)

الوصف : طوله حوالي ٢٢ بوصة . انظر اللوحة (٤٥) شكل (٣) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في الأقاليم حول حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إلى وسط آسيا ، وفي جنوب أسبانيا في المستنقعات الأندلسية وفي جنوب فرنسا في الكامارج ، وفي شمال البلقان وشمال بحر الإدراتييك ، وفي آسيا من خط عرض ٤٨° شمالا إلى الجنوب عند جزيرة سيلان ، كذلك في جنوب شرق الولايات المتحدة . يقضى الشتاء في افريقية الشمالية والاستوائية والجنوبية حتى الكاب وكذلك في مدغشقر .

في مصر : يشاهد في الربيع والخريف والشتاء في أسراب في البحيرات في صحبة البط وشوهد في وادي النطرون والفيوم وفي الدلتا عموما ، وكذلك في الطور في ٢٧ من يوليو وهو التسجيل الوحيد له من سيناء

مميزاته : هو نفس ما قبل عنه في جنسه الذي في صفحة ٢٩٨ ، وريشه في الصيف يلمع باللون متعددة من الأحمر والبفسجي والأرجواني ، أما في الشتاء فيكون كله أسود فاحم .

أبو منجل المقدس

Sacred Ibis

(Threskiornis aethiopicus aethiopicus)

الوصف : طولها حوالي ٣٠ بوصة . انظر اللوحة (٤٥) شكل (٧) ، (٨)
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة في كل إفريقية ماعدا الصحراء الكبرى ، ويقوم أيضا في الخليج الفارسي والساحل الجنوبي من بحر قزوين .
في مصر : كان قديما يتوالد فيها ويقيم طول السنة ، أما الآن فقد انقرض منها نهائيا ، وربما كان شائعا في عصر قدماء المصريين كما هو واضح من رسومهم له على جدران معابدهم ، وكذلك ذكره هيرودوت المؤرخ بأنه كان شائعا بكثرة في عهده في مصر عام (٤٥٠) ق م عندما زار مصر . وقال سافيني Savigny بأنه كان شائعا جدا عام ١٨٠٠ م وكان يراها في جموع من ٨ : ١ حول المنزل ودمياط ثم اختفت بعد ذلك بمرور ٥٠ عاما وذكر هيجلن بأنه اصطاد واحدة عند الغطاء في الفيوم . وعلى العموم فرؤيته الآن تعتبر نادرة جدا

(١) طيور اجتماعية تعيش في مستعمرات كما تتوالد أيضا في مستعمرات العش بجانب الآخر فوق الصخور والأشجار أو على الأرض . تمردقها للامام في طيرانها وتسحب كذلك رجلها للخلف .

مميزاته : كبير الجسم نوعا ما في حجم أنثى الدجاجة الرومية تقريبا ، أبيض اللون ، أسود الرأس والرقبة . طويل المنقار أسوده وهو منحني لأسفل وأشباه بالمنجل . يكون محتشدا تارة ومنعزلا أخرى كما شوهد ذلك عليه في بحيرة فيكتوريا . يمد رقبته للأمام في طيرانه ، خفقات أجنحته بطيئة وغالبا ما يصف أثناء طيرانه . قصير الذيل ، يطير في أسراب . يغشى الأراضي الرطبة وسواحل الأنهار والبحار . طعامه الرئيسي الأسماك الصغيرة . وقد يأكل الحشرات والديدان والحيوانات البحرية الرخوة . وكان قدماء المصريين يقدسونه ومن ذلك أخذت تسميته لأنه كان يظهر مع الفيضان معتقدين أنه هو سببه .

أبو منجل هيرمت (الناسك) Hermit Ibis (Comatibis eremita)

الوصف : طولها حوالي ٣٢ بوصة . انظر اللوحة (٤٥) شكل (٤)

الموطن : من الأوايد ومتجول : يتوالد صيفا في أعلى نهر الفرات حيث يقيم هناك وفي اسيا الصغرى وشمال غرب إفريقيا في جبال أطلس وفي الحبشة وعلى جبال البحر الأحمر . في مصر : يذكر البعض أنهم شاهدوه في مصر بالقرب من الأهرام وهذه الرؤيا مشكوك فيها حيث لم يحصل منه للآن أفراد .

مميزاته : يمتاز بالزوائد التي في الرأس مع زائدة كبيرة عجيبة خلف الجمجمة . قاعدة الرقبة بها ريش طويل ذو لمعان معدني أو أرجواني . الجسم والذيل والجناح سود بلمعان أخضر . الحذ والزور لونها أحمر مائل للسواد على القنة طول السنة يتوالد في أفريقيا الاستوائية والسودان .

أبو منجل الفياض Wood Ibis (Ibis lalis)

الوصف : طولها حوالي ٣٥ بوصة . انظر اللوحة ٤٥ شكل ٩ .

الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في إفريقيا الاستوائية والسودان .

في مصر : يقال بأنه يتجول إليها ، ولا يعمل على ذلك حيث لم ير فيها قط .

مميزاتها : القوادم والذيل أسودان لامعان . الحذ عاز والزور أحمر ، المنقار مستقيم ومنحن قليلا من المقدمة .

فصيلة أرديدائي (البلشون وأبو قردان والواق)



Family (Ardeidae) = Herons & Bitterns

Heron Family

المعروف من هذه الفصيلة هو ٧٨ نوعا Heron family ، والموجود منها حاليا ٦٣ نوعا (١) ، تقطن كل الدنيا ما عدا أقصى شمال أوراسيا والصحراء الكبرى الإفريقية ومنطقة القطب الجنوبي ، وهي طيور كبيرة الأجسام ، ذوات أجنحة عريضة مستديرة قللسا ، بطيئة خفقاتها . تحن رقاها في طيرانها على شكل حرف S الإنجليزية . طعامها الرئيسى الأسماك والحيوانات المائية الرخوية وكذلك الحشرات . تتوالد في مستعمرات ، العش بجانب الآخر على الأشجار المطلة على المياه في الفيض أو المستنقعات وتشمل هذه الفصيلة على فصيلة البلشون (الذى تنفرع منها الأجناس الستة وتشمل مالك الحزين والبلشون الأصلى وطائر الغنم وأبو قردان والواق بنوعه) وتدخل هذه الأنواع التى عددها ٦٣ نوعا حاليا ضمن ستة أجناس ، وتكثر في المناطق المعتدلة في أمكانها في المستنقعات والكياه الوشلية (الضحلة القليلة العمق) طويلة الرقاب . تظهر حراشيف مسننة كالمشط عند انطباق الفكين وتزداد وضوحا عند طرف المنقار المغطى من الداخل بمادة قرنية ملساء صلبة جدا ما عدا منطقة الأنف . أصابع القدم طويلة ، تغلب الأصبع الوسطى مسننة كالمشط . الجناح طويل عريض . قان وثالث ورابع قادمة متساوية الطول . ريشات الذنب ١٠ - ١٢ ريشة ، وريشة قصيرة مستدير الطرف . الريش في الجسم غزير ناعم لين وكثيرا ما تكون ريشات وسط القنة والظهر وأعلى الصدر طويلة ظاهرة الطول دون بقية الريش . لا يختلف الشقان إلا لآ في الحجم كما أن ريش الصغار يختلف عن ريش الكبار .

تختلف مواطن مرعاها ومسارح عيشها ، فالبعض يأوى إلى البحار ، وآخر المستنقعات والأماكن المكشوفة وغيره في الفيض والأدغال التى يتخللها الماء . وهى حذرة في مشيتها تطير لأقل اشتباه بالخطر ، تحرك رقبته ورأسها أثناء مشيتها ، كما أنها تحيد السباحة . صوتها كره أشبه بالصراخ . طيور اجتماعية . تغير على صغار الطير وتقتلها وتفتك بها ، كما أنها تتحاشى الكبير منها . طعامها الرئيسى الأسماك وكذلك صغار الحيوانات والثدييات كالضفادع وصغار الطيور وكذلك الديدان التى تنقب عنها مثل الدجاج المنزل . تهاجم العدو بعنف إذا اضطرت لذلك وتجتهد أن تصوب منقارها إلى عيون خصمها تعشش في مستعمرات العش بالقرب من الآخر فوق الأشجار أو بين الأدغال أو في شجرة نامية فوق المياه الضحلة . العش تبنى الأنثى ويحضر لها الذكر مواد البناء من القش الخ . والبيض ٣ : ٦ تضعها الأنثى بمفردها ويعولها الذكر .

(١) متفرعة من ١٥ جنسا .



آرديا (Ardea)
جنس (البلشون) = Herons

هو عبارة عن بلشون كبير (Great Heron) ليس أبيض اللون مطلقا ، قوى المنقار طويلة ومستقيمة وممدب من طرفه. يخرج من وسط القنة ريش أطول من باقى ريش الرأس يكون قنزعة أو شبه قنزعة ، أما ريشات الأكتاف فهي طويلة ولكنها لا تصل إلى طرف الجناح . حوالى ١١ نوعا منه فى العالم . يشاهد فى مصر منه اثنان والموجود فى العالم كله هو ٦٣ واحد مختلفة . يشمل هذا الجنس على عدة أنواع لها من المواطن ما للفصيلة كلها .

مالك الحزين (البلشون العادى أو الرمادى)
Common Heron = Grey Heron (European Form)
(Ardea cinerea cinerea)

الوصف : طولها حوالى ٣٨ بوصة . انظر لوحة (٤٥) شكل (١٠)
الموطن : البعض من الأوبد ، وبعضه الآخر من القواطع . يتوالد صيفا فى أوروبا جنوب خط عرض ٦٠° شمالا ، فى السويد وروسيا تمتد إلى جنوب أوروبا ، كذلك فى أزورة وماديرة وقناريا وشمال إفريقيا ، كذلك يتوالد فى شمال آسيا من جنوب خط عرض ٦٠° شمالا إلى جنوبها لغاية سيلان .

فى مصر : بعضه يقيم بها طول السنة حيث يتوالد فى مستنقعات وجزر شمال الدلتا والبحر الأحمر وربما توالد فى الفيوم ووادى النطرون . وهو يزداد شتاء بما يهاجر له أيضا من أوروبا ، وخاصة فى الحريف . لا يتوالد فى سيناء ، ولكن يهاجر منها وإليها ، وهجرة الحريف له فيها من أكتوبر إلى مارس ، وفى الدلتا من سبتمبر إلى نوفمبر . وشوهد فى الواحات الداخلة والخارجة فى مارس .

مميزاته وطبائعه : بلشون كبير الحجم ، أجزاءه العليا رمادية رصاصية والسفلى بيضاء . له تاج أسود كما له خصلة متدلّة تحت أسفل الرقبة قرب الصدر ، يوجدان فى البالغ فقط . يثنى رقبته على شكل حرف S أثناء طيرانه ، أما فى وقوفه فيدخل رقبته بين أكتافه وتارة يمدّها لأعلى كأنه يستطلع شيئا وتارة يوجه كذلك منقاره ورأسه للسماء كأنه يطلب من الله شيئا ويستمر على ذلك بدون حركة عدة فترات (١)
يقف كذلك على الأشجار صوته تقريبا هكذا (Frank) طعامه السمك يصيده ليلا ، يقف ساكنا وعندما يشعر بالفرسة فى الماء ينقرها ويصيدها بأسرع من لمح البصر . طيرانه قوى ، وخفقات أجنحته من ١٥٨ - ١٦٧ خفقة فى الدقيقة . يسحب أرجله خلفه عند طيرانه . يأكل كذلك الضفادع وصغار الحيوانات الثديية والسحالي والخنافس . يغشى المستنقعات والماء العذب والمالح والموحل والرائق . يجيد السباحة . يبنى عشه فى جماعات .

(١) ربما أنت تسميته مالك الحزين من مشهد ذلك الأتية بالحزين ، وقيل لأنه يفضل الأماكن المنعزلة البعيدة عن العمران فوصف بالحزن لوحده وانفراده وقيل لأنه يلزم الجداول والغدران فإذا جفت أو غاضت استولى عليه الحزن والكتابة وكل هذه التعليقات مقبولة .

البشون الأرجواني الغربي
(Purple Heron (Western Form.)
(Ardea purpurea purpurea)

الوصف : طوله حوالى ٣٢ بوصة . انظر اللوحة (٤٥) شكل (١١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط وجنوب أوروبا (ما عدا المورة وصقلية وسردينيا
وقورسيقا وقلب إيطاليا وشمال غرب أيبيريا) ويهاجر شتاء إلى إفريقية حتى الكاب ومدغشقر وغرب
ووسط آسيا .

في مصر : يشاهد فيها في الاعتدالين وقليل منه يقضى الشتاء فيها ، وهجرة الخريف في سبتمبر
ونوفمبر ، والربيع في مارس وإبريل . وشهد شتاء في الدلتا في يناير وفبراير كذلك في سينا في أكتوبر
وأبريل .

مميزاته وصفاته : يشاهد في جموع كبيرة مسابحة في جو السماء بالقرب من مصوع في يوليو
وأغسطس . أصغر قليلا من مالك الحزين السابق . لونه العام أحر رملي في أجزائه العليا وقسطل في
أجزائه السفلى . له تاج ، يتدل منه ريش من أسفل الرقبة . مأواه القصب الكثيف ولذا يكون مخفيا
غالبا ، يقف على أشجار النخيل إذا كان النخل قرب المستنقعات والمياه . طعامه كالسابق أعلى القنة
أسود يخرج منها ريشتان سوداوان طويلتان .

جنس البشون الأبيض (أَجْرَتَا)
Genus (Egretta)

يمتاز هذا الجنس ببياض كل ريش أنواعه ، إما بياض كالثلج ناصع البياض ، وإما قدر قليلا ،
كما أن منقاره أرق وأرفع من جنس البشون (أَرْدَا) وريش ظهر صغار الأولاد طويل . عالمي التوزيع
يستوطن جنوب أوروبا وخاصة جنوبها الشرقى ، كذلك كل إفريقية ووسط وجنوب آسيا حتى اليابان .
وتمتاز الرقبة في هذا الجنس بطولها . ولا يختلف الشقان في لونها اختلافا ملحوظا وكذلك في البالغ
والبالغ فإنهما لا يختلفان في لونها .

البشون الأبيض الكبير
Great White Heron (Palaearctic Form)
(Egretta alba alba)

الوصف : طوله حوالى ٣٥ بوصة . انظر لوحة (٤٤) شكل (٢)
الموطن : يتوالد صيفا في جنوب شرق أوروبا شرقا إلى شمال الهند واليابان ، وهو من القواطع
فيهاجر شتاء إلى شمال إفريقية والهند وجنوب الصين .

في مصر : يشاهد شتاء فيها وخاصة في الدلتا من نوفمبر إلى مارس .
مميزاته وصفاته : كله أبيض اللون في ريشه . أسود المنقار (١) والأرجل . في حجم مالك
الحزين . يشاهد منفردا وتارة في جموع صغيرة . لا يطير جماعات ، طعامه كالسابق أى مالك الحزين
وعاداته مثله

(١) المنقار مصفر عند القاعدة .

البلشون الصغير (طائر الغنم)

little Egret (Palearctic Form)

(Egretta garzetta)

الوصف : طوله حوالى ٢٢ بوصة . انظر اللوحة (٤٤) شكل (١)
الموطن : من القواطع ومقيم ومتجول : يتوالد صيفا في جنوب أوروبا ماعدا إيطاليا واليونان فإنه يزورها كمتجول فقط . كذلك يتوالد في جنوب آسيا كالهند وفي شرقها كالصين واليابان ، كذلك في كل إفريقية ومدغشقر .
كما أنه يقيم طول السنة في الهند وسيلان وسيام (تايلاند) والفلبين كذلك يقيم طول السنة في الكاب زيادة على أفراد تزوره كذلك شتاء .
في مصر : يقيم بها طول السنة وخاصة في الدلتا ومصر العليا والفيوم ، ولكن رؤيته قليلة لتتبع الصيادين له .

مميزاته وصفاته : شائع الوجود بكثرة في الهند في القرى والبرك المائية والمستنقعات لأن الهنود هناك يحمونه . كذلك يرى في حدائق الحيوان بالجيزة في صحبة أبي قردان ، كما يشاهد أحيانا في جو القاهرة ويظنه الرائي أنه أبو قردان ، صغير الجسم ، أبيض اللون ناصعه ، أسود المنقار ، وأرجله سوداء الرسخ والسيقان ، أصفر الأقدام (١) يشاهد في اسراب في الحقول . يتبع الماشية للبحث عن القمل والقراد والحشرات التي تثيرها الماشية في الأماكن المكشوفة . له تاج صغير قصير في مؤخرة الفنة ويطول التاج جدا صيفا حتى يصل إلى الأكتاف .

توالده : في الأشجار النامية وسط الماء أو قريبة منه ، يبني العش من الحشائش الجافة وصغار الفروع . البيض من ٣ : ٦ بيضات ، عادة ٤ بيضات مائلة للخضرة أو الزرقة ، والحضانة من ٢١ : ٢٥ يوما ويساهم الذكر مع أنثاه في إطعام الأولاد .

بلشون البحر الأحمر البحرى

Reef Heron (Red Sea Form)

(Egretta gularis schistacea)

الوصف : طوله حوالى ٢١ بوصة . انظر اللوحة (٤٤) شكل (٣)
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة على سواحل البحر الأحمر عند عدن . وشمالها ، وبلاذ العرب والخليج الفارسي إلى سيلان .

في مصر : يقيم على سواحل البحر الأحمر داخل حدودها عند أبي زنيمة والقصير كذلك في سيناء .
مميزاته وعاداته : يأوى إلى الصخور البحرية والمساحات الطينية نشيط للغاية في الليالي المقمرة ليلا . يوجد منفردا على الشواطئ الرملية للأهوار وحواف الصخور والأشجار العالية والمنخفضة القريبة من الماء . طعامه الأساسي السمك الصغير والسرطان البحرى وصغار الثدييات الرخوة والبحرية .
يخوض المياه الضحلة وهو على شكلين : شكل أبيض ناصع ، وآخر أبيض قذر ، والأول أكثر شيوعا ،

(١) يوجد في أمريكا شبيه به أقدامه صفراء مثله وأرجله سوداء اسمه Swow egret = leucophoyx thula

والنوع الآخر نجد كل الريش فيه أزرق غامق ماعدا الذقن والحذ وأعلى الزور فكل ذلك أبيض .
ريشتان طويلتان على القنة . يمتاز عن غيره بمنقاره البني القرنى الغامق وساقه القصير ، وأقدام الأرجل
صفراء ، ويوجد شكل من لونه أزرق سوداني وأقدامه صفراء ودائرة العين صفراء .

جنس (أبي قردان)

أرديولا (Ardeola) Genus

يمتاز هذا الجنس بقصر الرسغ نسبيا عن جنس آرديا (البلشون الكبير) ، و جنس (إجريتيا)
(البلشون الأبيض) . كما أن هناك حراشيف مستطيلة في الساق من أمامه . الجناح ناصع البياض .
موطنه جنوب أوروبا وكل إفريقيا شرقا إلى آسيا عند بحر قزوين ، وربما انتشر في باقي أوروبا (١)
تخرج من وسط القنة زوائد ريشيه ومثلها من أسفل العنق صفراء يرتقالية صيفا فقط تنعدم شتاء . تفضل
المستنقعات وضياف الأنهار والبحار كما تغشى الأراضي الزراعية وخاصة المحروثة بحثا عن الحشرات
والديدان . طعامها الاسماك الصغيرة كذلك والقاذورات . تطير بزوج قرن الشمس صباحا ثم تعود
إلى مبيتها عند الغروب . تبيت في جماعات وكذلك تبنى أعشاشها في مستعمرات فوق الأشجار . إذا
تحركت على الأرض نقلت قدمها في بطة وتؤدة . البيض من ٤ : ٥ خضراء تقريبا .

نوعان منه في مصر .

أبو قردان الغربي

Buff — backed Heron (Western form)

(Ardeola ilis ilis) = Cattle Egret

Heron Family

الوصف : طوله حوالى ٢٠ بوصة . انظر اللوحة (٤٤) شكل (٤)

الموطن : من الأوابد ومتجول . يقيم طول السنة حيث يتوالد في جنوب أوروبا في أسبانيا والبرتغال
وجنوب فرنسا وإيطاليا واليونان (أى الأقاليم المطلة على البحر الأبيض المتوسط) كذلك في قبرص
ومعظم إفريقيا وكل مدغشقر وبلاد العرب إلى بحر قزوين وفارس في آسيا . متجول في وسط وشمال
أوروبا . (٢)

في مصر : يقيم فيها طول السنة حيث يتوالد في مصر العليا والفيوم وفي القاهرة نفسها في أرض
الجزيرة (مدينة الملاهي) وكاد أن ينقرض حوالى سنة ١٩١٢ م لولا أن القانون حماه فعاد إلى الظهور
بكثرة الآن فيها في كل مكان ، وهو متجول إلى شمال الدلتا فقط .

مميزاته وطباعه : أمام أعيننا كل حين سابحا في سماء القاهرة فوق النيل خاصة في جماعات
متفاوتة . يغشى الأراضي الزراعية المرواة والمحروثة طلبا للحشرات والديدان . لونه أبيض خالص
شتاء ، تعلوه صفرة محمرة على الأكتاف وأسفل العنق صيفا . يغشى كذلك زرائب المواشى وأماكن
القاذورات في أى مكان . يشاهد كل ليلة وهويبيت على أشجار أرض الملاهي بالجيزة في القاهرة . شائع
جدا في مستنقعات أندولشيا حيث ترى آلاف منه بين الماشية أو على ظهورها تلتقط القراد والقمل ،
ولا يشاهد هذا المنظر في مصر إلا نادرا .

(١) أصبح الآن سنة ١٩٧٤ عالميا إذ انتشر في كل قارات العالم حتى الأمريكتين بعد تحواله .

(٢) أصبح الآن عالميا كما قلنا سابقا في كل قارات العالم .

توالده : العش على الأشجار - مثلاً أشجار الكافور التي أمام سور حديقة الحيوان بالجيزة وفي أرض الملاهي بالجيزة ، والعش من سيقان النباتات الرفيعة ، والأعشاش تكون جماعات في مستعمرات مصحوبة بأصوات وضجيج ، تضع الأنثى من ٣ : ٥ بيضات ، عادة ٤ بيضات في إبريل ومايو ويتناوب الذكر مع أنثاه الحضنة التي هي من ٢١ : ٢٤ يوما ، كما يساهم الأب مع الأم في إطعام الأولاد .

بلشون اسكواكو

Squacco Heron

(Ardeola ralloides)

الوصف : طوله حوالي ١٩ بوصة . انظر اللوحة (٤٤) شكل (٥)
الموطن : من الأوايد ومتجول : يتوالد صيفا في جنوب أوروبا (في شمال البلقان وشمال إيطاليا وجنوب فرنسا وجنوب أسبانيا) كذلك في جنوب روسيا شرقا إلى فارس وبحر قزوين وآسيا الصغرى وفلسطين كذلك خلال إفريقية كلها إلى الكاب .

في مصر : يقيم بها طول السنة ولكن رؤيته قليلة لأنه يتوارى بقلب القصب في البحيرات والمستنقعات والبرك ، ولم يعثر له على عش فيها .

مميزاته وطبائعه : أصغر من طائر الغنم قليلا ، وأصفر منه لونا محمرا قليلا ، وأهم ما يميزه أرجله الخضراء ومنقاره المخضر اللون الأسود الطرف ، أما أبو قردان فأرجله حمراء ومنقاره أحمر ، والأرجل في أبي قردان مائلة للصفرة أو للون البني أو الأسود . يشاهد غالبا منفردا وليس في جماعات كأي قردان ، يختفي في الغاب والأشجار ولا كذلك في فصول التوالد وبناء الأعشاش . يتناول طعامه ليلا ويختفي نهارا .

توالده : يتوالد في جموع صغيرة في الأشجار أو بين أعواد القصب في الماء . العش من الحشائش يبنى في أي شهر من شهور السنة . البيض من ٤ : ٦ بيضات ويشارك الذكر مع أنثاه في الحضنة .

البلشون الأخضر الظهر

Green - backed heron

Butorides striatus

الوصف : طوله حوالي ١٥ بوصة . انظر اللوحة (٤٤) شكل (٧)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد بكافة أنواعه على سواحل إفريقية الاستوائية وأستراليا وجنوب وشرق أمريكا الشمالية وجنوب ووسط أمريكا الجنوبية والوسطى .

في مصر : شوهد صدفة فيها على سواحل البحر الأحمر داخل حدودها ، يذكر بنهوت أنه شاهده في جزيرة جوبال عند مصب خليج السويس في يناير سنة ١٩١٩

مميزاته : ظهره أخضر غامق والنصل الانسي والوحشي للريش أبيض اللون وخاصة في الجناح . الذقن والزور أبيضان . الأجزاء السفلى رمادية فاتحة مع بقعة برتقالية في أسفل الزور وأعلى الصدر . والقزحية صفراء غامقة والقدم أخضر زيتوني والمنقار أسود .

جنس الواق (غراب الليل) (الواق الكبير)

نُكْتِيكُورَاكْس (Genus Nycticorax)

Night — heron

يستوطن هذا الجنس أحواض الأنهار والبحار مثل حوض وادي الطونة (الدانوب) في أوروبا وكذلك هولنده حيث المستنقعات والمياه ، ومناطق البحر الأسود وقزوين وحوض البحر الأبيض المتوسط ، وينتشر شرقا إلى الهند والصين واليابان وكذلك في كل افريقية تقريبا .

ريشه غزير على كل جسمه إلا ثلاث ريشات طويلة تخرج من مؤخر الرأس.القسمه (الصدغ) وحوالي ٢ سم تقريبا من القصبه عاريا من الريش لا يزيد طول المنقار فيه على طول الرأس وهو قوى نسبيا وطرف الفك العلوى منحن قليلا ، أما الفك السفلى فهو بطول الساق أو أقصر قليلا منه . الرقبة أقصر من كل رقاب البلشون . ينشط ليلا ويستريح نهارا ، ومأواه قلب الدوح وأعلى الأشجار الضخمة العالية حيث هى مأوى استراحتة ونومه نهارا كما هى أيضا موطن عشه . قلما يغشى المستنقعات التى ليست بقربها غابات أو أى أشجار . يسمع صوته ليلا في الساء في جموع مختلفة ، حتى إذا ما عثرت على مأواها المائى الشجريه حومت عليه وهبطت إليه ، كما أنها تجيد التسلق على الأشجار وبين فروعها ، كما أنها أيضا شديدة الحذر ، أما إذا أمت فإنها لا تعطى شكاً من من يقترب منها وخاصة في قلب حديقة الحيوان كما نراه . البيض من ٤ : ٥ والأنثى تحضن وحدها البيض وتكون الذكور على مقربة منها ، وإذا خافت طارت الذكور إلى أقرب مكان تخفى فيه . تبيض الأنثى أحيانا مرتين أو ثلاث مرات في السنة ، وفي فترات التزاوج تخرج الطيور للمصيد نهارا فضلا عن صيد الليل كى تطعم الأولاد . لا يسمع لها حفيف أجنحة في طيرانها . قليل من هذا الجنس استوائى . نوع واحد منه في مصر .

غراب الليل الأوروبي (الواق)

Night heron (European Form) (١)

(Nycticorax nycticorax nycticorax)

الوصف : طوله حوالى ٢٣ بوصة . انظر لوحة (٤٤) شكل (٨)

الموطن : منه ما يقيم طول السنة ، ومنه ما يقطع إلى بلاد أخرى في هجرته ، يتوالد صيفا في وسط وجنوب أوروبا ، ويقضى الشتاء في إفريقية عند نيجيريا ، كما أن كثيرا منه يقيم طول السنة في حوض البحر الأبيض المتوسط شرقا إلى البحر الأسود والهند والعراق وفارس والصين واليابان وأرخبيل الملايو ، كما أن البعض يهاجر من شمال إفريقية على ساحل البحر ومن جنوب أوروبا إلى إفريقية حتى الكاب ومدغشقر ومنه ما يقطن الولايات المتحدة واستراليا .

في مصر : يقيم فيها طول السنة وخاصة الدلتا والفيوم والأقصر وأسوان ، لم يسجل من سيناء .

مميزاته وطباعه : ثقيل في طيرانه ، بطيء خفقات الأجنحة ولكنه يجيد الطيران ، يرى نهارا ساكنا فوق قمة شجرة بالغة الارتفاع . حركاته ليلية ويقول الجاحظ : غراب الليل ، غراب ترك أخلاق

(١) يسميه الأمريكان Black—Ceowned nigh—heron وهو يقطن الولايات المتحدة أيضا وكذلك بسميه

الاستراليون بهذا الاسم .

الغريبان وتشبه بأخلاق البوم فهو من طيور الليل (. صوته هكذا (Kwak) ولذا يسميه عامة الهواة (الواق) وذلك من صوته . يميزه الثلاث ريشات الخارجة من وسط القنة والممتدة إلى الظهر وهي بيضاء . الظهر والقنة أسودان ، والأجزاء السفلى بيضاء والقوادم والخوافى رمادية . يدخل رقبته بين أكتافه في طيرانه ويمد رجليه خلف الذيل . كذلك في وقوفه يدخل رأسه بين أكتافه . طعامه ليلا الفئران الصغيرة والسحالي والخنافس والحشرات كما يهاجم أعشاش الطيور الصغيرة والكبيرة إن استطاع . الشقان متماثلان في اللون .

توالده : شوهد عشه في أشجار نامية في الماء أو قريبا منه في فيكتوريا نيانزا يتراوح ارتفاع الشجرة من ٥ : ٦ أقدام فقط ، كما يشاهد العش في الأشجار المائية في بركة الماء التي في وسط حدائق الحيوان بالحيزة .

العش من القش الخ والبيض من ٣ : ٤ ، عادة ٣ بيضات زرقاء فاتحة توضع في مايو أو سبتمبر ، يوضع البيض في مدى ٤٨ ساعة ، والحضانة بالإثنين ٢١ يوما ثم يغادر الكتكوت العش بعد ٣ أو ٤ أسابيع ولكنه لا يطير إلا بعد ستة أسابيع .

جنس الواق الصغير (إَجْزُؤُبرْتشُوس) الحناشة Genus (Ixobrychus) = little Bittern

هو واق صغير لا يزيد ارتفاعه عن الأرض أكثر من ١٢ بوصة . طويل المنقار مسحوبه بشكل الخنجر . المنخر عبارة عن شق الرقبة طويلة الذيل ١٠ ريشات . ليس له تاج . الشقان مختلفان . طائر ليلى . البيض أبيض وليس أزرق . أطول القوادم الثانية . يظل نهاره قابعا في وسط وقلب الأعشاب المائية كالقصب وخلافه أو بين فروع الأشجار ولا يثيرها من مكنتها إلا صوت طلقات نارية بجواره أو الخوف من الإنسان أو الحيوان نفسه في قلب الأدغال المائية . إذا مشى مدت رقابه للأمام . تجيد التسلق . طعامها الأسماك والضفادع والحشرات الخ وقتل الطيور الصغيرة بطرف منقاره المدب الذي يستخدمه حتى في وخز الإنسان إذا كان حيا وخاصة في العيون . العش على سيقان القصب ويندر أن يكون فوق الأرض أو الماء مباشرة . البيض ٣ : ٥ . يألف حياة الأقباص سريعا ويبيع للبهواة كثيرا من ضروب التسلية والسرور ولكنه خائن في نقره بطرف المنقار . انواع منه في استراليا ونيوزيلند ومدغشقر وإفريقية . وقد يطلق صوتا من قرار القصب يسمع من ثلاثة أميال .

حوالى ١٢ نوعا منه تقطن العالم . واحد منه في مصر .

الحفّاشة (الواقّة الصغيرة)
Little Bittern (Palearctic Form.)
(Ixobrychus minutus minutus.)

Heron Family

الوصف : طوله حوالي ١٤ بوصة . انظر لوحة (٤٤) شكل (١٠)

الموطن : البعض من الأوبد ، والآخر من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا (ماعدا اسكندناوة والجزر البريطانية واليونان وسردينيا وقورسيتا) وتمتد في توالدها شرقا إلى جبال أورال وبحر قزوين وكشمير والهند . كذلك هي تقيم طول السنة في كل إفريقية تقريبا وتزداد شتاء بما يهاجر لها من الشمال من أوروبا ولكنها نادرة في جنوب إفريقية وهي تهاجر من آسبانيا وإيطاليا واليونان في الخريف وتعود لها في الربيع . وعددها في شمال إفريقية تزداد شتاء بما يأتي لها من الشمال .

في مصر : تقيم طول السنة بها ولكنها تزداد في الخريف بما يهاجر لها من أوروبا وكذلك في الربيع بما يأتي لها من جنوبها ، وأكثر وجودها هو في البحيرات ذوات القصب والبردى الخ . ولوحظت هجرتها في الخريف في ١٧ أغسطس ، ٤ سبتمبر ، ٣٠ أكتوبر ، والخريف في إبريل . ولم تسجل من سيناء في أي مكان .


مميزاتها وعاداتها : هونفس ما قبل عنها في الجنس (جنس الواق الصغير للذكر خط عرضي أبيض يشق ظهر الجناح . تقف ساكنة بدون حركة مثل مالك الحزين فتدخل رقبته ورأسها بين أكتافها ، أما إذا شغلها شاغل حركت رأسها ورقبتها بمنة ويسرة ومدّت رقبته طويلا ووجهت منقارها ناحية السماء كما يفعل أيضا مالك الحزين .

توالدها : كما قبل عنها في الجنس صفحة ٣١٣ ، البيض عادة ٤ بيضات توضع في مايو ويونيو والحضانة من الإثنين تستغرق من ١٦ : ١٩ يوما ، والإطعام بالشقين أيضا من ٧ : ٩ أسابيع . ويمكن للصغير أن يطير بعد أن يبلغ من العمر ثلاثين يوما .


جنس الواق الكبير (الأنيس = الوبة)
Genus (Botaurus.)

يمتاز هذا الجنس بقوة منقاره الذي هو أقصر بكثير من الرسغ ، وهو مضغوط مسنن الطرف ويشبه المشط قبل نهايته ، الذيل ١٠ ريشات ، والشقان متماثلان ، المخالب طويلة ومنحنية قليلا ، ومخلب أصبع القدم الوسطى أطول بكثير من الرسغ . توجد خطوط مستقيمة رفيعة بنية غامقة معتمة وسوداء وصفراء تتخلل ريش الجسم . عريض الأجنحة . يغرز الريش على العنق . موطنه البحيرات والبرك المائية ذوات القصب والبردى الكثيف ولا تفارقه إلا في أيام الهجرة ، يطير نهارا فوق سطح الأحراش المائية ثم يطبق جناحيه هابطا في قرار القصب والغاب ، كما أنها تعلق في الجوليل وتصيد طعامه ليلا من السمك والضفادع والحشرات والحيوانات البحرية الرخوة والديدان . في فترات التزاوج نسمع صراخ الذكور ليلا . العش في قرار الغاب وتارة فوق سطح الماء أو على أرض وسط الماء أو قريبة منه ذات أحراش . ويصبح بقرار القصب بصوت أشبه برغاء البقر ^(١) ثلاثة أنواع منها في العالم . نوع واحد منه يرى في مصر .


(١) ومنه أخذ اسمه اللاتيني Botaurus




Flamingo (Old World Form.)




Mute Swan.



Lesser White-fronted Goose




Bean Goose.




Brent Goose



Red-breasted Goose.




Egyptian 'Goose




European Bee-eater



Wryneck



Little Ringed Plover



Montagu's Harrier

Pallied Harrier

Hen Harrier



Plover

في ٢ ، ٣ ، لاحظ أغطية القوائم منفردة ، في حين أن الأغطية ملتصقة في مونتاجو - كذلك خامس قادمة طاهرة في مونتاجو
وفي رقم (٢) وليس بها هوامش وهي قصيرة : وفي رقم (٣) بها هامش (نصل وحش) وهو أطول . لاحظ الخط العرضي الأبيض فوق ظهر الجناح

لاحظ الخط العرضي الأبيض فوق ظهر الجناح

الأنيس = (الوبه) (شكل البلياركتك)

common Bittern (Palearctic Form.)

(Botaurus stellaris stellaris.)

الوصف : طوله حوالى ٢٩ بوصة . انظر لوحة (٤٤) شكل (١٠)
الموطن : مقيم ومهاجر : يتوالد طول الصيف في معظم أنحاء أوروبا بل كلها ماعدا اسكتلندا
واليونان ، كذلك يتوالد في شمال غرب إفريقيا وآسيا إلى اليابان . تزور أفراد منه شتاء جنوب موطن
توالدها فتهاجر إلى الهند والصين وإفريقية الاستوائية والجنوبية وبلاد العرب .

في مصر : شائع الوجود شتاء في نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وإبريل ، ولم يشاهد في
سيناء لعدم وجود البرك والأحراش المائية .

مميزاته : مثل ما قيل عن جنسه وكذلك يندر أن يفارق غياهب نهارا في قرار الغاب ما لم يزعه أحد
فيهب مفزوعا . صوته للمناجاة والمناداه هكذا Kee-doo وللصراخ هكذا Kak يقف غالبا وسط قرار
الغاب مصوبا متقاره ورأسه ناحية السماء كأنه يناجى الله مثل مالك الحزين . طيرانه في اتجاه واحد .
توالده : العش في قرار القصب المائي قد يبلغ غوره حوالى ٣٠ بوصة . ويعلو عن سطح الماء
بحوالى ١٤ بوصة . والبيض من ٤ : ٦ بيضات عادة خمس بنية زيتونية والحضانة ٢٥ يوما وتغادر الأولاد
والعش بعد أسبوعين أو ثلاثة ولا يكمل نموها إلا بعد حوالى ٨ أسابيع حتى تبدأ في عملية الطيران .

رتبة (فيونيكوبترى) = الرتبة النحامية ^(١)

Order (phoenicopteriformes = phoenicopterii).

البشروش (Flamingos.)

توجد هذه الفصيلة في كل أنحاء العالم ^(٢) بمناطق المياه عند مصب الأنهار والبحيرات وخاصة
الوشلة الخ . .

وتمتاز هذه الرتبة بأرجلها المتناهية في الطول وكذلك رقابها التي هي تعادها في طولها ، كما أنه يوجد
بالساق حراشيف مستطيلة عريضة ، معظم الفخذ عار . تتصل أصابع القدم الأمامية بأغشية ،
والأصبع الخلفية في غاية الضلالة أو تكاد تكون منعدمة . ضخمة المقار منحنية الاطراف واضحة النفوس
في كل الأنواع ، وتوجد أسنان على هيئة المشط في كلا الفكين . اللسان أحمر اللون وفي غاية الغلظ .
القسمه عادية . تحتشد في أسراب دائيا ويندر أن تشاهد فرادى . وتقوم هذه الرتبة على فصيلة واحدة ،
ذات جنس واحد والمعروف عن لسانه الغليظ أنه لين وله ١٦ حلمة على كلا جانبيه ، والمقار مكسو
بغشاء لين عند قاعدته وهو أطول قليلا من الرأس . أطول القوائم الثانية . الذيل قصير مكون من ١٢
ريشة ، موطنه البحيرات الملحة القريبة من الشواطئ وقد تأوى أحيانا إلى المياه العذبة . تنام عادة على
رجل واحدة وتطوى الأخرى وتكون الرقبة عندئذ على حرف S أما عند الخوف فيرفع رأسه ويمد رقبة
لأعلى . تحب السباحة ولكنها تفضل المياه الوشلة غير عميقة . قبل أن تطير تجرى أولا على سطح الماء أو

(١) المعروف عنها ١٤ نوعا والذي على قيد الحياة الآن هو ٥ أنواع فقط

(٢) ماعدا استراليا .

الأرض ثم تنهض بعد ذلك سابحة في الجو . الغذاء من الديدان والحيوانات البحرية الرخوة ويرقات البعوض والقواطع والحلازين كما أنها تبتلع أجزاء من الطين بما تحوى من حيوان ، كما تأكل كذلك الحبوب .

تتخذ الأعشاش وسط الماء وهى عبارة عن كتلة من الطين مخروطية الشكل تهرسه أولا بأقدامها وتخلطها ببعض أعشاب الماء ثم ترفعه عن سطح الماء بمقدار حوالى ٧/٨ متر تقريبا وتكون الفتحة إلى أعلى ، كما يكون العش أيضا عبارة عن حفرة في الأرض تحفره بأقدامها . البيض من ٢ : ٣ بيضاء طباشير ، ومن العجيب أنه إذا أزيلت الطبقة الجيرية ظهر لون البضرة أزرق مخضر ، وتحتضن الأنثى البيض دون أن تمسه ببدنها وجسمها ، والحضانة حوالى ٣٠ يوما يتناوب فيها الزوجان هذا الواجب . وبمجرد خروج الصغار من البيض تبارح العش وتأخذها الآباء إلى الماء وتسبح فيه من أول يوم لها ثم تستطيع المشى بعد ١٤ يوما ، والطيران بعد بضعة أشهر .

تقطن البحيرات الداخلية للمقارات وتتغذى كما سبق على فقريات وهلاميات مائية صغيرة وذلك بعمل مصفاة بين الفكين فيبقى الغذاء في الفم بعد ذلك مجتمعاً في الفك السفلى .

الفصيلة النحامية (Phoenicopteridae)

Flamingo Family

تستوطن هذه الفصيلة المناطق الحارة والمعتدلة من العالم ، ولكنها تنعدم في جزر المحيطات واستراليا وتسمانيا ونيوزيلند . وهذه الفصيلة كل ما للرتبة من خصائص ومميزات وتوزيع . ويعرف منها ١٤ نوعاً ولكن الموجود حالياً هو ٥ أنواع فقط . نوع واحد منها في مصر . والجنس ٣

جنس النحام (البشروش)

Genus (Phoenicopterus.)

هى مثل الرتبة والفصيلة في كل شيء والشقان لا يختلفان ، ويخالف اليافع البالغ في لونه .

النحام (البشروش) (شكل الدنيا القديمة)

Flamingo (Old World Form.)

(Phoenicopterus ruber antiquorum.)

الوصف : طوله حوالى ٥٣ بوصة . انظر اللوحة (٤٦) شكل (١)
الموطن : مقيم ومهاجر ومتجول : يتوالد صيفاً في أسبانيا وجنوب فرنسا وفي أقصى الشرق عند بحيرة بيكال وجزيرة سيلان ، كما أنه يتجول في غرب أوروبا ، كذلك يتوالد في الهند ويغشى كل إفريقيا مقنيا ومهاجراً ومتجولاً .

في مصر : يقيم بها طول السنة في منطقة قنال السويس وبحيرة المنزلة والبردويل ومريوط والفيوم ووادي النطرون وإدكو . وهو قليل في النيل من القاهرة إلى أسوان ، ويزيد في الاعدالين بما يهاجر إليه من أوروبا في الخريف ، ومن جنوب ووسط أفريقيا في الربيع . وكان يتوالد سابقاً في الدلتا في المنزلة والبردويل حيث أخذ يبيضه منها في مايو سنة ١٨٩٤ م وكان ومازال حتى سنة ١٩٢٩ ، وقيل أن يعثر على عش له الآن لتتبع الصيادين له بالصيد .

مميزاته وطبائعه : هي مثل الرتبة في كل شيء إذا تناول طعامه في المستنقعات نجده يغمر رأسه ويكركر بمنقاره في الماء كما يفعل البط أحيانا بحثا عن السمك والقشور الصدفية والرخويات . الأرجل حمراء دموية الجسم كله أبيض مشرب بحمرة وردية متفاوتة . يسمع صوته من مسافة بعيدة إذا كان سابحا في طبقات الجو العليا . يوجد في أسراب .
النوالد : ذكر في الرتبة .

رتبة الوزيات (أنسيريس) Order (Anseres.) = (Anseriformes.) دواجن الماء Waterfowls.

تشتمل هذه الرتبة الواسعة الأنواع على جنس التمس (Swans) والأوز (Geese) والبط (Ducks) المستأنس والبري ، ويضيف إلى هذه الرتبة بعض علماء الطيور جنس الاسكريمار Screamer وكذلك meiganser وكلها دواجن مائية (Water-Fowls) والمعروف منها هو ٢٣٩ نوعا ولكن الموجود منها حاليا هو ١٤٦ نوعا فقط (١) . وكلها عالمية تقطن كل بقاع الأرض ماعدا مناطق القطب الجنوبي ، ومعظمها في نصف الكرة الشمالي ، كما أنها تقريبا تعيش في مستعمرات (أى جماعات) كبيرة . وتنقسم المجموعة إلى قسمين وهما : - الوزيات الأصلية (Anserinae) وهى التى لا يختلف فيها ريش الذكور عن ريش الإناث طول السنة وهى التمس Swans والأوز Geese ويط الشجر Tree-ducks وأشباه البط Duck-like ، وتميزها الحراشيف المربعة فى الساق ، والثانية هى البطيات Ducks (Anatidae) وهى التى يختلف فيها ريش الإناث أثناء الزواج العرسى فى الربيع والصيف ، وتميزها الحراشيف المستديرة فى الساق .

وتمتاز هذه الرتبة باستطالة أجسام طيورها ، وطول رقابها ، وكبر وضخامة رءوسها تقريبا ، كما يندر أن يزيد طول المنقار فيها على طول الرأس ، وهذا المنقار عريض أحذب أو مقعر من وسطه فى الفك العلوى الذى ينتهى بعرتين مدبب عريض كالمخلب ، وعلى جانبيه أسنان قرنية كالصفائح تدخل العليا فى السفلى عند الانطباق ، اللسان فى غاية الحساسية كما أن جوانبه قرنية ذوات نتوءات كثيرة تجعل منه مصفاة تفصل أدق الأجسام غير الصالحة للغذاء . الساق متوسطة الطول وقد تكون قصيرة أحيانا ، ويتكون القدم من أربعة أصابع ويندر أن تكون ثلاثة أصابع ، والأمامية منها مكففة بالأغشية . الجناح متوسط الطول تقريبا . وكذلك الذنب الذى يكون مستديرا أو مدبب الطرف . والقوادم ١١ ريشة . وهى طيور مائية كما أن بعضها يعيش فوق الأشجار ، وهى تحسن السباحة والغوص ، ثقيلة النهوض للطيران ولكنها تجميله إذا طارت ، وطعامها النباتات والحبوب وبعض اليرقات المائية الهلامية . تتوالد فى الأشجار فى فجوات السيقان أو فجوات الصخور أو بين أدغال الماء حيث ينتقل منها ساكن البحار إلى المياه العذبة ، وتحضن الأنثى بيضها بمفردها والبيض رائق بدون بقع أو نقط ، وهى ترعى أولادها بمفردها وتبارح الأولاد الدنن بمجرد أن يجف زغبها بعد خروجها من البيض ثم تصحب أمها إلى المياه وفى أيام الأعاصير والزوايع والأمطار تلجأ هذه الطيور إلى البحيرات الداخلية حيث هى أهدأ من البحيرات ولذا يصيدونها فى هذه الأيام من البحيرات .

(١) متفرعة من ٤١ جنسا والفصيلة اسمها Anatidae

فصيلة التمس والأوز والبط (Anatidae) Family

والبلقشة (أنا نيداي) = Watre — fawls

Duck Family

لهذه الفصيلة ما للرتبة من خصائص ومميزات

جنس التمس (سيجنوس) (الأوز العراقي)

Genus Cygnus (Swans)

هي جنس طيور طويلة ضخمة الأجسام للغاية ، بالغة الطول في رقاها ، تمدها للأمام أثناء طيرانها ، كما أن أجنحتها عريضة ، بيضاء الريش . تتغذى على النباتات المائية وصغار الحيوانات . تصبح بصراخ مثل البوق والتفير . قصيرة السيقان ذات الحراشيف المربعة ، والقسم عارية في البالغ منها ، يحتوي طرف الفك العلوي على عرنيين كبير ، والذيل قصير مستدير أو مروحي الشكل غالبا ، توجد الأقدام القصيرة في مؤخرة الجسم ، والإصبع الوسطى أطول من الساق والخلفية مرتفعة عن الأرض لا تمسها أثناء سيرها أو وقوفها ، كما لا يوجد انتفاخ بإصبع القدم الخلفي ، والشقان متماثلان أما الناهض فهو معتم قليلا ذو مسحة رمادية خفيفة .

وهي تقطن كل العالم ماعدا المناطق القطبية مع ملاحظة أن أغلبها يقطن نصف الكرة الشمالي في المناطق المعتدلة والباردة : أطول القوام الثانية ينتهي طرف الفك العلوي بمخالب مقوس قليلا لأسفل . الذنب من ١٨ : ٢٤ ريشه ، والريش كثيف ولكنه غير لامع وهو يشبه القطيفة على الرأس والعنق ، أما على الأجزاء السفلى فهو شبه الفراء غليظ قصير ، ولكنه طويل ملء بالزغب في عموم الجسم وطويل في الأجزاء العليا ، تتغذى على نباتات المياه والحبوب والديدان وصغار الأسماك . العش بعيدا عن السواحل ، ثم تلوذ بعد ذلك بالسواحل والبحار بعد التفريخ ، وهي لا تجيد السير فوق الأرض كما أنها لا تجيد ارتقاء الهواء من فوق الأرض إلا بصعوبة كبيرة كما أنها لا تجرؤ على الهبوط عليها في حالة الطيران . وهي طيور إجتماعية من نوعها فقط ولا تختلط بغيرها ومن يفضل طريقه يتعزل ولا يختلط إلا بنوعه . الحضانة للأنثى والحراسة للذكر . تبقى الأولاد في العش بعد الفقس يوما واحدا فقط ثم تقودها الأم إلى الماء وأحيانا يحملها الأبوان على ظهرهما نهارا كما تأويها تحت إبطها ليلا ، وكذلك يدافع الأبوان عنها بشجاعة نادره ٦ (ستة) أنواع منه في العالم . اثنان منه في مصر .

البيض من ٣ : ١٢ بيضة ، عادة خمس بيضات توضع في إبريل ، والحضانة ٣٦ يوما ، يكمل ريش الكتكوت بعد أربعة أشهر ونصف تقريبا . وقد يساهم الذكر أحيانا مع الأنثى .

التمس الصامت

Mute Swan

(Cygnus olor)

الوصف : طوله حوالي ٦٠ بوصة . انظر اللوحة (٤٦) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : يتوالد في مناطق بحر البلطيق وبحر الشمال صيفا (المواطن المقفرة المنعزلة من جنوب اسكندناوة والدنمارك وشمال ألمانيا ووسط وجنوب روسيا شرقا إلى منغوليا) يهاجر شتاء إلى حوض البحر الأبيض المتوسط وإقليم بحر قزوين إلى شمال غرب الهند .

في مصر : صيدت واحدة في فبراير سنة ١٩٢٨ م قرب الإسكندرية هي الآن بالمتحف الحيواني بالجيزة . نادر الزيارة شتاء لمصر . لم يشاهد في سينا .

مميزاته : كبير الجسم . حبة كروية سوداء فوق قاعدة الفك العلوى . المنقار أحمر يرتقلى وهذه الحبة في الأنثى أصغر من حبة الذكر . يمد رقبته للأمام في طيرانه ويسحب رجليه للخلف . إذا طار سمع حفيف الأجنحة مع حدوث ضوضاء . صوته أشبه بصهيل الفرس أثناء جريه على الأرض الوعرة ولو أن اسمه يخالف ذلك ، وربما كانت هذه التسمية لرؤيته كثيرا في حالة سكون أثناء سباحته فوق سطح الماء ولأنه أقل حدوثا للأصوات من التمس الصافر الذى بعده . الباقي كالجنس . يحنى رقبته على حرف تقريبا أثناء سباحته فوق الماء ، بخلاف التمس الصافر الذى يمد رقبته رأسيا أثناء سباحته وكذلك غيره .

التم الصافر

Whooper Swan = whistling Swan

(Cygnus cygnus = Cygnus musicus)

لوصف : طوله حوالى ٦٠ بوصة . انظر اللوحة (٧٣) شكل (٢)
الموطن : يتوالد صيفا في شمال أوراسيا وفي أيسلند . يتجول جنوبا شتاء ، إلى أقاليم حوض لبحر الأبيض المتوسط وفارس وكوريا والصين واليابان ، والبحر الأسود وبحر قزوين .

في مصر : ذكر هيجلن أنه رآه في مصر وليس هناك إثبات قطعى لذلك ، على أنى رأيت في شمال غرب رشيد شتاء في فبراير اثنين ولم أفسرهما على بعد حوالى نصف كيلو متر تقريبا (وهما لا يخرجان عن كونهما اثنين من التمس الصامت أو الصافر) ، ثم طارا بضجيج عندما اقتربت منهما على بعد حوالى مائتى متر تقريبا .

مميزاته : يحتوى المنقار على لونين أصفر ليمونى ، وأسود ، والأصفر أكثر من الأسود ، يمد رقبته رأسيا بدون التواء في سباحته . الذكر أكبر من الأنثى ليس له انتفاخ (حبة) في قاعدة الفك العلوى مثل الصامت السابق ، وإذا كان سابحا وأراد الطيران ضرب الماء بأجنحته إلى بضعة مسافات بسرعة فائقة ثم يرتقى الجوبعد ذلك ، وهذا ما شاهدت في شمال غرب رشيد في المياه الضحلة قرب البحر الأبيض المتوسط في مياه تجمع الأمطار في السبخة في فبراير وربما كانا من نوع الصافر ، وهما يؤيد ذلك أن أجنحتهما أحدثت صوتا كالصفير ولكن لم يتحقق بعد لبعدهما ولذلك يسمى الصافر على أن هذه التسمية هو لصوته العذب الموسيقى الذى يردده أكثر من غيره من بنى جنسه .

جنس الأوز (أنيسر)

Genus (Anser) = Goose

Duck Family

يمتاز هذا الجنس بأن الرأس يُساوى طول المنقار تقريبا ، وأن مكان وخط انطباق الفكين مسنن مشطى وقوى ، كما توجد سنة أو ما يشابهها وهي حادة في طرف المنقار العلوى . المنخر مستدير ومكانه منتصف المنقار أو للخلف قليلا عن الوسط . ريش الرقبة صغير كأنه فروة الجناح طويل نسبيا ، أطول القوادم الثالثة ، والذيل قصير من ١٤ : ٢٠ ريشه . مخالب الأصابع مقوسة . الشقان متماثلان . أقل ولوعا بالماء من طيور الفصيلة ولذا فإن أغلب أوقاتها تقضيه على اليابسة وفوق الأشجار أو بينها ، كما أنها

تحسن السير على الأرض أكثر من أبناء فصيلتها ، ولكنها لا تحسن السباحة مثلها مثل البط والتم (الأوز العراقي) . تستطيع الغوص والطيران .

جعلها الإفرنج - وخاصة الألمان - رمزا للغباء عكس ما هو ملاحظ عليها من شدة حرصها ويقظتها وعدم اطمئنانها ، وحيث هي تقيم جراساً من جنسها على جماعاتها وتدافع عن أولادها في جراءة وبسالة واستماتة نادرة إذا هاجت الصقور أولادها في أعشاشها أو خارجها . الحضنة من ٢٧ : ٢٨ يوماً . البيض ٤ : ٧ . بيضاء مصفرة .

طعامها كل ما نجده من نباتات وجيوب وبذور وقمح وذرة وشعير ومخلفات حيوانية ونباتية وفواكه وحشرات مثل ما يفعل الأوز المنزلي عندنا تماماً .

يوجد منها حوالي ١٢ نوعاً ، تقطن أوروبا وآسيا وأمريكا .

الأوزة الغراء

White - fronted Goose

(Anser albifrons albifrons)

الوصف : طولها حوالي ٢٨ بوصة . انظر اللوحة (٤٦) شكل (٣)
الموطن : من القواطع . تتوالد صيفاً في أقصى شمال إفريقيا وحول البحر الأسود وبحر قزوين وميسوبوتاميا وشمال الهند والصين واليابان .

في مصر : تزورها شتاء ولكن بقلّة والعثور عليها يكون مصادفة رغم أنها أكثر الأوز ظهوراً عن غيرها فيها ، وأكثر ما ترى في الدلتا في ديسمبر ويناير كذلك في الربيع في مارس وإبريل . والنوع الذي يتوالد في شمال كندا يقضي الشتاء في خليج المكسيك .

مميزاتها : تعرف لأول نظرة بغرتها البيضاء التي أخذ منها اسمها ، كذلك يمتاز البالغ بالرتوش (البقع المستطيلة) السوداء في الأجزاء السفلى ، والأرجل برتقالية اللون ، والمنقار أحمر قرنفلي ، أما التي من جرينلند فمقارها أصفر . ليس للصغير غرة بيضاء . الطعام الحشيش (الكلا) الأخضر والبرسيم والنباتات المائية والحبوب وخاصة (القمح) . تغشى المستنقعات والحقول المنزرعة . صوتها تقريباً هكذا (gono) أو (gagga) يسمع من مسافة عالية جداً فوق الرؤوس . وهي في غاية الحذر تطير بمجرد رؤية الإنسان من مسافة شاسعة ، والرأس بنى مسود قليلاً .

الأوزة الرمادية المتقاعسة

Grey-lag Goose

(Anser anser)

الوصف : طولها حوالي ٣٣ بوصة . انظر اللوحة (٧٣) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا وآسيا وتقضى الشتاء في جنوب أوروبا وجنوب آسيا كالسابقة تماما .

في مصر : صيدت صدفة من مربوط في يناير سنة ١٩٤٢ م وكانت واحدة هي التي صيدت من سرب مكون من ٦ منه ويظهر أنه كان متجولا .

المميزات : كالسابقة تماما في العادات . تمتاز بالرأس الشاحب الرمادي ، والجانب الكنتفى الشاحب في الجناح وظهر الجناح الرمادي تقريبا حسب اسمه . كبير الجسم عن زملائه العرنين (طرف أعلى المنقار) أبيض . وهو يرتقى اللون . ليس في المنقار سواد . الرأس أحمر قرنفلي خفيف .

الأوزة الغراء الصغيرة

lesser White-fronted Goose

(Anser erythropus)

الوصف : طولها من ٢١ : ٢٦ بوصة انظر اللوحة (٤٦) شكل (٤)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال شبه جزيرة اسكندناوة وشمال سيبيريا وتقطع الشتاء صوب الجنوب إلى الصين والهند وأوروبا والعراق .

في مصر : تزورها شتاء ولكن ذلك يكون نادرا وبقلة جدا .
مميزاتها : أصغر الأوز المعروف . منقارها أقصر منقار في الأوز ، والعرنين أبيض ، والغرة تمتد للوراء قليلا قرب منتصف القنة ، ويوجد دائر أصفر حول العين ظاهر الوضوح عن غيره وخاص به .
العادات كسابقتهما من بنى جنسها .

أوزة الفول

Bean Goose

(Anser fabalis)

الوصف : طولها من ٢٨ : ٣٥ بوصة . انظر اللوحة (٤٦) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال اسكندناوة وشمال سيبيريا شرقا إلى إقليم التندرا ، كذلك في بحيرات جبال أورال وفي الشتاء تيمم وجهها صوب الجنوب فتزور كل أوروبا وشمال إفريقيا والهند والتركستان .

في مصر : نادرة الحلول في مصر . وما صيد منها فهو من باب المصادفة
مميزاتها : يمتاز المنقار بلونه الأصفر البرتقالي والسواد التي يشقه من قاعدة الفك العلوى إلى قرب منتصفه ولكن السواد متفاوت النسب والحجم ، كما أن الأرجل صفراء برتقالية . والعرنين أسود اللون . وقد يوجد عند قاعدة الفك العلوى خط طولي أبيض ، والرأس بني مائل قليلا للسواد .

جنس برانتا (أوز البحار)

Genus (Branta)

Duck family

يوجد لهذا الجنس أسنان مشطية في الفك العلوى (في أسفله) وهي لا تكون واضحة عند انطباق الفكين . وهو أصغر حجما من سابقه من الأوز . العنق أقصر من سابقه ، والرأس كبير نسبيا ، كما أن المنقار صغير نسبيا وضعيف . مكف القدم ، طويل الجناح الذى يصل عند انطباقه إلى نهاية الذنب المستدير تقريبا . الريش غزير ويغلب على لونه اللون الرمادى . هو طائر ساحل لا يفارق البحار ولا يرى داخل البلاد إلا متجولا أو متابعا لمجرى مائى ، سلوكه هو نفس سلوك الفصيلة وطعامه النباتات والحشرات والديدان . البيض ٤ : ٨ شاحبة اللون ، ويحمى الذكر أنثاه وصغاره من الدخيل حتى ولو كان من الإنسان . الحضانة من الأنثى والذكر لا يفارق العش مدة الحضانة بل يشترك الذكر أيضا مع زوجته في تدريب الأولاد . اثنان منه في مصر .

أوزة حمراء الصدر

Red - breasted Goose

(Branta ruficollis)

الوصف : طولها حوالى ٢١ بوصة . انظر اللوحة (٤٦) شكل (٧)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أحياء سيبيريا التى تقع إلى الحد الشمالى لمنبت الغابات في وديان نهر أوب وينيسى ، وشرقا إلى حوالى خط طول ١١٥° تقضى الشتاء جنوب ما ذكر حتى منطقة بحر آرال والتركستان وبكثرة في بحر قزوين وسهول ترانسقوقاز وبعض أنحاء فارس والعراق .

في مصر : توجد صورة لواحدة منها مرسومة في كتاب (طيور بريطانيا) لجولد ذكر فيه أنه أطلق النيران عليها قرب الإسكندرية في ديسمبر سنة ١٨٧٤ م وتوجد صور أخرى على معابد قدماء المصريين لهذا الأوز وخاصة في مقابر ميدوم وطيبة (الأقصر) .

مميزاتها : الصدر ومعظم الرقبة بنى قسطل فاجر ، ولها خط أبيض منحني يشق الحاصرة وكذلك تحت الصدر خط أبيض آخر ، كذلك بقعة بنية قسطلية في غطاء الأذن مع نقطة بيضاء عند قاعدة المنقار (بعده) الباقي من الغذاء العادات كالأوز السابق . تغشى سواحل البحر عادة وتتوالد في سواحل التندرا . باقى الجسم أسود وأبيض فقط .

الأوز الأسود

Brent goose (١)

(Branta bernicla bernicla)

الوصف : طولها حوالى ٢٣ بوصة تقريبا . انظر لوحة (٤٦) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شمال سيبيريا ، وهناك شكل آخر من نفس النوع يتوالد في شرق أمريكا الشمالية وجرينلند (إلى خط عرض ٨٣° شمالا) إلى اسبتزبرجن . تتجول وتهاجر شتاء إلى شمال غرب أوروبا (الجزر البريطانية وبحر الشمال وبحر البلطيق والمحيط الأطلسي ووسط أوروبا وتارة إلى مناطق البحر الأبيض المتوسط)

(١) اسمه في أمريكا الشمالية Brant goose




ص ٢٥٨

Shelduck



ص ٢٥٩

Ruddy Shelduck



ص ٢٦١

Mallard



ص ٢٦١

Gadwall



ص ٢٦٢

Pintail



ص ٢٦٢

Widgeon



ص ٢٦٣

Marbled Teal



ص ٢٦٣



ص ٢٦٤

في مصر : شوهدت فيها صدفة في فبراير ومارس .
مميزاتها : هي على شكلين ، أحدهما أسود البطن ، والثاني مائل البياض في البطن ، مع وجود بقعة بيضاء على الرقبة في الشكلين . الصدر أسود مع الرقبة والرأس في الإثنين .

جنس أوز الشجر (ألبوشين) Genus (Alopochen)

يمتاز هذا الجنس بغلظ منقاره وقصره ، كما أن الفك العلوي ليس بحافته السفلى أسنان مشطية بارزة . المنخر بيضاوي . الجناح طويل مدبب الأطراف ويصل عند انطباعه إلى طرف الذيل . كذلك له مرآة معينة لامعة واضحة . ويوجد انتفاخ عند اتصال الرسغ بالقدم (بالساق) . الذيل مربع مكون من ١٤ ريشه . الساق به حراشيف ضيقة مستطيلة من الأمام . الأصابع مكففة . عارى الساق .

وهو على نوعين ، أحدهما في إفريقية والثاني في أمريكا الجنوبية .
يحبس المشى على الأرض وكذلك السباحة والغوص إلى أعماق بعيدة ولسافات طويلة ، يجيد الطيران . حذر كإبناء فصيلته .

الأوزة المصرية Egyptian goose (Alopochen aegyptiaca)

الوصف : طولها حوالي ٢٨ بوصة . انظر لوحة (٤٦) شكل (٨)
الموطن : من الأوبد ، ومتجولة : تقيم طول السنة في كل إفريقية حيث تتوالد فيها ما عدا صحاريها وجزيرة مدغشقر . تكثر حول بحيرة فيكتوريا وما حولها من بحيرات ، وفي النيل الأبيض والصومال .

في مصر : كانت كثيرة طول السنة في عهد قدماء المصريين ، أما الآن فهي نادرة العثور عليها وقليل منها قد يرى في مصر العليا على طول النيل .
مميزاتها : ترى مرسومة على معابد قدماء المصريين بكثرة مما يدل على كثرة وجودها في أيامهم ، وهي ليست حاذقة في الاحتراس من العدو وهذا هو السبب في تعقب الصيادين لها حتى أبادوا معظمها وأصبحت الآن تاديرة الوجود ، كما ساعد ذلك أيضا صوتها الموسيقي الذي ينبه الصياد ، وصوتها مزعج ومقلق . تشاهد مثنى فوق الشواطئ الرملية والمساحات الطينية ، أما في الشتاء فهي تحتشد في أسراب قد تصل إلى العشرين واحدة ، الصوت هكذا (كك) = (Kek) يردد غالبا أثناء طيرانها ، وتظهر عندئذ البقعة البيضاء على الجناح ، طيرانها أشبه بطيران البط من الأوز ولكن الصوت كصوت الأوز ، لحمها ليس شهيا .

توالدها : العش غالبا فوق الأشجار أو في فجوة في ساق شجرة ، أو بين فجوات الصخور وتارة فوق الأرض . يبني من القش والأعشاب الخشنة ، والبيض من ٦ : ٨ بيضات توضع في مارس

وإبريل ، وبعد الفقس مباشرة تسحب الأم أولادها إلى أقرب مكان للماء ، ويلاحظ أن العش يكون قريبا من الماء ، وإذا كان العش في شجرة حمل الآباء الأولاد على ظهورهما ونزلا بها على الأرض ، والحضانة من الأنثى وحدها ثم يفرخ البيض بعد ٢٨ يوما ، يقوم الذكر بحراسة زوجته ، وتبارح الأنثى البيض كل يوم ظهرا بعد أن تغطيه بزغب ريشها ثم تعود إليه ثانية للرقاد . طعامه كغيره من الأوز ولكنه مولع أكثر بالنش في الطين للديدان والقشريات .

أوزة بشوكة في جناحها

Spur - winged Goose

(*Plectropterus gambensis gambensis*)

الوصف : طولها حوالي ٣٥ بوصة . انظر لوحة (٧٣) شكل (٣)
الموطن : من الأوايد ومتجولة : تقيم طول السنة حيث تتوالد في كل أفريقية من خط عرض الخرطوم جنوبا إلى كل جنوب إفريقية وقد تتجول شتاء إلى السودان .
في مصر : تجولت صدفة شتاء من السودان إلى مصر .
مميزاتها : أكبر أنواع الأوز حجما ، فهي في حجم الديك الرومي والتم ، بالجناح عن الكتف شوكة بارزة هي أهم ما يميزه .

جنس الشهرمان

Genus (*Tadorna*) = *Shelduck*

Duck Family

يمتاز هذا الجنس بأن المنقار قصير ومقعر ، وعند قاعدته تنوء ، يتصل بالجبهة ، يظهر في فصل التزاوج أى في فصل الربيع والصيف . للذكر البالغ انتفاخ في أعلى قاعدة المنقار . يوجد انتفاخ قرني عند نقطة اتصال الرسغ . له مرآة معدنية كبيرة خضراء . الخواقي حمراء رميلة قسطنطينية . الذيل مستدير مروحي تقريبا مكون من ١٤ ريشه . أطول القوادم الثلاثة . بالساق حراشيف مستطيلة ضيقة من الأمام . لون الذكر بلون الأنثى . نوع واحد .

الشهرمان

(*Shelduck*)

(*Tadorna tadorna*)

الوصف : طولها حوالي ٢٥ بوصة . انظر لوحة (٤٨) شكل (١)
الموطن : من القواطع والأوايد ومتجول : يتوالد صيفا في شمال أوروبا وشمال آسيا ، ووسطها شرقا إلى الصين واليابان . يهاجر شتاء إلى الهند وحوض البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا والصين وفورموزا . كما أنه يقيم طول السنة في حوض البحر الأسود وبحر قزوين وميسوبوتاميا .
في مصر : نادر الزيارة لمصر شتاء وقد أصبح في هذه السنين قليلا جدا بل يعد كأنه قد انقرض من مصر ويندر أن ترى واحدة منه وميعاده هو ديسمبر إلى آخر مارس .

مميزاته : المنقار أحمر قرمزي . حزام عرضي بني قسطل يمحيط بمؤخر الصدر . للذكر انتفاخ في أعلى قاعدة المنقار . يفضل المياه المالحة على العذبة ولذا فإن أغلب مواطنه البحار والبحيرات الواسعة الملحة .

اجتماعي حتى في فترات التزاوج . غذاؤه النباتات المائية والحبوب ، والحشائش والحيوانات البحرية الرخوة . يظهر في طيرانه كأنه مكون من لونين أبيض وأسود من بعيد ولذا يسمى كذلك البط الأبقع وكذلك بط الصخور أو المخايء الصخرية التي هي مأواه للتوالد والمبيت . ينذر أن يغطس إلا إذا أحذق به الخطر .

التوالد : العش في فجوة في صخرة أو في جذع شجرة . البيض من ٧ : ١٢ بيضة ، والحضانة من ٢٨ : ٣٠ يوما ، وبعد الفقس تسحب الآباء الأولاد للماء . يبلغ غور العش في الصخور من ٢ : ١٢ قدما يبطن بالطحلب والأعشاب المائية .

جنس (أبو فروة) = كسارك

Genus (Casarca) = Ruddy Shelduck

يمتاز بأن المنقار مقعر ينتهي طرفه بمخالب والعنبرين أعرض من جنس تادرونا (الشهرمان) وهو يبلغ في طوله نصف عرض المنقار . الساق بها حراشيف مستطيلة من الأمام (١) مأواها البراري والسهول والجبال التي يصل ارتفاعها إلى ٣ آلاف مترا ، كذلك في المناطق الجليدية كما توجد في البحار والأنهار ومجاري المياه وكذلك صغار الجداول حيث تعيش أزواجا . لا تمكث في الماء طويلا وتتجاشى المستنقعات وتستعوض عنها بالحشائش القليلة التي تتخلل المروج والحقول ذات الخنطة التي على وشك النمو ، كذلك تأكل النباتات والحيوانات الرخوة الصغيرة . تحسن السير . طيرانها ببطء وبدون صوت . حذرة وجللة في كل حين . العش في فجوات وأماكن خربة وينذر أن يتخذ في الأشجار كما تشارك غيرها من جنسها في مكان واحد . البيض من ٩ : ١٦ بيضة ، أبيض برتقالي . والأنثى أصغر قليلا من الذكر . والحضانة من الأنثى وحدها من ٢٧ : ٢٩ يوما . تقفز الصغار من عشها العالي بمجرد أن يجف زغبها وتذهب وراء أمها تورا إلى الماء حتى ولو كان على بعد أميال .

وهو على أربعة أنواع ، إحداها في الإقليم البلياركتك ، والثاني في جنوب إفريقية ، والثالث في استراليا ، والرابع في نيوزيلند . واحد منه في مصر وهو البلياركتك .

أبو فروة (البط البراهمي)

Ruddy Shelduck (Brahminy Duck)

(Casarca Ferruginea)

الوصف : طوله حوالي ٢٥ بوصة . انظر اللوحة (٤٨) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب شرق أوروبا شرقا إلى البلقان واليونان والعراق وآسيا الصغرى وآسيا الوسطى لغاية الهند والصين وفرموزا واليابان . كذلك في جنوب أسبانيا وعلى مرتفعات آسيا التي حوالي ١٦٠٠٠ قدم . يهاجر شتاء إلى الجنوب في حوض البحر الأبيض المتوسط والسودان والهند والصين وبورما وسيلان .

(١) أي مأوى طيور هذا الجنس .

في مصر : يزورها شتاء ولكنه الآن أصبح قليل الوجود لتعقب الصيادين له ببنادقهم ، وأصبح يجشى عليه من الانقراض . يبدأ في الظهور من نوفمبر ، ثم يرحل من البلاد في أوائل مايو بعد أن يبقى طول مدة الشتاء المذكورة في الدلتا ومربوط والمنزلة الخ وكل البحيرات حتى الفيوم ووادي النطرون وعند قنال السويس .

مميزاته : بط كبير الجسم ، لونه كله بني قسطل بلون أبي فروة المسمى عندنا (القسطل) والذي من لونه أخذ اسمه ، والرأس فاتحة اللون قليلا في الذكر وأفتح منها في الأنثى ، وللدكر طوق أسود رفيع حول الرقبة . في طيرانه يظهر البياض بوضوح الذي يغطي الجناح . طيرانه شبيه بطيران الشهران . يشاهد مثنى داثيا . طعامه كباقي الفصيلة . لحمه ليس شهيا . يعرف في الهند باسم البط البراهمي وهو مقدس هناك وكثير ولا يمسه أحد بأذى . يهلك أراضى الأرض هناك .

توالده : يتوالد في فجوات الصخور والأحجار المهجورة . الباقي كالجنس .

جنس البط الأصلي (أناس)

Genus (Anas) = true Ducks

Duck Family

يشتمل هذا الجنس على الحضاري والبلبل والشوين والظي والحذف (الشرشير) بأنواعه .

يتناول طعامه على سطح المياه المكشوفة العارية من الأحراش والقصب الخ والأدغال المائية الخ ماعدا جنس الكيش (اللقاط) وكل بط أوروبي يتناول طعامه في العراء يرى في مصر إما في هجرته أو يكون مقبها بها طول السنة . ويمتاز بأن المقار معتدل ومستقيم تقريبا وحافته مسننة كالمشط في الفكين وتظهر عند انطباقهما . المنخر يبضاوى يوجد قرب القاعدة . ليس بأصبع القدم الخلفي انتفاخ . بالساق من الأمام حراشيف مستطيلة ، والجناح طويل مدبب ، وأطول القوادم الثانية والثالثة والشقان مختلفان .

وهو أليف ولكنه حذر عند المطاردة ، يحسن السير والسباحة والطيران بمهارة فائقة ، وتختلط أناه بغيرها من أبناء جنسها وفصيلتها بل ورتبتها ، وكما أنها تقترب من الإنسان إذا أمنت ولا تصبح أليفه إلا إذا أخذت صغيرة وعاشت البط المنزلي وعمولت معاملته ، كما أنها تتزوج بسهولة مع غيره مثل الحضاري .

تبيض الأنثى من ٨ : ١٦ بيضة خضراء زيتونية مشوبة بصفرة ، والحضانة من الأنثى وحدها ولا تفارق العش إلا بعد أن تغطيه بزغب من بدنها وتقترب من العش بحذر وبعد أن تطمئن ألا يراها أحد . وتبقى الأولاد بعد الفقس بضعة أيام ثم تبارح العش إلى الماء وتسحبها الأباء لهذا الغرض . طعامها النباتات والحشائش والحبوب وصغار الأسماك والحلالميات . الحضانة ٢٦ يوما .

تقطن أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية والمكسيك ويوجد من هذا الجنس حوالي ٥٠ نوعا .

الخضاري

Mallard = (Wild or common Duck)

Anas platyrhynchos platyrhynchos

الوصف : طوله حوالي ٢٣ بوصة . انظر لوحة (٤٨) شكل (٥)

الموطن : من القواطع والأوبد : يتوالد صيفا في كل أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط ماعدا صقلية ، كذلك يتوالد في شمال غرب أفريقية كذلك في آسيا من أقصى شمالها إلى الجنوب في الهند والصين واليابان كذلك في أمريكا الشمالية . يقضى الشتاء في شمال أفريقية جنوبا إلى خط الاستواء ولا يتعداه جنوبا ، كذلك في الهند وبورما والمكسيك وبورنيو والبعض منه يقيم طول السنة في الجزر البريطانية وقناريا وماديرة

في مصر : شائع في مصر وسينا شتاء ولكنه أقل من غيره من البط ولأنه أشهر من البط المعروف في مصر الذي يتردد اسمه على الألسنة . أكثر من أى بط آخر ، بل البعض يطلق اسمه على غيره مثل الشرشير فيقول (خضاري) وهو تضليل . يبدأ في الظهور من أكتوبر ويبقى بها ثم يغادر البلاد في أواخر مارس ، وربما كان القليل يتوالد في بحيرة المنزلة لأنه شوهد فيها طول السنة .

مميزاته : أشهر من نار على علم . يغشى البحيرات وسواحل البحار والمستنقعات وبجاري المياه البعيدة عن العمران ، وأكثر ما يتناول طعامه هو ليلا في الظلام من الغسق إلى الفجر ثم يستريح نهارا على صفحات مياه البحر الأبيض المتوسط والأحمر والبحيرات النائية عن الأنظار . يندر أن يغطس إلا إذا كان مطاردا أو مصابا طلبا للفرار . يمتاز الذكر برأسه السوداء مع رقبة بلمعان أخضر ، والصدر بني قسطنطين . الطعام كالجنس . ويمكن لإنثاه أن تتزاوج مع ذكر البط الداجن وهذا دليل على وحده الجنس أو شدة المماثلة .

الشوين (بط سماري)

(Gadwall)

(Anas strepera)

الوصف : طوله حوالي ٢٠ بوصة . انظر لوحة (٤٨) شكل (٧)

الموطن : يتوالد صيفا في جنوب وجنوب شرق أوروبا ، ووسطها ممتدا شرقا في آسيا جنوب خط عرض ٣٠° شمالا حتى المحيط الباسيفيكي ، كذلك يتوالد في أمريكا الشمالية وهو من القواطع : يزور شتاء إفريقية من شمالها إلى السودان وخط الاستواء ، كذلك آسيا في الهند وسيام والصين ، واليابان مصادقة ، كذلك المكسيك .

في مصر : شائع فيها شتاء من أكتوبر إلى أوائل مايو في بحيرات الدلتا والفيوم ووادي النطرون ومصر العليا .

مميزاته : كغيره من البط ، مأواه البرك والبحيرات المنعزلة وبخيتىء في الخضر طول النهار ، وأغلب ما يكون في المياه العذبة ويندر أن يرتدى البحار الملحة . وأهم ما يميزه هو البقعة السوداء العريضة المنتصفة بين بقعة بيضاء عريضة وأخرى بنية قسطنطينية والثلاثة تكون المرأة المعدنية على الجناح . يسمع لأجنحته صفير في طيرانه . الطعام كغيره من البط .

البببول

Pintail

(*Anas acuta acuta*)

الوصف : طوله حوالى ٢٨ بوصة . انظر اللوحة (٤٨) شكل (٩)
الموطن : من القواطع : يتوالد في النصف الشمالى الشرقى من أوروبا والجزر البريطانية وأيسلندا
وفي شمال آسيا شرقا إلى المحيط الهادى ، كما أنه يقيم طول العام في الجزر البريطانية . ويهاجر شتاء إلى
جنوب آسيا في الهند والصين وفي أفريقية من شمالها إلى خط الاستواء ، كذلك في جنوب أوروبا وجزائر
الهند الشرقية في بورنيو والفلبين ، وفي اليابان .

في مصر : شائع فيها شتاء من أكتوبر إلى آخر إبريل ، كذلك في سينا .
مميزاته : هو أشهر البط المعروف في مصر بعد الحضارى ، والبالغ تجرد ريشه وسط الذيل
طويلتين خارجيتين ومسننتين قد يصل طول الواحدة إلى ٨,٥ بوصة . يتناول طعامه ليلا في الحقول
ويستريح باقى نهاره على صفحة الماء . يعرف الذكر برأسه البنى الغامق والخط الأبيض الذى يشق هذا
اللون . ظهره رمادى اللون . شهى الأكل .

ومما يلاحظ عليه وعلى غيره مثل الخذف الشرشير (أنه في هجرته يتخذ نهر النيل طريقه في هجرته
من وإلى مصر والسودان وخط الاستواء)

الظى

Widgeon = Widgeon

(*Anas penelope*)

الوصف : طوله حوالى ١٨ بوصة . انظر اللوحة (٤٨) شكل (١٠)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شمال أوروبا وشمال آسيا وشمال كندا ، ويقضى الشتاء
في جنوب الولايات المتحدة والمكسيك ، وفي جنوب آسيا (الهند والملايو والصين واليابان وبورنيو)
وبلاد العرب ، وفي شمال أفريقية والسودان .

في مصر : شائع شتاء من أكتوبر إلى إبريل ، وسجل في سيوه والفيوم ووادي النطرون والواحات
الداخلية والخارجية .

مميزاته : أهم ما يميز الذكر هو رأسه البرتقالى وجبهته المائلة للصفرة ، والصدر أحمر خمرى ،
ويظهر في طيرانه بياض الأكتاف وله صوت صياح ونداء وهو هكذا (صى) أو (ظى) ومنه أخذ اسمه
بطيء الطيران مثل الحضارى والبببول . طعامه كثيره .

شرشير مخطط = منية
Marbled Teal = Marbled Duck
(*Anas angustirostris*)

الوصف : طوله حوالى ١٥ بوصة . انظر اللوحة (٤٨) شكل (١١)
الموطن : من الأوابد ، والبعض من القواطع : يقيم طول السنة ويتوالد في جزائر قناريا وجنوب
أسبانيا وأجزاء من مراکش والجزائر وتونس وسيرينكا إلى مصر وقبرص ومنطقة بحر قزوين وفارس
والعراق وأقصى شمال غرب الهند . بعضه يقضى الشتاء في إيطاليا وبعض أقاليم حوض البحر الأبيض
المتوسط .

في مصر : يتوالد بها في وادى النطرون والفيوم والواحات الداخلة ، ويكثر شتاء بها في الدلتا
ومنطقة قنال السويس . ولم يشاهد في وادى النيل في مصر العليا ، كما لم يسجل توالده من سيناء .
مميزاته : أكبر قليلا من الحذف الشتوى أو الصيفى . لونه العام رمادى غامق . يوجد في أسراب
صغيرة . طيرانه أقرب إلى طيران الحذف الصيفى منه إلى الشتوى . صوته صغير وأزير تردده الإناث ،
وهو منخفض .

توالده : العش على سطح الأرض مباشرة إما تحت شجرة نامية قرب الماء في الفيوم أو في القصب
في وادى النطرون . البيض ٤ ، بيضاء اللون توضع من إبريل إلى مايو ، وهي شاحبة مصفرة قليلا .

الحذف الصيفى

Garganey

(*Anas querquedula*)

الوصف : طوله حوالى ١٤ بوصة . انظر لوحة (٤٨) شكل (١٢)
الموطن : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا شمال اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا وجنوب
أوروبا (اليونان وإيطاليا وأسبانيا) كذلك يتوالد في شمال آسيا ووسطها وهو من القواطع : فهو يزور في
الشتاء أفريقية جنوب خط الاستواء وكثير منه يكون في صحبة البلبول في أعالي الخرطوم في السودان .
كذلك يشترى في كل جنوب آسيا (في الهند وبورما والفلبين وبورنيو وجاوة واليابان) كذلك في نيجيريا
وأوغندا والصومال وبعض بلاد العرب .

في مصر : هو أول البط الذى يكثر بالظهور في مصر في شمالها في الحريف ولذا يسميه الصيادون
فيها باسم (الحذف الصيفى) أو (الشرشير الصيفى) ، وهذه التسمية هي كذلك في إنجلترا إذ هو
يصل إلى قلب أوروبا عائدا من الجنوب في مارس ثم يغادرها في أغسطس حيث يبدأ في الظهور في مصر
في الأسبوع الأخير من يوليو ثم يتكاثر في أغسطس وسبتمبر ولا يبقى منه واحدة بعد آخر أكتوبر .
وشاهد كذلك في مصر في مارس .

مميزاته : هوى حجم الحذف الشتوى تقريبا ، يمر فى أسراب كبيرة قد تبلغ المائة مائة فوق ساحل البحر الأبيض المتوسط فى أغسطس وسبتمبر من الشرق إلى الغرب فيعمل له الصيادون فجوة فى الأرض قرب الساحل ويحيطونها بسيج خفيف من القصب والأعشاب حتى إذا ما قربت الأسراب منها أطلقوا عليها النيران وذلك فى شمال الدلتا . كما أنه يظهر أيضا فى البحيرات ولكن بقله . يمتاز الذكر بالقوس الأبيض فى رأسه من الجانب ، والبقة الزرقاء فى الكتف . سريع الطيران بل يعتبر أسرع البط طيرانا وقدردت السرعة بحوالى ٨٩ ميلا فى الساعة .

الحذف الشتوى

Teal

(*Anas crecca crecca*)

الوصف : الطول حوالى ١٤ بوصة . انظر لوحة (٤٨) شكل (١٣)
الموطن : من القواطع يتوالد صيفا فى كل أوروبا تقريبا ماعدا أسبانيا والبرتغال وإيطاليا والبلقان ، كذلك يتوالد فى آسيا إلى حوالى خط عرض ٧٠° شمالا شرقا إلى كامتشاتكا . يقضى الشتاء فى إفريقية من شمالها إلى قرب خط الاستواء ولكن لا يتعداه ، كذلك فى ميسوبوتاميا والهند والصين وسيلان واليابان وسيام وفيليبين . (١)




فى مصر : يزورها شتاء بكثرة إذ هو أكثر البط شيوعا وظهورا فى مصر ، من نوفمبر إلى مارس .
مميزاته : يتناول طعامه ليلا . مأواه البرك والبحيرات . يشاهد غالبا فى أسراب . يعرف الذكر برأسه البنى القسطل يشقه من الجانب اللون الأخضر اللامع ذو الحواف الصفراء . كذلك له خط أفقى أو منحني قليلا ممتد من اتصال الكتف بالجسم إلى نهاية الجناح فوق أعطية الذيل . الغذاء كغيره من البط .

جنس الكيش (اللقاط) = اسباتيولا

Genus (*Spatula*) = Shoveller

هو جنس قريب الشبه جدا من البط الأصل (أناس) ولا يختلف عنه إلا فى المنقار العريض من طرفه والذى هو أشبه بالملعقة ، حتى إن بعض الناس يطلقون عليه اسم (البط أبو ملعقة) ، ويبلغ عرض طرف المنقار ضعف عرض المنقار عند القاعدة ، كما أن المنقار كله أطول من منقار البط الأصل السابق . الرأس كبير ، والأصابع مكففة ، والذيل مكوّن من ١٤ ريشه . والشقان فى لونها مختلفان وهو يفضل المياه العذبة على المياه الملحة ، وتارة يشاهد فى مواضع المياه الوشلة من البحار . وهوبط كسلان لا يمشى ولا يسبح أو يطير أو يغوص إلا بدافع الحاجة والاضطرار . طعامه الحشرات والديدان وصغار الأسماك والحيوانات الرخوة والهامية وتارة الخضروات المائية والقواقع والحجوب . لا يالف حياة الأسر إلا نادرا . يطير ليلا للبحث عن طعامه ويستريح نهارا على شواطئ المياه الرملية أو الطينية على رجل واحدة أو منبطحة على بطنها . قريب الشبه من الحضارى فى الذكر .

(١) يوجد مثله فى أمريكا الشمالية اسمه winged teal - = *anas carolinensis* هلال ابيض بين البطن والصدر ، ونيس له الخط الأبيض الطول فوق الجناح .






Blue-throat
(Lapland Form.)



Eleonora Falcon



Little Martin



Masked Booby

العش في أدغال الغاب والقصب وتارة في حقول القمح المجاورة في مكان مستتر ، ويبطن العش بالزغب . البيض من ٨ : ١٤ بيضة ، صفراء محمرة أو مخضرة ، والحضانة ٢٤ يوما ويكمل نمو الأولاد بعد شهر تقريبا . ٤ أنواع منه : أحدها بلياركتك والثاني في جنوب أفريقية والثالث من استراليا والرابع في أمريكا الجنوبية .

الكيش

Shoveller

(*Spatula clypeata*)

الوصف : الطول حوالى ٢٠ بوصة . انظر لوحة (٤٩) شكل (١)
الموطن : يتوالد صيفا (من القواطع) في كل أوروبا تقريبا ماعدا إيطاليا والبلقان وأيبيريا واسكندناوة ، كذلك في معظم آسيا وأمريكا الشمالية يقضى الشتاء جنوبا ، توالده في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقية حتى خط الاستواء وكذلك في آسيا في الهند والصين واليابان وبورما وسيلان والملايو ، وكذلك في أمريكا الجنوبية وجزائر الهند الغربية .

في مصر : يزورها شتاء من أكتوبر إلى إبريل ومايو .
مميزاته : نفس ما قيل عنه في الجنس في صفحة ٣٤٢ . ليس شهيّا في الأكل .

جنس (المونس) = نيتا

Genus (*Netta*) = Red - crested Pochard

هو قريب من البط الغطاس (نيروكا) ولكنه أكبر منه . تسنينة الفك العلوى قصيرة وغلظية . الشقان مختلفان . للذكر فتزعة (تاج) للساق حراشيف مستطيلة من الأمام . الإصبع الخلفى به انتفاخ وعليه شرائح جلدية . القدم قصير والمتقار أحمر اللون وقصير ، الذنب مستدير ومكون من ١٦ ريشة . طباتعه مثل الحمران والزرقي . الأجنحة متوسطة الطول ومدببة . نوع واحد . العش على جزيرة أو سطح بحيرة عشبية كثيفة . البيض حوالى ١٠ بيضات مخضرة قليلا ، والحضانة ٢٧ يوما .

كان كثيرا حوالى عام ١٩٢٠ ، أما الآن ومن عام ١٩٦٥ فهو في حكم المنقرض

المونس

Red - crested Pochard

(*Netta rufina*)

الوصف : الطول حوالى ٢٢ بوصة . انظر اللوحة (٤٩) شكل (٢) ، (٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في سواحل جنوب أوروبا المطلّة على البحر الأبيض المتوسط (ساحل أسبانيا الجنوبي والشرقى ، وسردينيا وصقلية وجنوب إيطاليا ، والدنمارك) وفي شمال إيطاليا ، وهو شائع التوالد في دلتا الرون ، كذلك في شمال غرب أفريقية وفي آسيا الوسطى ومنه ما يقيم طول السنة في الطرف الجنوبي لإيطاليا وصقلية وسردينيا .

يقضى الشتاء في حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وقزوين والهند والصين .

في مصر : يزورها شتاء ولكن بقلّة ، من نوفمبر إلى أبريل .
مميزاته : كبير الجسم في حجم الخضاري ، غطاس ماهر ، ينقض للطيران بصعوبة ، وأغلب ما يأوى من المياه هي القليلة الغور ولا يوجد مطلقا في البحار ، ويندر أن يرى في أسراب . يتناول طعامه عن طريق الغطس ولذا يسمى أيضا البط الغطاس . طعامه الخضراوات المائية والحيوانات البحرية الرخوة .

جنس البط الغطاس (نيروكا)

Genus (Nyroca) = Diving Ducks

يشتمل هذا الجنس على البط الغطاس الذي هو عبارة عن (الحرمان والزرقي الأحمر والإسود وأبو عين ذهبية وبط اسكوب والاسكوتار) ولذا يسمى باللاتيني (نيروكا) أى الغطاس .

ويتميز بوجود شرائح جلدية عريضة في إصبع القدم الخلفي ، والقدم عريضة ، كما أن المنقار بطول الرأس تقريبا ، وطرفه في الفك العلوي منحني لأسفل قليلا أى مقعر ، والمنخر أقرب إلى القاعدة بكثير عن وسط المنقار ، والذيل مكون من ١٤ ريشة وهو مستدير الشكل . الجناح متوسط الطول ومدبب . والنصل الأنسي للقوادم مائل للبياض . والشقان مختلفان ، كما أن الإناث لا تصبح بصوت البططة .

موطنه غالبا البحيرات الكبيرة والصغيرة ، وهو يحسن المشي أكثر من غيره ، بسمع صوت وحفيف للأجنحة في طيرانها . يجيد السباحة طعامه النباتات والحشرات والسماك والقواقع والحجوب والخضراوات والملاحيات ، أما في الهجرة فغذاؤه حيواني بحت ، الأمر الذي يجعل لحمه غير مستساغ في الأكل .

وتختار الأنثى زوجها ، العش بين القصب والأدغال المائية ، البيض ٨ : ١٠ رمادية مخضرة ، والذكر يقوم بحراسة أثنائه عند البدء وعند عملية وضع البيض ، وعندما تحضن الأنثى بيضها ينسحب الذكر إلى جماعات من أضرابه ولا يعنى بشأن أثنائه بعد ذلك ، والحضانة حوالي ٢٣ يوما تسحب الأولاد بعد الفقس ببضعة أيام ونجدها تجيد السباحة والغطس مع الآباء دون تلقين من الأم أو الأب ولذا فهي ماهرة بحكم الغريزة التي تساعد على تفادي الخطر بالغطس ، وهو على ١٤ نوعا . كلها عالمية التوزيع .

الحميران
Common Pochard (١)
(Nyroca ferina ferina)

الوصف : الطول حوالى ١٨ بوصة . انظر لوحة (٤٩) شكل (٤) ، (٥)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في النصف الشرقى من وسط أوروبا (الدنمارك وجنوب السويد ولا بلاند وفنلندة ووسط روسيا إلى خط عرض ٦٠° شمالا وممالك البلطيق وبولندة وألمانيا وفرنسا ، وأسبانيا على ارتفاع ١٩٠٠ قدم ، وهنغاريا ورومانيا وشرقا خلال سيبيريا ، وفي بريطانيا العظمى . أما في الشتاء فهو يزور بحيرات الألب المرتفعة في طريقه إلى إقليم البحر الأبيض المتوسط حيث يقضى الشتاء في مراكش ومصر ولكن لا يبعد جنوبا أكثر من السودان . كما أنه يقضى الشتاء كذلك في الهند والصين واليابان .

في مصر : يزورها هي وسينا من أكتوبر ويبقى ويمكث بها حتى إبريل ثم يغادر البلاد .
مميزاته : أهم ما يميز الذكر هو الثلاثة ألوان وهي : الأحمر القسطل البنى للرأس والرقبة ، واللون الأسود في الصدر ، وأعلى الذيل ؛ ثم باقى لون الجسم الرمادى اللون . وهو أشهر البط المعروف في مصر هو والخضارى والبلبول والحذف (الشرشير) ، واسمه في رشيد (البغل) نظرا لكبر جسمه ولأنه يزن كثيرا ومكتنز باللحم ، إذ يبلغ وزن الواحدة حوالى ٢ ١/٢ رطلا إنجليزية ، مع أن وزن الخضارى هو ٣ أرطال فقط . وبذلك فهو قريب منه في الوزن . سريع الطيران جدا ، وضربات أجنحته في غاية السرعة ، يوجد دائما في أسراب ، يغشى الماء العذب . طعامه كالجنس المذكور عن طريق الغطس ، إذا أحسق به الخطر وكان مصابا ، غطس بجسمه في الماء وأخرج طرف منقاره فقط مع المنخركى يتنفس كى لا يراه الصياد .

الزُرْق الأحمر

White - eyed Pochard = Ferruginous Duck = Mahogany

(٢) (Nyroca myroca myroca)

الوصف : الطول حوالى ١٦ بوصة . انظر لوحة (٤٩) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في نفس الأماكن التى يتوالد فيها الحميران السابق الذكر ، كما أنه من الأوايد فيقيم طول السنة في جنوب أوروبا من البرتغال إلى نهر الفولجا . كذلك يتوالد في شمال غرب أفريقية . يقضى الشتاء في نفس أماكن الحميران أيضا وكذلك في آسيا الصغرى وميسوبوتاميا وفلسطين وزيادة على الصين والهند وبورما ، ويصل شتاء إلى أفريقية جنوب خط الاستواء .

في مصر : شائع الوجود بها وفي سينا من أكتوبر إلى مارس .
مميزاته : يمتاز الذكر بأن لون جسمه كله أحمر قسطل ما هوجانى حسب التسمية الإنجليزية ، وغطاء أسفل الذيل أبيض ، وللجناح خط عرضى أبيض يظهر في الطيران للإثنين . أول البط الذى يبكر بالظهور في مصر في البحيرات . سريع الطيران . يشاهد في أسراب صغيرة مثنى وثلاث ورباع . طباعه كالحميران تماما وكذلك غذاؤه .

(١) يوجد مثله في أمريكا اسمه Aythya americana = Red head

(٢) يوجد في أمريكا بط مثله تماما اسمه anas cyanoptera = cinnamun teal غير أن أكتافه زرقاء .

الزرق الأسود

Tufted Duck

(*Nyroca fuligula*)

الوصف : الطول حوالى ١٧ بوصة . انظر اللوحة (٤٩) شكل (٧) ، (٨)
الموطن : من القواطع والأوايد : يتوالد صيفا في معظم إقليم البلياركتك من أوروبا وآسيا ولكنه لا يتعدى في تولده شمال البحر الأبيض المتوسط (في آسيا شمالا إلى خط عرض ٣٠° شمالا - وفي أوروبا في السويد وفنلندة وروسيا والتروبيج وشمال البلقان) . وهو يقيم طول السنة في الجزر البريطانية يقضى الشتاء في حوض البحر الأبيض المتوسط وميسوبوتاميا والهند والصين واليابان ، وأفريقية من شمال إلى خط الاستواء ، وقد تجول في ماديرة وليبيريا والملايو .

في مصر : يزورها شتاء هي وسينا فيصل لها في آخر أكتوبر ، ويغادرها في مارس .

مميزاته : هو عبارة عن بط أبيض وذى لونين (أبيض وأسود فقط) وذلك في اللون للذكر ، كما أن له تاج (شوشة) طويلة قليلا مسترسلة خلف القفا وهي أكبر من الأنثى . يشاهد في أسراب ويختلط بغيره من البط الآخر ويسميه الانجليز (البط المعقعى Magpie—duck وذلك لكونه مكون من لونين فقط أبيض وأسود مثل المعقعى . أمهر البط في الغطس . يطير ليلا إلى الحقول للطعام وتارة إلى البحيرات التي بها طعامه .

البط الإسكوبى

Scaup

(*Nyroca marila*)

الوصف : الطول حوالى ١٩ بوصة . انظر اللوحة (٤٩) شكل (٩)
الموطن : من الأوايد . ومتجول : يتوالد صيفا في أقصى شمال اسكندناوة وفي أيسلند وشمال سيبيريا وشمال أمريكا الشمالية (أى مناطق القطب الشمالى وجزائره) . وهو مهاجر أيضا ، ففي الشتاء نجده يزور أوروبا وآسيا حول بحر قزوين والإندريتليك وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وسينا والخليج الفارسى وفارس ، والصين واليابان والفليين ، والولايات المتحدة ، وشمال غرب أفريقية وتارة مالطة والهند ومصر .

في مصر : يذكر هيجلن بأنه شاهده في مصر ، وأدخله ضمن طيورها وأيده في ذلك شلُ ونيقول . نادر الزيارة جدا لمصر وسينا .

مميزاته : شبيه جدا بالزرق الأسود السابق غير أن أجزائه العليا رمادية شاحبة وليست سوداء كالزرق . والمنقار أزرق تقريبا وليس له قنزة أى تاج (شوشة) كالزرق . كل ذلك في الذكر . تغشى غالبا البحار والمياه الشاسعة .

بطة بعين ذهبية

(١) Golden-eye

Bucephala clangula

الوصف : الطول حوالى ١٨ بوصة . انظر اللوحة (٤٩) شكل (١٠)
الموطن : من القواطع : التوالد والهجرة هي نفس الأماكن التي للبط الإسكوي السابق في كل
شئ غير أنها لا تصل إلى مصر .
في مصر : نادرا جدا رؤيتها في مصر ، ولو أن البعض يذكر أنه رآها وربما التبس عليه الأمر لوجود
بط كثير في مصر بعين ذهبية
مميزاته : الذكر البالغ ، له بقعة بيضاء أمام العين وتحتها قليلا .

بطة فلقت اسكتار

(٢) The Velvet Scoter

(*Oidemia fusca*)

الوصف : الطول حوالى ٢١ بوصة . انظر اللوحة (٤٩) شكل (١١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في مناطق القطب الشمالى من الدنيا القديمة والجديدة .
ويتحرك جنوبا شتاء إلى الولايات المتحدة ووسط آسيا ووسط أوروبا فقط .
في مصر : أدخلها شلى ضمن طيور مصر ووافقة على ذلك فون هيجلن وذكرها بأنها شاهدها شتاء
في الدلتا رغم أنه لم يحصل على أية واحدة منها .
المميزات : بطة كبيرة الجسم . الذكر كله أسود اللون والمنقار أصفر يتوسط أعلى الفك العلوى
انتفاخ أسود ، ويظهر في الاثنين عند طيرانها بياض البقع في الخواقي . تغشى البحار ولا توجد مطلقا في
الماء العذب . (٣)

جنس البط أبو مروحة (أكسيورا)

Genus (*Oxyura*)

White - headed Duck - White - faced Duck = Stiff tailed Duck

يعرف هذا الجنس بمعظم اللون الأبيض في الرأس ، والمنقار اللبني الأزرق ، والفك العلوى
منتفخ عند القاعدة والعنق صغير للغاية . المنخر كبير ومفتوح ويوجد انتفاخ عريض باصبع القدم
الخلفى . الريش ناعم مثل ريش البط الغطاس (تيروكا) . الذيل طويل مسحوب مروحي الشكل
ومكون من ١٨ ريشه وهو ضيق مسحوب مخروطى . الرأس كبير والمنقار مقعر قليلا من وسطه . الساق
قصيرة والأصابع الخلفية ذات شرائح جلدية . الجناح يادى القصر ومقوس لدرجة ظاهرة الريش ملون
وناعم .

(١) اسمه في أمريكا الشمالية American Goldeneye

(٢) يسميه الأمريكان white - winged scoter

(٣) بعده البط الموسكوفى الذى في صفحة ٥٩٥ .

العش بين الغابات الكثيفة يصعب اختراق الغابات للوصول إليه ، والحضانة للإناث والبيض حوالي ٨ كبيرة نسبيا ولونه أبيض قاتم ، وتسحب الآباء الأولاد بعد الفقس إلى الماء ، وعند السعور بالخطر تختفى الأولاد بين أدغال الأعشاب . والحضانة للإناث . يستوطن المناطق الحارة والمعتدلة من الدنيا القديمة والجديدة ، وتوجد معظم الأنواع في أمريكا الجنوبية . ٧ أنواع منه في العالم .

أبو مروحة

White - faced Duck = White - headed Duck = Stiff - tailed Duck
Oxyura leucocephala

الوصف : الطول حوالي ١٨ بوصة . انظر اللوحة (٤٩) شكل (١٢)
الموطن : من الأوايد ومتجول شتاء . يتوالد صيفا في جنوب أسبانيا وسردينيا وصقلية وجنوب إيطاليا وقورسика وشمال البلقان ، وفي شمال غرب إفريقية وآسيا الصغرى ووسط وآسيا وقزوين ويقم طول السنة في بحيرة هوليه في فلسطين .
في مصر : قيل إنه يتوالد فيها في الدلتا وليس أكيدا ما ذكر ، وحصل عليه شتاء من شمال الدلتا من نوفمبر إلى مارس وهو قليل الوجود .
مميزاته : الوجه الأبيض والمنقار الأزرق اللبني في الذكر ، والذيل المخروطي المروحي المسحوب . يغشى البحيرات ذات الأدغال . يفضل الغطس على الطيران ، وإذا طار ظهر طول ذيله وقصر جناحيه وسرعة طيرانه للغاية وذلك أهم ما يميزه .

جنس البلقشة (ميرجس)

Genus (Mergus) = Merganser

Duck Family

يمتاز بطول المنقار الرفيع ولا ينطبق فكاه على بعضها تماما مثل البط ، والأسنان فيه منشارية الشكل في كلا الفكين ، العرنيين كبير ومنحن لأسفل أشبه بالشص أو الخطاف ، والمنخر كبير مفتوح يقع في منتصف الفك العلوى . الساق بها حراشيف مستطيلة من الأمام ، وبالمخالب الخلفى انتفاخ عريض . الرأس به فتزعة في الشقين ، والذيل مروحي مكون من ١٦ : ١٨ ريشه . لون الشقين مختلفان طعامه السمك خاصة .
يفضل المياه الجارية ، ويمشى معتدلا منقبض العنق ؛ ويجيد السباحة والغوص ، وقيل الغطس يرفع جسمه قافزا فوق الماء ثم لا يلبث أن يغيب بين أعماقه ثم يطفو من مكان بعيد ، نشيط في أبرد الطقوس ، يختلط بالبط الزرق . يأكل كذلك الحشرات ، والمأسور منه يأكل النباتات والخيز أيضا .
العش في شقوق الأشجار يبطن بالزغب ، وكذلك يتخذ العش في فجوات تحت الأحجار . والبيض من ٧ : ٩ لامة باهته . الحضانة ٢٩ يوما وهو على ٧ أنواع تقطن شمال ووسط آسيا وشمال أوروبا وشمال أمريكا الشمالية على سواحل المحيط الأطلسي (أى مناطق شمال القارات)

بلقشة حمراء الصدر
Red-breasted merganser
(*Mergus serrator*)

الوصف : الطول حوالى ٢٤ بوصة . انظر لوحة (٤٩) شكل (١٣)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا (ممالك بحر البلطيق) (اسكندناوة والدنمارك وشمال شرق ألمانيا وشمال وجنوب شرق روسيا) كذلك في جرينلند وأيسلند وفاروس وسويسره واسكتلندة وأيرلندة تقضى الشتاء في باقى أوروبا ماعدا ألبيريا وإيطاليا واليونان فهى بذلك نادرة في مناطق إقليم البحر الأبيض المتوسط . كذلك تشتت حول بحر قزوين والبحر الأسود والسند واليابان ، والتي تتوالد في شمال كندا تشتت في كليفورينا وفلوريدا ، والاسيوية تشتت كذلك في الصين .
في مصر : نادرة الرؤية فيها ، وحصل عليها شتاء من السويس .

مميزاتها : تغشى البحيرات والأنهار الكبيرة وسواحل البحار ويندر أن تفارقها إلا في فترة التوالد ، وهى في حجم الخضاري تقريبا للذكر طوق أبيض عريض وتاج مزدوج أسود بلمعان مخضر ، وعلى الصدر بقعة كبيرة بيضاء . في الطيران تظهر البقعة البيضاء بوضوح على الجناح . سريعة الطيران . المنقار رفيع ليس عريضا كمنقار البط . طعامه اللحوم والأسماك .

البلقشة الأصلية (جوصندر)
The Goosander (١)
(*Mergus merganser*)
Duck Family

الوصف : الطول حوالى ٢٦ بوصة . انظر لوحة (٤٩) شكل (١٤)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في نفس الأماكن التي تتوالد فيها البلقشة الحمراء الصدر تقريبا ، وتشتت أيضا في نفس الأماكن التي تشتت فيها البلقشة الحمراء الصدر سالفة الذكر :
في مصر : أدخلها يقول في كتابه ضمن طيور مصر رغم أنها لم تؤخذ مطلقا من مصر .
مميزاتها : الذكر جسمه طويل أبيض اللون مشرب بحمرة خفيفة ، ورأسه أسود بلمعان أخضر وله قنزعة . الباقي كحمراء الصدر .

البلقشة البيضاء
Smew
(*Mergus albellus*.)

الوصف : الطول حوالى ١٧ بوصة . انظر لوحة (٤٩) شكل (١٥) .
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال اسكندناوة وشمال روسيا خلال سيبيريا شمالا إلى حدود الغابات الصنوبرية وتقضى الشتاء في سواحل غرب أوروبا المطلة على المحيط الأطلسى حتى جبل طارق ، كذلك في جنوب آسيا في الهند والصين واليابان .
في مصر : تزورها شتاء ولكن بقلّة جدا لدرجة أنها نادرة الرؤية فيها ، وفي الدلتا خاصة .

(١) يسميها الأمريكان American Merganser

مميزاتها : يمتاز الذكر بلونه الأبيض الذي تتخلله علامتان سوداوان ، أو أكثر ، وله تاج أبيض ، أكبر قليلا من الخذف (الشرشير) ، تحب الماء المنخفض في الوديان ، تفضل الغطس على الطيران عند الخوف ، ثقيلة الطيران ، ولكنها سريعة إذا طارت للغاية ، تحب الماء العذب في الربيع ، وكذلك البحار في باقي أيام السنة . الباقي كغيرها . غير أن الحضنة هي حوالي ٤ أسابيع . إذا خافت قذفت في الهواء لأعلى ثم هبطت فجأة في الماء وغطست ومكثت طويلا .

رتبة البجعيات

Order (Steganopodes = Pelecaniformes)

هذه الرتبة واسعة كبيرة تشمل البجع بأجناسه وأقاربه التي هي الطيور الاستوائية Tropic — birds ، والبجع الأصل Pelican والأطيش Gannets وغربان الماء Cormorants والدارتار Darter ، وطائر البارجة Fri- gate — bird وهي طيور سباحة ، كبيرة الأجسام ، مكففة أصابع القدم كلها وليست الثلاث الأمامية فقط كالبط . قوية الريش ويصعب انتزاعه كما أن حياتها كلها على سطوح المياه من بحار وبحيرات وأنهار ولسانها ضامر ، وهي قوية الطيران ، ماهرة في الغوص ، وليست مهيأة للسير الجيد على الأرض . غذاؤها الرئيسي هو الأسماك . ولكنها قد تأكل أيضا الحيوانات البحرية الرخوية والطيور الفقرية مثل غيرها من الطيور البحرية ، وتحصل على طعامها عن طريق الغطس ، ولا يشذ من هذه الرتبة إلا البجع لأن الوسادة الهوائية ، التي تحت جلده تحول بينه وبين الغطس إلى أعماق الماء ، ويشذ عن ذلك نوع يقطن أمريكا الوسطى . ولا يختلف الشقان في لونهما ولكن اليافع ظاهر الاختلاف .


فصيلة غربان الماء (فلاكر وكورا سيداي)

Genus (Phalacrocoracidae)

= Cormorants . Cormorant Family

تحتوي هذه العائلة على حوالي ٥٠ نوعا ، ولكن الموجود منها حاليا هو ٢٦ نوعا تقطن كل قارات الدنيا وجزاها . متفرعة من ٢ جنس وهي تشمل غربان الماء الأصلية أو غربان البحر الأصلية ، والغاق ، والدارتار . وتشير الكلمة اللاتينية carbo التي بمعنى غراب إلى اسمه الآن ذكره . وأهم ما يميزها أن الأصبع الوحشية أطول من الوسطى دائما ومن بقية الأصابع أيضا ، كما أن الخلفية ليست مرتفعة عن الأمامية ، بل كل الأصابع في مستوى واحد ، كما أن الرسغ لا يزيد طوله عن طول الأصبع الأنسية ، والأجنحة إما متوسطة الطول أو قصيرة والذنب ظاهر الطول مخروطي تقريبا .

وهي طيور طويلة الرقاب ، وطرف المنقار في الفك العلوى منحني لأسفل كالشخص ، والذيل من ١٢ : ١٤ ريشه ، وهي طيور ساحلية بحتة ولكن بعضها يعيش في البحار والأنهار ، وطعامها الأسماك الصغيرة بكافة أنواعها ، ويمكنها أن تغوص تحت الماء إلى عمق كبير . ويمر الأهل في الصين واليابان هذه الفصائل على صيد السمك ، ويمكنها ريشها الفضفاض من أن يتخلله الماء بسهولة ولذا كثيرا ما نراه يجلس بعد الغطس في الشمس ناشرا جناحيه كي يجف . وهي تبنى أعشاشها وتتوالد في مستعمرات إما على الأشجار وإما على جوانب الصخور المشرفة على البحار أو شاسع البحيرات وتارة على الأرض . وإذا اقترب منها إنسان هبطت إلى الماء أولا ثم طارت من بعيد ثانية . وسميت بذلك لقرب الشبه بينها وبين الغربان .



جنس غراب الماء (فلاكروكوراكس)
Genus (Phalacrocorax)

الخواص كالفصيلة . يوجد من هذا الجنس حوالى ٤٠ نوعا تغشى السواحل المائية في كافة أنحاء العالم . صوته يشبه صوت الغراب المعروف وسمى بذلك .

غراب الماء الشرقى

Cormorant (Eastern Form) = Southern Cormorant

(Phalacrocorax carbo sinensis)

الوصف : الطول حوالى ٣٦ بوصة . انظر لوحة (٥١) شكل (٣)
الموطن : من الأوايد ومتجول : يتوالد صيفا من شرق البحر الأبيض المتوسط ، شرقا إلى الهند والصين واليابان . وقد يتجول شتاء قليلا إلى الجنوب ، كذلك يتوالد في جنوب ووسط أوروبا . ويوجد في أمريكا الشمالية آخر شبيه به (١) كذلك في استراليا (٢)
في مصر : يقيم بها طول السنة حيث يتوالد فيها رغم أنه لم يشاهد له عش بها ، ولكن يرى طول السنة في النيل والفيوم والسويس وشمال الدلتا .

مميزاته : لونه أسود ، طويل الرقبة ، أبيض الخد والذقن ، يطير ورأسه ورقبته ممدودتان للأمام ، ضربات أجنحته سريعة للغاية في طيرانه من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ خفقة في الدقيقة . إذا استراح فوق الماء نصب رأسه ومد رقبة لأعلى . طعامه السمك يحصل عليه عن طريق الغطس ثم يبتلعها إذا طفا فوق سطح الماء ، وإذا خاف غطس بكل جسمه ولا يظهر منه غير رأسه فقط . يطير قريبا من سطح الماء وتارة على ارتفاع شاهق وقد يطير ولا يحرك جناحيه ، وإذا وقف على صخرة نشر جناحيه لتجفيف ريشه .

توالده : العش في مستعمرات الخ كما ذكر في الفصيلة ، والبيض من ٣ : ٤ بيضات ، ونادرا ٦ بيضات ، والحضانة من الإثنين من ٢٣ : ٢٤ يوما ، لون البيض أبيض طبا شيرى وإذا قشرت كان لون البيضة أزرق ، والإطعام خمسة أسابيع على الأقل ، ولا يكمل نموريش الأولاد إلا بعد شهرين تقريبا .

الغاق (غراب الماء الأخضر)

Green Cormorant or shag (Mediterranean Form)

(Phalacrocorax graculus desmaresti)

الوصف : الطول حوالى ٣٢ بوصة . انظر لوحة (٥١) شكل (٤)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة في إقليم البحر الأبيض المتوسط ، كما أنه يتجول شتاء ويهاجر جنوبا قليلا .

في مصر : حصل عليه من غرب الإسكندرية من السلوم وسيدى عمر من فبراير إلى مارس ، وهو قليل وجوده .

(١) اسمه عند الأمريكان GreatCormarant

(٢) اسمه في استراليا هو Black

مميزاته : أصغر من غراب الماء السابق . ينقصه اللون الأبيض في الوجه وليس له كذلك بياض في الفخذ . المنقار أرفع من السابق ، مائل للخضرة ، له في الربيع قنزعة ، ذيله ١٢ ريشه ، لا يبعد عن البحار الصخرية ، يمارس الغطس باستمرار ، يقف مائلا بزاوية وتكون الرقبة على شكل حرف S تقريبا . إذا كان سابحا وهم بالطيران عمل ضوضاء على سطح الماء وجرى قليلا وضرب الماء لمسافة ما ثم طار .

العش في مستعمرات . البيض ٢ : ٥ بيضاء ، والحضانة ٢٤ : ٢٨ يوما ، والإطعام بالإثنين . اللون الأبيض في الوجه يظهر في أيام التوالد في غراب الماء السابق ، أما هذا فلا يوجد البياض في الوجه في أي وقت .

غراب ماء طويل الذيل (غراب بيجمي الإفريقي المائي)
Long - tailed Cormorant; African Pygmy Cormorant
(Phalacrocorax africanus africanus)

الوصف : الطول حوالي ٢٣ بوصة . انظر لوحة (٥١) شكل (٢)
الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة في كل افريقية من رأس الرجاء الصالح إلى النيل وغرب افريقية .
في مصر : على طول وادي النيل وكذلك في الفيوم وبحيرات الوجه البحري حيث يقيم ولكن العثور عليه قليل .
مميزاته : صغير الجسم للغاية ، يحتشد في جموع كبيرة ، نشيط جدا في الماء ، يقف على القصب والأشجار دون أبناء الفصيلة .
التوالد : عثر على أعشاش له في بركة قارون بالفيوم على الأشجار في الشواطئ الغربية ، البيض ٢ : ٤ وأحيانا ٥ ، بيضاء مزرق ، والحضانة من ٢٣ : ٢٥ يوما . وقد يتخذ العش على الصخور المائية أو بين أدغال القصب في البحيرات .

غراب الماء بيجمي (القزمي)
The Pygmy Cormorant
(Phalacrocorax . p. pygmaeus)

الوصف : طوله حوالي ١٩ بوصة . انظر لوحة (٥١) شكل (١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شمال البلقان والعراق وفلسطين والجزائر .
في مصر : ذكر هيجلن أنه رآه شتاء بها . وهو نادر جدا رؤيته
مميزاته : صغير جدا نسبيا ولكن شكله مثل باقي أشكال غرابان الماء . نجد الشقين صيفا نجد الرأس أحمر بني غامق ، بلمعان أخضر وأسود ، وبه نقط بيضاء وذلك في الجسم . وهذه النقط تكون منعقدة وقت التزاوج في الربيع .

فصيلة رئيس البحر (الطائر الاستوائي)

فائونيداي (Phaethonidae) Family

= Tropic - bird

تختص طيور هذه الفصيلة بالمناطق الاستوائية في البحار والمحيطات ، وتكاد تكون طلائعها هي الأطيش Gannet والخرشنة Tern واحدة ومتحدة . البيض إما أرقط أو أبقع ، وتبيض الأنثى بيضة واحدة الذيل وتدي (غروطي) ينشق من وسطه ريشتان طويلتان ، ويمكنها أن تصلب في الهواء في مكانها وهي ثابتة دون أن يسمع لها أى صوت ، ثم تهبط فجأة من علو كبير على الأسماك والرخويات المائية . يوضع البيض على حافة صخرة أو على الأرض مباشرة .

وهي طيور طويلة الأجسام ، طويلة المنقار الذي هو بطول الرأس تقريبا ، وهو مدبب وعلى حافة طرفيه ما يشبه الأسنان ، وفتحة المنخر كالشق ، قصيرة الأقدام ، وهي أربعة كلها ذوات أغشية (مكففة) طويلة الأجنحة ، والذنب من ١٢ : ١٤ ريشه . ولون الطائر إما أبيض وهو المعتاد ، أو به حمرة وردية أو قرمزية والشقان لا يختلفان ، وأجنحة الإناث أطول من أجنحة الذكور . وهي لا تبنى أعشاشا . وهي طيور محيطات بحته وقد سميت بحق (بنات الشمس) إذ هي للملاح العلامة المؤكدة بأن سفينته قد وصلت إلى مياه المنطقة الحارة والمياه الاستوائية التي هي موطنها ومسارحها . ترى نهارا بقرب الشواطئ ، وتطير في الليالي القمرية أيضا ، وتقطع في رحلاتها حوالى ٣٠٠ ميلا بحريا ، وشوهدت وهي على بعد ١٠٠٠ ميل بحرى من الشاطئ . وقد تهبط على ظهر (سطح) السفينة . وهي تطير في جماعات حوالى العشرين واحدا تقريبا ، ولا تقترب كثيرا من الناس .

وتختلف فترات التكاثر وفق موقع الجزر التي تفرخ فيها ، فقد تكون هذه الفترة بقرب استراليا ما بين شهرى أغسطس وسبتمبر ، وفي جزر مرمودا بين شهرى مارس وإبريل ، كما تكون في جنوب البحر الأبيض المتوسط في شهرى يونيو ويوليو .

ويقع صراع عندئذ حاد بين الذكور حيث تنفض وراء الإناث في الشقوق التي تعتصم فيها وتفضل لوضع البيض الجزر المنعزلة النائية البعيدة عن مواقع نزوح الإنسان لها ، وهناك تضع بيضها إما فوق الأرض مباشرة في ظل الأشجار أو في الشقوق الأرضية ، أو في شقوق الصخور المطللة على الشاطئ . البيض رمادى أو وردي ويشترك الزوجان في الحضانة ويدافعان عن العش دفاع الأبطال بمناكيرهما ، وقد تمسك هذه الطيور في عشاشها طلبا لريشها الذى يستعمل في الزينة ولكن العادة هو أن يطلق سراحها بعد أن ينتزع منها الريش المطلوب .

يعرف منها ٤ أنواع ، والموجود حاليا منها هو ٣ أنواع (١) موزعة بالمنطقة الاستوائية بين المدارين في جزائر المحيطات كلها في شمال شرق استراليا والبحر الأحمر وحول مدغشقر وجزائر الهند الغربية وأمريكا الوسطى .

(١) منفردة من جنس واحد

جنس رئيس البحر (فايثون)
Genus (Phaethon) = Tropic - bird

الموجود منه في العالم حاليا هو ٣ أنواع .
يمتاز هذا الجنس بطول منقاره المنحني من طرفه العلوى قليلا ولكن ليس كالشخص . الفككان مسننان كالشط عند انطباقهما . المنخر واضح وقرب القاعدة . ليس له منطقة عارية حول العين والزور . الجناح طويل مدبب . أطول القوادم الأولى . الذيل مروحي الشكل وريشاه من وسطه طويلتان للغاية . نوع واحد في المياه المصرية .

رئيس البحر الصغير أحمر المنقار
Smaller Red - billed Tropic - bird; Bo'sun Bird
Phaethon indicus

الوصف : طوله حوالى ٢١ بوصة . الذيل وحده حوالى ٣٠ سم في الطول . انظر اللوحة (٥٢)
شكل (١)
الموطن : من الأوابد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في شمال المحيط الهندي وجنوب البحر الأحمر في جزائرها ، كذلك في جزائر ديهلاك ومسوا في إريتريا ، وشوهد في جزيرة جوبال .
في مصر : حصل بنهرت على رأس طائر منه من جزيرة جوبال عند مصب خليج السويس في يناير سنة ١٩١٩ هو الآن بالمتحف الحيوانى بالجيزة ، وشوهد أيضا بين السويس والطور .
مميزاته : أصغر بكثير من الأطيش (Gannet) ولكنه أكبر من معظم خراشنة البحر Terns ريش الذيل طويل للغاية الى ٣٠ سم تقريبا ، المنقار أحمر والقدم رمادية ، والظهر أبيض به نقط سوداء وطيرانه متموج يغشى البحار ، ويحصل على السمك عن طريق الغطس .
توالده : العش على سطح الأرض تحت صخرة صغيرة ، أى على سطح الصخرة ، وتبيض الأنثى بيضة واحدة لونها رمادى قرنفل شاحب أو رمادى مزرق بها نقط بنيه ، من سبتمبر الى نوفمبر .

رئيس البحر الكبير أحمر المنقار
Larger Red - billed Tropic - Bird Large , Bo'Sun Bird
Phaethon Aethereus

الوصف : طوله حوالى من ٢٥ إلى ٣٩ بوصة . لوحة (٥٢) شكل (٧)
الموطن : من الأوابد : خاص بالمحيط الهادى والأطلسى .
في مصر : يمتثل أن يحل في البحر الأحمر ، فقد سجله ألكسندر من خليج السويس عند خط عرض ٥٩ شمالا وهو التسجيل الوحيد .
مميزاته : كالسابق .

الفصيلة الأطيشية
Booby Family
سوليداي (Sulidae)
Gannets & Boobes

الموجود منها حالياً هو ٩ أنواع
تتميز هذه الفصيلة بغلظ المنقار القوي الذي هو أشبه بالخنجر ، وطرف الفك العلوي منحني قليلا
ولكن ليس مثل الشص كما في غريبان الماء ، حواف انطباق الفكين مسننة كالمشط دقيقة . الفك العلوي
به شق مائل أمام القسم (الصدغ) . ثم ضيق كالخط على كلا جانبي أعلى المنقار ، والمنخر في البالغ
مغطى كلية . الصدغ (القسم) وأعلى الزور عاريان تماما . الجناح في غاية الطول ومدبب أطول
القوادم الأولى . الذيل وتدي (مخروطي) ومسحوب ومكون من ١٢ ريشة أصابع القدم الأربعة كلها
ذوات أغشية (مكففة) . الساق أقصر من القدم . الذكر كالأنثى .

ترتاد الماء دائما ولا تأوى إلى اليابسة إلا عند التوالد فقط في مستعمرات ، ويمكنها أن تغطس من
ارتفاع حوالى ١٠٠ (مائة) قدم وهي أطول مسافة يعملها أى طائر مائي ولا يصاب بشيء وذلك لأن
جسمه يحتوي على أكياس هوائية تحت جلده تمكنه من تلافى صدمات الاندفاع المرتفع عند ارتفاعه
بالماء .

تقضى طيلة نهارها فوق الماء سابحة في الهواء باحثة عن الغذاء ولا تأوى إلى الأرض إلا للنوم
وقضاء الليل أو عند التوالد وتفضل الصخور المشرفة على الماء أو الناتئة من وسطه كي تشرف على البحر
مباشرة وتلجأ إلى أحضانها في ساعة الخطر لمهارتها في السباحة والغوص . وفي المناطق الحارة ينحصر
طعامها في الأسماك الطائرة ، ولوحظ أنها تأتى إلى الشواطئ البريطانية في ميعد وفود أفواج السردين
إليها حتى أنها تكون علامة من علامات وجود السردين عندهم هناك . ولوحظ أنها في فترات التزاوج في
الجزر التي تتجمع فيها على هيئة مستعمرة كبيرة منها تصم أسماع من يقترب من هذه الأماكن ، وتكون
العناش قريبة من بعضها مبنية من نباتات أرضية ومائية ، والبيض بيضة واحدة خضراء تقريبا : وقد
تكثر في مكان الأفراخ وتتجمع في طيرانها حتى تكاد تحجب أشعة الشمس . وهي لا تعرف الإنسان
لبعدا عنه في مواطنها الخاصة بها . وهي ليست من المهاجرات ولا من الطيور المتجولة ، فمهما ابتعدت
عن مواطنها ، لا بد أن تعود إليها . والمعروف عنها هو ١٢ نوعا في العالم والباقي جاليا هو ٩ أنواع فقط ،
وقديما كان ٢٦ نوعا . (١) وكلها تقطن كل سواحل قارات الدنيا المطلة على المحيطات وجزائرها
وسواحل البحر الأحمر فقط وليس الأبيض المتوسط ، كما أنها لا توجد بقلب القارات مثل البجع إلا في
البحر الأحمر فقط وخليج عدن كما ذكرنا .

(١) متفرعة من ٢ جنس .

(١) جنس (الأطيش) = سُولا

Gyenus (Sula) = Gannet

Booby Family

لهذا الجنس ما للفصيلة من خواص ومميزات . نوعان منه في البحر الأحمر . واحد منه يحل ويقيم طول السنة في المياه المصرية .

الأطيش البني

Brown Gannet = Brown Booby

Sula leucogaster

الوصف : الطول حوالي ٣٢ بوصة . انظر اللوحة (٥٢) شكل (٣)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة في المحيط الهندي والأطلسي والبرازيل ، وباهاماز ،
وجزائر الهند الغربية وغرب وشرق سواحل إفريقية ، وجزائر الرأس الأخضر وعدن والبحر الأحمر .
في مصر : يحتمل أن له قواعد توالد في البحر الأحمر ، وشوهد في جزيرة جوبال عند مصب خليج
السويس ، بل في خليج السويس ذاته ولكن لا يتجول أبعد من الطور شمالا ، وكان شائعا قرب
القصور .

مميزاته : كالفصيلة التي في صفحة ٣٦٢ ، قوى الطيران متموج . طعامه السمك خاصة ، وهو
لا يحضر السمكة إلى خارج الماء ، بل يتلعبها قبل ظهوره على سطح الماء .
التوالد : كالفصيلة ، البيض واحدة ، بيضاء ، والحضانة من ٤٢ : ٤٥ يوما .

الأطيش المقنع

Masked Booby = Blue - faced Booby

Sula dactylatra melanops

الوصف : طوله حوالي ٣٤ بوصة . انظر لوحة (٥٠) شكل (٤)
الموطن : من الأوايد : يتوالد ويقيم طول السنة في غرب المحيط الهندي وجنوب البحر الأحمر .
في مصر : سجله تيلور Tylor ، أنه شاهده قرب السويس ولا معول على كلامه إذ لم يعثر عليه
قط للآن .

مميزاته : يختلف عن غيره بأنه لا يوجد فيه لون أصفر في الرأس (صفرة خفيفة) التي في أطيش
الكاب الذي لا يرى في مصر ، أجزاءه العليا بيضاء بل معظم جسمه ما عدا ريش الطيران ، الذيل بني
غامق ريش القوادم والخواقي كله اسود .

(١) سعى بذلك من عاداته وطيشه حيث يحط على أسطح السفن دون خشية من ركايبها ودون امتثال لهم عندما
تكرر محاولاتهم إبعاده مما قد يسهل لهم إمساكه باليد .

الفصيلة البجمية^(١)
بليكانيداي (Pelecanidae)
Family (Pelican Family)
Family (Pelicans) Pelican Family

يعرف من هذه الفصيلة قدر ١٦ نوعا في العالم ، ولكن الموجود منها حاليا هو ٦ فصائل فقط تقطن مواطن المياه في المناطق الاستوائية والمعتدلة من قارات العالم ، في جنوب الهند ، وسواحل استراليا ، وغرب أمريكا الجنوبية ، ومعظم أمريكا الشمالية ، وكل إفريقيا ما عدا صحاريها ، وحول البحر الأسود ، وبحر قزوين ، والخليج الفارسي . وتمتاز هذه الفصيلة بأن المنقار فيها كبير بهيئة القارب الصغير يتدلى من الفك السفلي ويستخدم كمخزن للسّمك ، كما يوجد اللسان الصغير في مؤخرة قاع الفك الأسفل ، أما الفك العلوي فهو كخطاء له ، طرفه مدبب معقوف كالشخص أو الخطاف ، أما العنق فهو طويل ونحيف ، كما أن الذنب قصير يتراوح عدد ريشاته من ٢٠ : ٢٤ ريشة كما لا يوجد ريش في منطقة الرقبة وما حول العين ، والمنخر صغير ، والشقان متماثلان ، ويختلف اليافع عن لون البالغ ، الجسم أسطوانى كبير ، وكل أصابع الأقدام مكففة ، وطول المنقار حوالى ١٨ بوصة . الريش صلب كثيف مرسل قليلا على القفا ومؤخر الرأس .

والبجع لا يفرق بين المياه الملحة والعذبة في إتيانها ، ولكنه يفرق بين العميقة والضحلة ، لأنه لا يمكنه أن يغطس نظرا لوجود الوسادة الهوائية تحت جلده وهى التى تحول بينه وبين الغوص إلى أعماق الماء ، ويشذ عن ذلك نوع يقطن أمريكا الوسطى . وهو يتجمع زرافات في المياه الضحلة يغمر فيها الرموس ويحاصرها ليقضى على ما بها من أسماك ، أما في البحار والبحيرات فإنه ينتظم على شكل قوس كبير سابع صوب الشاطئ يضيق بالتدريج كلما اقترب منه مثل ما يفعل صيادو الأسماك عندنا بالشباك ، حتى يحاصر السمك عند الشاطئ ويلتهمه ، أما في النهرات والترع الكبيرة فإنها تصطف صفين تجاه بعضها ثم تقترب من بعضها حتى تعمل الحصار على ما في المنطقة من سمك وتلتهمه مثل عملية تطويق الجيوش في الحرب ، وقد تأكل أيضا حيوانات فقيرة ، وهو أثناء صيده يأخذ في فمه كمية كبيرة من الماء مع الفريسة يتخلص منها بأن يطأطأ منقاره ويضغط رقبتة فيندفع الماء إلى الخارج . وهو يصيد صباحا في جماعات ثم يستريح بعد الشبع ظهرا على أرض رملية على ساحل البحار ، أو على أغصان الأشجار لهضم ما أكله ، ولتنظيف ريشه وطيئه بالزيت ، وتزداد هذه الجموع ظهرا كل لحظة حتى إذا ما حل وقت العصر ، بدأت في مبارحة أماكنها إلى مواطن أخرى للصيد الذى يستمر حتى الغروب ، ثم تعود بعدها إلى مواطن نومها . وهو أقل ولوعا بالبحار من غيره ويشذ عن ذلك نوع بأمريكا الجنوبية . وهو يصيد السمك وجسمه ظاهر فوق سطح الماء ، ولا يغطس مثل الأطيش وغراب الماء وطائر السفينة ورئيس البحر التى هى من ضمن الرتبة ، كما أنه لا يمكنه بالرغم من عظم جسمه أن يجلس معتدلا قائما رأسيا على سطح الماء لأن عظامه الجوفاء المليئة بالهواء تحول دون ذلك وتجعل وزنه خفيفا .

يتخذ العش وسط البحيرات والمستنقعات التى لا يصلها الإنسان إلا بعد مشقة بالغة ، وتكون على هيئة مستعمرة كبيرة مكونة من مئات الأعشاش . البيض ٢ : ٣ لونها أبيض مصفر ، والعش في

(١) متفرعة من جنس واحد والرتبة هى Order Pelecaniformes تشمل البجع وغربان الماء والأطيش .

غاية المتانة ويبلغ طوله حوالى ٢٦٠ سم وارتفاعه ٧٠ سم تقريبا ، وتبارح الأولاد العش بعد ٣٨ يوما تقريبا ، وتنمو سريعا بعد ذلك . ونجد أن الأولاد في الدنيا القديمة تخرج من البيض مفتوحة العينين مكسوة برداء كثيف من الزغب بينما نرى أحوالها في الدنيا الجديدة تخرج مقفلة العينين عارية وتلبث هكذا بضعة أيام حتى تبصر ، وأسبوعين حتى ينبت لها ريش . والحضانة في أمريكا أقل بكثير منها في الدنيا القديمة ، ويتكفل الزوجان بالحضانة والإطعام وباقي العناية بالأولاد ، ويبديان شجاعة وجلدا في حراسة العش والصغار وينسيان كل ما يعرف عنها من خوف ووجل . هذا . ونرى في مدينة نابولي تمثالا لبيجة في وضع يمثل الأمومة في عتيف حبيها وبالغ إيثارها ، تذكرها لهؤلاء الذين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجبهم في مكافحة وباء الكوليرا الذي دهم البلاد عام ١٨٨٤ م .

جنس البجع (بلبكانوس) . (Genus (Pelecanus)

طيور إجتماعية ، بعضه يقف على الأشجار .
الأعشاش في مستعمرات . باقى الخواص كالفصيلة .

البجع الأبيض White Pelican (Pelecanus onocrotalus .)

الوصف : الطول من ٥٥ : ٧٥ بوصة . انظر لوحة (٥٢) شكل (٥)
الموطن : من القواطع ويتجول : يتوالد صيفا في جنوب شرق أوروبا (بلغاريا ورومانيا عند مصب نهر الدانوب) كذلك في جنوب غرب آسيا في بحر قزوين والبحر الأسود وبحر أزوت وبحر آرال ، كذلك في إفريقية الشرقية الاستوائية . يقضى الشتاء في شمال اليونان ، وقد يتجول في غرب أوروبا .






في مصر : شائع صيفا من الربيع للخريف ، في الفيوم وقنال السويس ونهر النيل بطوله على شواطئه الرملية من القاهرة إلى وادى حلفا ، وقد يشاهد في جموع تستريح على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في شمال الدلتا وبحيراتنا في الربيع والخريف أثناء هجرته ، وشاهدت سربا من حوالى ٢٠٠ واحدة على ارتفاع حوالى ٢٠٠ متر في سماء رشيد تصف في طيراتها .

مميزاته : كالفصيلة . رقبته تكون على حرف S في طيرانه . الأجزاء العليا والسفلى وردية قرنفلية . ولم يثبت توالده للآن في مصر . القوادم والخوافى من أسفل سوداء في طيرانه .

البجع الرمادى Grey Pelican = Pink - backed Pelican Pelecanus Rufescens

الوصف : الطول حوالى ٥٥ بوصة . انظر لوحة (٥٢) شكل (٦)
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة في إفريقية الاستوائية جنوب الصحراء الكبرى وفي مدغشقر .

في مصر : اصطاد نيقول واحدة من بحيرة التمساح من قنال السويس صدفة .
المميزات : رمادى في اعلاه ، الردف قرنفلى وردى ، والأجزاء السفلى بيضاء رمادية قليلا . وعند التوالد نجد له قنزعة طويلة






Black-eared Wheatear (Black-throated Form)
(Eastern Form.). In Spring and Summer Dress.



Temminck's
Stint



Little Stint



Green
Sandpiper
(In Flight)

بجع دلاشيا Dalmatian Pelican
(*Pelecanus crispus* .)

الوصف : الطول حوالى ٧٠ (من ٦٠ : ٨٠ بوصة) انظر لوحة (٥٢) شكل (٤)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شبه جزيرة البلقان (هنغاريا و دلاشيا) وبحر أزوف وقزوين وسوريا والخليج الفارسي شرقا إلى منغوليا . يقضى الشتاء في الهند ومصر وجنوب الصين .
في مصر : يحل بها شتاء من الحريف إلى الربيع عكس الأبيض ، في نفس موطنه
مميزاته : حذر للغاية كالأبيض فيطير من مسافة بعيدة . ريش الجبهة ملتو ولونه بني . يحتمل أنه
أكثر البجع شيوعا في مصر . وهو أكبر قليلا من البجع الأبيض . القوادم والخواف بيضاء وأطراف
القوادم سوداء فقط

(١) رتبة طيور النوء (توبينارس) = بروسيلاريفورمس

Order (Tubinares) = (Procellariiformes .)

Shearwater Family.

تحتوى هذه الرتبة على فصائل وعائلات القادوس Albatross والفولمار Fulmar وجلم الماء Shearwater والبتل Petrel (٤ فصائل) . والبتل الأخير هذا على ثلاثة أنواع وهي البترل الأصل True Petrel وبتل الزوابع Storm Petrel والبتل الغطاس Diving Petrel وتختلف هذه الرتبة اختلافا بينا في تفاوت أحجام أنواع طيورها ، فمنها ما هو كبير الجسم للغاية مثل القادوس ، ومنها ما هو صغير جدا مثل الخطاف Swallow ، كما أن بعض الأفراد ليل وبعضها نهاري ، ولكن البيض في الجميع هو بيضة واحدة ، والأولاد في الجميع أيضا مغطاة بالزغب ولا تفارق العش إلى أن يتم تبديل الريش الكامل لها . أما المنخر فهو عبارة عن فتحتين من أنبوتين متلاصقتين ويمتدين من قاعدة الفك العلوى في أعلاه ويصلان إلى ما بعد منتصف الفك العلوى ، وقد ينتشر الأنبوتان على جوانب الفك العلوى ، ويوجد تنوء قرنى أمام كل من فتحتى المنخر . الثلاث اصابع الأمامية لقدم كففة ولا أصبع رابع لها في الخلف وإن وجد فهو غير ملحوظ وضامر للغاية . الجناح طويل ومدبب . الذيل من ١٢ : ١٦ ريشه . تغشى هذه الطيور الماء ، في البحار والمحيطات ، وهي في نصف الكرة الجنوبي ، والمناطق الحارة ، أكثر منها في المناطق المعتدلة والباردة في نصف الكرة الشمالى لأن الجنوب أغنى بالماء وبمواطن رزقها . وهي لا تطأ الأرض إلا عند وضع البيض فقط وتختار لذلك الأماكن النائية المنعزلة البعيدة عن مهبط المخلوقات لأن العش يكون على سطح الأرض مباشرة أو مرتفعا عنها قليلا مثل القادوسى (ألباتروس) طعامها الجيف والأسماك وفضلات ما يلقى في البحر من المراكب ورخويات البحار . التي تلتقطها من الماء سابحة عليه أو وهي على جناح الهواء . وهي تتبع السفن في عرض البحار لتلقف ما تقذفه المراكب والبواخر من فضلات على سطح الماء ، ويمكن صيدها بالشص بسهولة حيث تغطى الشص بقطعة من اللحم فيبتلعها الطائر . وهي لا تصلح للأسر إذ تضعف وتموت لعدم طيراتها في الأقفاص . تحتوى هذه الرتبة على أكثر من ١٠٠ نوع من طيور المحيطات والموجود حاليا ٥٦ نوعا

(١) سميت طيور النوء لأنها لا تعبأ بالعواصف وتستمر في التحليق أثناء هبوبها .

الفصيلة الجلمية (Family (Procellarudae

تحتوى هذه الفصيلة على البترل Petrel وجلم الماء Shearwater والمعروف من هذه الفصيلة هو ٦٠ نوعا ، غير أن الموجود منها حاليا هو ٤٧^(١) نوعا فقط على قيد الحياة ، وهى تقطن جميع المحيطات فى العالم وخاصة سواحلها فى أمريكا الجنوبية الغربية ، وسواحل أوروبا الغربية ، وجنوب أوروبا ، وجنوب استراليا ، وجنوب آسيا ، كما أنها تكثر فى المحيط الهادى .
تقضى طول نهارها سابحة فوق سطح الماء أو طائرة فوقه . باقى الخواص مثل الرتبة .

جنس حلم الماء (برفينوس)

Genus (Puffinus)

(Shearwater) = shearwater Family

هى طيور متوسطة الأجسام ، طويلة الأجنحة ، طويلة المنقار ورفيعه ، والنصف الأوسط المضغوط من المنقار يساوى حوالى نصف طول المنقار كله . المنخر فى قمة المنقار من أعلى وهو منقسم الذيل ١٢ ريشه وهو وتدى .

٢٠ نوعا منه ، فى المحيط الأطلسى والهادى . نوعان منه فى البحر الأبيض المتوسط ، كلاهما يحل داخل المياه المصرية . بعض الأنواع واسعة الانتشار وبعضها محلى .

طرف شق المنقار الأعلى مقوس منحرف فوق طرف الشق الأسفل . فتحتا الأنف تنتهيان قرب قمة المنقار بأنبويتين مستويتين قصيرتين ، وتبرز عند مؤخر الجسم . الجناح طويل نسبيا ، والذنب متوسط الطول ، مستدير الطرف .

وهى طيور لا تبارح الماء إلا للإفراخ ووضع البيض ، ولكنها تقترب من الأرض أكثر من أضرابها ، إذ كثيرا ما تدخل إلى الموانى . وهى تعيش فى أسراب تتراوح ما بين ٨ ، ٢٠ طائرا ، تطير كلها معا متجهة صوب هدف خاص ، ولكنها فى فترات التزاوج تتجمع أفواجا ضخمة تغطى الجزيرة التى تحل بها ، وتتكدس فوقها حتى تغطيها ويحيل إلى الرأس أنها مغطاة بسحابة سوداء من جنس هذا الطائر .

ويتغذى هذا الجنس غالبا على الأسماك ، والحيوانات البحرية الرخوة والحلالية ، وصغار الثدييات المهمة التى تعثر عليها على سطح الماء ، وهى تقبض على فريستها أثناء سباحتها على سطح الماء ، أو تغوص وراءها تحت الماء . وسميت بجلم الماء لأنه يبدو منها أثناء طيرانها كما لو كانت تجلم الماء أى تجزئه وتشقه دون أن تحرك الأجنحة تحريكا ظاهرا ودون صوت ملحوظ .

(١) متفرعة من ٩ أجناس

جلهم ماء ليفانتين^(١)
Levantine Shearwater
(Puffinus puffinus yelkouan)

الوصف : الطول حوالى ١٤ بوصة انظر اللوحة (٥٢) شكل (٧)
الموطن : من الأوايد ومتجول : يقيم طول السنة حيث يتوالد في مواطن إقليم البحر الأبيض المتوسط ، والبحر الأسود . كما أنه في غير التوالد نجد صيتجول خلال البحر الأبيض المتوسط . كما أنه يشاهد أيضا بكثرة في أسراب في تركيا في خليج البوسفور وهو سابح في الهواء طول النهار يعلو ويبط فوق مياهه .

في مصر : يشاهد غالبا في إقليم البحر الأبيض المتوسط في شمال الدلتا عند بور سعيد والإسكندرية ودمياط ورشيد والمنزلة وكل سواحل الدلتا الشمالية ، يرى قرب الساحل سابحا في الهواء ، وصيد كثير منه عند البرلس وأبي قير في شهر أغسطس وشهر سبتمبر ، وقد صلت أنا بنفسى واحدا منه عند ساحل البحر الأبيض المتوسط كان يبعد عن الساحل بمقدار حوالى عشرة أمتار تقريبا ، وكان ذلك في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر عام ١٩٣٧ ، وكان في شمال شرق رشيد (في البر الشرقى) .

مميزاته : أهم ما يميزه هو أنه يطير دائما فوق سطح الماء طول النهار ويكون قريبا من ساحل البحر في أيام الزوايع والأعاصير والرياح الشديدة أو المتوسطة الهبوب .

وهو لا يأوى إلى البر إلا عند التوالد فقط ووضع البيض من أجل التكاثر . قد يستريح على سطح الماء في أسراب كبيرة . الأجزاء العليا شديدة السواد . طعامه يتناول من فوق ظهر الماء مباشرة وأحيانا يغطس من أجله . وطعامه طبعاً صغار الأسماك ومخلفات البحر من حيوانات بحرية رخوية وهلامية وقشرية . يمكنه أن يمشى تحت الماء حوالى ٢٠ ثانية . نجده في أيام الأعاصير والزوايع عندما يقترب من الساحل كما ذكرنا ، يمكن عندئذ للإنسان أن يمسكه بيده أو يضربه بالعصا حيث هو حيث لا يعلو عن سطح الماء أكثر من نصف متر في مثل هذا اليوم العاصف .

يمتاز كذلك بأن أجزائه السفلى بيضاء .

التوالد : العش في جحر كجحر الأرناب في الصخور أو السهول الوعرة أو شق في الصخرة . البيض عبارة عن بيضة واحدة ، فقط لا غير .

(١) معنى Levantine أى شرقى

جلم ماء مان

Manx, Shearwater

(Puffinus puffinus Puffinus)

الوصف : الطول حوالى ١٤ بوصة . انظر لوحة (٥٢) شكل (٩)
الموطن : من الأوابد ومتجول : يقيم طول السنة حول جزيرة مان (Man) المنسوب إليها بكلمة (Manx) وهذه الجزيرة هي بين بريطانيا وأيرلندا في البحر الأيرلندي بين خط طول ٤ ، ٥ شرق جريتش ، وشمال خط عرض ٥٤° . كذلك في كل المنطقة حول أيرلندا وسواحل شرق بريطانيا ، كذلك في جنوب أوروبا المطل على البحر الأبيض المتوسط وجزائره .
في مصر : سجل نيقول أنه حصل عليه من دمياط في ١٢ سبتمبر سنة ١٩١٦ م وربما التمس عليه الأمر .
مميزاته : الأجزاء العليا أعمق من سابقه ، وغطاء أسفل الذيل يعمه البياض أكثر من سابقه .
الباقى كالسابق .

جلم البحر الأبيض المتوسط الكبير

Mediterranean Great Shearwater

(Puffinus Kuhl Kuhl)

الوصف : الطول حوالى ١٩ بوصة . انظر لوحة (٥٢) شكل (٨)
الموطن : من الأوابد ومتجول : يقيم طول السنة في كل حوض البحر الأبيض المتوسط من جبل طارق إلى سوريا والبيسفور ومصر .
في مصر : متجول لها فقط
مميزاته : يميل للون الرمادى بكثير عن سابقه ، وأكبر منها أيضا . الباقى مثلها .

بتل الزوايع

Stormy Petrel

(Hydrobates pelagicus)

Shearwater Family

الوصف : الطول حوالى ٦ بوصة . انظر لوحة (٥١) شكل (٦)
الموطن : من الأوابد ومتجول : يقيم طول السنة في المحيط الأطلسى غرب الجزر البريطانية ، وفي البحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا (حول صقلية والبلبار وسردينيا وقورسقا) .
في مصر : شاهده ميترتزاهاجن متجولا على بعد ٥٠ ميلا تقريبا شمال غرب بورسعيد في مارس ، وأكتوبر ، وكذلك في البحر الأحمر على مسافة ٣٠٠ ميل تقريبا شمال عدن في سبتمبر وقد رآه في المرة الأخيرة الكسندر .
مميزاته : يشبه شكل سنونو المنزل House-martin غير أنه ضعفه في الجسم تقريبا . أسود الظهر ، أبيض الردف . يسف في طيرانه قرب سطح الماء . لا يشاهد غالبا في الوديان المتعوجة .

بتزل ولسن
Wilson Petrel
(*Oceanites oceanicus*)

الوصف : الطول حوالى ٧ بوصة . انظر لوحة (٥١) شكل (٨)
الموطن : من الأوايد ومتجول : يقيم طول السنة حيث يتوالد في أقصى منطقة القطب الشمالى
وتحتها بقليل في المحيطات ، أما في الصيف فهو يزور البحار جنوب غرب أيرلندا وخليج يسكاى كما أنه
يتجول على سواحل الجزر البريطانية وحوض البحر الأبيض المتوسط .

في مصر : شاهده الكسندر في البحر الأحمر على مسافة ٣٠٠ ميل تقريبا شمال عدن في سبتمبر .
مميزاته : شبيه جدا بالسابق ولكن أغشية الأقدام صفراء يتبع المراكب . مربع الذيل ، أبيض
الردف ، متموج الطيران قليلا الذى هو أشبه بطيران أبو النور . وهو في طيرانه يمد رجله للخلف ،
فتخرج الأرجل إلى حوالى نصف بوصة وراء الذيل تقريبا ، أى بمعدل ١/٢ طول الذيل .

الرتبة الغماساطية
Order (Pygopodes = Podicipiformes)
Grebe Family

(بيجو يوديس = بوديسيبينفورمس)

تحتوى هذه الرتبة على الغماسة والغطاس (Grebes & Divers) وتحتوى الفصيلة على ٢٠ نوعا .
وتمتاز بالخواص الآتية وهى : أن الذيل صغير جدا ويصعب وجوده في الغطاس ، بل يوجد مكانه
خصلة صغيرة من الريش المرسل . أصابع القدم كلها ذات أغشية كاملة ، وشرايح ، وأصبع القدم
الخارجى هو الأصوب ، ويغطى الريش كل الفخذ . والناهض ذو زغب وقت التوالد ، الجسم مستو
ومنضغط ، الرقبة نحيفة طويلة ، والرأس صغير ، المنقار مدبب كالخنجر مخروطى وذو قواطع في غاية
الحدة ، يدخل الفك الأسفل منها في الفك العلوى عند انطباقها ، أطول القوام على الترتيب هى
الثانية ثم الأولى ثم الثالثة والقوام ١٢ ريشه والأولى شبه ضامرة والجناح قصير ، والأرجل ممتدة إلى
خلف الجسم ، وريش الأجزاء السفلى ناعم كالقراء وهو براق مثل الحرير ، بينما هو على الرأس والعنق
مسترسل كالشعر ، ويزين الطيور البالغة في الربيع طوق عريض زاهى اللون يظهر حول الزور
والصدغين .

مواطنها البرك والمستنقعات في المياه الراكدة ، وكذلك الجارية ذات الأدغال كالقصب والريش
ويندر أن تظهر فوق البحار . وهى طيور وجلة مخادعة جمة الحذر فما أن ترى أى مخلوق يرمقها بعينه وهى
على سطح الماء حتى تغطس في الحال ، ثم تظهر من بعيد ، فإن شعرت أنه رآها غطست ثانية
وهكذا (١) . طعامها صغار الأسماك والديدان ويرقات الضفادع وصغارها ، وهى تكون في مأمن
من أخطار جمة مادامت فوق ظهر الماء ، أما إذا كانت في الجو فإنها تكون عرضة لأن تقع فريسة للطيور

(١) لا تظهر كل جسمها عند الخوف بل الرأس والرقبة فقط ، وباقى الجسم يكون مغمور في الماء .

الجارحة ، لأنها ضعيفة الطيران لقصر الجناح ومن عجب أمرها أنها تبتلع ريشها وخاصة ريش الصدر من بدنها ، وتأخذ أولادها تحت جناحها ثم تغطس بها في أعماق الماء ساعة الخطر ، وتارة تأخذها بين ريش صدرها وتصحها سابحة في الهواء .

ويبنى العش من المواد الرطبة التي تستحضر من قاع الماء ثم تثبت إلى عود من القصب أو على غطه على غير نظام . البيض من ٤ : ٦ مخضرة بيضاء ، والحضانة بالتبادل ، ولكن النصب الأوفر هو للأنثى ، والحضانة ثلاثة أسابيع ، وما أن تخرج الأولاد من البيض حتى تقودها الأمهات مباشرة إلى الماء وتعلمها الغطس ، وتحافظ الآباء على الأولاد هذه في ساعة الخطر فنجدها تأخذها تحت جناحها ثم تغطس بها في أعماق الماء وتارة تأخذها بين ريش صدرها وتصحها سابحة في الهواء . وتارة تأكل النباتات المائية .

وهي ضعيفة الطيران لقصر جناحها ولكنها تستعيص عنه بالغطس كما ذكرنا غير أنها في حالة الخوف لا تطفو بكامل جسمها فوق سطح الماء بل تظهر رأسها ورقبتها فقط وتبقى جسمها مغمورا في الماء .

وهذه الرتبة تتكون من مجموعة صغيرة من الطيور المائية موزعة فوق معظم الكرة الأرضية ماعدا مناطق القطب الشمالى والجنوبى ، وتوجد في المياه المنخفضة كما توجد أيضا في العالية . ففي الحبشة مثلا توجد في مناطق ترتفع نحو ٢٥٠٠ متر ، وفي بيرو حوالي ٤٠٠٠ متر عن سطح البحر . والريش فيها قريب المسافة جدا من بعضه ولذا يزيد عدده عن عدد أى ريش طائرا آخر .

الفصيلة الفطاسية (برديسبيدای)

Family (Podicipidae)

Grebes

المعروف من هذه العائلة هو ٢٢ نوعا ، ولكن الموجود منها هو ١٧ نوعا فقط على قيد الحياة . متفرعة من ٣ أجناس تقطن كل الدنيا ، ماعدا بورنيو وسومطرة وكل بلاد العرب ، والصحراء الكبرى الإفريقية وجرينلاند .

تمتاز بوجود شرائح جلدية على كلا جانبي أصابع القدم ، كما أن مخالبها قصيرة ومسطحة ، وريشها ناعم للغاية ، ويندر وجود ذيل لها وبالكثكوت خطوط ، والبيض أبيض اللون ، وطعامها الرئيسى صغار الأسماك تحصل عليها عن طريق الغطس ويمكنها أن تمكث تحت الماء على عمق ٢٠ قدما لغاية ١/٢ دقيقة ، والقوادم ١١ قادمة ، وإحداها ضامرة . الباقي مثل الرتبة .

جنس الفطاس (بوديسبس)

Genus (Podiceps) = Grebe

يمتاز هذا الجنس بأن أعلى المنقار إما منحن قليلا أو في استقامة واحدة ، كما أن الساق أقصر من الأصبع الوسطى بمخالبها . وريش الجبهة منسق ومنظم بطبيعته . العش عبارة عن كومة أعشاب وجذور مائية عائمة .

ويضم هذا الجنس حوالي ١٥ نوعا ، ثلاثة منها في مصر ، وكلها تستوطن كل البحيرات ومواقع المياه الملائمة من أوروبا جنوب خط عرض ٦٠° شمالا ، كما يستوطن أيضا وسط الصين وجنوبها ، وبورما وجزر فورموزا وبورنيو والفلبين ، وإفريقية من جنوب الحبشة ، وجزيرة مدغشقر وسيلان وجنوب الهند ؛ وهي أمهر الطيور من الفصيلة في السباحة والغوص ، ولكنها ليست ماهرة وحاذقة في الطيران ، وتستعصم عنه بالغوص تحت الماء أو الهرب بين الأدغال المائية إذا ما شعرت بالخطر .
الغذاء وبناء العش مثل الرتبة .

غطاس متوج كبير بلياركتك
Great Crested Grebe (Palaearctic Form)
(Podiceps cristatus cristatus)
Dabchick Family

الوصف : الطول حوالي ٢١ بوصة . انظر لوحة (٥١) شكل (٩) ، (١٠)
الموطن : من الأوابد ، وبعضه من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا تقريبا والجزر البريطانية ، ماعدا اليونان واسكندناوة ولكنه يتوالد في جنوب السويد . كذلك يتوالد في بعض أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقية وجنوب أوروبا ، كذلك في شمال الهند ، وفي آسيا الوسطى والصين واليابان ، . يقضى الشتاء بعضه في شمال إفريقية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والهند وبرما .

في مصر : يقيم فيها طول السنة ولكنه نادر العثور عليه . فيشاهد في بحيرات الدلتا والفيوم والمنزلة .

مميزاته : لا يجيد السير فوق اليابسة لوجود رجليه في مؤخرة الجسم ، وهو في طيرانه يظهر كأنه أبيض للغاية ، يمد رقبته في طيرانه للأمام وأرجله للخلف . قبل طيرانه يضرب الماء بجناحيه ويعمل فيه رشاشا كالبحار . إذا حط على الماء لاقى واستقبل الماء بصدرة أولا ولا كذلك بأرجله كما يعمل البط . أكبر غطاس . يعرف شتاء من الغطاس الأحمر الرقبة يخطه الأبيض فوق العين . عند المطاردة نجده يكت تحت الماء حوالي دقيقة تقريبا . طعامه كالفصيلة .

توالده : العش كومة من الأعشاب المائية الطافية وتارة مشتبكة بعض يطل على الماء أو في الأعشاب الأخرى ؛ البيض من ٣ : ٦ بيضات وعادة ٤ مائلة للزرقة المخضرة ، والخضانة من ٢١ : ٢٤ ، وقد تصل إلى ٢٩ يوما . ولم ير البيض في مصر . وإذا فاجأه العدو طار من فوق العش إلى أعلى ثم هبط فجأة وغطس في الماء .

غطاس أحمر الرقبة
Red — necked grebe (١)
(Podiceps griseigena)

الوصف : الطول حوالى ١٨ بوصة . انظر اللوحة (٧٣) شكل (٤)
الموطن : من الأوايد . ومتجول والبعض مهاجر . يتوالد صيفا في شمال ووسط أوروبا الشرقى
شرقا إلى غرب آسيا وأرمينيا . والبعض يتجول شتاء إلى الجنوب قليلا .
في مصر : سجله هيجلن أنه رآه شتاء فيها في الدلتا وأنه رآه صدفة ولا معول على كلامه حيث لم ير
للان .

مميزاته : مقدم الرقبة أحمر رملي ، وليس له خط أبيض فوق العين

غطاس أسود الرقبة بلياركتك (٢)
Black — necked grebe (Palearctic Form)
(Podiceps nigricollis nigricollis)

الوصف : الطول حوالى ١٢ بوصة . انظر لوحة (٥١) شكل (٥)
الموطن : من الناطق : يتوالد صيفا في معظم الإقليم البلياركتك شرقا إلى بلوخستان وفي وسط
وجنوب أوروبا وآسيا ، يقضى الشتاء جنوب موطن توالده .
في مصر : يزورها فقط في الشتاء وخاصة الدلتا في يناير وفبراير ، ولكنه ليس بكثرة بل بقلة ،
وربما كان في المنزلة وخليج السويس وقناها ، وصدته بنفسى من شمال شرق رشيد في نوفمبر وديسمبر
سنة ١٩٣٩ م


مميزاته : أكبر قليلا من الغطاس الصغير الدابشك (Dabchick) يظهر متفاره كأنه منحني لأعلى .
اسمه كذلك الغطاس أبو آذان (Eared Grebe) نظرا للزوائد حول الأذنين

الغطاس السلافي (الصقلي)
Slavonian grebe = Horned grebe
(Podiceps auritus)

الوصف : الطول حوالى ١٣,٥ بوصة . انظر اللوحة (٥١) شكل (٧)
الموطن : من الأوايد والقواطع ومتجول : يتوالد صيفا في الإقليم البلياركتك الشمالى (أيسلند ،
وحول بحر البلطيق وشمال روسيا ، ويتجول شتاء إلى سواحل غرب أوروبا ، كما يزور في الشتاء أيضا
جنوب أوروبا وشمال إفريقيا
في مصر : سجله هيجلن كزائر شتوى لها وأنه يتوالد في الفيوم ، وليس لدينا إثبات لصحة
ما ذكره .

(١) يسميه الأمريكان Holbuell's Grebe

(٢) يسميه الأمريكان Eared grebe



المميزات في حجم الغطاس الأسود الرقبة غير أن منقاره ليس منحنيًا لأعلى ، يندران يوجد به بياض في القواعد من الداخل . في الشتاء نجد البياض يمتد إلى العين وغطاء الأذن ، أما في الصيف فنجد مقدم الرقبة بني .

الغطاس الإفريقي (الدابشك)
Little grebe (African Form) = Dabchick
(Podiceps ruficollis capensis)

الوصف : الطول من ١٠ إلى ١٢ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (١)
الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في إفريقية ، الهند وبرا وسيلان ، وقد حلّ في العراق ويحتل في فلسطين .
في مصر : شائع الإقامة فيها طول السنة في الدلتا ووادي النطرون والفيوم والواحات الداخلة . ويحتل أن يكثر شتاء بما يأتي له أيضا من الشمال . وأغلب ما يرى هو في قنال السويس شتاء وتارة على طول نهر النيل .

مميزاته : أصغر بكثير من الحذف (الشرسير) ، دائم الغطس ، لون الزور والخد بني عمر ، يغشى المياه المكشوفة ، يرى مثنى أو منفردا ، يندران يستريح فوق ظهر الماء مدة كبيرة بدون غطس . إذا خاف غطس بسرعة كالبرق . يمكنه أن يستريح بسهولة على راحة اليد دون أن يترنح أو يميل . في آخر الشتاء وأوائل الربيع يصيح كصياح دجاج الماء أو الغرة يمكنه أن يغطس بكل جسمه في الماء ولا يظهر إلا منقاره وأنفه فقط فوق السطح لاستنشاق الهواء . إذا خاف طار لأعلى ثم هبط فجأة وغطس .

التوالد : العش بداخل القصب أو يكون طافيا على وجه الماء ويستحضر أدواته من قاع الماء . البيض من ٣ : ٤ توضع من إبريل إلى يونيو وأحيانا ٥ أو ٦ أو ٧ . البيض أبيض به نقط بيضاء ، وتبيض الأنثى مرتين في السنة ، وقبل مبارحة الأباء للعش تغطيه بالأعشاب التي تحضرها من قاع الماء عن طريق الغطس . الحضانة بالاثنتين من ٢٠ : ٢١ يوما ، وتحميد الأولاد الغطس بعد ١٧ يوما .

الفواصيات = رتبة الغماسيات (جافيفورم)
Order (gavuiformes) = Divers
= colymbiformes)

هي رتبة صغيرة الأنواع وهي ٤ أنواع فقط موزعة في الأقاليم الباردة من نصف الكرة الشمالي . وهي تحميد الطيران والسباحة والغطس ولكن أقدامها مركزة في مؤخرة أجسامها ، لا تحسن الوقوف على الأرض ، وطعامها السمك والحوانات البحرية الرخوة والصدفية والقشرية .

الفصيلة الغماسية (كوليمبداي)

Family (Colymbidae.) = Divers

تتميز هذه الفصيلة بقصر الذيل للغاية في أنواعها ، ولكنه ظاهر ومكون من ١٦ : ٢٠ ريشة ، والريش قوى . القوادم ١٠ ، والأولى ضامرة . ليس لريش الكتكوت خطوط . المش على الأرض أو بالقرب من الماء . البيض بني زيتي أبيض .

جنس الغماسة (كوليمبوس)

Genus (Colymbus) = Divers.

تتميز لأول نظرة من غريبان الماء بخلوها من سن معقوف كالشخص في طرف الفك العلوي الذي لغريبا الماء ، ولكن الفكين متوازيان بمستوى سطح الجسم ، أما غريبان الماء فهي تنحى رموسها لأعلى قليلا . كل الغماسات أثقل وزنا وأكبر جسما من أكبر غطاس . باقي الخواص كالـفصيلة . (أنظر فوارق المتقارص ٣٩ - ١)

غماسة حمراء الزور

(١) Red-throated Diver.

(Colymbus stellatus.)

الوصف : الطول من ٢١ - ٢٤ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (٢)
الموطن : مقبلة طول السنة في مواطن توأدها وبعضها يهاجر جنوبا والبعض الآخر يتجول . وهي تقبم طول السنة حيث تتوالد في كل شبه جزيرة اسكندناوة وأيسلند وشمال اسكتلندة (المناطق الشمالية الباردة) وبعضها يهاجر جنوبا إلى وسط أوروبا والبعض يتجول إلى حوض البحر الأبيض المتوسط .

في مصر : ينذر أن ترى شتاء بل لم ترى للآن فيها ويذكر شل أنه رآها في يناير وفبراير ولا معول على كلامه لعدم رؤيتها للآن

مميزاتها : جسمها قريب من حجم جسم غراب الماء غطاسة ماهرة ، حمراء الزور في الذكر صيفا - توجد شتاء في البحار ، الأجزاء العليا رقطاء شتاء ، الأجزاء السفلى بيضاء .

غماسة سوداء الزور

Black- Throated Diver = Loon.

(Colymbus arcticus.)

الوصف : طولها من ٢٣ : ٢٧ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (٣)
الموطن : مقبلة ومهاجرة ومتجولة في نفس مواطن السابقة ماعدا أيسلندا
في مصر : لم يعثر عليها فيها وقد ذكر البعض أنه رآها ولا معول على ذلك .
مميزاتها : الزور في الذكر أسود صيفا ، ظهر الرقبة رمادي - أكبر قليلا من السابقة

(١) يسميه الأمريكيان Red — throated loon

(٢) تقطن الاصقاع الشمالية القطبية من الدنيا كما تدل عليها التسمية اللاتينية arcticus ويسميه الأمريكيان Arctic loon or Pacific loon

رتبة الحماميات (كولومبيفورميس)

Order (Columbiformes.)

(Sandgrouses & True Pigeons - Doves.)

Pigeon Family

تحتوى هذه الرتبة على القطا بكافة أنواعه ، وكذلك على الحمام بمختلف أشكاله (ومنه الدودو) وأيضا القمرى واليمام والموجود منها حاليا هو ٢٨٥ واحدة وطيور هذه الرتبة صغيرة الرؤس قصيرة الأعناق ، متوسط الأجسام والأحجام ، ضعيفة المناقير لينة عند القاعدة قرنية (أى صلبة) عند الطرف المقوس قليلا ، وعرضها أقل من ارتفاعها . فتحات الأنف متسعة مكسوة بششاء منتفخ ، قصيرة الأقدام ، ذات أربعة أصابع ، والرسغ أطول من الأصبع الوسطى ، والأصابع الأمامية إما منفصلة أو متصلة جزئيا كالقطا - بأغشية قصيرة ، والمخالب قوية قصيرة ومقوسة قليلا ، وتوجد على الرسغ من أمامه صفائح ترسية ومن الخلف بأخرى شبكية . القوائم ١١ قادمة ، والذيل مكون من ١٢ إلى ٢٠ ريشة ، وهو غالبا قصير مستدير قليلا ، والريش قوى صلب مختلف الألوان . طيور سريعة الطيران ، تحسن السير على الأرض ، كما أنها أحيانا تسبح وتغوص إن استدعى الأمر ذلك - وهى وديعة حسنة الهضم رشيقة القوام حتى جعلها الإنسان رمزا للسلام ومضرب المثل في حسن المظهر . تغشى مناطق المحاصيل الغلالية كالقمح والشعير والفول والحبلة والحمص - وهى من أهم طيور الصيد التى يتعقبها الصيادون في مواسمها بالصيد ، ومنها المهاجر والمقيم والمتجول ، وقد يتغذى البعض أيضا على الخضروات والحشرات الصغيرة ولكن الغذاء الرئيسى هو الحبوب والحبوب والذرة والشمار والغلال . وهى طيور شجرية مولعة بالأشجار وبعضها يأوى إلى الصحراء . أعشاشها تتخذ على الأشجار أو في شقوق الجدران أو على الأرض (أفحوص) كالقطا ، والبيض اثنان عادة بل دائما . والصغار من ملازمات العش .

الفصيلة الحمامية ^(١)

Family (Columbidae.) « كولومبيداى »

pigeon Family.

طيور هذه الفصيلة عالمية التوزيع أى تغشى كل أنحاء الكرة الأرضية ماعدا مناطق القطبين الشمالى والجنوبى ، والسواد الأعظم منها يقطن المناطق الاستوائية من أمريكا والإقليم الهندى الأسترالى . تتغذى أولادها بطعام مهضوم في حوصلة الآباء أشبه بلبن لزج تقذفه الآباء في جوف الأبناء عن طريق الفم . وكان يدخل طائر قديم اسمه (الدودو Dodo) في هذه الفصيلة ولكنه انقرض من عهد قريب . . كان موطنه جزيرة موريتيوس (جزيرة في المحيط الهندى قرب مدغشقر (شرقها) الباقى من المميزات والصفات مثل الرتبة ، غير أنها طيور شجرية فنية بحتة .

(١) تحتوى هذه الفصيلة على ٤٨ جنسا تشمل ٢٩٨ نوعا معروفا ، موجود منها حاليا ٢٨٥ ولا يعرف متى استخدم الحمام كوسيلة للمراسلات في الحرب ، ولكن من المعروف أن يوليوس قيصر استخدمه لإرسال أخبار انتصاراته واستمر في أداء دور الحمام كحامل للرسائل حتى الحرب العالمية الثانية عندما حلت محله كليات الاتصالات في الخدمات العامة .

جنس الحمام الأصلي (كولومبا) Genus (Columba)

يوجد من هذا الجنس في العالم حوالي ٦٠ شكلا منه . اثنان منه في مصر . وهو عبارة عن جنس الحمام الكبير الأصلي ذو الأجنحة المثلثة الشكل . الذيل مكوّن من ١٢ ريشة ، وانشاق أقصر من أصبع القدم الوسطى بمخيلها .

الحمام البرى الأوروبي Stock Dove (European Form.) (Columba oenas oenas.)

الوصف : الطول حوالي ١٣ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (٩)
الموطن : من الأوايد والبيض من القواطع وبعضه متجول . يقيم طول السنة في كل أوروبا وخاصة قلبها ووسطها ، كذلك في شمال غرب إفريقيا وفي فلسطين وآسيا الصغرى والتركستان - حيث تتوالد صيفا في هذا الموطن يهاجر البعض منها شتاء إلى الجنوب في شمال إفريقيا .
في مصر : تشاهد شتاء فيها في بعض الأعوام ، وليس كل عام بانتظام ، وهي تمر في أسراب كبيرة من أكتوبر إلى فبراير وذلك على الدلتا والفيوم والجيزة وقنال السويس . ويسميه بعض الصيادين في مصر خطأ باسم حمام (راميه) (Pigeon Ramier) وهو تسمية خطأ بالطبع ، لأن هذا الحمام الأخير اسمه بالإنجليزية . Wood Pigeon or ring-dove وطوله ١٦ بوصة أى أكبر من هذا وتندر الرؤية في مصر شتاء .

مميزاته : أهم ما يميزه هو وجود خطين عرضيين رفيعين في كل جناح في الخواقي ، والردف رمادى اللون . وهو في سيناء ومصر لا يقف ولا يستريح على المبانى كما يفعل الحمام الصخرى . طعامه الحبوب والبنودر شهى الأكل للذئذ اللحم طيب المذاق . يشاهد شتاء في صعيد مصر طائرا فوق المحاصيل الزراعية من الفيوم إلى أسوان ، وخاصة في أسبوط . صوته كنواح القمرى . قد يشاهد على سفوح التلال الرملية بالقرب من الأهرام ويسمى في أوروبا حمام الرمال sand-pigeon ليس بالصدر لمعان .

الحمام المطوق الأوروبي (حمام الغابات) Ring or Wood Dove (European Form.) (Columba palumbus.)

الوصف : الطول حوالي ١٦ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (١٠)
الموطن : من الأوايد والقواطع وتارة متجول : مقيم طول السنة في كل أوروبا ما عدا شمال اسكندناوة وماعدا أيسلندا ، ويهاجر شتاء من المناطق الباردة فيها إلى وسطها وجنوبها ولكنه لا يتعدى جزر البحر الأبيض المتوسط . والبعض مقيم طول السنة في قبرص وصقلية وسردينيا حيث يتوالد فيها .
في مصر : يذكر البعض أنهم رأوه مصادفة في مصر غير أن ذلك يحتاج إلى إثبات حيث لم يعثر على واحدة منه للآن .

مميزاته : هذا هو المسمى بالفرنسى حمام (راميه) (Pigeon Ramier) وأهم ما يميزه كبر جسمه والقوس الأبيض في كلا الجناحين وكذلك البقعة البيضاء في جوانب الرقبة التي تعطيه اسم الحمامة المطوقة ، كذلك الخط العرضى المائل للبياض قبل الخط العرضى الأسود في طرف الذيل .

الحمام الجبلى (شكل شرق البحر الأبيض المتوسط) (١)

Rock Pigeon (Eastern Mediterranean Form.)

(Columba livia gaddi.)

الوصف : الطول حوالى ١٤ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (٥)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في جنوب غرب فارس وفي العراق وسوريا وفلسطين ماعدا أقصى جنوبها ومنخفض البحر الميت كذلك تتوالد في كريد والأناضول وسيرنيكا .
في مصر : يقيم فيها طول السنة حول السلوم ومرسى مطروح حيث تتوالد فيها .
مميزاته : يغشى الصخور الشاهقة الارتفاع المطلة على البحر ، وكذلك الكهوف والآثار والمباني الخربية . سريع الطيران للغاية ، الردف أبيض تقريبا ، يوجد خطان أسودان على كل خافضة من الجناح . غطاء أعلى الذيل رمادى معتم عن الردف . الذيل رمادى به خط عرضى أسود قبل نهايته .
أغطية الجناح رمادية شاحبة . أغطية القوائم والخوافى الداخلية بها خطوط قبل الأطراف سوداء .
الأجزاء السفلى رمادية مائلة للزرقة وهى أغمق من الظهر ولكن لا تصل في عمتها كالرأس . باطن الجناح أبيض رائق .

توالده : تضع الأنثى بيضتين لونهما أبيض ، توضع من مارس إلى أغسطس في مرسى مطروح وربما كان في غير هذا الميعاد أيضا . والعش يتخذ على حافة صخرة أو في كهف مطل أو داخل الأراضى الزراعية .

الحمام الجبلى المصرى

Rock Pigeon (Egyptian Form.)

(Columba livia schimperi.)

الوصف : الطول حوالى ١٢ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (٦)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في الدلتا المصرية وأعلى النيل لغاية أسوان ووادى حلفا وكذلك الفيوم ، وقد اختلط بالحمام المنزلى في مصر وتتناسل معه واندمج فيه .
مميزاته : لونه كالسابق ولكنه أصغر منه جسما ، وظهره أغمق قليلا منه وأجزاءه السفلى فاتحة عنه . موطنه كالسابق يظهر في طيرانه عجزة الأبيض أو مائلا للبياض ، ونظرا لاختلاطه بالناس فقد أصبح أليفا للغاية واندمج مع الحمام المنزلى وعمل له الفلاحون الأجران لتكاثره في الأبراج الصناعية .
توالده : كالسابق تماما في كل شىء وقد تبيض الأنثى مرتين أو ثلاث مرات في العام .

الحمام الجبلى العربى

Rock Pigeon (Arabian Form.)

(Columba livia palaestinae.)

الوصف : الطول حوالى ١٣ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (٧)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في منخفض البحر الميت وبكثرة في سينا وبلاد العرب جنوبا إلى مسكات وعدن . كثير في سينا .
في مصر : شائع بكثرة في سينا .

(١) اسمها كذلك Feral pigeon

مميزاته : الأجزاء العليا والسفلى أعمق من السابق ولكن ليس معتما كثيرا مثل حمام شرق البحر الأبيض المتوسط الجبل في أجزائه السفلى . أسفل الظهر رمادى مثل الوشاح ويندر أن يكون شاحبا . وهو أكبر من المصرى قليلا . الباقي كالمصرى وكذلك توالده . يرى بكثرة في مسجد بيت الله الحرام بمكة ويسمى هناك باسم (حمام الحمى) أى المحمى من أذى الناس لأن الناس هناك لا يمسونه بل يرمون له الطعام أيضا وكذلك في الحرم النبوى (مسجد الرسول بالمدينة المنورة) .

حمام الواحات الداخلة الجبل
Rock Pigeon (Dakhla Form.)
(Columba livia dakhlae.)

الوصف : الطول حوالى ١٢,٥ بوصة . انظر اللوحة (٥٤) شكل (٨)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في الواحات الداخلة والخارجة من مصر فقط .

المميزات : أكثر الحمام الجبل شحوبا من صدره إلى فتحة الشرج فاللون كمثرى رمادى شاحب جدا ، معظمه أبيض . الكتف والوشاح رمادى كمثرى شاحب ، أسفل الظهر أبيض رائق . أشحب بكثير عن المصرى وهو في الحقل تظهر الأجزاء العليا والسفلى كأنها أبيض كالثلج . يشاهد على أشجار الواحات وهو يقف عليها .

التوالد : العش في نتوء وفجوات في صخور المرتفعات . تبيض الأنثى مرة واحدة في السنة فقط .

جنس القمري (استربتوبيليا)
Genus (Streptopelia.)

يحتوى هذا الجنس على القمري واليمام . وهو أصغر من الحمام ، ولكن الذيل فيه أطول نسبيا لجسمه عن الحمام ، والأجنحة أيضا أقصر نسبيا من جناح الحمام . الساق عارية كلية من الريش .

القمري الأوروبي
Turtle Dove (European Form.)
(Streptopelia turtur turtur.)

الوصف : الطول حوالى ١١ بوصة . انظر اللوحة (٥٥) شكل (١) ، (٢)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا أقصى شمالها (اسكندناوة والدنمارك وأيسلند) وبعضه يتوالد في السويد وعند خط عرض ٦٠° شمالا في روسيا . يتوالد كذلك في سوريا وآسيا الصغرى وماديرة وقناريا . يقضى الشتاء في السودان والصحراء الكبرى ولا يبعد جنوبا أكثر من خط الاستواء .

في مصر : يأتي لها بكثرة في أسراب متفاوتة من اثنين إلى ٥٠ أحيانا ، فيمر عليها في الخريف من آخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر ، كذلك في الربيع وخاصة في الأسبوع الأول من مايو . فيشاهد في الدلتا والفيوم وسينا ومصر العليا .

مميزاته : أشهر طيور الصيد في مصر بعد البط والسمان والبكاشينة . توجد على خلف الرقبة الجانبى أطواق سوداء . سريع الطيران . يغشى المناطق الشجرية . طعامه الحبوب . يرى بكثرة في سبتمبر في سواحل رشيد ودمياط وبور سعيد والإسكندرية عند تجار الطيور – وهو حتى داخل الأقفاس . يمتاز عن الحمام ببطنه الأشد بياضا وأجنحته المدببة والأطول قليلا ، كانه حمامة جبلية يشاهد في الربيع في أجران القمح ووسط أراضي القمح ويأوى عند المساء إلى الحدائق القريبة من القمح وذلك في الوجه القبلى خاصة أثناء عودته من الجنوب .

القمرى الشرقى
Turtle Dove (Eastern Form.)
(Streptopelia turtur arenicola.)

الوصف : الطول حوالى ١٢,٥ بوصة . انظر اللوحة (٥٥) شكل (٣) ، (٧)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في فارس ووسط آسيا وفي مراعى سهول الخرزج في جنوب روسيا وفي شمال غرب إفريقيا من طرابلس إلى مراكش ، وفي بعض واحات الصحراء الإفريقية الغربية .

في مصر : يشاهد في الربيع من ١٢ إبريل إلى ٢٣ مايو ، كذلك في الخريف ولكن أقل من الربيع ، فيرى في أكتوبر ، ويشاهد في الدلتا ومنطقة قناة السويس والفيوم ووادي النطرون .

مميزاته : يصعب تمييزه في الحقل عن الأوروى ، كثير في الوجه القبلى في الربيع في الحدائق وحقول القمح وهو المسمى (قمرى الترجيعه) ، وهو قريب الشبه جدا من الأوروى ولكن القنة أفتح قليلا في لونها الرمادى ، كما أن الردف شاحب اللون ، والكتف وأغطية الجناح شاحب أصفر برتقالى . الباقي كالأوروى .

القمرى الصيفى
Isabelline Turtle Dove.
(Streptopelia turtur isabellina.)

الوصف : الطول حوالى ١٣,٥ بوصة . انظر لوحة (٥٥) شكل (٨)
الموطن : من القواطع يتوالد صيفا في مصر في الواحات الداخلة والخارجة والفيوم وبعض مناطق الدلتا ، وهو يكثر في الفترة بين فبراير وسبتمبر ، ويهاجر شتاء صوب الجنوب ، والمرجح أنه يشتد في السودان يغادر موطن توالده حوالى منتصف سبتمبر ، ويصل إلى الفيوم والدلتا حوالى آخر مارس ولكن بقلّة جدا ، ويحتمل أنه يتوالد في مصر العليا لأنه شوهد فيها في مارس وإبريل عند الأقصر والعياط وقنا وأسوان .

مميزاته : يغشى حدائق المشمش والبرتقال بكثرة في الواحات الداخلة كما شوهد في مارس وهو ينوح باستمرار فيها . له بقع سوداء وبيضاء على جوانب الرقبة من الخلف كالأوروى . الأجزاء العليا باهتة مصفرة .

توالده : العش من رفيع الأعشاب . البيض ٢ لونهما أبيض توضع في آخر مارس في الواحات
الداخلة في أشجار البرتقال والمشمش ويندر أن تكون في النخيل . الحضانة بالإثنين . (١) بعده
القمرى المطوق في صفحة ٥٣٧

يمام عربى قرنفل الرأس
Pink-headed Dove (Arabian Form.)
(Streptopelia roseogrisea arabica.)




الوصف : الطول حوالى ١٠,٥ بوصة . انظر اللوحة (٥٥) شكل (٤)
الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في جنوب غرب بلاد العرب من عدن إلى
جدة ، كذلك على ساحل أرتيريا الإيطالية .
في مصر : يقيم طول السنة في جبل علية .
المميزات : مغرم بالأشجار . يميزه الطوق الأسود الكامل خلف الرقبة ، والأجزاء السفلى
شاحبة . الصوت (كو) مد . الرأس قرنفل اللون . غطاء أسفل الذيل رمادى .
التوالد : العش في الأشجار والنخيل . البيض ٢ لونهما أبيض .

اليمام المصرى (٢)
Palm Dove=Laughing Dove= Senegal
Dove. (Egyptian Form.)
(Streptopelia senegalensis oegyptiaca.)

الوصف : الطول حوالى ١٠ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٥٥) شكل (٥) ، ص ٥٣٦
الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في كل القطر المصرى من شمال الدلتا إلى
وادي حلفا حيث يختلط بها مع اليمام السودانى (بين اسوان ووادي حلفا) . لا يوجد في غرب
الإسكندرية ولا في وادي النطرون ولكن يوجد في الفيوم . (٣)

مميزاته : أمام العين في كل مكان في القرى والمدن ، على الأشجار ، وفوق سطوح المنازل وعلى
الأرض ، وهو أشهر من نار على علم . لونه العام بنى شكولاتى . قد يقف على أسلاك البرق . صوته
كالضحك ولذلك تسمى كذلك اليمامة الضاحكة . الطعام الحبوب والبذور . تطير أحيانا من أى مكان
رأسيا إلى السماء ثم تعمل دائرة استكشاف ثم تهبط ثانية على ما تريد .
التوالد : العش في الأشجار وأحيانا في فجوات المنازل في القرى (في جدران المباني والمدن
أحيانا) . يتخذ من الأعشاب ، البيض أبيض عدده ٢ . قصير الجناح .

(١) بعده القمرى المطوق فيما بعد في صفحة ٥٣٧
(٢) الأنثى أغمت قليلا من الذكر وأقل في حمرة الصدر وكذلك في نقط الصدر السوداء
(٣) وقد استقر الآن في استراليا بعد أن أدخل فيها .






Black-bellied Sandgrouse
= Imperial Sandgrouse.




Crowned Sandgrouse.


فلسطينية من سينا



Large Pin-tailed Sandgrouse (Eastern Form.)




Spotted
Sandgrouse



Singed Sandgrouse.

ص ٣٠١



Close-barred Sandgrouse.
= Lichtenstein's

اليمام السودانى
Palm Dove (Northern Sudan Form.)
(Streptopelia senegalensis sudanensis.)

الوصف : الطول حوالى ٩ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٥٥) شكل (٦)
الموطن : من الأوابد : تقيم طول السنة حيث تتوالد من وادى حلفا إلى الخرطوم وبحيرة نو .
وصيدت من أبى سنبل .
مميزاتها : كالمصرية ولكنها أشحب منها بكثير . الصدر قرنفل خرى شاحب يميل للزرقة عن
المصرى . أغطية الجناح الصغيرة أشحب لونا فى اصفرارها ، والأغطية الكبرى أفتح لونا فى زرقتها .
الأجزاء السفلى أقل فى لونها الحمري على صدرها .
التوالد : كالمصرية . وشوهدت الأنثى على بيضها راقدة فى وادى حلفا فى آخر فبراير .

يمامة الواحات الداخلة (Palm Dove (Dakhia Form.)
(Streptopelia senegalensis dakhiae.)

الوصف : الطول حوالى ١٠ بوصة . انظر اللوحة (٥٥) شكل (٩)
الموطن : من الأوابد : تقيم طول السنة فى الواحات الداخلة فقط وربما تجول بعض منها إلى
الخارجة .
مميزاتها : أجزاؤها العليا أفتح من المصرية ، والأجنحة يكسوها لون احمر رملى . الأجزاء السفلى
فاتحة وليست خمرية شديدة على الصدر كالمصرية . وتمتاز عن السودانية بازدياد الحمرة الرملية فى أجزائها
العليا ، كما أن السفلى أعمق قليلا مع لون خمرى أقل ، ورملى فاتح أكثر . الطبايع كالمصرية . ترى فى
الداخلة فى طرقاتها المترية، وحدائقها وهى أليفة جدا هناك لعدم إيذاء أى أحد لها هناك .
التوالد : العش برأس نخلة قصيرة أو شجيرة منخفضة . البيض ٢ لونها أبيض وقد يتخذ العش
فى دغلة أو أعشاب كثيفة .

جنس يمامة الكاب (أوينيا) Genus (Oena)

يستوطن هذا الجنس أواسط إفريقية وجنوبها وجزيرة مدغشقر وبلاد العرب حيث توجد بقرب
مدينة جدة وعدن . وتتميز بطول ذيلها المسحوب . ريشته الوسطى ضعف طول باقى الذيل .

يمامة الكاب (يمامة نماكوا) Namaqua Dove. (١)
(Oena capensis.)

الوصف : الطول حوالى ١٠ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٧٢) شكل (٧)
الموطن : ذكر سابقا فى جنسها .
فى مصر : صيدت مصادفة من جبل نعلبة .

(١) اسمها كذلك Masked Dove وأيضاً Long tailed dove وأيضاً Cape dove

الرتبة القطاوية (تُرْكُلَيْس)
Order (Pterocletes.)=sandgrouses.

الموجود منها حاليا هو ١٦ نوعا

تحتوى كل هذه الرتبة على جميع أنواع القطا بمختلف أشكاله وأحجامه وألوانه متوسطة الأجسام ، صغيرة الرؤوس ، تغشى السهول والصحارى ومناطق المراعى (الاستبس) وتجم دائما على سطح الأرض وتلتصق بها ، كما أنها تطير إلى مسافات بعيدة طلبا للطعام والماء . البيض ٢ ، مستطيل ، ومن ناحية الطرف مستدير . يكسو الزغب الأولاد . اقرب شيها إلى الحمام من غيره . سريع الطيران للغابة . أصابع القدم واسعة ومنفرجة وقصيرة ، وتغطى الحراشيف بعض الأرجل في بعض الأنواع . الريش كثيف ، والجلد متين . الشفان مختلفان في اللون . تغشى المواطن الصحراوية التي تماثلها في لونها فتكون كحماية طبيعية لها من العيون ، وكذلك في المواطن الصخرية .

وهي على نوعين ، واحد منه في مصر .

يتردد ذكرها كثيرا في كتب العرب أكثر من غيرها ، ويستخدمونها في أشعارهم ، حيث هي كانت - ولا زالت - معهم بجوار الحيام ، يرونها في قطع البيد والقفار . فلا غرابة إذ ذكروها في أشعارهم مثل قول مجنون ليل (قيس بن الملوح)

أسراب القطاهل من معير جناحه لعل إلى من قد هويت أطيـر

الفصيلة القطاوية
تُرْكُلَيْدِيْدَايْ
Family (Pteroclididae)
Sandgrouse Family

المعروف من هذه الفصيلة هو ١٩ نوعا ولكن الموجود منها حاليا هو ١٦ فقط ^(١) . تفتن كل الدنيا حتى جزائر المحيطات - ما عدا سيبيريا وشمال كندا - أما القطا الأصل وهو Sand grouse فهو يقطن الدنيا القديمة وخاصة إفريقية حيث الصحارى التي هي مأواها الرئيسى كذلك في صحارى آسيا وأوروبا . كما أنه لا يقطن مناطق الغابات لأنه يجب الأرض المكشوفة .

وهي مجموعة صغيرة أقرب الشبه من القطا الأصل عن الحمام . طويلة الأجنحة مديبتها ، وأرجلها قصيرة للنهية ذات لبادة شعرية أو ريشية على الساق . الثلاث أصابع الأولى يلتصم بعضها ببعض . سريعة الطيران . اجتماعية تعيش في أسراب في الاستبس (المراعى العشبية) والصحارى من إفريقية وجنوب أوروبا وجنوب آسيا . طعامها كلية على الحبوب والبذور . إذا عبت (شربت) غمرت كل منافرها في الماء كما يفعل الحمام ، تماما بتمام . مليئة الأجسام ، متوسطة الأعناق في الطول ، صغيرة الرأس ، قصيرة المنقار ومنحن قليلا من طرفه العلوى . فتحتا المنخر منفصلتان بحاجز وهما قرب قاعدة المنقار تكاد تحفيهما ريشات الجبهة بغشاء رقيق إلى النصف . الرسخ قصير . الأصابع قصيرة

(١) مشتقة من جنسين 2 Genus.

والأمامية مكففة حتى المفصل الأول وأحيانا تكون ملتصقة ببعضها والخلفية عالية عن مستوى الأمامية وهي كليلية الطرف وأحيانا لا توجد . المخالب قصيرة مقوسة قليلا وعريضة وكليلية . الذنب مستدير مخروطي غالبا من ١٤ : ١٨ ريشه ، ريشته من الوسط غالبا طويلتان بارزتان ممتدتان وراء الذيل . تتباين ألوانها بحسب البيئة التي تأوى إليها ولذا يغلب عليها اللون الرملي والصحراوي وهذا يجعل لها حماية طبيعية عن رؤية العيون . البيض من ٢ : ٣ بيضات في كل مرة . الصغار من مباحرات العش . الشقان مختلفان . تشبه الحمام إلى حد بعيد كما أطلق عليها (حمام البراري) في فترات التزاوج ، يجتمع كل ذكر مع أنثاه ، والبيض يوضع في حفرة اسمها (الحوض) وقد تبيض الأنثى مرتين في العام . وهي طيور أبدا لا تخرج مكانها في ثلاث قارات ، ومنها ما يرحل في بعض الأوقات إلى بلاد لم يشاهد فيها من قبل .

جنس القطا (تيركليس) Genus (Pterocles)

هو على ثلاثة أشكال تقطن كلها بأنواعها المختلفة إفريقية وآسيا وجنوب أوروبا تحتوي القدم على ٤ أصابع ملتصقة تقريبا ومتصلة بغشاء صغير عند قواعدها . الأصبع الخلفي للقدم صغير جدا شبه منعدم . بالساق ريش من الأمام إلى قاعدة الأصابع ولكنه عار من الريش من خلفه . ريشنا وسط الذيل طويلتان تمتدان خلف الذيل ، والذيل مكون من ١٤ : ١٦ ريشة ولونه بلون الأرض التي يجثم عليها ، والقوام ١١ ريشه وأطولها الأولى والثانية والجناح طويل ومدبب . يوجد من جنسه حوالي ٢٠ نوعا ، وفي مصر منه ٦ أنواع

ملك القطا = قطاة سوداء البطن Imperial Sandgrouse = Black - bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis)

الوصف : الطول حوالي ١٤ بوصة . انظر لوحة (٥٦) شكل (١)
الموطن : من الأوايد ، ومتجولة أحيانا : تقيم طول السنة في جنوب أوروبا (أسبانيا والبرتغال وجنوب روسيا) - كذلك في شمال غرب إفريقية وجزائر قناريا وقبرص وآسيا الصغرى وسوريا وفارس وكذلك في وسط آسيا . حيث يتوالد في كل ما ذكر صيفا . وهي نادرة التجول .

في مصر : ينذر أن تتجول شتاء كل عام إلى شمال سيناء حيث ظهر البعض منها وهو يحب الماء عند القوسيا في مارس . ولم يسجل من غرب قنال السويس .

مميزاته : أكبر القطا المصري ، يميزها البطن الأسود مع أسفل الصدر الأسفل . ريش وسط الذيل ولكنه ليس مسننا ومسحوبا يصعب الاقتراب منها فهي حذرة للغاية . تشرب الماء صباحا ومساء عند الظلام قبيل الشروق وبعد الغروب بقليل . لحمها شهى ولكنه ليس طريا .

قطاة كبيرة مسننة الذيل (الشكل الشرقى)
(Large Pin - tailed Sandgrouse (Eastern Form)
(Pterocles alchata caudatus)

الوصف : الطول حوالى ١٢ ¼ بوصة . انظر اللوحة (٥٦) شكل (٣)
الموطن : البعض من الأوباد والبعض متجول . تقيم طول السنة في شمال غرب أفريقية شرقا إلى
سيرينكا ، وفي آسيا الصغرى وسوريا والعراق وفارس ووسط آسيا . تظهر شتاء في أسراب عظيمة في
العراق وشمال غرب الهند .

في مصر : نادرة الوجود في سيناء حيث حصل على واحدة قرب رفح في نوفمبر سنة ١٩١٧ كذلك
عند الشلال وقرب غزة ، والطور في إبريل ومن سيناء في يناير ومارس وإبريل .
مميزاتها : تمتاز بذيلها الطويل جدا المسنن ، وبطنها الأبيض ، أغطية الجناح في الذكر بيضاء .
ذات خطوط بنية وبيضاء وسوداء عرضية على الجناح في الأنثى الصوت مثل صلصلة الناقوس هكذا
تقريبا (catar) الذى يسمع قبل أن تطير مباشرة أو بزمان طويل . ترد الماء في الغسق والفلس في العراق
حيث هي أكثر القطا شيوعا هناك .

القطا الرقطاء
Spotted Sandgrouse
(Pterocles senegallus)

الوصف : الطول حوالى ١٤ بوصة . انظر لوحة (٥٦) شكل (٤)
الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة وتتوالد في شمال إفريقية من الجزائر حتى الصحراء
المصرية ، وتنتشر جنوبا حتى الخرطوم ، كما تستوطن المناطق الصحراوية من فلسطين وشرق الأردن
وسوريا وبلاد العرب والعراق وبلاد الصومال ومنها تمتد مواطنها شرقا حتى شمال غرب الهند .
في مصر : هي من طيورها الأوباد التي ترى في صحاريها وفي سيناء والواحات الداخلة والخارجة
والفيوم وطريق مصر - الإسكندرية - الصحراوى .
مميزاتها : الأنثى بها نقط سوداء وسميت الرقطاء نسبة إلى الأنثى . الذيل مدبب مسنن ، الزور
برتقالى ترى في أسراب صغيرة . تجبو على الأرض كالصبي نظرا لقصر رجليها . وقد أطلق العالم
(لينايوس linnaeus) عليها الاسم العلمى (سنغال) Senegal لواحده يدعى أنه أحضرها من هناك
ناحية تمبكتو . تشاهد على جانبى طريق القاهرة - الإسكندرية - الصحراوى ، وبالمثل طريق القاهرة -
السويس الصحراوى .

التوالد : البيض من ٢ : ٣ مبقعة مستطيلة توضع في حفرة في الرمل تسمى (الأنحوص) لون
البيض بلون القهوة المزوجة باللبن مع نقط دكناء ولأن لم يعثر على بيض لها داخل مصر

القطاة المغنية المصرية
Singed Sandgrouse (Egyptian Form)
(Pterocles senegalensis floweri)

الوصف : الطول حوالى ١٣ بوصة . انظر لوحة (٥٦) شكل (٦)
الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة وتتوالد في مصر إلا أنها قليلة الوجود في الصحراء المصرية ، وقد أمكن الحصول عليها من الفيوم وعلى جانبي وادى النيل من الأقصر إلى الواسطى . كما شوهدت في حافة شرق الدلتا .

المميزات : الذيل مسنن ، القوادم سوداء ، صغيرة الجسم ، معتمة البطن في الذكر والأنثى .
خط أسود يشق صدر الذكر والأنثى . أقل ولوعا بالصحراء البحتة من غيرها ، بل تقطن المواطن شبه الصحراوية ذات الأعشاب الصحراوية والأشواك . توجد في أسراب صغيرة . الصوت قطا . قطا .
ترد الماء صباحاً ومساءً .

التوالد : البيض من ٢ : ٣ توضع في أفحوص في الرمال قد يطن أحيانا بالأعشاب ، يوضع في إبريل ومايو والبيض بلون الرمال تقريبا بنى مع خطوط زيتونية .

القطاة المتوجة الفلسطينية
(^(١) Coronetted Sandgrouse (Palestine Form)
(Pterocles Coronatus vastitas)

الوصف : الطول حوالى ١٢ بوصة . انظر اللوحة (٥٦) شكل (٧) من سينا
الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في صحارى جنوب فلسطين ، وفي الإقليم رب منخفض البحر الميت وشمال شرق سينا قليل منها يغرب الماء بالقرب من القوسيا .
في مصر : تقيم طول السنة في شمال شرق سينا وجنوبها في وادى فيران ، وفي الطور . (كذلك في القوسيا .

مميزاتها : الذيل طويل قليلا وليس مسننا . الذقن والصُدغ أسود مع إكليل أزرق كل ذلك في الذكر . أما الأنثى فالزور يرتقى به بقع صغيرة مع صدر به خطوط عرضية متعرجة وكذلك في البطن .
قريب الشبه جدا وهي على الأرض من الحمامة . تردد الماء صباحاً فقط . الصوت (cla cla) طعامها الحبوب والبذور من نبات الصحراء .

التوالد : لم يعثر بعد على العش داخل الحدود المصرية ولو أنه مثل غيره .

(١) اسمها كذلك Crowned Sand grous

القطاة المتوجة الصحراوية

Coronated Sandgrouse (Saharan Form)

(Pterocles Coronatus coronatus)

الوصف : الطول حوالي ١٢ بوصة . انظر لوحة (٥٦) شكل (٢) صحراء مطروح
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة في شرق الصحراء الكبرى الإفريقية من جنوب الجزائر
إلى أير وتونس وطرابلس وسيرينكا وشمال السودان وغرب مصر .
في مصر : تقيم طول السنة في غرب مصر ، وشوهدت في مرسى مطروح ووادي النطرون والمرج
والكاب Kab وعند الشلال الثاني وعلى حافة شرق الدلتا (الكاب حى في شمال نيجيريا بالسفلى الأوسط
من نهر النيجر) .

توالدها وطبائمه كالفلسطينية ، ولونها كالفلسطينية ولكنها أفتح منها لونا بكثير ، وذلك في الذكر
وكذلك فإن أجزاءه السفلى متشابهة كالفلسطينية ، وأغطية الجناح فيه ليس فيه أية علامات مائلة
للسود .

أما الأنثى فإن الخطوط المعتمة العرضية في الظهر أقل وضوحا من الفلسطينية ، وأجزاءها السفلى
أشد صفرة .

القطاة النوبية الموشمة

Close - barred Sandgrouse (Nubian Form)

Pterocles Lichtensteini Lichtensteinu

الوصف : الطول حوالي ١٠ بوصة . انظر اللوحة (٥٦) شكل (٥)
الموطن : من الأوايد ومتجولة : تقيم طول السنة حيث تتوالد من السودان وتشق بلاد العرب إلى
بلوخستان والسند غربا إلى الهندوس .

في مصر : حلت فيها كمتجولة في أقصى شرق سيناء ، وكمقيمة طول السنة في منطقة جبل علية .
مميزاتها : الذيل مربع والخطوط متقاربة جدا في الريش . ترد الماء صباحاً ومساء . ليست من
طيور الصحراء البحتة فقد تفضل الأقاليم ذات الصخور أو نصف الصحراوية ذوات الأعشاب
والأشواك وصغار الشجيرات ويندر أن تغشى الصحارى الواسعة الجرداء كما يندر أن توجد في أسراب
وسهلة الوقوع في قبضة الصياد .

رتبة القطقاطيات

شرادر ينفورس (الطيور الخواضة والقطقاطيات)

Order (Charadriiformes) = Wading _ birds & Plovers

تحتوى هذه الرتبة الواسعة على كل الطيور الخواضة Waders من دريج وطلايط ودجاج ودمشق
وكورسار وجليل وقبر الماء وبقيقة وبكاشينة وكروان الغيط وحنكور وأبي جراب Sheathbill ويدخل
ضمنها أيضا الكروان الجليل ، وقد ضم بعضهم إلى هذه الرتبة الأكتع Anks والتورس بكافة أنواعه
(أنظر طيور الجزر البريطانية تأليف يتهرست ، تكار ، جوردان ، وذاريلى) ج ٤ ص ١٥١ ويدمج
بعض علماء الطيور (الجاكنا) في هذه الرتبة أيضا .

وهي طيور مهيأة للعيش عند البحار وسواحلها والبحيرات ، ومنها في الأراضي المكشوفة الواسعة كالصحارى ونحوها كالجبال ذات الثلجات .

وهي توجد في كل أنحاء العالم ، منها صغير الجسم ومنها المتوسط ، وهي كبيرة الرؤوس برعا ، قصيرة الرقاب ، مختلفة المناقير في طولها وتركيبها وهي (أى المناقير) لينة عند القاعدة صلبة عند الطرف . الساق متوسطة الطول أو ظاهرة في طولها الملموس وبها غلظ عند المفصل الرسغي ، وبالقدم عادة ثلاث أصابع مكففة أو بدون أغشية ، والجنح طويلة نسبياً مدببة ، وأطول القوائم الأولى عادة وأحياناً الثانية ، والأولى بطول الثالثة ويندر أن تقل عنها في طولها . الذنب مكون من ١٢ ريشة وهو قصير أو متوسط الطول مستدير تقريباً . كما أن الريش غزير أملس لا تتفاوت ألوانه كثيراً بتفاوت السن ولكنه يتغير لونه بتغير الفصول . وعدد فقرات العنق من ١٢ : ١٥ فقرة ، وفقرات الظهر ٩ فقرات غير ملتصقة ، وفقرات الذنب من ٧ إلى ٩ فقرات . واللسان رفيع حاد الحافات وله شبه أسنان في نهايته .

وهي طيور نشيطة دائمة الحركة ليلاً ونهاراً ، وتأخذ في وقت الظهيرة قسطاً لراحتها ، وبعض الطيور تنشط نهاراً أكثر من الليل ، وبعضها على العكس ينشط ليلاً ويستكين نهاراً كالكروان الجبلي . وهي سريعة العدو على الأرض وكذلك سريعة الطيران ولا تهبط إلى الماء إلا مرغمة ومتى اضطرت إلى ذلك فإنها تجيد عندئذ السباحة .

كما أنها تعيش أزواجاً في فترات التكاثر ، بينما تجتمع في أوقات الهجرة في أسراب ضخمة ولكن يحرص كل نوع على ألا يختلط إلا بجنسه فقط ، ولا يختلط نوعان معاً إلا إذا كانا قاصدين مكاناً واحداً . لها غدة زيتية تحت الريش .

تقتاد الحيوانات الرخوية البحرية والبرية وكذلك يأكل بعضها الحبوب . والعش عبارة عن فجوة في منخفض من الأرض أو وسط الأعشاب المائية أو غيرها في البر ، والبيض من ٣ : ٤ وهو أبيض اللون ماعداً في جنس *Dromas* ويشارك الزوجان في الحضانة وقد تبارح الأولاد العش أو تلازمه .

منها ما يؤكل لحمه ومنها ما تعافه النفس .

الفصيلة الطيطوية (شرادريدي)

Family (Charadriidae) = Plovers & Turnstones

Plover Family

يعرف من طيور هذه الفصيلة حوالي ٦٥ طائراً في العالم ، والموجود منها حالياً على قيد الحياة هو ٦٠ طائراً فقط (١) . وهي طيور عالمية الوجود ماعداً وسط جرينلاند ، وصحراء قلب استراليا ، والصحراء الكبرى الإفريقية . (تقطن الأقاليم الباردة والمعتدلة) على شواطئ البحار والأنهار والبحيرات والمستنقعات . تمتاز بمناقيرها المختلفة الأشكال والأطوال والأحجام . عدد فقرات العنق ١٥ فقرة ، وقد يكون المنقار طويلاً للغاية وتارة متوسطاً ، وأحياناً قصيراً وتارة منحنياً أو مستقيماً ، والمنخر مختلف ولكن مقره قرب قاعدة المنقار . البيض أبيض . طيورها كثيرة وكل نوع له عاداته وطبائعه الخاصة به . طعامها الكلى الحشرات والحيوانات البحرية الرخوة والديدان .

(١) مشتقة من ٩ أجناس

جنس الطيطوى
شرادريوس (Charadrius)

يقطن هذا الجنس كل بقاع الأرض . صغير الجسم أو متوسطه . المنقار غليظ قصير مستقيم ولين عند القاعدة . الجناح مدبب . أطول القوادم الأولى ، والخواقي الداخلية طويلة ولكنها لا تكون بطول ريش القوادم . متوسط الطول في الذنب المستدير تقريبا . الساق تقريبا طويل ، والقدم يحتوى على ثلاثة أصابع كلها أمامية ، وليس لها قدم خلفية ، ويغطى الريش الساق حتى الرسغ الذى هو أطول من الأصبع الوسط . يوجد منها في العالم حوالى ٣٥ جنساً أو نوعاً .

درجيّة سيبيريا المطوقة (١)
(Ringed Plovers (Siberian Form)
(Charadrius hiaticula tundrae)

الوصف : طولها حوالى ٧ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٥٧) شكل (١) و لوحة (٤٧) شكل (٧) .

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفاً في أقصى شمال أوراسيا (سيبيريا) وكل اسكندناوة وسواحل البحر البلطى وأيسلند وسواحل الجزر البريطانية ، وتهاجر شتاء إلى جنوب آسيا وكل إفريقيا وجنوب غرب أوروبا . وتتوالد صيفاً كذلك في جزيرة سردينيا وصقلية في حوض البحر الأبيض المتوسط .

في مصر : تهاجر إليها شتاء فتري فيها من سبتمبر إلى مارس ولكن لم تشاهد في جنوب الفيوم ، وقليل منها شوهد صيفاً فيها (أى مصر) ، ويحتمل تولدها . (انظر لوحة (٨) شكل (١)) .

مميزاتها وطياتها : حزمة سوداء تشق الصدر ، الأرجل صفراء أو صفراء برتقالية ، نصف المنقار الخارجى أسود والداخل برتقالى ، خط أبيض عريض يشق القوادم والخواقي يظهر بطولها وامتدادها عند مدّ الجناحين ، (٢) .

الدرجيّة المطوقة الصغيرة


Little Ringed Plover
Charadrius dubius curonicus

الوصف طولها حوالى ٦ بوصة . انظر لوحة (٥٧) شكل (٧) و لوحة (٤٧) شكل (٦) .

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفاً في كل أوروبا تقريباً ماعدا أقصى شمالها وأقصى شمال آسيا . تتوالد في سيبيريا واليابان والصين ، والتركستان والعراق ، لا تتوالد في أيسلند وشمال الجزر البريطانية ولا في النرويج . كما تتوالد أيضاً في شمال غرب إفريقيا ولا تتوغل في شمال أوروبا أكثر من خط عرض ٦٠° شمالاً . تهاجر شتاء إلى جنوب آسيا (الهند وسيلان والملايو) وكذلك في إفريقيا وقد تصل إلى خط الاستواء فيها .

(١) اسمها في أمريكا Semipalmated plover

(٢) منقار الذكر والأنثى صيفاً برتقالى وطرفه اسود ومنقار الناهض والأنثى شتاء قرنى وطرفه أغمق . والصغير مائل للسواد والقاعدة مائلة للصفرة . ويجرى بسرعة وهي على الأرض . وطيراتها في اتجاه واحد وصوتها هكذا Pip-pip أو pee-oo ويوجد في أمريكا شبيه بها اسمها Piling plover وأخذ اسمها من صوتها .



في مصر : تزورها شتاء وتكون فيها ، زيادة على أنها تقيم فيها طول السنة . (أنظر لوحة ٨ شكل (٢)) .

مميزاتها وعاداتها : صورة مصغرة من السابقة ولكن أرجلها حراء دموية أو لحمية ، وليس لها خط عرضي أبيض في ريش الطيران كالسابقة ، ولكن لها خط أبيض رفيع مائل يمتد من الجبهة إلى ما فوق العين ويعددها بقليل .

ويصعب التفرقة بينها وبين السابقة من بعيد والمقار كله أسود . بمجرد وقوفها على الأرض بعد الطيران لا تقف مباشرة بل تجرى قليلاً لمتراً تقريباً ثم تثبت وتبرز رأسها حركة علوية سفلية مع الصدر وحافة جفن العين يرتقالي طعامها الديدان والحشرات والرخويات والقشرية كالسابقة تماماً . تغشى الأراضي الطينية الرخوية والرمالية قرب الشواطئ .

أبو الرءوس الصغير^(١)
Kentish Plover (Small Form .)
(charadrius alexandrinus alexandrinus.)

الوصف : الطول حوالي ٦ ½ بوصة . انظر لوحة (٥٧) شكل (٣) .
الموطن : من الأوايد ، ومتجولة ، وأحياناً تهاجر أفراد منها شتاء جنوباً . تتوالد صيفاً في كل سواحل أوروبا الغربية والجنوبية وشمال إفريقيا كلها والبحر الأحمر إلى الصومال وكذلك في الهند وسيلان .
في مصر : شائعة الإقامة طول السنة في الدلتا المصرية والفيوم ووادي النطرون ومصر العليا وسواحل سيناء ، حيث تتوالد في كل ما ذكر .

مميزاتها وطبائعها : بقعة صغيرة سوداء على جانب الصدر بجوار الكتف^(٢) ، الأرجل سوداء . الثلاث ريشات من كل جانب في الذيل لونها أبيض . تغشى سواحل المستنقعات والمساحات الصغيرة ، وتارة تكون منفردة وهذا هو الأغلب . طعامها كالسابقة . وعادة تكون منفردة أو مثنى (أنظر لوحة (٨) شكل (٣)) .

توالدها : العش على الأرض فوق الطين الجاف أو الحصى : أو الرمال ، البيض من ٣ : ٤ ، عادة ثلاث بيضات ، في أفحوص (منخفض) من الأرض يطن بالقش الناعم ، والحضانة ٢٤ يوماً ويشارك الأثنان في إطعام الأولاد ، من الديدان واليرقات الخ .

(١) يسميه الأمريكيان Snowy Plover ويسمونها الأستراليون بهذا الاسم وهو Red-capped Dotterel

(٢) والخلود وذلك في الذكر أما الأنثى فإن البقع فيها بنية معتمة . المقار أسود الأرجل رمادية مسودة وتجري بسرعة وهي على الأرض الصوت wit - أو wec - it

أبو الرءوس الكبير
Kentish Plover (Large Form.)
(Charadrius alexandrinus cantianus .)

الوصف : الطول حوالى ٧ بوصة . انظر اللوحة (٥٧) شكل (٤) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في سواحل الجزر البريطانية وسواحل غرب أوروبا وشمال غرب إفريقيا وشرقا إلى شرق آسيا .
في مصر : تهاجر شتاء لمصر حيث فحصت من الدلتا والفيوم ومن سيناء .
طبائعها ومميزاتها : كالسابقة في كل شيء غير أنها أكبر منها فقط .

دُرِّيَّة كِلْتَر المصرية
Kittlitz's Plover (Egyptian Plover.)
Charadrius pecuarius allenbyi.

الوصف : الطول حوالى ٦ بوصة . انظر لوحة (٥٧) شكل (٥)
الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في مصر في الدلتا والفيوم ووادي النطرون ومصر العليا إلى الأقصر تقريبا . لا توجد في سيناء ومنطقة قناة السويس أو في غرب الإسكندرية .
مميزاتها وعاداتها : أصغر الدريج المصرى المطوق ، تغش المياه العذبة وتكون عادة مثنى على المساحات الطينية أو ضفاف الأنهار والبرك المائية والقنوات . الصدر أحمر كالصدأ . حروف ريش الأجزاء العليا ليست واضحة تماما . الباقي كثيفها .
توالدها : كالسابقة وهى أبو الرءوس الصغير غير أن العش بلون تبطين . البيض ٢ بيضاء باهتة مصفرة مع نقط ويقع بلون الرمال ، وقبل مغادرة البيض تغطى الأنثى البيض بالرمال حماية له من أشعة الشمس ولا يراه العدو من طائر آخر أو ثعلب الخ . ويعمل الذكر أيضا نفس العمل .

درِّيَّة الرمال الكبيرة (١)
Large Sand-plover = Geoffroy's Plover
(charadrius leschenaulti .)

الوصف : طولها حوالى ٨ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٦٦) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في اليابان وفورموزا وهينان Hainan . ويعرف كذلك بتوالدها في منغوليا وحول بحر آرال . تقضى الشتاء من شرق إفريقيا خلال جنوب آسيا إلى استراليا ، وشمال إفريقيا ووسطها إلى الجنوب حتى الكاب .
في مصر : شائعة الوجود على سواحلها وسواحل سيناء شتاء ، وقليل منها يقضى الصيف بها ولا يغادرها .

مميزاتها وعاداتها : كبيرة الحجم ، تشاهد في أسراب صغيرة على شواطئ البحار ، ينذر أن تغشى المياه الداخلية . ليس لها حزمة صدرية سوداء ، الصدر بنى صيفا والسهم أبيض في ريش الذيل

(١) اسمها كذلك greater sand-plover

الخارجي . المقار أسود له بقعة سوداء في طرفه وحول العين ، وليس لها طوق أبيض على الرقبة .
الصوت موسيقى هكذا تقريبا (بيب) = Peep .
توالدها : لم يعثر لها على بيض داخل مصر . ويحتمل أن تكون كغيرها من زميلاتها .

الدُمَشَق (الدُّبُرْل)

Dotterel

(Charadrius morinellus)

Plover Family

الوصف : الطول حوالي : ٨ ¼ بوصة في الذكر ، وحوالي ٩ بوصة في الأنثى . انظر لوحة (٥٧) شكل (٦) .

الموطن : تتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا (النرويج وشمال اسكتلندا) فهي من القواطع .
كذلك تتوالد في مناطق التندرا الأوروبية والآسيوية وتشتوي فلسطين وسوريا ومصر وبلاد العرب وشمال
إفريقية وغرب آسيا ووسط أوروبا شمال البلقان واليونان وجنوب إيطاليا وصقلية ، وسردينيا ،
والتركيستان وفارس . وظهرت صدفة في اليابان والسكا وتحولت إلى جزائر قناريا .

في مصر : تشاهد بها شتاء في الأقاليم نصف الصحراوية من شمال شرق سيناء وجنوب فلسطين ،
في أسراب صغيرة لا تتجاوز ٥٠ واحدة عادة ، وتشاهد من نوفمبر وتستقر ثم تغادر البلاد في آخر
مارس ، وهي شائعة عندئذ في غرب قنال السويس ، وشوهدت في الدلتا والفيوم وأقصى جنوب
مصر .

مميزاتها وطبائعها : تأكل القواقع الأرضية ، يختلف لونها شتاء كلية ، عن الصيف ، لها خط
أبيض رفيع يمتد من خلف الفك العلوي وينحني مارا بأعلى العين إلى قرب الفقا . الصدر أبيض شتاء
مائل للزرقة الخفيفة صيفا ، أطراف القوائم بيضاء تلاحظ في طيرانها ، البطن باهتة ترابية شتاء ، حمراء
رملية صيفا يفصل بينها وبين الصدر خط أبيض ، ولونها في الصيف كلونها في الربيع تقريبا ، ويصعب
تمييز ألوانها من بعيد وهي واقفة على الصخور . بطيئة الطيران ، وإذا أطلقت عليها الطيران هبطت
لأسفل مباشرة في طيرانها . تأوى المستنقعات . تأكل كذلك الحشرات والديدان واليرقات والحيوانات
البحرية الرخوة وهي تجرى على الأرض لمسافة قدم أو قدمين ثم تقف ثم تميل للأمام لالتقاط طعامها ،
وفي أثناء جريها غالبا ما ترفع أجنتها فوق ظهرها .

القطقاط الذهبي (الشمالي)

Golden Plover (Northern Form)

(Charadrius apricarius apricarius .)

الوصف : الطول حوالي ١١ بوصة . انظر لوحة (٥٧) شكل (٩)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا وآسيا (أيسلندا واسكتلندا شرقا
إلى شمال سيبيريا إلى ينسي وفنلندا والدنمارك والجزر البريطانية) . يقضى الشتاء في جنوب آسيا
والصومال وعدن وإقليم البحر الأبيض المتوسط .
في مصر : يزورها أحيانا شتاء وخاصة الدلتا وقنال السويس فقط من نوفمبر إلى أوائل مارس ولم
يحصل عليه من سيناء .

مميزاته وعاداته : كبير الجسم نسبياً في قرب حجم القطقاط البلدى أبو شوكة في جناحه Super-Winged Plover تقريباً أو أصغر قليلاً منه . يحتشد في أسراب كبيرة . صوته يسمع طول العام هكذا تقريباً (تُوى) سريع الطيران قويه للغاية في استقامة واحدة ومنخفض مثل القطقاط الشامى . يمكن للإنسان أن يقترب منه إذا قُلد صفيحه أجزاؤه العليا شتاء بنى بها نقط ذهبية غير لامعة . ريش الإبط أبيض صيفاً وشتاءً ، والأجزاء السفلى بيضاء شتاءً سوداء صيفاً ، اما القطقاط الرمادى فريش إبطه أسود . أصبح القدم الخلفى ضئيل جداً وتارة غير موجود . الأجنحة مدببة قليلاً عن القطقاط الشامى وهو أسرع طيراناً من الشامى . يغشى المياه الداخلية وخطوط المحراث في أوروبا . (انظر اللوحة أمام ١٨ - ١) .

جنس القطقاط الرمادى (اسكاتارولا) Genus Squatarola

قريب الشبه من جنس الطيطوى والدريج والقطايط ، ولكن أصبح القدم الخلفى واضح وهو صغير وله غلب صغير قد يكون معدوماً أحياناً (١) . وهو نوع واحد يتوالد في الأقاليم القطبية الشمالية من أوروبا ، وآسيا وأمريكا .

القطقاط الرمادى الغربى (٢) Grey Plover (Western Form) .

الوصف : الطول حوالى ١١ بوصة . انظر لوحة (٥٧) شكل (٧) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً في أقصى شمال أوراسيا إلى خط عرض ٧٤° شمالاً وفي آيسلند ونادراً في جرينلند ، كذلك في شمال كندا القطبية في التندرا . يقضى الشتاء في نصف الكرة الجنوبي حتى مستعمرة الكاب ومدغشقر وأستراليا وأمريكا الجنوبية .

في مصر : يشاهد فيها في الاعتدالين وقليل منه يبقى بها شتاءً ، على أنه رغم ذلك قَلَّ من يشاهده ، وميعاده من ١٤ أكتوبر إلى ٤ إبريل ، ويشاهد في شمال الدلتا وشمال سينا وقنال السويس ونادراً في ساحل البحر الأحمر .

مميزاته وطبائعه : يرى ريش إبطه الأسود بسهولة في طيرانه . يغشى سواحل البحار وعلى السدود وضفاف الأنهار الرملية والطينية ويندر أن يوجد في المياه الداخلية أو يرى في أسراب كبيرة كما هو الحال في الدمشق الذهبى . سريع الطيران ، يعتلى ظهر الهواء على مسافة شاهقة ويصبح هكذا Pee-wee تقريباً . طعامه كغيره من القطايط . (انظر اللوحة أمام ١٨ - ١) .

(١) في حالة الانتماء يكون الإبط أسود

(٢) اسمه في الولايات المتحدة Black bellied plover وفي أستراليا Grey plover

القطقاط الرمادي الشرقي
Grey Plover (Eastern Form)
(Squatarola Squatarola hypomelaena)

الوصف : الطول حوالي ١٢ بوصة . انظر اللوحة ٥٧ شكل ٨
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في الأقاليم القطبية الشمالية من أمريكا الشمالية الغربية
وشمال شرق سيبيريا . يقضي الشتاء في استراليا والهند .
في مصر : صيد منه اثنان هما الآن بالمتحف الحيوانى بالجيزة ، صيدا من قنال السويس شتاء .
مميزاته وطبائعه : كالغري السابق في كل شئ .

جنس القطقاط الشامي
Genus (Vanellus)

يقطن هذا الجنس أوراسيا وتجول حتى وصل إلى أمريكا الشمالية متقاربه أقصر من رأسه ، أصبح
القدم الخلفى صغير ولكنه موجود ، عريض الجناح مستديره ، وللرأس قنزعة ظاهرة الطول تمتد خلف
القفا منتصبه . أطول القوائم الثالثة . العش بالقرب من الماء وقد يختار أرضا مستوية فوق الجبل على
المروج الشاسعة والحقول الرطبة ، وهو عبارة عن حفرة عميقة مبطنة بالحشائش ويبنى الوالدان شجاعة
وتخدعا في الدفاع عن البيض والصغار في فترة الحضنة وفقس البيض ، فإذا اقتربت الماشية من العش
وأصبح مهدداً ، اندفعت الأم منه صارخة منتفشة الريش مبسوطة الجناحين فتولى الماشية الأدبار لا تبغى
غير الابتعاد عن هذا الخطر .

طعامه الحشرات ويزور الحشائش . وتصاد هذه الطيور في أوروبا بكثرة إذ يعتبر الأهالي هناك
لحمها طعاما شهيا ، ويأكلون كذلك البيض .
وهي تصلح لحياة الأبقاص وتصبح أليفة ونحاسة إذا أحضرت صغيرة فنجدها تألف عندئذ حياة
الأسر بسرعة . نوع واحد منه في العالم .

القطقاط الشامي
Lapwing = Green Plover = Peewit
(Vanellus Vanellus)

الوصف : الطول حوالي ١٢ ¼ بوصة . انظر لوحة (٥٧) شكل (١١) .

الموطن : من القواطع ومتجول أحيانا : يتوالد صيفا في معظم أوروبا وشمال آسيا (خلاها إلى
المحيط الهادى من ٦٥° شمالا إلى منغوليا ومنطقة جبال تيان شيان على ارتفاع حوالي ١١ ألف قدم --
كذلك في أيسلند في أوروبا واسكتلندا وشمال روسيا من ٦٢° غربا ، ٥٩° في أورال جنوب إلى جنوب
أوروبا والقوقاز) ويقضي الشتاء في غرب أوروبا وشمال إفريقيا وفلسطين وآسيا الصغرى وفارس
وشمال الهند والصين واليابان . وقد تجول إلى جان ماين وجرينلند وألسكا وشمال شرق أمريكا الشمالية
وتزور أفراد منه شتاء أمريكا الشمالية ولا يتوغل شتاء أبعد من الصحراء الكبرى جنوبا في إفريقيا .

في مصر : شائع الزيارة لها شتاء كل عام في كل مكان ماعدا الصحارى وليس شائعا في شمال سيناء ولا في مصر العليا . كثير في الفيوم والدلتا ووادي النطرون وسيوة . يصل لمصر حوالي آخر أكتوبر ويغادر البلاد في آخر مارس .

مميزاته : يسهل معرفته بسهولة بالشوشة التي تخرج من وسط الرأس ولون الظهر الأخضر ، من بعيد يظهر في طيرانه كأنه مكون من لونين : أبيض وأسود ويكون أشبه بالغراب الزيتوني . يكون دائما في أسراب يوجد في المستنقعات وسواحل المياه الداخلية وكذلك الحقول والأراضي المزروعة برسيب الخ . صوته هكذا pee-wit ناعم لا يسمع في مصر وأخذ اسمه الإنجليزي منه .

جنس القطقاط الاجتماعي

Genus (Chettusia)

يمتاز هذا الجنس بسواد منقاره وسُمك طرفه . أطول القوائم الأولى والثانية ، الأصبع الخلفية ظاهرة ولكنها صغيرة . وتختلف من السابق في أنها عارية من التاج (الشوشة) والبريق في الأجزاء العليا وقصر الساق . جمجمة الحذر ، ولكنها وقت الخطر على أولادها تطير إلى مسافة قريبة ثم تعود ثانية مرددة صياحات مختلفة انذارا إلى أولادها كي تختفي . الطعام الحشرات والقواقع والديدان والفراشات ، وكل ما يروقها من هذا القبيل . البيض ٤ أخضر فاتح به بقع بنية متفاوتة . نوعان منه في مصر .

القطقاط الاجتماعي

Sociable Plover.

(Chettusia gregaria .)

الوصف : الطول حوالي ١٢,٥ بوصة . انظر لوحة (٦٠) شكل (٦) الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في وسط وشرق أوروبا ، وفي روسيا إلى خط عرض ٥٣° شمالا وفي منطقة بحر آرال وقزوين وغرب سيبيريا وتركستان والتاي . يقضي الشتاء في الهند وبلاد العرب والنوبة والسودان والحبشة والصومال . كما أنه يتوالد كذلك في التركستان وغرب منغوليا ، ويقضي الشتاء في شمال شرق إفريقيا .

في مصر : شائع بها وفي سيناء شتاء وربما كان في مصر العليا ولا كذلك في غرب الاسكندرية . وحصل عليه من قتال السويس والجيزة والفيوم من أكتوبر إلى مارس .

مميزاته وطبائعه : قريب الشبه من القطقاط الشامي والبلدي إلا أنه بدون تاج — تظهر خوافيه البيضاء بوضوح أثناء طيرانه ، شكله من بعيد كالقطقاط البلدي إلا أنه أطول منه في رجليه . الذيل مكون من اللون الأبيض والأسود ، له خط حاجبي أبيض يمتد من الجبهة ويمر بما فوق العين إلى القفا ، وهو دائما يكون في أسراب صغيرة كما تدل عليه التسمية الانجليزية (القطقاط الاجتماعي) لأنه يكون في جماعات صغيرة دائما . حذر يطير من مسافة بعيدة . محصور وجوده في الأراضي الرملية .

تقطاط أبيض الذيل
White - tailed Plover
(*Chettusia leucura* .)

الوصف : الطول حوالى ١١ بوصة . انظر اللوحة (٥٧) شكل (١٠)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في سهول جنوب روسيا شرقا إلى التركستان وفارس والعراق . ومتجول أحيانا للسودان .

في مصر : ليس شائعا شتاء فيها ولا في سينا وشوهد مرتين على ساحلها الشمالى في فبراير ، كما سجل من الفيوم في فبراير ومارس ومن الدلتا في نوفمبر وديسمبر .

يمتاز ببياض ذيله الذى هو في غاية الوضوح مع أرجله الطويلة الصفراء يغشى المستنقعات خاصة ، يكون في أسراب متفرقة . القوادم سوداء والخوافى بيضاء ويظهر للرائى في طيرانه أنه كله أبيض اللون . وهو الطائر الخواص الوحيد الذى ذيله كله أبيض .

جنس القطقاط البلدى
Genus Hoplopterus .

يتميز هذا الجنس بمنقاره السميك الطرف ذى الانتفاخ الذى يمكنه من الابتلاع ، ومنخره الذى هو أشبه بشق في قاعدة الفك العلوى ، وأهم ميزة له هو الشوكة الكائنة في المنكب السوداء وهو الطائر الوحيد في مصر ذو الميزة المذكورة . ليس له أصبع خلفية . الساق بها حراشيف مربعة من الأمام والخلف .

تعيش أزواجا وقل أن ترى في جماعات . تسهر ليلها أيضا . تدافع عن نفسها بشوكة منكب جناحها ضد الحيوان والطير المهاجم . الطعام الحشرات والديدان وما على شاكلتها . العش في المواطن الرطبة وعلى التلال الرملية .

موطنه : جنوب شرق أوروبا ، وفي إفريقيا ، وجنوب آسيا وهو على ثلاثة أنواع . نوع واحد منه في مصر فقط .

القطقاط البلدى
Spur - winged Plover
(*Hoplopterus Spinosus* .)

الوصف : الطول حوالى ١١ بوصة . انظر لوحة (٥٧) شكل (١٢) .

الموطن : من الأوباد : يقيم طول السنة في إفريقية من شمالها جنوبا إلى السنغال والنيجر والحبيشة وتنجانيقا وكينيا ، كذلك في أقصى جنوب شرق أوروبا وسوريا وقبرص وفلسطين ، ومصر والسودان ، حيث يتوالد في كل ما ذكر .

في مصر : يقيم بها طول السنة ويتوالد فيها من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ولا كذلك في واحاتها على أنه قليل جدا في سينا وكثير جدا في الدلتا .

مميزاته : يغشى الأراضي المرواة وسواحل الترع ولا كذلك على سواحل البحار والأنهار . ويمكن مشاهدته في السفر للصعيد أو للإسكندرية وهو يطير على سواحل الترع والرياحات .

ويظهر في طيرانه أنه مكون من لونين : أبيض وأسود . يمتاز في اليد بشوكة في الجناح في الكتف ، وهي ميزة لا توجد في غيره من طيور مصر . ريش القنة طويل قليلا أشبه بتاج أليف لعدم الاهتمام بصيده وهو محرم صيده بالقانون المصري . صوته تقريبا مكثا يردده على جناح الهواء Zit.zit.etc مرارا .

التوالد : العش في منخفض صغير في الرمال أو التربة الطينية وسط المحاصيل الزراعية الحديثة ويطنه بالقش . البيض من ٣ : ٤ بيضات ، عادة ٤ توضع في مصر من إبريل إلى أغسطس ، وتبيض الأنثى مرتين في السنة . البيض بني زيتون به نقط .

جنس أريناريا (قلاب الحجر)

Genus (Arenaria)

Sandpiper Family

يمتاز هذا الجنس بلونه الجذاب الجميل في الذكر الذي يلعب في ضوء الشمس وخاصة في الصيف والربيع ، مستقيم المنحرف قليلا عند الطرف وهو أقصر من طول الرأس ، مدبب الطرف ، قصير الأقدام والسيقان ولا يزيد طول الساق عن طول الإصبع الوسطى ، وبالساق حراشيف مستطيلة من الأمام ومربعة من الخلف وهي نامية في أصبعها الخلفي وأصابع القدم ذوات أغشية : أطول قوائم الجناح الأولى ، ويتكون الذنب من ١٢ ريشة قصيرة . يوجد دائما على سواحل البحار ، ويندر أن يرى على سواحل المياه الداخلية . يعيش مثنى صيفا ، ويتجمع في أسراب عند الهجرة . نشيط وقلما يكون ساكنا إلا وقت الظهيرة عندما تضرب الشمس الأرض بسيطا من هب . تعدو سريعا على الأرض ، سريعة الطيران . طعامها الحيوانات البحرية الرخوة والقشرية والصدفية والمحار والحشرات والبرقات والديدان وما أشبه ذلك وأهمها الحشرات الكامنة تحت الحجارة الصغيرة فيقلبها بمنقاره ليكشف ما تحتها من يرقات ولتتبعها ولذا يسميه الأجانب (قلاب الحجر) . Turnstone وكذلك الحشرات التي ينحسر عنها ماء المد . يسميه البعض قنبر الماء .

العش في الجزر الرملية الصغيرة ومواطن الصخور الشاطئية وهو عبارة عن حفرة أو منخفض صغير يبطن بالأعشاب ، البيض ٤ رمادية أوزيتونية باهتة ذوات بقع غامقة داكنة .


قلاب الحجر (الشكل البلياركتك) = قنبرة الماء

Turnstone Palaearctic Form .)

(Arenaria interpres interpres)

Sandpiper Family

الوصف : الطول حوالي ٩ بوصة انظر لوحة ٥٨ شكل ١
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا وآسيا (سواحل جزائر اسكندناوة والدنمارك والبلطيق) وكذلك على الساحل الشمالي لسبيرييا وعند بوغار بيرنج وشمال غرب ألسكا .



أى في المناطق القطبية من أوراسيا وأمريكا الشمالية . وتقضى الشتاء في شواطئ غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وجنوب آسيا إلى أستراليا وتسمانيا ونيوزيلند وإفريقية لغاية مدغشقر والكامب .
في مصر : تشاهد فيها في الشتاء وخاصة على ساحل الدلتا الشمالي على البحر الأبيض المتوسط من سبتمبر إلى نوفمبر ثم ترحل إلى الجنوب لتقضى باقى الشتاء فيه في جنوب ووسط إفريقية ، وصلت ٦ منها على ساحل البحر الأبيض المتوسط من شمال شرق رشيد في ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٤٠ .

مميزاتها وعاداتها : مثل ما قبل عنها في الجنس صفحة ٤١٧ ، وزيادة على ذلك فإنها تطير قريبا من سطح الأرض والماء وتظهر في طيرانها أنها مكونة من لونين : أبيض وأسود ، وهي مكتنزة جدا بالدهن في الخريف . الأرجل صفراء برتقالية . الصوت هكذا Chee يردده في طيرانه .

جنس الدجداجيات (كلدريس)

Genus (Calidris)

Sandpiper Family

هى طيور متفاوتة الأحجام منها الصغير الجسم ومنها متوسطه . المنقار رفيع ومعتدل أو منحن قليلا كالقوس أو مقوس قليلا من طرفه المنخر في منتصف الفك العلوى ناحية المنقار . الذيل مربع تقريبا ويندر أن يكون مسحوبا . ريشتا وسط الذيل غالبا هما الأطول . أصبح القدم الخارجية موجود ونام . مناقير الإناث عادة أطول من مناقير الذكور .

مأواه المياه الداخلية على السواحل ويغوص المياه الضحلة والوشلة ، نشيط الحركة ويبدأ ظهورها . العش في حفرة رملية قريبة من الساحل يطن بسيقان النبات . البيض عادة ٤ لونه زيتوني والحضانة بالأنثى وحدها ويقوم الذكر بحراستها ويشارك الأبوان في إطعام الأولاد . الحضانة بالإثنين والإطعام ٢٥ يوما

يستوطن هذا الجنس المناطق الشمالية من الكرة الأرضية ويزور الأصقاع الجنوبية شتاء ، ماعدا أستراليا . ويشتو في جموع كبيرة على ساحل بحر قزوين الجنوبي والغربي .

حوالى ٢٠ نوعا منه في العالم . يوجد منه في مصر حوالى ٦ أنواع تشمل الدنلن وكروان الماء والدجداجة (الفطيرة الصغيرة) ، ودجداجة تمنكى والنط .

الدنلن الشمالي (Dunlin (Northern Form)

(Calidris alpina alpina)

Sandpiper Family .

الوصف : الطول حوالى ٧ بوصة . انظر اللوحة (٥٨) شكل (٢) .
الموطن : من الأوبد والقواطع : تتوالد صيفا في أيسلند وفاروس ولايلاند وشمال روسيا واسبتنبرج وجنوب نوفايا زمليا وغرب سيبيريا وفي اسكندناوة على علو حوالى ٣ آلاف قدم في شملها ، وتقر شتاء على حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقية إلى جنوب خط الاستواء . وهي تقيم طول السنة في الجزائر البريطانية .

في مصر : تشاهد في الخريف ويبقى جزء منها فيها شتاء هي وسينا ، كذلك ترى في الربيع من منتصف مارس إلى منتصف إبريل .

مميزاتها وعاداتها : المتقار منحني قليلا لأسفل على شكل قوس صغير ، المتقار أطول من الساق ، وهي أكبر قليلا من الدنلن الجنوبية وتمتاز كذلك عنها صيفا بقفاها الرمادي ويطنبا الأكثر سوادا ، وظهرها الأكثر لونابنيا . توجد دائما بالقرب من الماء أو على شواطئ البحار في جوع صغيرة . نشيطة . قد تشاهد في أسراب نائمة على ضفاف الأنهار والبحار والخلجان والمستنقعات .

الدنلن الجنوبية

(Dunlin (Southern Form)

(Calidris alpina Schingu)

الوصف : الطول حوالي ٦ بوصة . انظر لوحة (٥٨) شكل (١)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شمال أوروبا في آيسلند وجنوب البلطيق والدنمارك وهولاندة والجزر البريطانية ، وفي بعض أنحاء جنوب ووسط أوروبا . وتهاجر شتاء إلى إفريقية إلى جنوب خط الاستواء .

في مصر : شائعة في الاعتدالين وجزء منها يمكث طول الشتاء فيها وفي سينا .
مميزاتها وعاداتها : اقرأ الاختلافات في سميات السابقة عن هذه .

كروان الماء

Curlew Sandpiper Curlew-Stint

Calidris Ferruginea

الوصف : الطول حوالي ٨ بوصة . انظر اللوحة (٥٨) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شمال أوروبا وشمال آسيا (في التندرا في سيبيريا وسواحل المحيط المتجمد الشمالي في أوروبا وشوهد على جبال هملايا على ارتفاع حوالي ١٨ ألف قدم وعلى ساحل الصين ،) ويقضي الشتاء في جنوب آسيا وبلاد العرب والهند وشبة جزيرة الملايو والصين وجاوة وبورنيو ، وفي إفريقية في حوض البحر الأبيض المتوسط وكل إفريقية حتى الكاب ، وهو يقطع مسافات كبرى في هجرته فقد شوهد في استراليا وتسمانيا ونيوزيلند ومدغشقر .

في مصر : يشاهد فيها وفي سينا في الربيع والخريف أكثر من أي فصل آخر وخاصة في الدلتا وقنال السويس ووادي النطرون . لم يسجل بعد من الفيوم . وهجرة الربيع من ٢٠ إبريل إلى آخر مايو ، والخريف من ٩ سبتمبر إلى عشرة (١٠) من أكتوبر .

مميزاته : قريب الشبه جدا من الدنلن الشمالية ، غير أنه أكبر منها حجما ، ومنقاره أطول وأكثر من منقارها انحناء ، واسمه عند الانجليز (مكتشف الكرة الأرضية) وهو الاسم الذي يطلقونه عليه وذلك لأنه يقطع أشواطاً بعيدة في رحلته حيث سجل من أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا . غطاء أعلى الذيل أبيض . عاداته مثل الدنلن . يشاهد غالبا في أسراب مختلطة مع غيره من الطيور الخواضة سريع الطيران متموجه ولكن أقل من تموج الدنلن . صوته عندما يطير مفزوعا هكذا Tuee,etc يردده مرتين وأحيانا هكذا Wick-a-wiak . يجرى بسرعة على الشاطئ . منخفض الطيران .

الدجاجة الصغيرة

Little Stint .

(*calidris minuta*)

Sandpiper Family

الوصف : الطول حوالي ١/٥ ٥ بوصة . انظر اللوحة (٦٠) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في مناطق التندرا في أقصى شمال أوروبا وآسيا عند القطب الشمالي وأقصى شمال الترويج شرقا على طول التندرا من شمال سيبيريا وروسيا إلى بنشورا وجنوبا إلى موسكو وفي غرب سيبيريا . تهاجر شتاء إلى كل إفريقيا حتى الكاب وكذلك في جنوب آسيا في الهند وسيلان وبلاد العرب وساحل البحر الأحمر عند عدن .

في مصر : شائعة في الربيع والخريف في مصر في إبريل ومايو ، وفي الخريف في سبتمبر وأكتوبر والبعض يقضي فصل الشتاء بمصر وسينا ولكن بقلة جدا .

مميزاتها وعاداتها : الطعام كثيرا ، صغيرة الجسم تعتبر أصغر الطيور الخواضة في مصر . نشيطة . تغشى المستنقعات والمياه الداخلية . تحتشد في أسراب ، سريعة الطيران وتلتوى في طيرانها . ظهرها في الربيع بني صادي وفي الشتاء رمادي (الخريف) وبه خطوط قليلة بيضاء ، الأرجل سوداء ، بخلاف دجاجة تمكّي الآتية فأرجلها مصفرة أو مخضرة ، وليس في ظهرها خطوط بيضاء .

دجاجة تمكّي (تمك)

Temminck's Stint.

(*Calidris temminckii*)

الوصف : الطول حوالي ١/٥ ٥ بوصة . انظر اللوحة (٦٠) شكل (٤) .
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في مناطق القطب الشمالي من نصف الكرة الشمالي (شمال غرب ألسكا وشمال شرق سيبيريا) وتقطع الشتاء صوب الجنوب (المكسيك وجزائر الهند الغربية والبرازيل وشيلي وجزائر جالا باجوز والولايات المتحدة والهند وحوض البحر الأبيض المتوسط ، والصين وسيلان والسودان والصومال ولكن لا تصل إلى خط الاستواء بل لغاية خط ١٠° شمال خط الاستواء تقريبا) .

وشوهدت وهي تعبر جبال هملايا صيفا على ارتفاع ١٨ ألف قدم في طريقها إلى الهند وجنوبها لقضاء الشتاء .

في مصر : شائعة فيها وفي سينا شتاء من آخر أكتوبر إلى آخر مايو ، وخاصة في الدلتا والبحيرات والمياه والمستنقعات الداخلية منها وفي وادي النطرون والفيوم وسيوة والواحات الداخلية .

مميزاتها وعاداتها : ليس لها خطوط بيضاء في ظهرها كالسابقة ، وأرجلها مصفرة أو مخضرة ، ريش جانب الذيل أبيض وصدرها ترابي اللون . تشاهد منفردة أو مثنى . أليفة للغاية . هي في حجم الدجاجة الصغيرة السابقة تقريبا الباقى كالصغيرة السابقة .
ملاحظة : انظر فرق الأذنان في لوحة ٥٣ .

النط (البلياركتكية)

Knot (Palearctic Form .)

(calidris canutus canutus .)

Sandpiper Family .

الوصف : الطول حوالى ١٠ بوصة . انظر لوحة (٦٠) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال أوراسيا (سيبيريا القطبية وجرينلاند وأيسلند ، وفي السكا في شمال غرب كندا) . تقضى الشتاء جنوبا على سواحل غرب أوروبا لغاية البرتغال وسردينيا وصقلية وغرب إفريقيا وجنوب آسيا ونيوزيلند ، والأمريكية تشتت جنوبا في أمريكا الجنوبية عند بناجونيا - كذلك تشتت الأسيوية في جنوب إفريقيا وفي استراليا ونيوزيلند وفي الهند .

في مصر : تمر على مصر وسينا في الاعتدالين في طيرانها وقل أن تهبط فيها للراحة ومن العجب أنها تقطع مسافة ٣ آلاف ميل كل خريف وربع دون أن تستريح راحة كافية في مصر . شوهدت مصادفة فيها من مارس إلى مايو .

مميزاتها وطبائعها : تغشى سواحل البحار في كل أنحاء العالم وهي أهم ميزة لها ويندر أن تأوى إلى المياه الداخلية ، توجد في أسراب كبيرة وقل أن تشاهد منفردة . قصيرة الأرجل نسبيا ، بدنية الجسم ، مستقيمة المنقار قصيرة ، جسمها أكبر من جسم الزرزور . تطير مصحوبة بصوت وضوضاء .

لونها العام رمادى من أعلى أبيض من أسفل شتاء ، وأحمر بني من أسفل في الربيع والصيف . تردد صوتها على جناح الهواء هكذا تقريبا . Knot, not . ومنه أخذ اسمها .

الأرجل والأقدام خضراء زيتونية ، والمنقار أسود .

جنس الحجالة (فيلوماشوس)

Genus (Philomachus .)

Ruff & Reeve . Sandpiper Family .

يستوطن هذا الجنس كل الأصقاع الشمالية من الدنيا القديمة ، كما يوجد شاردة في شرق إفريقيا ، ويقطع الشتاء إلى كل بلاد أوروبا وآسيا وإفريقية حتى الكاب ، وكذلك في الهند .

وهو قريب الشبة من جنس الدجاج calidris ولكن المنقار أعرض قليلا من ناحية الطرف ، والذكر أكبر بكثير من الأنثى ، كما أنه في الربيع والصيف يتزين بأجمل الألوان من الريش والوسادة العنقية التي تلفت الأنثى إليه وليس اللون على غمط واحد بل هو متعدد الأشكال فيبيننا نجد ذكرا لونه أحمر اللون نجد الآخر أصفر اللون ، بينا الثالث رمادى ، وليس اللون خالصا بل يكون مختلفا بعدة ألوان أخرى غير أن اللون الأحمر هو الذى يغلب عليه ، ويعمل اللون كمظلة متعددة الألوان ، وهذه الوسادة تختفى في الخريف والشتاء . غطاء أسفل الذيل طويل جدا يصل إلى طرف الذيل .

القدم ٤ أصابع . أصبع القدم الخلفى نام وموجود وقصير والخارجى والأوسط متصلان بغشاء . الجناح مدبب متوسط . الطول . أطول القوادم الأولى . الذنب قصير منبسط ومستدير والريش ناعم وغزير . طيور نشيطة تواصل العمل طول الليل في ضوء القمر سعيا وراء غذائها من الحيوانات المائية

الصغيرة والديدان وبعض البذور ، كما تأكل الأرز في الهند ومصر . هادئة ساكنة إلا عند التزاوج . تحب العراك والمحاكاة بين أبناء جنسها فقط وخاصة وقت التزاوج تقريبا من الإناث . العش قريب من الماء أو فوق أرض وسط المستنقعات عبارة عن حفرة تبطن بالأعشاب والحشائش . البيض ٤ والحضانة بالأنثى .

وهو نوع واحد في العالم ، يزور مصر شتاء .

الحجوة

Ruff and Reeve

(Philomachus pugnax)

Sandpiper Family .

الوصف : الطول حوالي ١٢,٥ بوصة في الذكور ، أما الإناث فالواحدة طولها حوالي ١١ بوصة . انظر لوحة ٥٨ شكل ٦ .

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في النصف الشمالي من أوروبا ، وكذلك في سيبيريا إلى خط عرض ٧٦° شمالا وفي وسط شمال غرب آسيا وهي كثيرة في هولندا لحماية بالقانون . تقضي الشتاء في جنوب أوروبا المطل على البحر الأبيض المتوسط وكذلك جزائر قناريا وماديرة وكل إفريقيا لغاية الكاب ، كذلك في جنوب آسيا في التركستان ، الهند وبنغال وسيلان ، وكذلك بورنيو والصين وتارة في شرق الولايات المتحدة .

في مصر : تشاهد في الربيع أكثر من الخريف ، وقد يبقى بعض منها شتاء بها ، والهجرة الربيعية هي من أول إبريل إلى ١٧ مايو ، والخريفية من ٢٧ أغسطس إلى ١٥ أكتوبر ، وحصل عليها في فبراير من سينا في الطور ، والذكور في الربيع أكثر من الإناث وجودا ، وهي شائعة في ميعادها في الدلتا والفيوم ، ووادي النطرون والواحات الداخلية ومصر العليا .

مميزاتها : هي الطائر الوحيد الذي يسمى الذكر فيه باسم خاص وهو Ruff أي (شمسية) والأنثى باسم (Reeve) تأنيث ما سبق ويمكن أن يقابلها في اللغة العربية باسم (المظلل والمظلة) . يعرف الذكر بسهولة في الربيع بمظلتة التي ينشرها حول عنقه وهي على أشكال مختلفة ، تشفى الشواطئ والمياه الداخلية والمزارع ذات الضباب . طعامها الحشرات الخ كما في الجنس . سريعة الطيران . قصيرة المنقار . الذكر أكبر من الأنثى التي هي أكبر قليلا من البكاشنة العادية . تشاهد في أسراب . ينذر أن ترى على شواطئ البحار في مصر . للذينة اللحم . وهي أقرب الشبه شتاء بالطيطوي أحمر الرجلين (أبو طيرو) Redshank .

جنس ترينجيتس (طيطوي برتقالي الصدر)

Genus (Tryngites)

قريب من جنس الدجاجة Calidris إلا أن النصل الأنسي لقوادم الجناح به نقط وخطوط رفيعة منكسرة . كما أن المنقار مستقيم وقصير وليس مسطحا ولا منحنيًا ناحية الطرف . ريش وسط الذيل أطول من الباقي . قلما يختلف لونه صيفا وشتاء وهذا الاختلاف قل أن يلحظ . هو نوع واحد .

طيوطى بصدري برتقالي
Buff-breasted Sandpiper .
(Tryngites Subruficollis)

الوصف : الطول حوالى ٨ بوصة . انظر اللوحة (٦٠) شكل (٣)
الموطن : من القواطع ومتجول : يتوالد صيفا في أقصى شمال كندا (في أمريكا الشمالية) في الأقاليم القطبية وكذلك في شمال شرق سيبيريا (في آسيا) وكذلك في شمال ألسكا . وفي الشتاء يزور الولايات المتحدة في وادي المسيسيبي وأمريكا الجنوبية لغاية الأرجنتين وقد تجول شتاء في اليابان وفي غرب أوروبا .

في مصر : حصل مينرتر هاجن على ذكر منه عند القصير على البحر الأحمر في ٢١ فبراير سنة ١٩٢٨ . وهو نادر جدا أن يرى ، ولا ندرى من أى النواحي قدم لمصر ؟ أمن الشرق أم من الغرب .

Sanderling جنس المدروان Genus Crocethia

لا يختلف عن جنس الدجاجة (كالديريس) ماعدا في عدم وجود أصبع القدم الخلفى . الذكر يختلف لونه في الربيع عن الحريف . الشقان لا يختلفان . نوع واحد في العالم .

المدروان

Sanderling

(Crocethia alba .)

Sandpiper Family

الوصف : الطول حوالى ٧ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٦٠) شكل (٦)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في أقصى شمال أمريكا الشمالية عند القطب وسوسهجتون وشمال جرينلند واسير برجن ، كذلك في شمال سيبيريا والأقاليم القطبية من أوروبا ، ويهاجر شتاء إلى جنوب إفريقيا وإلى أمريكا الجنوبية وأستراليا والهند والصين واليابان وكثير من جزر المحيط الهادى وعلى طول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل شرق إفريقيا وبلاد العرب والبعض الآخر يسافر بطريق النيل في طريقه إلى البحيرات العظمى الاستوائية وجزائر المحيط الهندى ، كذلك في الهند وسيلان وجاوة وبورنيو وجزائر هاواي وأمريكا الجنوبية في بتاجونيا وشيلي . وهو على العموم يعتبر أكبر طائر جوال عالمي ولا يوجد طائر يحول العالم كله في هجرته مثله .

في مصر : يشاهد فيها في الربيع من آخر مارس إلى منتصف مايو ، وفي الخريف من منتصف سبتمبر إلى آخر أكتوبر ، فيشاهد في أسراب كبيرة في الدلتا وغربا إلى السلوم وبالمثل في سيناء على سواحلها الشمالية ، وقليل منه يقضى الشتاء في مصر .

مميزاته وطبائعه : هو في حجم الدنلن ، يشاهد دائما على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وتارة على ضفاف النيل يجري هنا وهناك فيسابق ويلحق الأمواج ويتقهقر ثم يتنحى عنها . منقاره مستقيم للغاية . أجزاؤه العليا في الشتاء رمادية تقريبا والسفلى بيضاء . ليس له إصبع قدم خلفى أبدا . يميزه في طيرانه الخط العرضي الأبيض الذى يشق وسط ريش الطيران كله . صوته هكذا (Week) . يفضل الشواطئ الرملية على الطينية ولذا يكثر على سواحل البحار الرملية . دائم الحركة . طيرانه يشبه طيران الطيطوى المعتاد (أبو طيرو) . أجزاؤه العليا ورأسه وصدره في الربيع والصيف أحمر رملي .

جنس الطيطوى عريض المنقار

Broad - billed Sandpiper

ليميكولا (Limicola)

يختلف عن جنس كاليدريس (الدجاجة) بأن المنقار متفتح قليلا في الفك العلوى عند القاعدة ، وهو قصير وعريض عند القاعدة .
الأقدام قصيرة نسبيا عارية من الريش إلى ما فوق الساق ، والقدم بها ٤ أصابع . الأجنحة متوسطة الطول مدببة . أطول القوادم الأولى والثانية . الذنب قصير وريشاته الوسطى مدببة وهى أطول الريش . الشقان لا يختلفان . أصبع القدم الخلفى نامية .
وهى طيور خواضة .
نوع واحد منه .

طيطوى عريض المنقار غربى

Broad - Billed Sandpiper (Western Form .)

(Limicola falcinellus falcinellus .)

الوصف : الطول حوالى ٦ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٦٠) شكل (٧) .
الموطن : من القواطع : يتوالد في شمال ووسط أوروبا وشمال آسيا عند التندرا ويقضى الشتاء في جنوبها في الهند وحوض البحر الأبيض المتوسط وقزوين وأورال (شرق البحر الأبيض المتوسط) ، والبحر الأسود .
في مصر : شائع شتاء على سواحل البحر الأبيض المتوسط فيها وفي سواحل سيناء من منتصف أكتوبر إلى أوائل إبريل .
مميزاته وعاداته : يصعب التمييز بينه وبين الدنلن حيث أن المنقار واحد تقريبا ولكن الظهر والرأس ب كليهما خطان أبيضان مزدوجان أشبه بذلك البكاشينة الصغيرة . Jack Snipe . ليس له بقعة سوداء في الأجزاء السفلى في الربيع مثل الدنلن .

جنس الطيطوى (ترنجا)^(١)

Genus Tringa = (Shanks & Sandpipers .)

Sandpiper Family

تستوطن طيور هذا الجنس المناطق الشمالية من آسيا وأمريكا وتقطع الشتاء إلى أوروبا وجنوب آسيا وجنوب أوروبا وإفريقية كما أن النوع الذى يقطن أمريكا يقطع إلى إفريقيا أحيانا .
المنقار مستقيم أو منحن قليلا ، وهو بطول الرأس أو أطول منه قليلا . الجناح مدبب ، أطول القوادم الأولى . القدم تحترق على ٤ أصابع ، الذنب إما مستدير الطرف أو مشقوق . وهى تغير ريشها مرتين في السنة ولذلك تختلف ألوان الريش في الصيف عنها في الشتاء . وهى طيور مهاجرة .

(١) انظر فوارق الأذنان في لوحة ٥٩

وهي في أسفارها تتبع شواطئ البحار ولا تفارقهما أو تبارحها إلا شذوذاً إلى المياه الداخلية ولا توجد داخل البلاد إلا قليلاً . وتتجمع على الشواطئ في أسراب كبيرة . طيور نشيطة تجيد العدو والطيران والسباحة ، طعامها الحيوانات البحرية الرخوة والديدان والقشريات والحشرات والبرقات الخ . تلتقطها من بين صغار الحجارة والحصى أو من بين الطين . الساق بها حراشيف مستطيلة . الخلف في كل الأنواع المصرية ومن الأمام في كل أفراد الجنس . اصبع القدم الخلفي تام وموجود دائماً . العش عبارة عن حفرة ليست عميقة مبطنة غالباً . البيض ٤ مختلفة الألوان بين الرمادي المخضر ، والزيتوني المصفر . الأنثى تحضن وحدها البيض .

طيوطى أحمر الساق أسود منقط

Spotted or Dusky Redshank

(*Tringa erythropus*)

الوصف : الطول حوالى ١٣ بوصة . انظر لوحة (٥٨) شكل (١٠) .
الموطن : يتوالد صيفاً - حيث هو من القواطع - في الأقاليم القطبية من شمال أوروبا وآسيا ، ومن شمال اسكندنافيا وشمال روسيا إلى شمال شرق آسيا ، يقضى الشتاء في إفريقية حتى الكاب وفي آسيا في جنوبها في الهند والصين وسيلان والخليج الفارسي .
في مصر : صيد منها من الدلتا مصادفة بين ديسمبر ومايو شتاء ، كما شوهد كذلك في إبريل في جنوب الدلتا .

مميزاته وطبائعه : في الربيع والصيف يكون اللون أسود وله نقط بيضاء في أجزائه العليا . أما شتاء فيكون لونه العام مثل لون الطيطوى الأخضر الرجل أى رمادى في أجزائه العليا ومائل للبياض في أجزائه السفلى كما أنه في حجمه تقريبا . الأرجل حمراء دائماً . الصوت تقريبا هكذا tew,tew . مثل صوت الطيطوى أحمر الساق العادى . المقار طويل .

طيوطى أحمر الرجلين عادى (أوروبى)

Common Redshank (European Form)

(*Tringa totanus totanus*)

الوصف : الطول حوالى ١١,٥ بوصة . انظر اللوحة (٥٨) شكل (١٢) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً في كل قارة أوروبا ونصف إفريقية الشمالى ، ويصل توالده في أوروبا إلى خط عرض ٧٠° شمالاً إلى المحيط المتجمد الشمالى ، كما أنه يقم طول السنة في الجزر البريطانية . يقضى البعض الشتاء في وسط أوروبا وجنوبها ويصل في إفريقية شتاء إلى الكاب ، كما أنه يتوالد في آسيا في غربها شمالاً إلى خط عرض ٥٦° في سيبيريا وجنوباً إلى آسيا الصغرى وفارس ويقضى الشتاء في جنوبها .
في مصر : شائع الوجود في مصر شتاء من ١٩ أغسطس إلى منتصف مايو ، وكذلك في سيناء ، والدلتا والفيوم ووادى النطرون وواحة سيوة والداخلة ومصر العليا وقنال السويس .

مميزاته وطبائعه : الغذاء كغيره من الجنس ، الصوت مثل السابق تماما ، في طيرانه يظهر بياض ريش الخواقي ، الأرجل حمراء دموية ، أوبرتقالية ، المنقار نصفه الأمامي أسود ، والخلفي أحمر برتقالي ، الأجزاء العليا بنية فاتحة رمادية والسفل بيضاء وهذا اللون حيفا وشتاء ، والمنقار أقصر من السابق أى الأسود المبقع . يوجد في أسراب في المياه الداخلية والمستنقعات . اسمه في رشيد (أبو طيرو) .

طيوطى أحمر الرجلين أسبوى (عادى)

Common Redshank (Central Asiatic Form)

(Tringa Totanus eurhinus)

الوصف : الطول حوالى ١٢,٥ بوصة . انظر لوحة (٥٨) شكل (٨)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في آسيا في لوداك وجنوب التبت ومعظم وسطها . يقضى الشتاء في العراق والهند وجنوب الصين وساحل الصومال وبلاد العرب وزيلع ومصر .
في مصر : يقضى فيها وفي سينا الشتاء في نفس المواطن السابقة .
مميزاته وطبائعه : هو كالسابق تماما غير أنه أكبر منه جسبا .
والأجزاء العليا افتح في لونها البنى الرمادى ، كما أن الصدر والخاصرة بهما كرات بنية غامقة صغيرة .

طيوطى أحمر الرجلين إسبوى شرقى (عادى)

Common Redshank (Eastern Asiatic Form)

(Tringa Totanus terrignotae)

الوصف : الطول حوالى ١١ بوصة . انظر اللوحة (٥٨) شكل (١١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في أقصى شرق آسيا ومنغوليا ويزور شتاء جنوبا في جنوب الصين وبورينيو والهند والعراق .
في مصر : حصل عليه من رشيد في ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧ وأثناء هي الآن بالمتحف الحيوانى .
مميزاته وطبائعه : الأجزاء العليا أفتح لونا ومائلة للون الرمادى أكثر ، والأجزاء السفلى أشد بياضا والخطوط فيها أقل وأضيق وليس بها اللون الرمادى الخفيف الذى في الأفراد الأوروبية . غطاء أسفل الذيل به خطوط عرضية أقل وأضيق من السابق . هذا شتاء .

طيوطى أخضر الرجلين

Greenshank

(Tringa nebularia)

الوصف : الطول حوالى ١٣ بوصة . انظر اللوحة (٥٨) شكل (٩) ، ولوحة (٥٣) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا (اسكندناوة حتى خط عرض ٥٧° شمالا وشمال روسيا وشرق سيبيريا إلى حوالى الدائرة القطبية الشمالية) ويمتد إلى شرق آسيا ، ويقضى الشتاء في الجنوب (إفريقيا حتى جنوبها ، وكذلك استراليا ونيوزيلند والصين وشمال الهند وسيلان وسيام (تايلاند) والفليبين .

في مصر : شائع شتاء فيها وفي سينا ، وفي الفيوم ووادي النطرون ومصر العليا ، وهو كثير في الدلتا وبحيراتها ومستنقعاتها من سبتمبر إلى آخر مارس ، وفي سينا من فبراير إلى منتصف إبريل تقريبا .
ومميزاته طبائعه : الردف أبيض ، كبير الجسم ، لونه شتاء رمادي وليس في أجنحة بقع بيضاء كبيرة ، المنقار منحني قليلا لأعلى ، الأرجل خضراء . قوى الطيران للغاية . يغشى المياه الداخلية . لا يسير الطين ، بل يأكل ما يراه على سطح الأرض مباشرة من حشرات وديدان الخ . يغشى كذلك سواحل البحار .

طيوطى البطائح
Marsh Sandpiper
(*Tringa stagnatilis*)

الوصف : الطول حوالى ١٠ بوصة . انظر لوحة (٥٨) شكل (٧)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب شرق أوروبا ، شرقا إلى آسيا الوسطى وسيبيريا جنوبا إلى التركستان . يهاجر شتاء إلى جنوب آسيا (الهند والصين وسيلان والملايو وبورما وأستراليا) . كذلك في إفريقيا من شمالها إلى أقصى جنوبها .
في مصر : شائع شتاء في هجرته لها ، ويمر عليها في أسراب كبيرة في أوائل إبريل ، وسجل بكثرة في الدلتا ومصر العليا وقال السويس وميعاده هو من ٨ أكتوبر إلى ١٩ إبريل .
مميزاته وطائعه : صورة مصغرة للطيوطى أخضر الرجلين السابق ، ولكن منقاره أرفع منه ، ومستقيم عنه ، الأرجل خضراء زيتونية كالسابق — يوجد منفرداً ، يغشى المياه الداخلية الوحشة ويغوص فيها بأرجله الطويلة نسبيا . الباقي كثيره .

الطيوطى الأخضر
Green Sandpiper
(*Tringa ochropus*)

الوصف : الطول حوالى ٩ بوصة . انظر لوحة (٥٨) شكل (٤)
الموطن : من القواطع ، وبعضه يقيم طول السنة في مناطق توالده : يتوالد صيفا في شمال أوروبا وشمال آسيا من الدائرة القطبية الشمالية إلى وسط وشمال أوروبا والبلقان ووسط آسيا شرقا إلى منشوريا ، وبحر قزوين وجبال التركستان ، ويقضى الشتاء في إفريقيا إلى ما بعد خط الاستوائية ويندر أن يصل إلى جنوبها ، كذلك في جنوب آسيا إلى الهند وسيلان والهند الصينية والملايو وأحيانا يصل إلى أستراليا ، كذلك في سيام (تايلاند) واليابان وبورنيو . وهو يقيم طول السنة في الجزر البريطانية وهولندا حيث يتوالد فيها .

في مصر : شائع فيها شتاء من ٢٧ أغسطس تقريبا إلى آخر مارس وأوائل إبريل ، هي وسينا ومصر العليا والسفلى .

مميزاته وعاداته : أكثر الطيور الخواضة رؤية في المستنقعات ، والمياه الداخلية الوحشة ويقلب الجداول والترع الصغيرة وسط الأراضي الزراعية . يشاهد منفرداً دائماً ، إذا فاجأه إنسان طار مغزوعا

مصحوبا بصوت وظهر في طيرانه كأنه مكون من لونين فقط : أبيض وأسود ، وطار قريبا من سطح الأرض ، ونادراً أن يكون مثنى ، ويكون جماعات عند الهجرة فقط ، الصوت هكذا twi, twi, twi يردد على جناح الهواء . لا يأوى إلى البحار مطلقاً بل المياه الداخلية فقط ، وسط المزارع أو الأراضي القحلة ، الأرجل خضراء معتمة بسواد قليلاً . الأجزاء العليا سوداء خفيفة بها نقط بيضاء .

طيوطى الغياض

Wood Sandpiper

(Tringa glareola .)

الوصف : الطول حوالى ٨ بوصة . انظر اللوحة (٥٨) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً في أوروبا من أقصى شمالها عند خط عرض ٧٠° عند حدود الغابات الصنوبرية إلى شرق آسيا إلى طامشاقطا ، ووسط أوروبا وآسيا . يقضى الشتاء في شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط لغاية جنوب إفريقية ، كذلك في جنوب آسيا وجنوب شرقها وأرخيبيل الملايو وفي الهند ، وظهر شتاء في الصين وأستراليا والسكا متجولا . كثير شتاء على مرتفعات الجبشة إلى علو حوالى ٩ آلاف قدم ، وهو كثير جدا في الكاب من سبتمبر إلى مارس .

في مصر : شائع في الاعتدالين وفي الشتاء فيها وفي سينا ، فيصل حوالى آخر يوليو وتارة في أوائل مايو ويونيو ، وهو في الاعتدالين أكثر منه في الشتاء .

مميزاته وطيائمه : قريب الشبه بالطيطوى الأخضر السابق غير أن أجزائه العليا أفتح منه لونا (أبهى)^(١) . الأرجل خضراء زيتونية مائلة للصفرة عن السابق ، والمقار قرنى اللون مائل للاخضرار وطرفه معتم ، وهو (أى المقار أقصر من منقار الطيطوى الأخضر وطيوطى البطائح ، كما أن أرجله أقصر من طيطوى البطائح)^(٢) . أحيانا يهتز في وقوفه بعد طيرانه . يظهر في طيرانه كأنه مكون من لونين : أبيض وأسود كالسابق ولكن السابق أكثر وضوحا . يغشى المياه الداخلية كالسابق ونادرا على الشواطئ البحرية ، الصوت هكذا tit tit, tit tit .

الطيوطى المعتاد^(٣)

common Sandpiper

(Tringa hypoleucos .)


الوصف : الطول حوالى ٧ ٣/٤ بوصة . أنظر اللوحة (٦٠) شكل (٨) .
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفاً من الدائرة القطبية الشمالية إلى وسط وجنوب أوروبا ، كذلك في آسيا من شمالها القطبي إلى وسطها على الجبال على ارتفاع حوالى ١٧ ألف قدم في الهملايا . يقضى الشتاء في إفريقية ومدغشقر ، وفي الهند والملايو وأستراليا جنوباً إلى تسمانيا ، وكذلك يتوالد في اليابان .

(١) وهي بنية غامقة قليلاً بها نقط بيضاء .

(٢) الأرجل مائلة للخضرة وهي صفراء باهته شاحبة


(٣) اسمه في أمريكا الشمالية Summer Snipe

هذه اذنان :




(1)

Marsh Sandpiper



(2)

Green Sandpiper



(3)


Wood Sandpiper



(4)

Common Sandpiper

أنظر من صفحة ٣٧٥ - ٣٧٩



ص ٣٧٧


Redshank
(European)



ص ٣٧٦

Central Asiatic

Redshank



في مصر : كثير في مصر شتاء وفي الاعتدالين وفي سينا في نفس الميعاد وفي سيوة والواحات الداخلة والفيوم ومصر العليا وكذلك الدلتا وذلك من منتصف يوليو ويمكث طول الشتاء ويرحل في آخر إبريل وهو أكثر في الاعتدالين منه في الشتاء . يرى منفردا على شواطئ الأنهار والبحيرات الداخلية والبرك ويندر أن يغشى السواحل قبل الخريف هناك . ضربات أجنحته سريعة تظهر كأنها ترتعش ، صغير الجسم . طيرانه فوق الماء مباشرة . في حجم الشنق الصغير (البكاشينة الصغيرة) . الصوت هكذا di, di, di, يغشى السواحل الصخرية بجانب النهر أو البرك الداخلية . أهم ما يميزه هو امتداد اللون البني الفاتح شتاء على جانب الرقبة .

الفصيلة الفالاروبية (فالاروبيداي) Family (Phalaropidae .)

تقطن طيور هذه الفصيلة شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية (شمالها ووسطها) وجزائر نوريل . وهي على ثلاثة أنواع تقطن العالم الآن .

جنس الفالاروب (Phalaropus) Genus (Phalaropus)

طيور هذا الجنس لها أغشية في إصابع القدم . أصبع القدم الخلفي موجود ، الإناث أجل من الذكور . يشترك الذكر مع الأنثى في الحضانة ، طيور مائية . تغشى سواحل البحار شتاء . من القواطع . لم يسجل رؤية أى نوع منها بعد في مصر . ولذلك لا داعي لذكرها بالتفصيل .

جنس أبي مغازل (أبو ساق) Genus (Himantopus) Plover Family

تتميز طيور هذا الجنس بطول السيقان للغاية طولاً ملحوظاً وهي حمراء ، والمتنار مستقيم ، ومعظم الفخذ عار من الريش ، ليس له أصبع خلفي في القدم . أطول القوائم الأولى . له خيطان على الذيل على هامشه في كل الأنواع . الأرجل تمتد خلف الذيل في طيرانه . موطنه البرك والمستنقعات وشواطئ الترع والمياه الداخلية الناتية عن عيون الناس ، تعيش في جماعات ولا ترى فرادى إلا قليلاً ، كما ترى مثني في فترة التزاوج ، أليفة لا تخشى الناس ما لم تطارد . طعامها الحشرات والقواقع والأسماك الصغيرة والديدان والقشريات الخ تأكل كل ذلك من الماء أو تنقب عنه في باطن الطين . العيش في حفرة في الأرض فوق مستوى سطح الماء الذي تقيم بجواره ، يبني عشه من الأعشاب وسيقان الحشائش ممزوجاً بالطين والحصى وغير محكم ، والبيض من ٣ : ٤ رماد ذوات بقع . والحضانة بالأنثى ، من ٢٥ إلى ٢٦ يوماً والاطعام بالأنثى حوالي ٤ أسابيع ، ويصرخ الأبووان صراخاً عالياً إذا ما اقترب إنسان أو حيوان من عشهما . أنواعه كثيرة منتشرة في كل العالم . نوع واحد منه في مصر .

أبو مغازل (أبو ساق)

Black - winged Stilt

Himantopus himantopus himantopus ..

Plover Family

الوصف : الطول حوالي ١٤,٥ بوصة . انظر لوحة (٦٠) شكل (٩)

الموطن : من الأوايد ومتجول ومن القواطع أيضا : يتوالد صيفا في أسبانيا وجنوب فرنسا وشمال شرق البلقان كذلك في بعض أقاليم غرب أوروبا مثل النمسا وألمانيا وسويسرا وهولندا والدنمارك وفي صقلية ورومانيا وحول بحر قزوين وأرال وشمال إفريقيا ووسطها بل وجنوبها ومدغشقر وفي وسط آسيا وجنوبها في سيلان وشمال الهند وجنوب ووسط آسيا بعيدا شرقا إلى الصين والملايو . البعض يهاجر إلى حوض البحر الأبيض المتوسط صيفا فيصل له في مارس وأبريل ويبقى إلى أواخر نوفمبر ، والبعض يهاجر شتاء على كلا جوانب سواحل إفريقيا ومدغشقر وشمال غربها . وهو أليف جدا في الهند يشاهد فيها في أسراب .

في مصر : يقيم فيها طول السنة في قنال السويس ووادي النطرون والفيوم والدلتا ولم يشاهد في سيناء . ويزداد في الربيع والخريف حيث يرى في أسراب كبيرة في الفيوم .

مميزاته وعاداته : أهم ما يميزه هو رجلاه الطويلتان الحمراء ، وأجزاؤه العليا سوداء والسفلى بيضاء . الباقي كالجنس يمتاز الذكر عن الأنثى بسواد قنته وقفاه .

جنس النكّات (ريكوفير وستر)

Genus (Recurvirostra) = Avocet

تمتاز طيور هذا الجنس بالمقار الطويل الرفيع المنحني طرفه لأعلى - كما أن المنخر على هيئة شق . أصبع القدم الخلفي صغير يكون موجوداً وتارة متعددا ، كما أن أصابع القدم ذوات أغشية من منتصفها فقط . أبقع اللون عادة والبعض صدره أحمر قسطنطيني فاتح كالأمركي . الجناح مدبب متوسط الطول . أطول القوادم الأولى ، الذنب قصير مكون من ١٢ ريشة .

وهي طيور مائية بحتة بحرية لا تفارق شواطئ البحر أو البحيرات الداخلية ، تعيش في جماعات وتخشى الاقتراب من الناس ، كما أنها قد تختلط بغيرها من الطيور الخواضة طعامها الحيوانات المائية الرخوة كالقواقع والحلمايات والديدان ويرقات الحشرات . العش على سطح الأرض مباشرة بين المروج وأدغال الحشائش وتارة وسط حقول الحنطة بشرط قربها من الماء . البعض من ٣ : ٤ ، والحضانة بالاثنتين . لون البيض رمادي أصفر شاحب به بقع سوداء ، والحضانة من ٢٤ : ٢٥ يوما .

وهو على ٨ أنواع منتشرة في كل بقاع العالم ، منها الآن ٧ على قيد الحياة . وواحد فقط في مصر . وعائلة هذا الجنس (Recurvirostridae) Family تحتوي على ٤ أجناس تشمل ٨ أنواع .

وسمى بذلك لأنه ينكت الرمال والطين بمنقاره بحثا عن الديدان والحشرات كما سماه بذلك أحمد فارس .

النكات (أبوجت) = الطنان

Avocet

Family (Recurvirostridae)

Recurvirostra avocetta

Avocet Family

الوصف : الطول : حوالى ١٨ بوصة . أنظر لوحة (٦٠) شكل (١٠)

الموطن : منه المقيم طول السنة (الأوبد) ومنه المهاجر والمتجول : يتوالد صيفا حول سواحل الدغمارك وبحر البلطيق الجنوبي وفي هولندا كما أنه يقيم طول السنة في أحياء من حوض البحر الأبيض المتوسط (شمال اليونان وشمال البلقان وسواحل البرتغال وأسبانيا وعلى حافة البحر الأسود وقزوين وآرال وجنوب فرنسا وسردينيا وصقلية) . كذلك يتوالد صيفا خلال آسيا في منغوليا والصين ، ويهاجر منه أفراد شتاء إلى سيلان وجنوب إفريقية عند الكاب والبعض يقيم في جنوبها طول السنة كذلك عند إفريقية الاستوائية ، وظهر متجولا في فارس وقناريا والرأس الأخضر .

في مصر : يمر على مصر في الربيع والخريف ، وبعضه يقضى الشتاء فيها في هجرة الخريف ، وهو قليل الوجود وصدته أنا بنفسى في صيف ١٩٤٠ في يونيو ويوليو وأغسطس من بحيرة ملحة (ملاحة) بجوار الطريق الزراعى عند إدكو وصدت كذلك في ١١ يوليو سنة ١٩٤٠ وأيضا من بحيرة صغيرة عند (مياح) ^(١) في ١٦/١١/١٩٤٦ في الساعة ١١ر٥ صباحا ، وهذا دليل على أنه يقيم أيضا طول السنة في مصر ، كما يشاهد كذلك على طول بحيرات قنال السويس (المنزلة والبحيرات المرة والتمساح) وكذلك البرلس .

والطيور التى تتوالد في شمال أوروبا تهاجر شتاء إلى الجنوب في إفريقية وفلسطين وفارس ، وإفريقية الاستوائية والجنوبية .

مميزاته وطباعه : كالجنس ، غير أن أهم ما يميزه هو لونه الأبيض (أى المكون من لونين : أبيض وأسود) كذلك منقار المنحنى طرفه إلى أعلى وهى ميزة ليست في غيره من الطيور الخواضة المصرية . يسبح في الماء إذا صادفه ماء عميق . يسميه الإنجليز بالعواى (Yelper) نظر لصوته الذى هو أشبه بنباح الكلاب يردده عند الخوف والنداء . الشقان متماثلان في اللون .

جنس البقويقة (ليموزا)

Genus (Limosa .) Godwite.

Sandpiper Family

هى طيور خواضة كبيرة ، لا يكبرها إلا كروان الغبط Curlew طويلة المنقار ، يرتقلى القاعدة ، مستقيم أو منحن قليلا لأعلى عند الطرف . الفك العلوى أقصر بقليل من طول الفك السفلى أطول القوام الأولى ، الذيل مربع الشكل أو مستديره مخطط أو كله بلون واحد . وبالساق حراشيف

إصبع القدم الخلفى كاملة النمو ، والأقدام مكونة من ٤ أصابع ، موطنها المناطق الشمالية من أوروبا وآسيا صيفا وتهاجر شتاء إلى الجنوب وشوهدت متجولة شاردة في جرينلند .

(١) بين إدكو والبصيل .

وهي حذرة مادامت في أسراب ، تخوض المياه حتى صدرها . طعامها الحشرات والديدان والحيوانات المائية القشرية والرخوة والقواقع وكذلك الحلازين وصغار الأسماك . العش حفرة في مكان مرتفع أو في وسط المستنقعات أو في أرض رطبة عامة . يبني عشه من سيقان النباتات والحشائش . البيض ٤ رمادية مصفرة أو خضراء زيتونية بها بقع مختلفة من الرمادي والبني . الحضنة بالاشتراك والتناوب وهي حوالي ٢٤ يوما .

وهي ٤ أنواع منها في العالم . نوع واحد شائع الحلول في مصر ، والآخر نادر الرؤية فيها .

بقويقة سوداء الذيل
Black - tailed Godwit
(*Limosa limosa limosa* .)

الوصف : الطول حوالي ١٧ بوصة . انظر لوحة (٦٠) شكل (١٤)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في النصف الشرقي من وسط أوروبا إلى غرب آسيا ، (غرب سيبيريا جنوب خط عرض ٦٠° شمال وفي التركستان إلى جبال التاي) تهاجر شتاء إلى الجنوب في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى السودان والحبيشة وشمال إفريقيا وجنوبها ومصر ، وفي آسيا في الهند وسيلان . وتجولت في جرينلاند وغينيا وناتال .

وفي مصر : شائعة الحلول شتاء ولم تسجل من سينا ، وتشاهد من سبتمبر إلى أواخر إبريل .
مميزاتها : الذيل أسود اللون صيفا ، المنقار مستقيم وليس منحنيًا لأعلى كاللاني ذكرها ، الصدر أحمر صاديء ، أما في الشتاء فلونها العام رمادي (رمادي فاتح من أسفل وغامق من أعلى) والذيل أسود كالصيف والمنقار كالصيف الباقي كالجنس يشق الجناح خط أبيض طولي .


بقويقة موشمة (مخططة) الذنب
Bar - tailed Godwit


(*Limosa lapponica lapponica* .)

الوصف : الطول حوالي ١٦ بوصة . انظر لوحة (٦٠) شكل (١١) .
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شمال أوروبا وآسيا وتقضى الشتاء في إفريقيا وجنوب آسيا في الهند .

في مصر : لم تسجل في مصر ، رغم أن البعض رأى أفراداً منها سابحة في سماء مصر ووطن أنها هي وربما اختلط عليه الأمر .


مميزاتها : كالسابقة في كل شيء غير أن المنقار منحني قليلاً لأعلى وأقصر قليلاً من السابقة وهي أشحب لونا في الشتاء من السابقة ، ولونها في الربيع أحمر صاديء . المنقار في الأنثى أطول من منقار الذكر .






Great Snipe

عدد ريش الذيل ١٦ ريشة




Common Snipe

عدد ريش الذيل ١٤ ريشة



Palla's Grasshopper Warbler.




Scul-warbler.



بالغ صيفا




ملحق لما في لوحة (٦٤)



Common Gull.

بالغ صيفا

ص ٣٤٦



جنس كروان الماء (نرمنيوس)

Genus (Numenius.) = Curlew

Sandpiper Family .

يشمل هذا الجنس الكروان الغيطى المعتاد والصغير والرفيع المنقار ، وهو أكبر من الحجم المتوسطة للطيور الخواضة .

الأجسام متوسطة الأحجام . المنقار طويل ومنحن ورفيع ينذر أن يكون غليظ الطرف . تتكون القدم من ٤ أصابع ، والأصبع الخلفية نامية والوسطى أقصر من الساق ، والساق أطول من إصبع القدم الوسطى ، ومغطى بحراشيف سداسية الشكل من الخلف ، أما من الأمام فالحراشيف مستطيلة وتعم جزء منه فقط . أطول القوائم الأولى . الذيل مستدير وفي غاية الصغر . الأجنحة طويلة ومدببة ، الذيل من ١٢ ريشة .

وهي طيور وجلة حذرة تعيش في جماعات صغيرة مختلطة مع غيرها من أبناء جنسها وفصيلتها على السواحل إمعانا في الحرص والحذر وتارة في المستنقعات والمياه الداخلية . تمشي على الأرض مشيا خفيفا واسعة الخطوات ، تخوض الماء إلى صدرها وتسبح جيدا . العش حفرة مبطنة بالقش الخ . البيض عادة ٤ بيضات توضع من إبريل إلى مايو لونه أخضر زيتوني به نقط بيضاء . الحضانة ٣٠ يوما . إذا اقترب أحد من العش راقبه وصاح بصوت مرتفع هكذا Cour-lieu ومن ذلك أخذ اسمه وهذا في الإنسان والماشية أما الصقر والغراب والنورس فإنه يطاردها ويهاجمها جمعا بحدّة . الطعام كالفضيلة غاما من الديدان والحشرات والقواقع والقشريات والحيوانات الرخوة البحرية والهلالية الخ . الإناث أكبر من الذكور جسما .

٩ أنواع منه تقطن في نصف الكرة الشمالي من العالم . يهاجر شتاء إلى نصف الكرة الجنوبي . في مصر منه ٣ أنواع فقط .

كروان الماء الغربى

Curlew (Western Form .)

(Numenius arquata arquata .)

الوصف : الطول حوالى ٢٣ بوصة . انظر اللوحة (٦١) شكل (١)
الموطن : من الأوايد وبعضه من القواطع : يتوالد صيفا في وسط وأقصى شمال أوروبا عند خط عرض ٥٧° شمالا (حول خليج فنلندا وبحر البلطيق وسواحل النرويج والجزر البريطانية) كذلك في غرب آسيا في جنوب روسيا . ويقطع الشتاء إلى وسط وجنوب أوروبا وجنوب آسيا وكل إفريقيا لغاية الكاب ومدغشقر . وقد تحول صدقة في أمريكا الجنوبية .

في مصر : شائع فيها في كل مكان وخاصة الدلتا والفيوم ووادي النطرون وسواحل غرب الإسكندرية وساحل البحر الأحمر . وهو نادر في سينا . فيشاهد من آخر ديسمبر إلى مايو . وشوهد صدقة في قنال السويس في يونيو .

مميزاته وطبائعه : أكبر الطيور الخواضة جسما ، وهو أكبر زملائه في الجنس وأطولها منقارا ، ليس لرأسه خطوط بنية غامقة كعلامة له كالتى في الكروان الغيطى الصغير ، يظهر وهو طائر كأنه نورسة متوسطة الجسم ويكون مصحوبا بصوت وضربات أجنحة بطيئة ، يوجد منفردا ونادرا في جماعات ، يسبح جيدا في الماء ، يتناول طعامه ليلا ونهارا ، يبرز رأسه عند وقوفه ، يغشى المياه الداخلية وسواحل البحار . الأنثى أكبر من الذكر .

كروان الماء الشرقى

(Curlew (Eastern Form)

(Numenius arquata lineatus .)

Sandpiper Family

الوصف : الطول حوالى ٢٥ بوصة . انظر لوحة (٦١) شكل (٤)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في شمال آسيا ويقضى الشتاء في جنوبها وسواحل إفريقية الشرقى .

في مصر : يوجد بالمتحف الحيوانى بالجيزة واحد حصل عليه من الفيوم في ١١ مارس سنة ١٩١٧ .

مميزاته : كالغري السابق تماما غير أنه أكبر منه بكثير وخاصة في طول منقاره ، أعلاه أشحب من السابق وأقل في العلامات من أسفله .

(١) كروان الماء الصغير الغربى (هومبرل)

(Whimbrel (Western Form .)

(Numenius Phaeopus Phaeopus .)

Sandpiper Family

الوصف : الطول حوالى ١٨ بوصة . الأنثى أكبر من الذكر . انظر اللوحة (٦١) شكل (٢)
الموطن : من القواطع ، والبعض الآخر من الأوابد : يتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا عند خط عرض ٦٩° شمالا ، كما أنه يتوالد في انحاء من شمال روسيا حيث يقيم فيها طول السنة ، كما أنه يتوالد في غرب سيبيريا . يقضى الشتاء على سواحل إفريقية حتى الكاب كذلك في مدغشقر وغرب الهند وموريتيوس وعلى طول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وبحيرة ألبرت وفي حوض البحر الأبيض المتوسط . وقد تجول في جزيرة جان ماين وجرينلند واسبتزبرجن صيفا ، وأزوره وماديرة وقناريا شتاء وكذلك شرق أمريكا الشمالية .

في مصر : شائع فيها على ساحل الدلتا الشمالى في سبتمبر ، كذلك في الربيع في مايو ولكن أقل من الخريف ، ولم يعثر عليه في سيناء .

(١) يسميه الأمريكان Hudsonian curlew ويميزه الخط في وسط القنة بطولها

مميزاته : كالسابق ، يشق القنة خط أسود بني مميزة له ، ردفه أبيض ، صوته هكذا تقريبا Whimbrel ومنه أخذ اسمه يردده مرارا حوالي ٧ مرات ويسميه الإنجليزى ذا النغمات السبع ، ضربات أجنحته أسرع من السابق . ماواه كالسابق والباقي كالجنس .

كروان الماء رفيع المنقار

Slender - billed Curlew .

(Numenius tenuirostris)

الوصف : الطول حوالي ١٨ بوصة . انظر اللوحة (٦١) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في إقليم الاستبس الرطب من أقصى شمال أوروبا وغرب
سيبيريا وسهول الخزر من جنوب روسيا ، يقضى الشتاء في حوض البحر الأبيض المتوسط والسودان
وميسوبوتاميا ووسط وغرب أوروبا .

في مصر : يندر رؤيته في مصر ، وشاهد صدفة في الفيوم .
مميزاته وعاداته : المنقار طويل ورفيع كزملائه - أطول من الكروان الغيطي الصغير وأصغر من
الكروان الغيطي المعتاد . الأجزاء السفلى بها نقط بنية غامقة كثيرة الشكل . الباقي كغيره .

جنس البكاشينة (كابيللا)

Genus (Capella) = common & Double Snipe

Sandpiper Family

تحتوى فصيلته على ٧٥ نوعا تشمل زمار الوحل وديك الغاب والبكاشينة تشمل طيوره البكاشينة
العادية والكبيرة ، وتمتاز بطول المنقار طولا ملحوظا ، ! حيث أن طوله أكثر من طول ضعف الرأس .
قاعدة الفك العلوى مستعرضة قليلا بمقدار $\sqrt{3}$ طول المنقار . العين كبيرة ومكتنبة عند منتصف الأذن أن
الأذن تحت وسط العين وليست خلفها كما هو الحال في باقي الطيور . الجزء الأسفل من الفخذ عار من
الريش . الساق بها حراشيف مستطيلة من الأمام والخلف . ليس لها أغشية في أصابع القدم ، والأصبع
الخلفية نامية . أول قادمة هي الأطول . الذيل قصير من ١٤ : ٢٦ ريشة . يوجد منها في العالم ٦
أنواع ، وفي مصر منها أثنان فقط .

العش بين أدغال المستنقعات . البيض ٤ . والحضانة ١٩ يوما إلى ٢٤ يوما .

(١) البكاشينة المعتادة

Common snipe = Full Snipe (Continental Form)

(Capella gallinago gallinago)

الوصف : الطول حوالي $10\frac{1}{4}$ بوصة . انظر اللوحة (٦١) شكل (٧) .
الموطن : من الأوباد والبعض من القواطع : تتوالد صيفا في شمال شرق أوروبا ، كذلك في
شمال آسيا جنوب خط عرض ٧٠° شمالا في سيبيريا شرقا إلى ينساي وجنوبا إلى ياركاند .
بعضها يقيم طول السنة في أيسلند والجزر البريطانية وشمال غرب أوروبا وفي حوض البحر الأبيض

(١) اسمها في أمريكا الشمالية Wilson's Snipe

المتوسط في جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقية ، على أنها تتوالد صيفا في هذه المواطن أيضا ، والبعض منها يهاجر جنوبا شتاء ، كما أن البعض يأق عليها شتاء من شمال شرق أوروبا . تقضى بعض الأفراد الشتاء في أزورة وماديرة وقناريا وفي إفريقية حتى خط الاستواء ولا تبعد عن النيل الأبيض جنوباً ، كذلك تشتت في جنوب آسيا في الهند وسيلان وأسام وبورما والملايو والعراق وشمال إفريقية .

في مصر : ينذر رؤيته في مصر ، وشوهد صدفة في الفيوم .
تتجول أحيانا جنوب الحبشة والصومال .

في مصر : شائعة جدا فيها وفي سينا شتاء من أواخر سبتمبر وتمكث حتى ترحل نهائياً من البلاد في أواخر إبريل . شوهدت في الواحات الداخلة والخارجة وأكثر ما توجد هو في الدلتا .

مميزاتها وعاداتها : متقارها الطويل ، القنة بها خطوط بيضاء وبنية داكنة ، الأجزاء السفلى بيضاء بها قليل من الخطوط الداكنة على الخاصرة . الذيل كله بني صاديء لا أثر مخلوط فيه للبياض أشهر طيور الصيد عند الهواة لصعوبة صيدها عندما تهب مفزوعة من مكمنها ثم تلتوى مباشرة في طيرانها يمينا وشمالا ولا تستقيم إلا بعد أن تبعد مسافة كبيرة تعلو بعد ذلك في الجو . ولذلك يوصف بها الصياد الماهر في صيدها . موطنها المستنقعات والمواطن الرطبة ذات الحشائش الكثيفة التي تمكثها من مداراتها ، ولا توجد في الأرض العارية من الأعشاب ، كما أنها توجد بكثرة في أكتوبر بين نبات القطن المروى حيث يمكنها أن تسير الطين وتستخرج منه الديدان من باطنه وتتوارى بين نبات القطن . إذا طارت اصططبت صوتها ، ريش الذيل ١٤ ريشة بخلاف الكبيرة فريش ذيلها ١٦ ريشة ، والشنقب (البكاشينة الصغيرة) ١٢ ريشة وهذه ملاحظة هامة جدا تنشيط عند الغسق والفلس . أهم طعامها الديدان الحمراء من باطن الطين وقد تأكل في الطقس البارد بعض الحبوب .

البكاشينة الكبيرة

Great Snipe = Double or Solitary or Fan tailed Snipe .

(Capella media .)

الوصف : الطول حوالي ١١ بوصة . انظر اللوحة (٦١) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شمال أوروبا وفي الترويح وشمال غرب آسيا ، وتقضى الشتاء من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الكاب في إفريقية في جنوب آسيا .
في مصر : ينذر أن تشاهد في مصر في هجرتها لها سواء في الاعتدالين أم الشتاء .

مميزاتها وطبائعها : الريش الأبيض في جوانب الذيل ، كما أن أجزاءها السفلى بها خطوط بنية داكنة كلها تقريبا على البطن ، كذلك فإن عدد ريش الذيل هو ١٦ الخ ما في الملاحظات السابقة . تغشى المواطن أقل رطوبة من العادية السابقة وهي أثقل منها نهوضا عند طيرانها وأقل كذلك روغانا منها في طيرانها الباقي كالسابقة — لا تلتوى في طيرانها مجرد قيامها من مجثمها كالعادية والصغيرة في اتجاه واحد تقريبا . وإذا طارت تكون بدون صوت عادة .

جنس (البكاشينة الصغيرة) لينموكريبيتس

Genus *Lymnocyrtus* = Jack Snipe .

يمتاز هذا الجنس بصغر جسمه . ريش وسط الذيل أطول قليلا من باقيه وهو مذهب قليلا . الذيل من ١٢ ريشة . المنقار عند القاعدة أعلى بكثير من العادية وضخم وضيق جدا من وسطه . ريش وسط الظهر أخضر لامع .

يختلف عن العادية بفروق تشريحية في المحقن وعظم القفص والأعضاء الداخلية . سلوكها كالعادية . البيض والتوالد كالعادية نوع واحد يقطن العالم (أوروبا وآسيا - ويشترى الهند وإفريقية وجنوب أوروبا) ولا يوجد في أمريكا .

البكاشينة الصغيرة

Jack Snipe .

(*Lymnocyrtus minima* .)

الوصف : الطول حوالي ٧ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٦١) شكل (٦) .
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا في شمال الدائرة القطبية الشمالية ، كذلك في سيبيريا عند خط عرض ٧٠° شمالا وشرقا إلى كوليبيا في شرق آسيا . تقضى الشتاء جنوبا إلى الهند والصين وإفريقية لغاية جنوب خط الاستواء بقليل . كذلك في بورما . وقد تزور اليابان والصين ولكن ذلك نادر :

في مصر شائعة جدا شتاء في كل مكان رطب من شمالها إلى جنوبها وفي سينا من آخر أكتوبر إلى منتصف إبريل ، وسجلت من الواحات الداخلة .

مميزاتها وطبائعها : صغيرة الجسم ، ريش الذيل ١٢ ريشة فقط ، الظهر لامع باخضرار جذاب . توجد منفردة دائما ، تهب مفزوعة من مكانها وتلتوى قليلا ثم لا تغير بعيدا ثم تضع ثانية في مكان قريب وتكون بلا صوت .

فصيلة الخوليات

Family (Rostratulidae) = Painted Snipe

يعرف من هذه الفصيلة ٣ أنواع يوجد منها الآن ٢ تقطن استراليا وأمريكا الجنوبية وكل إفريقية جنوب الصحراء الكبرى ما عدا الكونغو ، وعلى طول وادي النيل والصين الهندية والملايو والهند وإيران وآسيا الصغرى وكوريا وسومطره .

جنس الخفولى (رُستراتولا) البكاشينة المزوقة

Genus (*Rostratula* .) = Painted Snipe .

Painted Snipe Family Rostratulidae

يقطن طيور هذا الجنس إفريقية ومدغشقر وجنوب آسيا واليابان وفرنموزا والفلبين واستراليا وتسمانيا وأمريكا الجنوبية . طول المنقار ضعف طول الرأس منحني قليلا لأسفل عند الطرف . القدم يحتوي أصابع قصيرة نسبيا والأصبع الخلفي أعلى قليلا منها ، وليس بالأصابع أغشية بل منفصلة تماما عن بعضها . الساق متوسطة الارتفاع الجناح عريض . أطول القوادم الثالثة . الذنب مستدير تقريبا

مكون من ١٢ : ١٤ ريشة . الإناث أجمل لونا من الذكور وأكبر قليلا منها . مأواها المستنقعات مثل البكاشينة العادية تماما ، وزيادة على ذلك فهي تأوى إلى مواطن الغابات وبين الأدغال . طيور ليلية ترعى ليلا فلا تظهر إلا بعد الغسق ، ولا تتحرك إلا في حماية النباتات التي تداريها ولا تظهر في العراء إلا نادر ومرغمة للاجتيار أو العبور ثم لا تلبث أن تعدو سريعا لتتوارى ثانية . سرعة العدو على الأرض الصلبة والطينية ، كما أنها تجيد السباحة ، ضعيفة الطيران . طعامها كالبكاشينة تماما بتمام . البيض يوضع في أبريل ومايو وهو ٤ بيضات لونها بني مصفر كلون الحصى - يقع بنية داكنة كبيرة ويعتنى بالعيش أكثر من زملائه من الطيور الخواضة فيكون عمقه كبيرا في الأرض بين السمار والحشائش الكثيفة أو القصب ويبطن بالأعشاب الناعمة ، وفي جنوب إفريقية يضع البيض على الأرض في الحفر بدون تبطين ، والحضانة من الذكر فقط .

الساق بها حراشيف مستطيلة من الأمام والخلف .
يعرف من هذا الجنس ٣ أنواع يوجد منها الآن على قيد الحياة نوعان يقطنان ما ذكرناه . نوع واحد منه في مصر . الجنس ٢ .

الخلوى (البكاشينة المزوقة)

Painted Snipe

Painted Snipe - Family

(*Rostratula bengalensis bengalensis*)

الوصف : طول الذكر حوالي ٩ ١/٢ بوصة وطول الأنثى حوالي ١٠ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٦١) شكل (٨) .

الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة حيث تتوالد صيفا في كل إفريقية ومدغشقر وأسيا الصغرى وجنوب بلاد العرب والعراق وفارس والهند والصين .

في مصر : تقيم بها طول السنة وخاصة في الفيوم وأجزاء من الدلتا من دسوق إلى مصب رشيد على ضفة النيل الشرقية في الأرياف في المستنقعات ذات الحشائش القصيرة ، حيث تكثر شتاء وتقل صيفا .

مميزاتها وعاداتها : مثل جنسها المذكور سابقا .
توالدها : ذكر في الجنس أيضا .

جنس ديك الغاب (حمار الحجل) اسكولوباكس

Genus (*Scolopax* .) = Woodcocks .

Sandpiper Family

يشمل هذا الجنس ديك الغاب الذي يسميه أيضا بعض الصيادين البكاشنة نقلا عن اللفظ الإيطالي *Becaccia* ثم حرفت إلى بكاشنة ، على اعتبار أنها من صروب البكاشين . المنقار طويل مثل البكاشين ولكنه أغلظ قليلا من مناقيرها . الأذن مثلها تحت العين . العين كبيرة للغاية . الجناح مستدير عن جناح البكاشينة . أطول القوادم الأولى والثانية وهما متساويتان تقريبا . الذيل ١٢ ريشة . يغطي الريش كل الفخذ . أصبح القدم الخلفية نامية ، المنقار مستقيم لين مرن حساس يمكنه أن يحرك طرفه .

مأواه المواطن الرطبة ذوات الحشائش الطويلة والغابات . جم الحذر لا يظهر في العراء نهرا بل يستقر في سكون إلا إذا أزعجه أحد ، ينشط عند الغسق ، لا يستطيع العدو على الأرض . متوسط الطيران ، طعامه الديدان الحمراء التي يسير من أجلها الطين بحثا عنها ، كذلك الحشرات واليرقات بين روث المواشى ، وبعض الثمار البرية .

العش في وسط الغابات خلف الأشجار أو بين الحشائش النامية ، وهو عبارة عن حفرة في الأرض تبطن بناعم النبات الجاف . البيض ٤ شاحبة ذات بقع بنية داكنة ورمادية . والحضانة ٢٠ يوما وهي للإناث وحدها .

يوجد منه في العالم نوعان في أوروبا وآسيا وأمريكا . نوع واحد منه في مصر . لا يوجد في أقصى جزائر شمال أوروبا . وتجول في أيسلند ، وماديرة وقناريا .

ديك الغاب (البكاشة) = حمار الحجل

Woodcock (Palaearctic Form .)

(Scolopax rusticola rusticola .)

الوصف : الطول حوالي ٢٤ بوصة . انظر لوحة (٦١) شكل (٩)
الموطن : من الأوبد والقواطع ومتجول أحيانا : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا أقصى شمالها (شمال اسكندنافيا) وماعدا جنوبها المطل على البحر الأبيض المتوسط) . كذلك في آسيا إلى الهملايا ووسط الصين ويقضى الشتاء في جنوب موطن توالده على جانبي البحر الأبيض المتوسط وفي جنوب فارس وبلاد العرب وجنوب آسيا إلى الهند وسيلان ، والصين واليابان وبورما . كما أنه يقيم طول السنة في الجزر البريطانية وغابات قناريا وماديرة وأزورة ، وتجول على ساحل أمريكا الشمالية الذي يطل على المحيط الأطلسي ، وجرينلند وأيسلند واسبتنبرجن وفارس ، وتتوالد على جبال هملايا صيفا على ارتفاع ١٠ آلاف قدم .

في مصر : يزورها شتاء هي وسينا (شمالها) في أسراب صغيرة وذلك من آخر نوفمبر إلى أوائل مارس ، ويقول مينرتزهاجن أنه لا يشاهد في الدلتا وكان في شمال القاهرة وفي الجزيرة وعند العريش مع أنني شاهدته في بحيرة إدكو سابحا في الهواء فوق القصب (البوص) وصدته بنفسى عام ١٩٤٤ .

مميزاته وطبائعه : كما ذكر في الجنس فتنه مخططة عرضيا باللونين البني الغامق والبني الرملي ، كذلك يمتاز بحجمه الكبير . يهب من مكمنه إذا فزع بطيران سريع وملئ ، وإذا أطلق أحد عليه النيران عند طيرانه هبط إلى الأرض مرة واحدة ولبد بها ثم طار ثانية عند قدوم الإنسان عليه ويلاحظ فيه أن الأذن تقع تحت العين بدلا من خلفها وهي حالة شاذة .

فصيلة آكل المحار (هابوماتو برديداى)

Family (Haematopodidae = Oystercatchers.

Oystercatcher Family

يعرف من هذه الفصيلة ٦ أنواع في العالم ولكن الموجود منها حاليا على قيد الحياة هو ٤ أنواع فقط . تقطن سواحل أمريكا الجنوبية كلها وسواحل أمريكا الوسطى وغرب سواحل أمريكا الشمالية ، وكل سواحل أوروبا المطلة على المحيط الأطلسى ووسط غرب أوروبا وكل سواحل استراليا وكيوتون وكامتشاكا ونيوزيلاند . وهى جنس واحد وهى طيور متوسطة الأجسام ، كبيرة الرؤوس ، والمناقير غليظة طويلة صلبة قرنية منضغطة الجانبين ذات حواف عريضة حادة من طرفها . كما أن الجناح مدبب ومتوسط الطول . أطول القوادم الأولى ، والذنب قصير مستقيم الطرف به ١٢ ريشة ، والقدم قوية متوسطة الطول ذات غشاء جلدى عند اتصالها بالقدم ، وعددها ٣ أصابع قصيرة عريضة والخلفية منعدمة .

وهى طيور ساحلية بحتة يندر أن تتوغل في داخل البلاد أو تبعد عن شواطئ البحار ، ومن العجيب أن أنواعا منها توجد في القوقاز حيث المياه العذبة . وهى لا تجيد المشى على الأرض ولكنها تجيد الطيران وتحب المشاهدة والعراك أكثر من باقى الطيور الخواضة الساحلية .

طعامها كما هو معروف من اسمها - المحارات مثل أم الخلول والحلازين والقواقع والديدان والحيوانات الرخوة البحرية والحشرات من روث الدواب التى ترعى قريبا من الساحل .


العش قرب الشاطئ يتخذ في حفرة في الأرض قليلة العمق ويطن بناعم الطحلب والحشائش ، ويتخذ عادة على الحصى والحصباء أو بين التلال الرملية على مكان من رواسب المحارات والأصواف . البيض من ٣ : ٤ صفراء صافته ذات بقع غامقة . الحضانة من ٢٤ : ٢٧ يوما وهى بالأنثى وحدها ، كما أنها تباح البيض وقت الظهيرة وإذا هلك الأم عنى الذكر بالبيض أو الصغار التى تستطيع الاختفاء والسباحة والغوص .

جنس آكل المحار (هابوماتوبوس)

Genus (Haematopus)

Oystercatchers.

المنقار أطول من الرأس وغليظ وليس مدببا ولكن الطرف على شكل حافة السكين . الذنب مربع قصير ٤ أنواع عالمية نوع واحد منه في مصر . الباقي كالفصيلة .



آكل المحار الغربى
Oystercatcher (Western Form.)
(Haematopus ostralegus ostralegus)
Plover Family

الوصف : الطول حوالى ١٧ بوصة . أنظر لوحة (٦٣) شكل (١) .
الموطن : البعض من الأوبد ، وبعضه من القواطع ، وبعضه متجول : يتوالد صيفا في أقصى شمال أوروبا وآسيا (في ايسلند والبعض يقيم بها طول السنة) – كذلك يتوالد صيفا في فاروس وسواحل أوروبا الشمالية والغربية (من شمال النرويج وسواحل بحر البطلق والجزر البريطانية وسواحل غرب فرنسا واسبانيا والبرتغال) والبعض يزور هذه المناطق الأخيرة شتاء كذلك يتوالد في كثير من المياه الداخلية لأوروبا وعلى طول الأنهار الكبرى من روسيا كما في بحر إيجه والبحر الأسود وقزوين . يزور شتاء جنوب أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، كذلك إفريقيا جنوبا إلى السنغال وفي بلاد العرب وموزمبيق وشمال غرب الهند . قد تجول في جرينلند وماديرة في مصر : نادر الرؤية في مصر ، حصل عليه من وادى النظرون في ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٠ كذلك شوهد في شمال الدلتا في سبتمبر وفي الشتاء وعند بور سعيد والسويس .

مميزاته وعلاماته وطبائعه : أبقع اللون مكون من لونين : أبيض وأسود ، المنقار أحمر برتقالى . يشاهد على ساحل البحر الأبيض المتوسط غالبا في الشتاء وفي الاعتدالين ، لا يرى في المياه الداخلية إلا نادرا .

الباقى مثل الكلام عنه في الفصيلة يطلق عليه كذلك الانجليز اسم Sea-Pie . أى عقق البحر نظرا للونه الأبيض والأسود .

فصيلة الخنكور (Dromadidae) Family

(دروما ديداي) Crab Plover

Family Dromadidae = Crab-Plover Family

هذه الفصيلة تحتوى على نوع واحد منه في العالم ولا ثانى له يقطن الخليج الفارسى وعدن والصومال وسواحل كل الهند المطلة على المحيط الهندى ، وكذلك سواحل كينيا وتنجانيقا المطلين على نفس المحيط وشواطئ البحر الأحمر ، وهى على جنس واحد ونوع واحد .

وهى تمتاز بغلظ المنقار وقوته وهو (المنقار) أطول من الرأس ، عريض من قاعدته ، منحني قليلا عند الطرف العلوى ، الجناح مدبب طويل أطول القوادم الأولى ، والأصبع الخلفية موجودة نامية وعلى الوسطى شرائح جلدية ولها مخلب مسنن . وهى تفضل الجزر المرجانية حيث يتوفر طعامها من الحيوانات القشرية كما هو ظاهر من اسمه الانجليزى طيور السرطان (Crab Plover) (ابو جلمبو) الصغير أو (الخملخل) الذى يعيش على الأرض وينزل إلى البحر ، كذلك على باقى القشريات والحيوانات البحرية الرخوة والحشرات إن وجدها مع الحلازين . العش في حفرة في الأرض تضع فيها الأنثى بيضة واحدة كبيرة بيضاء وقيل إن الأولاد تبارح العش ليلا بحثا عن الطعام مثل الأفراد الكبيرة . وهو حذر يتجنب الإنسان ما استطاع وخاصة إذا كان على انفراد البيضة كبيرة جدا بالنسبة له وهى في حجم بيضة الأوزة المنزلية عندنا ولونها ابيض طباشيرى محدة الطرفين .

جنس الخنكور (دروماس)

Genus (Dromas) = Crab Plover

هذا الجنس كل ما للفصيلة من خواص ومميزات .

الخنكور (طيطوى السرطان)

Crab Plover .

(Dromas ardeola)

الوصف : الطول حوالى ١٥ بوصة . انظر اللوحة (٦٣) شكل (٢)

الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة في جزائر أندمان وكوبار في المحيط الهندي ، كذلك على كل ساحل شبه جزيرة الهند المطلين على المحيط الهندي ، كذلك على سواحل الخليج الفارسي وخليج عدن والساحل الشرقي لإفريقية بعيدا جنوبا إلى ناتال ومدغشقر .

في مصر : يندر رؤيته في مصر . شوهد صدفة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في شمال دمياط وشمال رشيد .

مميزاته وطبائعه : في حجم كروان الغبط الصغير . كل الأجزاء العليا والسفلى بيضاء ما عدا القوادم والظهر فهما سوداوان.بحرى محصن لا يوجد أبدا في المياه الداخلية . المنخر ذو شكل خاص معروف.طيرانه كطيران النحام (البشروش) يمد رقبته ورجليه للأمام وللخلف . الباقي كالفصيلة .

الفصيلة الكروانية

Family (Burhinidae) = Stone-curlews.

Thick-knee Family

تشمل هذه الفصيلة الكروان الجبل الطويل الأرجل ، الجاحظ (المنتفخ) العين ، الكبيرة الحجم المستطيل المنخر الواقع في منتصف المنقار تقريبا . لا يوجد له أصبع خلفية في القدم . الساق بها حراشيف مستطيلة من الأمام والخلف . المخلب في أصبع القدم الوسطى عريض وغلظ من جانبه الداخل . حياته ومعيشته وتحركاته ليلا أو على الأقل عندما يرعى الظلام أسناره ، ويسمع صوته من جوف الليل وينشط خاصة في الليالي القمرية . الفقرات ١٦ فقرة (العنق ١٦ فقرة)

وهي طيور متوسطة الأجسام ، وطول المنقار بطول الرأس تقريبا ، مدب الطرف مقوسه قليلا من الطرف لين القاعدة ، فتحتا المنخر طويلة . الجناح متوسط الطول . أطول القوادم الثانية ، الذنب متوسط الطول ، مكون من ١٢ : ١٤ ريشة ، طويل السيقان غليظها ، ذو ثلاث أصابع أمامية . طعامه الحشرات والفئران ، تقبض على الفريسة بمنقارها مثل الفأرة وتضرب بها الأرض حتى تنهشم ضلوعها وتموت ثم تبتلعها ولذا فهي توصف بالقطة.تنشاحن الذكور في فترة التزاوج وتقتل من أجل الإناث . البيض في حجم بيض الدجاج ، والحضانة من ٢٦ : ٢٧ يوما ويحتمل أن تبيض الأنثى مرتين في السنة ، فزحيتها صفراء كهرمانية ، سريعة العدو ، له خط عرضي أبيض يشق الجناح ، ونارة يكون غير موجود . قال الدوميرى عنه : الكروان سمي من الكرى وهو النوم — سمي بضده والجمع كروان ، العش عبارة عن حفرة في الرمل يصعب الاهتداء إليها توضع فيها بيضتان منقطنان ، وتبارح الفراخ العش بعد خروجها من البيض ولا تعود إليه ثانية ويتعهدها الأبوان بالغذاء ، وتختفى الأولاد في أقرب مكان إذا ما شعرت بأى خطر .

وتستوطن هذه الفصيلة المناطق المعتدلة والحارة من الدنيا القديمة ، والمناطق الحارة من أمريكا الجنوبية . والمعروف منها ١١ نوعا . والموجود منها على قيد الحياة الآن هو ٩ فقط (١) جنس واحد منها في مصر .

جنس الكروان الجبلي

Genus Burhinus = Thick _ knees = Stone-curlew

يمتاز هذا الجنس بأن طيوره تكون مناقيرها أقصر قليلا من طول الرأس ، والأجنحة طويلة مدببة . الشقان متماثلان . الباقي كالفصيلة ، نوعان منه في مصر .

الكروان الجبلي (شكل الصحراء الكبرى)

(٢) Stone-curlew (Saharan Form.)

(Burhinus oedinenus saharae)

الوصف : الطول حوالي ١٦ بوصة . انظر لوحة (٦١) شكل (٣) الموطن : من الأوبد ، ومتجول أحيانا : يقيم طول السنة في الصحراء الكبرى الإفريقية من مراکش إلى سينا ، وفي السودان الفرنسي إلى مصر وسوريا وشمال بلاد العرب والعراق وكرد وقبرص وجنوب فلسطين ، وتجول في الصومال . يتوالد صيفا فيما ذكر كله في مصر : يقيم فيها طول السنة حيث يتوالد فيها ، ولكنه قليل الوجود في مناطقها الصحراوية ، وشوهد في الفيوم ووادي النظرون وغرب الإسكندرية والقاهرة والجيزة والسويس والعريش . مميزاته وطبائعه . مثل ما ذكر في الفصيلة ، ويمتاز بالركبة الغليظة كما يسمه الأنجليز بذلك Thick-knee . يميل إلى الأماكن الفسيحة الصحراوية الحلوة وتارة يرى على الشواطئ الطينية بجوار النيل أو الرملية . يضرب به المثل في صوته الجميل . طرف المنقار أسود فقط .

الكروان الجبلي السنغالي (شكل السودان)

Senegal Stone-curlew (Sudan Form)

(Burhinus Senegalensis assimilis)

الوصف : الطول حوالي ١٥ بوصة . انظر لوحة (٦١) شكل (٤)

الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة في مصر والحجشة والسودان ولا يوجد في سينا . في مصر : يشاهد في الدلتا ومصر العليا ولكن لم يثبت وجوده بعد في واحاتها أو الفيوم ويحتل وجوده في وادي النظرون . ولم يسجل من غرب الإسكندرية .

مميزاته وطبائعه : كالفصيلة ، لا يوجد على جناحه الخطان العرضيان الأبيضان الموجودان في كروان الصحراء السابق . يوجد على سطوح المنازل في قرى ومراكز شمال الدلتا والبيوت القديمة والمهجورة مثل رشيد الخ .

توالده : العش داخل مصر على وجه الصحراء أو الأرض الرملية أو الطينية أو على سطوح المنازل القديمة والمهجورة أو سطوح الحصون والقلاع الخ والبيض يوضع في أوائل إبريل وآخر مارس وأوائل مايو . معظم المنقار أسود

(١) متفرعة من ثلاث اجناس

(٢) اسمه كذلك Thicknee

الفصيلة الجليسية (Family (Cursoridae)
كورسوريدي (Coursers + pratincoles)
Pratincole Family

الموجود منها حاليا في العالم ١٥ نوعا .
تحتوي هذه الفصيلة على الجليل وأبي اليسر ، وتختص بوجود شرائح مستطيلة في السيقان ،
وطرف المنقار العلوي منحن قليلا من الأمام ، كما أن المنخر عبارة عن شق طولي منخفض ، ولحلب
القدم الوسطى مسنن كأسنان المشط ، وأصبع القدم الخلفى موجود أو معدوم ، وعدد فقرات العنق ١٥
فقرة .
يوجد منها ٥ أو ٦ أجناس . ثلاثة منها في مصر .

جنس الجليل (كورسوريوس)
Genus (Cursorius) = Coursers

تشمل طيور هذه الجنس الجليل (كورسار) ذا المنقار الرفيع تقريبا والمنحن قليلا لأسفل ،
والمنقار بطول الرأس تقريبا وهو متوسط الطول وصلب عند طرفه ، كما أن السيقان طويلة والأصابع
قصيرة مزودة بمخالب رفيعة ، والحافة الأنسية (الداخلية) لمخالب الأصبع الوسطى مسننة ، وهو أطول
بكثير من الباقي ، الساق أبيض ليني كأصابع القدم ، الذيل قصير مربع الشكل غالبا ، والأجنحة مدببة
وأول قادمة بطول أو تزيد على الثانية قليلا . المنخر يضاوى منخفض قليلا عند قاعدة المنقار ، وليس له
أصبع قدم خلفي .

تغشى طيوره المناطق الصحراوية والقاحلة التي تكثر فيها الصخور والحصى الملائم لالوانها
فتكسيها حماية طبيعية ، كما نشاهدها عادة في طرق القوافل تنتقى الديدان والحشرات من بحر الإبل
وغيرها من روث الماشية والدواب . وهي طيور أبدة قلما تهاجر ولكنها قد تتجول إلى مسافات بعيدة إذ
شوهدت في أسبانيا وفرنسا . وهي سريعة العدو على الأرض وقلما ترى أرجلها وهي تجري وتميزها ،
وهي تطير إذا طوردت .

يتخذ البيض في حفرة تبطن بقليل من العشب الجاف ، ويكون مكانه في الصحراء او شبه
الصحراء أو في موضع يصعب الاهتداء إليه ، والبيض ٢ رملي اللون به نقط بنية داكنة صغيرة توضع في
مصر عادة في إبريل .

تستوطن طيوره إفريقية وغرب آسيا . ويوجد من هذا الجنس ٥ أنواع في القارتين المذكورتين ،
وفي مصر منه نوع واحد فقط .

جليل كريمي اللون (شكل الصحراء الكبرى)
Cream-Coloured Courser (Saharan Form)

(Cursorius cursor)

الوصف : الطول حوالي ٩ ¼ بوصة : انظر لوحة (٦٩) شكل (٢)

الموطن : من الأوايد ومتجول : يقيم طول السنة ويتوالد صيفا في شمال إفريقيا من الجزائر إلى
مصر ويتبع كل طول خط العرض بحذاء ما ذكر ، كذلك في السودان وسينا وفلسطين وفي غرب آسيا
خلال صحراء سوريا وبلاد العرب والعراق وبلوخستان وشرقا إلى شمال الهند وربما إلى جنوب فارس .
تجول إلى الجزر البريطانية وفي السويد وفنلندا . والدنمارك وهولجاند وهولندا وبلجيكا وفرنسا

وهنغاريا وأسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا وصقلية ومالطة . كذلك يتوالد على سواحل البحر الأحمر وسومطرة .

الذي يتوالد في إفريقية يقضى الشتاء في السودان إلى بحيرة شاد ، والذي يتوالد في الشرق يخترق شتاء الأفغانستان وبلوخستان وغرب ولايات الهند ، والتي تتوالد في شمال أوروبا يهاجر بعضها شتاء إلى جنوبها .

في مصر : يقيم بها طول السنة ويزداد في الربيع والخريف بالأفراد التي تهاجر إليها من الجنوب والشمال ، على أنه يجل شتاء في جنوب الصحراء الكبرى ، وهو يرى كذلك في سيناء .

مميزاته وطبائعه : مثل الجنس ، لونه بلون أرض الصحراء أو شبه الصحراء التي يأوى إليها ، في حجم الكروان الجبل أو أصغر قليلا منه ، يظهر في طيرانه أنه كبير الجسم ، له خط حاجبي أبيض فوق العين ، باطن الجناح أسود يلحظ في طيرانه ، يرى على الأرض كأنه صغير ، طعامه الحشرات والسحالي والجراد في الصحراء . لا يوجد في أسراب بل منفردا أو مثنى أو في عائلات صغيرة .

توالده : ذكر في الجنس

فصيلة أبي اليسر (اليسرية)

Family (Lareolidae) = Pratincoles

Pratincole Family

تحتوي هذه الفصيلة على حوالي ١٧ نوعا توجد في الأقاليم الدافئة من الأستبس والصحارى من أوروبا وإفريقية وآسيا وأستراليا ومدغشقر . وتمتاز بقصر المنقار وهو أقصر من طول الرأس منحنا قليلا من طرفه العلوى ، وفتحتا الأنف بيضاويتان قريبتان من قاعدة المنقار . الجناح طويل مدبب والخواقي بادية القصر والذنب مشقوق وطويل مكون من ١٤ ريشة . أطول الأصابع الوسطى وحافة مخالبها الأنسبة مسننة كالمشط ، والأصبع الخلفية نامية وقد تنعدم نحيب الجرى كما تحس الطيران ، مغرمة بالحياة بجوار المياه الملحة والعذبة على السواء ، غير أنها تتجنب في الصيف شواطئ البحار وخاصة الرملية منها . أطول القوادم الأولى وهي مسالة في فترة التزاوج ، وقلبا ينشعب بينها قتال ولكنها تدافع ببسالة عن البيض والصغار . عدد فقرات العنق ١٥ فقرة . البيض أبيض ملون ، من ٢ : ٣ بيضات والحضانة من ١٧ : ١٨ يوما ، وتتناول الأولاد طعامها من ١١ : ١٢ يوما ثم تطير بعد حوالي ٢٢ يوما ويكمل نموها بعد أربع أسابيع . تبيض الأنثى مرة واحدة في السنة . والعش قرب الشواطئ والمستنقعات وفي المراعى الخالية من الأشجار ، وكذلك في البرارى ، وهو حفرة صغيرة في الأرض مبطنة بأعواد الحشائش اللينة . الساق عار من الريش ، والقدم ٣ أصابع رفيعة متوسطة الطول مزودة بمخالب طويلة مستقيمة مدببة ويصل غشاء جلدى بين الأصبعين الخارجية والوسطى .

تخرج للصيد عادة عند الغسق وتظل تسعى وراء قوتها إلى ساعة متأخرة من الليل .

جنس أبي اليسر (Genus Glareola)
(Pratincole)

تتميز طيور هذا الجنس بأن المنخر بيضاوي يوجد أمام منبت الريش مباشرة ، والساق بها حراشيف مستطيلة من الأمام والخلف (شرائح) . الباقي كالفصيلة .
وهي على ٩ أنواع منتشرة في إفريقيا ومدغشقر وجنوب أوروبا ووسط جنوب آسيا ، وأستراليا .
اثنتان منها في مصر .

أبو اليسر البلياركتك

Pratincole (Palaerctic Form)
(Glareola Pratincola Pratincola)

الوصف : الطول حوالي ١٠ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٦٣) شكل (٥)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب أوروبا وغرب آسيا وقبرص وسوريا وآسيا الصغرى وفلسطين والعراق ، وشمال غرب أفريقية . تحول في غرب أوروبا . يقضي الشتاء جنوبا .
في مصر : شائع في الربيع والخريف من منتصف إبريل إلى أوائل مايو ، ومن سبتمبر إلى آخر أكتوبر ، وإنني أشاهده طول شهر أغسطس في شمال رشيد بجوار النيل ، وشوهد على الساحل الشمالي من سيناء ، مميزات : يظهر في طيرانه كأنه نورسة صغيرة . الزور أبيض خفيف ، أغطية باطن الجناح قسطل أحمر فاخر . يكون ساعة الظهيرة في أسراب صغيرة جالسا على الشواطئ الطينية أو الأراضي المروية . سهل المعرفة . الباقي مثل ما ذكر في الفصيلة والجنس الذيل كذيل الخطاف شوكي .

أبو اليسر أسود الجناح^(١)

Black-winged Pratincole = Nordmann's Pratincole.

(Glareola nordmanni)

الوصف الطول حوالي : ١٠ ١/٢ بوصة أيضا . انظر اللوحة (٦٣) شكل (٦)

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في رومانيا وسهول جنوب روسيا وغرب آسيا وسيبيريا والعراق وسوريا إلى التاي . يقضي الشتاء في أفريقية حتى جنوبها في صحبة السابق ، فيطير على طول ساحل أفريقية من شمالها إلى جنوبها في سبتمبر ويصل إلى أكتوبر وهو سريع جدا في الهجرة .
في مصر : يشاهد فيها في الربيع والخريف في نفس ميعاد السابق .
مميزات وطبائعه : كالسابق ، يمتاز بأغطية باطن الجناح السوداء . وباطن الجناح كله أسود .

(١) اسمه كذلك Swallow Plover وأيضا Collared Pratincole

جنس طائر التمساح (بلوفيانوس)

Genus (Pluvianus) = Crocodile Bird.

تمتاز طيور هذا الجنس بأن طول المنقار بطول الرأس تقريبا ، وهو منحن ، وليس له أصبع قدم خلفية ، وأصبع القدم الوسطى بها غلب مسنن ، كالمشط . أطول القودام الأولى ، أما الثانية فهي أقصر منها بقليل . الخواقي الداخلية تصل إلى طرف الجناح . ريش القفا طويل بشكل الرمح . الذيل قصير ومستدير قليلا .

وهو يستوطن وادي النيل حتى منابعه في إفريقيا الوسطى . وهي طيور آبدية وليست من المهاجرات ولا من المتجولات وإنما تلازم الشواطئ الرملية وحيثما وجد التمساح وهو يصطلي في الشمس فوق الرمال ، ولذا فهي تلازمه دائما وسميت من أجل ذلك باسمه ، وهي لا تحشاه فتراها تنتقل فوق ظهره وتدخل في فمه الذي يفتحه ثم تنقى الفم من الطفيليات وبما يعلق به بين الأسنان من الحشرات التي تؤذيها ويقايا الطعام المتخلفة بين الأسنان ويحرص التمساح على هذه الصداقة فلا يطبق فمه على الطائر خشية ألا يعود زملاؤه من الطيور مرة أخرى إليه . وهي طيور جمة الحذر تنزع من أقل حركة ، طعامها الحشرات والحيوانات البحرية الرخوة والديدان كما تلتهم الأسماك الصغيرة .

البيض ٢ : ٣ بيضات توضع في العراء ، وهي بنية اللون باهته عليها نقط دكناء وقد تغطي البيض بالرمال ، والبيض يدفن البيض في الرمل ثم يرقد عليه بعد دفته ربما كان يقصد حمايته من الشمس أكثر من الرقاد عليه ، وهو كذلك يدفن الأولاد ليس في ساعة الخطر فحسب — ثم يرقد فوقها ليظللها أو لتندية البقعة بالماء . لا يدفن الأولاد كلها بل لغاية رقتها فقط . وقد يتمشى بجسمه على الرمال ، ويغطي البيض بجسمه أيام شدة الحر وهو مدفون خوفا من شدة الحرارة التي تضر البيض من دفته . نوع واحد خاص بأفريقية — والذي أطلق عليه طائر التمساح هو المؤرخ (هيرودوت)

طائر التمساح = الققطاط المصري

Crocodile Bird = Egyptian Plover (Egyptian Form.)

(Pluvianus aegyptius aegyptius)

الوصف : الطول حوالي ٩ بوصة . انظر اللوحة (٦٣) شكل (٧) .
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة ويتوالد صيفا في وادي النيل والسودان وغربا إلى الساحل الغربي وجنوبا إلى أوغندة والحيشة . وكان يتوالد سابقا في مصر العليا ولكنه الآن أصبح نادرا جدا لاختفاء التمساح من وادي النيل . كما يوجد في فلسطين وجزائر قناريا .

مميزاته : مثل الجنس ، يكون كذلك مثنى فوق الشواطئ الرملية ولا يبعد عن الماء مطلقا يطير بالقرب جدا من سطح الماء يتموج مصحوبا بصوت هكذا تقريبا تشي (Chee) . يدخل في فم التمساح الخ . له حزمة سوداء عرضية على صدره ، أجزاءه العليا رمادية مائلة للزرقة وبها لون اسود توالده : كالجنس : أخذ بيضه من يناير إلى إبريل في السودان .

الرتبة النورسية (لارى = لاريفورمس)

Order (Lariformes) = (Lari) = Gulls + Terns + Kittiwake + Shuas (Scissor-Bill = Shimmer)

تستوطن طيور هذه الرتبة كل مواضع الماء الملح في كافة أنحاء العالم ، طويلة الأجنحة المدببة ، وريش القوادم ١١ ريشة والأخيرة بالغة الضمور ، وأطولها العاشرة فتحة المنخر عبارة عن شق صغير الأقدام مكففة والريش ناعم غزير لين . والغدة الزيتية مغطاة بريش شعري . ريش الذنب ١٢ ريشة . الطيران تارة معتدل وتارة متموج . القدم مكون من ٣ أصابع كلها مكففة ، والأصبع الخلفي نام ، تشمل هذه الرتبة كل النورس بأنواعه من كبير وصغير والخرشنة كلها ، والإسكيوا والقشاش (أبو مقص)

الفصيل النورسية (لاريداي)

Family (Laridae) = Gulls + Terns + kittiwake

Skua + Skimmer = Scissor-Bill

Gull Family

يعرف من هذه الفصيلة ٩٢ نوعا ، والموجود منها حاليا هو ٧٨ فقط على قيد الحياة ، تقطن كل الدنيا يابسا وماء ماعدا الصحارى ، ويذكر هافاس أن أنواع الفصيلة عددها ١٢٠ نوعا مضافا إليها الاسكيوا والقشاش . وهذه الفصيلة على ٤ أجناس .

وهي طيور تحيد الطيران للغاية ، بل تقضى معظم وقتها سابحة في الهواء ، ولكنها لا تحيد السباحة ، طعامها الرئيسى هو السمك والحيوانات البحرية الرخوة . عادة تحبب في أسراب وتتوالد في مستعمرات يكسو الكتكتوت زغب سميك ولونه يختلف كلية عن لون الآباء ويمكث في عشه حتى يأنس من نفسه على الطيران . قصيرة الرقاب ، كبيرة الرؤوس ، المنقار متوسط الطول ومستقيم من القاعدة إلى وسطه ثم ينحني قليلا عند الطرف وعلى حافة الفكين نتوءات قرنية حادة . القدم متوسط الطول يحتوى على ٤ أصابع ، الثلاثة الأمامية مكففة ، الجناح طويل عريض ولكنه مدبب . أطول القوادم الأولى . الذنب متوسط الطول مكون من ١٢ ريشة ، وعريض مستقيم وأحيانا يكون مشقوقا ، كما قد تسطيل ريشاته الوسطى عن باقى ريش الذنب . الريش غزير ، وهو في الأجزاء السفلى ناعم لين كالقراء (١) . وهي طيور لا تفارق السواحل والمياه إلا نادرا ومتجولة أو مهاجرة ، وحتى في هجرتها تتبع سواحل البحار والمحيطات وإن بعدت عن السواحل فلا تلبث بعد حين أن تعود إليها . وهي للملاح العلامة التي لا تخطئ والرسول الذي لا يكذب فهي خير مرشد له على أن السفينة قد قربت من البر وكانت هي الدليل لكروستوفر كولومبوس في اطمئنانه إلى وجود بر أمريكا . قد تطير داخل البلاد في أوروبا متتبعه خطوط المحراث لأكل الديدان والحشرات ، ومنها ما يتبع مجارى المياه الكبرى والأنهار والبحيرات الداخلية ويلازمها بل ويفضلها على البحار .

الطيور التي تستوطن الشمال منها هي طيور مهاجرات ، وغيرها متجولة . غذاؤها الرئيسى هو الأسماك ، وتزيد عليه يأكلها الحشرات والقشريات والحيوانات البحرية الرخوة بل وبعض ما تقذفه


(١) . يلاحظ أن الذيل في الناهض به خط عرضى أسود في الطرف أما التابع فذيله كله أبيض (انظر شكل ٤)
لوحة ٦٦ وكل النورس الكبير يكون لونه من أعلاه بيا وهو صغير .



ص ٣٤٥

بالغ شتاء


Yellow-legged Herring Gull



صيفاً

ص ٣٥٠

Little Gull



ذكر شتاء

ص ٣٤٩

Mediterranean Gull



ذكر بالغ صيفاً


Black-headed



ص ٣٤٩

أنثى بالغة صيفاً

Black-headed Gull.



بالغ شتاء


ص ٣٤٨

Glaucous Gull




Kittiwake

ص ٣٥١




ص ٣٤٦

Lesser Black-backed
Gull (Scandinavian)



Whiskered Tern (European Form.)



White - winged Black Tern



Large Sand Plover
= Geoffroy's Plover.

ذيل النورس

(٤)



الناقص



البالغ

البواخر من فضلات اللحوم في البحار ، كما أنها تتبلع صغار الحيوانات دون أن تقتلها وهي طيور متفاوتة الأحجام ، فمنها الكبير الذي في حجم النور ، ومنها للصغير الذي في حجم الزرزور ، وهي تمشي سريعة على الأرض ، كما أنها تحسن السباحة والغوص إلى قعر الماء . وهي طيور جماعية وخاصة وقت التكاثر .

العش من النباتات المائية والساحلية غير منسق الشكل ، والبيض من ٢ : ٣ بنية أو بنية مخضرة بها بقع رمادية وأخرى سوداء . والحضانة بالتناوب وتستمر حوالي ٤ أسابيع . وإذا كان العش بجوار الساحل وجدنا الأبناء تبارح الأعشاش بعد أن تبلغ أشدها ، أما التي تكون على الصخور بعيدا عن الساحل فالأولاد لا تفارق الأعشاش إلا بعد أن تأنس من نفسها القدرة على الطيران .

جنس النورس (لاروس) Genus (Larus) =(Gulls)

يشمل هذا الجنس النورس الأصل (Gulls) . ويمتاز بأن المنقار صلب قوى ، مضغوط من نهايته ، وفكه العلوى ينعطف إلى أسفل وخاصة عند طرفه . المنخر مستطيل ، أصبع القدم الخلفية نامية . الساق بها شرائح مستطيلة من الأمام وبارقيها بها شرائح مربعة الشكل . أصابع القدم بها أغشية كاملة . أول قادمة خارجية هي الأطول . الذيل قصير مربع . الشقان متماثلان ولكن الصغير يختلف كل الاختلاف عن الكبير . معظم الأنواع بحرى محض وبعضه يغشى المياه الداخلية .

حوالى ٤٤ نوعا منه تغشى العالم . في مصر منها حوالى ١٤ نوعا .

النورسة الزرقية

Yellow-Legged Herring Gull .

(Larus Cachinnans)

الوصف : الطول حوالى ٢٣ بوصة . انظر اللوحة (٦٥) شكل (١)

الموطن : من القواطع والأوباد : تتوالد صيفا من شرق البحر الأبيض المتوسط وخليج فنلندا إلى بحيرة بيكال كذلك في جنوب أوروبا ، وفي غرب آسيا ، والبعض يقيم طول السنة في مناطق توالده . تقضى الشتاء في حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج الفارسي والهند والصين واليابان .

في مصر : شائعة شتاء على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المياه الداخلية في الفيوم ووادي النطرون وبحيرات شمال الدلتا ، وفي خليج السويس . ويحتمل أن تقيم طول السنة في كريد كما أنها تتوالد فيها ، ولم يعثر عليها وهي تبيض في مصر أو سينا . رحلة الشتاء من سبتمبر إلى إبريل .

مميزاتها : الأفراد البالغة : الظهر مع الأجنحة رمادي مائل قليلا للزرقة : أطراف ريش القوادم سوداء بها نقط بيضاء (طرف القادمة الثانية أسود ويقر به بقعة بيضاء أو شريط أبيض ، وبقية أطراف القوادم بيضاء) الذنب كله أبيض .

واللون في الصيف لا يختلف عن الشتاء تقريبا ، وتبدأ الخطوط والبقع البنية في الأفراد الصغيرة تزول تدريجيا حتى يأخذ الطائر لونه الطبيعي بعد نموه الكامل بعد ٤ سنوات .

الأرجل صفراء ، أما التي تتوالد في شمال وغرب أوروبا فأرجلها حمراء قرنفلية-Larus cachin-
(nans argentatus).

المقار أصفر ليموني ، وفي طرف الفك السفلي من أسفله بقعة صغيرة فزنفلية حمراء . وهي
النورسة التي تمتاز بهذه البقعة هي والنورسة الصغيرة السوداء الظهر ، والكبيرة السوداء الظهر ، ونورسة
جلوكفص .

نورسة سوداء الظهر صغيرة

(اسكندنافية)

Lesser Black-Backed Gull (Scandinavian Form)

(Larus Fuscus Fuscus)

الوصف : الطول حوالي ٢٢ بوصة . انظر لوحة (٦٥) شكل (٧)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شمال روسيا وشمال أوروبا من إقليم بحر البلطيق إلى
نهر دون ، وعلى سواحل السويد والنرويج ، وتقضى الشتاء في شرق البحر الأبيض المتوسط والجزر
البريطانية ووادي النيل والساحل الغربي من إفريقيا إلى سيراليون ، وفي جنوب أوروبا والبحر الأحمر
والخليج الفارسي وإفريقية الاستوائية في منطقة هضبة البحيرات (فيكتوريا وتنجانيقا ونياسا)
في مصر . كثيرة شتاء فيها وفي سينا على ساحل البحر الأبيض المتوسط والبحيرات الداخلية ، من آخر
سبتمبر إلى أوائل مايو .

مميزاتها : كبيرة الجسم في حجم نورسة الرنجة السابقة ظهرها بني غامق يميل للسواد ، أول قادمة
خارجية بها بقعة بيضاء . الأرجل صفراء أو برتقالية اللون القفا به خطوط . وهي أكبر النورس الذي
يشاهد في مصر في مياه ميناء الاسكندرية وبور سعيد شتاء ، كما أنها أكثر غشيانا لمياه البحر الأبيض
المتوسط من أية نورسة أخرى . تمتاز كذلك كالسابقة بالبقعة القرنفلية الحمراء في طرف اسفل الفك
السفلي .

النورسة الأوروبية المعتادة (١)

Common Gull (European Form)

(Larus-canus canus .)

الوصف : الطول حوالي ١٧ بوصة . انظر اللوحة (٦٤) شكل (٦) واللوحة (٦٢) شكل (٥) .

الموطن : من الأوايد والقواطع : تتوالد صيفا في كل شمال وغرب سواحل أوروبا ، وفي شمال ووسط
روسيا إلى بحر قزوين ، وتخل في سيبيريا عند نهر ينيس . تقضى الشتاء على سواحل وشواطئ
وبحيرات وأنهار بقية أوروبا وجنوب آسيا وعلى كلا جانبي البحر الأبيض المتوسط وفي فلسطين وقنال
السويس ومصر ، وفي بحار الصين والعراق والخليج الفارسي . يقيم بعضها طول السنة في الجزر
البريطانية .

(١) اسمها في أمريكا الشمالية . New Gull وأيضا Short-billed

في مصر : شائعة شتاء فيها على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمياه الداخلية .

مميزاتها وطبائعها : كالفصيلة ، وكذلك أهم ما يميزها أرجلها الخضراء المصغرة قليلا وكذلك المنقار بنفس اللون . الرقبة شتاء بها نقط أكثر من الصيف ، البقعة البيضاء في أطراف القوائم أوضح منها عن نورسة هرنج الزرقى ، في أيام الزواجر والأعاصير تلجأ إلى المياه الداخلية وفيها عدا ذلك لا تفارق البحر الأبيض المتوسط . تتابع في أوروبا خطوط المحراث أحيانا حرصا على التهام الحشرات التي تبرزها المحارث . الطعام من الديدان وصغار الأسماك والقواقع وفضلات اللحوم التي تقذف بها البواخر في الموانئ . التواضع والتي لم يكتمل نموها تكون قوائمها بنية غامقة والظهر بني غامق وحروف (هوامش) ريشه بني فاتح ، والأجزاء السفلى بها خطوط رفيعة ، وطرف المنقار السفلى والعلوى أسود ؛ ولونه (أى المنقار) محمر ، وفي الشتاء بعد أول عام يبدأ الظهر في التحول للون الرمادي ثم يصفر المنقار باختصار بعد تمام النمو . هي أشهر نورسة في مصر ، ترى في مياه النيل الملحة (المأخوذة من البحر المتوسط كما في رشيد ودمياط في فارس وباريل) . وهي صورة مصغرة لنورسة هرنج ولكن ليس لها نقطة حمراء في أسفل طرف الفك السفلى . يميزها كذلك أن الثلاث ريشات الأولى من القوائم أطرافها بيضاء وقبلها من الخارج حروف سوداء .

نورسة رفيعة المنقار

Slender-billed Gull

(Larus genii)

الوصف : الطول حوالي ١٦ بوصة . انظر اللوحة (٦٤) شكل (٢)
الموطن : من الأوبد ، ومتجولة أحيانا . تتوالد وتقيم طول السنة في ساحل إفريقيا الشمالى الغربى ، وخلال البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين وبحر آرال وأزف وساحل الهند وخلال آسيا الصغرى والعراق والخليج الفارسى وساحل مكر شرقا إلى وسط آسيا .
في مصر : ينذر أن ترى فيها . يوجد بالمتحف الحيوانى ثلاثة منها صيدت صدفة من الاسكندرية ، وسجلت من قنا وقنال السويس .

مميزاتها وطبائعها : الشاح شاحب جدا ، البياض في أطراف القوائم الخارجية كبير للغاية . المنقار والقدم لونها أحمر . هي في حجم النورسة سوداء الرأس لكن منقارها أرفع منها بكثير ، كما أن رأسها أكثر بياضا مع الرقبة شتاء عن النورسة العادية . تعرف في إيطاليا باسم النورسة الوردية Rosing Gull (Gabbiano rosea) نسبة إلى اللون الأحمر الوردى الذى يعم الأجزاء السفلى في ريش التوالد ويكون أكثر وضوحا على الصدر .

نورسة أُوْدُون (أُوْدُونِي)

Audouin's Gull

(*Larus audwinii* .)

الوصف : الطول حوالى ١٩ ½ بوصة . انظر اللوحة (٦٤) شكل (٤) .
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في حوض البحر الأبيض المتوسط .
في مصر : نادرة وفي سينا . وحصل عليها من العقبة في ابريل .
مميزاتها : أصغر قليلا من النورسة الزرقية ، أطراف القوادم تظهر سوداء جدا أثناء طيرانها .
تغشى البحار فقط أهم ما يميزها هو أن المنقار أحمر لامع يحيط به قرب الطرف دائر أسود في الفكين والأرجل خضراء زيتونية مسودة .

نورسة الثلج (جلوكس)

Glaucous Gull .

(*Larus hyperboreus* .)

الوصف : الطول حوالى ٣٠ بوصة . انظر اللوحة (٦٥) شكل (٥) .
الموطن : من القواطع ، ومنها ما يقيم طول السنة ، ومنها المتجول . تتوالد صيفا في الأقاليم القطبية من الدنيا القديمة والجديدة ، وتقضى الشتاء في غرب أوروبا وتارة تتجول إلى أن تصل إلى أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط . (التوالد عند خط عرض ٨٠° شمالا في جرينلاند وأيسلند وجان ماين ونوفاياز مليا وكولجيف الخ) — تمتد هجرتها شتاء إلى بحر قزوين (شماله) واليابان في الباسيفيكي ، وفي البحيرات العظمى الأمريكية والمسيسي وشرق فلوريدا وتكساس وكوبا والحويان . وتارة تتجول إلى خليج العقبة . وبعض أفراد في شمال غرب أوروبا تقيم بها طول السنة .
في مصر : نادرة الوجود ، وحصل فيليبس على واحدة في ١٨ ابريل وهو التسجيل الوحيد لها في مصر .

مميزاتها : ليس لريش الطيران سواد مع نقط كالنورس السابق بل كله أبيض على نسق واحد ، كبيرة الجسم في حجم السوداء ، الظهر الكبيرة البالغ أجزاؤه العليا شاحبة للغاية رمادية . لطعة حمراء وردية دموية في أسفل طرف الفك السفلى ، الأرجل حمراء قرنفلية . تختلط مع النورسة السوداء الظهر الكبيرة أحيانا ، التي هي في حجمها تقريبا — القوادم بيضاء .

نورسة كبيرة سوداء الرأس (١)

(نورسة السمك)

(Great Black - headed gull = Fish - gull

(*Larus ichthyaetus* .)

الوصف : الطول ٢٩ بوصة . انظر لوحة ٦٤ شكل ٥ .
الموطن : من القواطع تتوالد صيفا في حوض بحر قزوين والبحر الأسود وجنوب روسيا وشرقا إلى وسط آسيا ، وتقضى الشتاء في شرق البحر الأبيض المتوسط والهند وبورما وسيلان وقبرص وعدن .
في مصر : شائعة في مياهاها ومن بينها الدلتا والفيوم ومصر العليا وقنال السويس والعقبة وأي زنيمة .

(١) وطرف المنقار أصفر .

مميزاتها : كبيرة الجسم ، رأسها أسود في الربيع والخريف وذات لون غامق معتم حول العين وعلى القنة شتاء . منقارها يرتقالي يشقه خط طولي صغير أسود قرب الطرف . الأرجل مائلة للخضرة . شوهدت في الفيوم وهي تهاجم الغرة والغطاس وصغار النورس أثناء تناوله الطعام . قوية المنقار للغاية فإذا عضت إنسانا أراقت دمه من عضتها . تأكل كذلك الجراد والزواحف الصغيرة كالضفادع . وما على شاكلتها .

نورسة البحر الأبيض المتوسط سوداء الرأس

Mediterranean Black-headed Gull .

(Larus melanocephalus .)

الوصف : الطول حوالي ١٥ ¼ بوصة . انظر لوحة (٦٥) شكل (٣) الموطن : تتوالد في شرق البحر الأبيض المتوسط . وهي من القواطع . ومتجولة أحيانا ، إذ تقضى الشتاء في سواحل تونس ومصر وبحر الإديراتيك وأسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا وبحيرات سويسرة وعلى العموم فهي تتوالد في الأجزاء الشمالية من شرق البحر الأبيض المتوسط وفي البحر الأسود ، وبعضها يقيم طول السنة في مناطق توالده والبحر ، الآخر يتجول شتاء إلى الغرب وسواحل شمال إفريقية .

في مصر : تشاهد فيها وخاصة على سواحلها الشمالية من حوض البحر الأبيض المتوسط عند بور سعيد ودمياط والاسكندرية ورشيد والبرلس .

مميزاتها : يمكن أن تختلط بسهولة بالنورسة الأوروبية سوداء الرأس ولكن المنقار أغلظ منها وقوامها بيضاء بدون علامات في البالغ . الرأس لونه صيفا أسود وليس بنيا غامقا . لون المنقار والأرجل أحمر .

النورسة سوداء الرأس الغربية

Black-headed Gull (Western Form) = Laughing Gull

(Larus ridibundus ridibundus .)

الوصف : الطول حوالي ١٥ ¼ بوصة . انظر لوحة (٦٥) شكل (٤) الموطن : من القواطع والأوباد : تتوالد صيفا في أوروبا ومعظم آسيا المعتدلتين الدافئتين ، وتقضى الشتاء في شمال إفريقية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وتصل للسودان والبحر الأحمر والصومال والهند والصين واليابان والملايو والخليج الفارسي منه ما يقيم طول السنة في بريطانيا . في مصر : هي أكثر النورس الذي يزور مصر شتاء وكذلك سيناء . وتظهر من أوائل أكتوبر إلى آخر مارس .

مميزاتها : تغشى المياه الداخلية وسواحل البحار والأنهار ، الرأس ^(١) بني غامق في الربيع والصيف والأرجل حمراء دموية ، ومنقارها أحمر دموي في كل الفصول . أما في الشتاء فالرأس تكون

(١) الرأس - ليس القفا مع الرقة - بني غامق شكولاني صيفا .

بيضاء بدون أى لون غامق يميزها والمنقار والأرجل كما هي ^(١) ، وأيضاً يميزها القوادم السوداء وأطرافها البيضاء في كل الفصول . طيرانها متموج كثيرة في الموانى وأعلى النيل وداخل الدلتا وفي الفيوم . وهي أكثر النورس الشائع في هجرته لمصر الذى يجثم على أرصفة الموانى والصخور وسط المياه وتبحث عن طعامها من القوارب في النيل وهي تصرخ هكذا . Klee — ak . تترده أثناء طيرانها ويندر أن ترى بعيداً عن السواحل تتابع خطوط المحرات في أوروبا . ليست ماهرة في صيد السمك .

النورسة الصغيرة

Little Gull .

(Larus minutus)

الوصف : الطول حوالى ١١ بوصة . انظر اللوحة (٦٥) شكل (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفاً خلال أسيا المعتدلة إلى بحر أختسك وفي شمال شرق أوروبا شرقاً إلى شرق سيبيريا ، وتقضى الشتاء في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين .
في مصر : شوهدت شتاء عند العقبة وبور سعيد والفيوم والإسكندرية ويحتمل أن تكون هجرتها شتاء لمصر نادرة .

بميزاتها : أصغر نورسة على الإطلاق ، باطن الجناح مائل للسود ، للناهض خط عرضى يشق الجناح مائل للسود ويصل للخواقي . ليس للبالغ لون أسود في قوادمه . أليفة ، تكون دائماً بصحبة النورسة السوداء الرأس شتاء . المنقار اسمر بني شتاء ، أحمر دموى في الربيع والصيف ، الرأس أسود فاحم مع دائر أبيض حول العين صيفاً مع مقدم (أى أعلى الرقبة) كل ذلك يبنى غامق مسود ، أما في الشتاء فلا يوجد هذا السواد ، ويكون الرأس في الفنة رصاصياً غامقاً فقط وخلف القفا مع لطة رمادية خلف العين . الأرجل حمراء دموية صيفاً ، وشتاء في البالغ ، وفي الناهض قرنفلى محارى ^(٢) .

المُعْجَمَة (نورسة بيضاء العين)

White - eyed Gull .

(Larus leucophthalmus .)

الوصف : الطول حوالى ١٦ ¼ بوصة . انظر لوحة (٦٤) شكل (١)
الموطن : من الأوبد : تقيم طول السنة حيث تتوالد على طول ساحل البحر الأحمر من العقبة والسويس إلى خليج عدن ولا توجد في أية بقعة أخرى .
في مصر : خاصة بساحل البحر الأحمر وخليج السويس المشرفين على أراضي مصر ، حيث تقيم طول السنة فيها وفي سيناء حيث تتوالد صيفاً .

^(١) هي النورسة الوحيدة Gull التي منقارها وأرجلها حمراء باستمرار . كذلك بالخط الأبيض العريض الممتد من طرف الجناح إلى المنكب تقريباً ويظهر بوضوح في الطيران ، والأرجل قرمزية مائلة للصفرة في الناهض والمنقار قرمزي (يرتقالي طرفه أسود في الناهض) كذلك النورسة الصغيرة أرجلها ومنقارها حراوان وكذلك نورسة رفيعة المنقار - نورسة البحر الأبيض المتوسط .

^(٢) كذلك ما يميزها هو جناحها

مميزاتها : يمكن رؤيتها في أى وقت عند السويس وبورتوفيق وأبي زينة والطور والعقبة . أهم ما يميزها القوسان الأبيضان فوق وتحت العين . الرأس أسود . المنقار برتقالى مصفر وطرفه أسود .

التوالد : يوضع البيض في حفرة في الرمال على سطح الأرض مباشرة تحيطه الأنثى برفيع السيقان وناعم الأعشاب البحرية ولكن البيض يكون ملاصقا للرمال مباشرة ، لونه أصفر شاحب رملي به نقط برتقالية ، وشوهد البيض فوق الجزائر الصخرية وتحت الصخور وهو من ٢ : ٣ بيضات بلون الأرض التي عليها . وهى النورسة الوحيدة التى عثر عليها تتوالد داخل الحدود المصرية .

نورسة هيمبرتش (سويدى) = (المعتممة)

Hemprich's Gull = Sooty Gull

(Larus hemprichii .)

الوصف : الطول حوالى ١٧,٥ بوصة . انظر اللوحة (٦٤) شكل (٣)
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر (جنوب خط عرض جدة) خلال خليج عدن وعلى طول الخط الساحلى لبلاد العرب إلى الخليج الفارسى وبلوخستان وسواحل مكران والسند وجنوبا إلى الساحل الشرقى لإفريقية إلى دار السلام وتنجانيقا وشرقا إلى كرتشى ونادرا في ممباى .
في مصر : نادرة الوجود في نجاها لها .

مميزاتها : البالغ منها لونه بنى وليس أسود اللون ، وليس لها بياض حول العين . بحرية بحته لا تغشى المياه الداخلية أبدا . أليفة جدا في الموانئ حيث تجثم على مراكب النقل (الصندل) وأرصفة الموانئ والصخور الناتئة من المياه .

نورسة الكيتويك = نورسة كيتويك

The Kittiwake .

(Rissa tridactyla .)

Gull Family

ذكر نيقول أنه رأى هذه النورسة في مارس سنة ١٩١٦ خارج بور سعيد غير أن ذلك مفتقر إلى إثبات وربما التبس عليه الأمر لرؤيته لها من بعيد لأنه لم يحصل عليه قط من المياه المصرية . لوحة(٦٥) شكل ٦ تمتاز بمنقارها الأصفر الشمعى وأرجلها السوداء وأطراف الأجنحة سوداء وطولها حوالى ١٦ بوصة . وهى تتوالد في شمال أوروبا عند القطبين وفي غربها الشمالى وأيسلند وسواحل الجزر البريطانية . وتقضى الشتاء في جنوب أوروبا وغربها وجنوبها المشرف على حوض البحر الأبيض المتوسط من أسبانيا إلى إيطاليا فقط . ولا تبعد شرقا عن إيطاليا مطلقا .

جنس الخرشنة (إسترننا) ^(١)

Genus (Sterna) = Terns .

Gull Family

هي عبارة عن أنواع من رتبة النورس غير أنها صغيرة الأجسام ومتوسطتها ، نشيطة دائبة الحركة تقضى معظم نهارها سابحة في الهواء بحثا عن صغار الأسماك والجنينى ، وهي تتجمع في فترات التزاوج جماعات كبيرة في مكان واحد ، وتضع بيضها غالبا على وجه الرمل مباشرة ، أما التي تبيض على الأشجار تتخذ عشها وسط المستنقعات وتقيم لذلك عشا وتبينه من القش وتارة تضع البيضة على ملتقى فرعين مباشرة بين بناء عش . والبيض من ٣ : ٤ بيضات ، أما ساكنات الأشجار فتضع بيضة واحدة فقط . والحضانة في المتوسط حوالى ٢٢ يوما .

وهي تغشى المياه المالحة والعذبة على السواء وأكثر ما تغشى هي المياه الداخلية ويندر أن تغشى سواحل البحار ، كما يفضل بعضها المواطن المنعزلة الرملية من الشواطئ ويفضل الآخر المياه العشبية على ضفاف الأنهار ومجارى المياه . تتناول طعامها دائما من فوق سطح الماء .

وهي طيور مدببة الأجنحة طويلتها نسبيا ، وأطول قوادمها الأولى . والشقان لا يختلفان في لونهما إلا قليلا ، ولكن الكبار تختلف اختلافا ملحوظا عن الصغار . المنقار تقريبا بطول الرأس أو أطول قليلا منه ، مستقيم أو منحني قليلا من طرفه العلوى . ريشتا الذيل الجانبين في غاية الطول ، والذيل مشقوق يحتوي على ١٢ ريشه . أصبح القدم الخلفية نامية ، كما أن أصابع القدم الأمامية بها أغشية كاملة ومخالب حادة .

ونوع الخرشنة يبلغ أكثر من ٣٠ نوعا في العالم . منها في مصر حوالى ١٣ نوعا منها .

خرشنة متوجة كبيرة = خطاف البحر الأحمر

Swift Tern (Red Sea Form) = Great crested Tern .

(Sterna bergu Velox .)

الوصف : الطول من طرف الذيل الشوكى حوالى ٢٠ بوصة . انظر اللوحة (٦٨) شكل (١) .
الموطن : من لاوايد : تقيم طول السنة على سواحل البحر الأحمر ، وساحل إفريقيا الشرقى وخليج عدن وسوقطرة والخليج الفارسى ، وشرقا إلى خليج بنغال وخليج عدن شمالا على طول ساحل بلاد العرب .
في مصر : نادرة على سواحل خليج العقبة والسويس .
مميزاتها : تغشى البحار ويندر أن تتوغل في المياه الداخلية . أكبر الخرشنات المصرية بعد خرشنة بحر قزوين ذات المنقار الأحمر البرتقالى . القدم أسود والمنقار أصفر كشمع العسل مائل للخضرة عند القاعدة (٢) .

(١) هذا الاسم هو نسبة إلى خرشنة وهي بلد بالروم (انظر جمهرة خطب العرب لأحمد صفوت ج ١ ص ٧١)

(٢) من عادة خطاف البحر أنه يحطم بيضة بمنقاره عمدا متى شاهد عدوا مغيرا يقترب منه إذ يفضل أن يتلف البيض عن أن يسرقه هذا العدو .



ص ٣٥٣ (١)
شطاء
Sandwich Tern



ص ٣٥٤ (٣)
شطاء
Common Tern




ص ٣٥٥ (٥)
صيفاً
Little Tern




ص ٣٥٦ (٧)
صيفاً
Arctic Tern




ص ٣٥٧ (٦)
شطاء
Whiskered Tern.



ص ٣٥٨ (٨)
صيفاً
Gull-billed Tern



ص ٣٥٩ (٩)
صيفاً
Caspian Tern



ص ٣٦٠ (١٠)
شطاء
Skimmer = Scissor-bill
(African Form)

ص ٣٦١ (١١)
صيفاً
Pomarine Skua.

(١)



ص ٣٥٢

Swift Tern (Red sea Form)
= Large Crested Tern.

(٢)



Lesser-crested Tern


(٣)



ص ٣٥٥

White-checked Tern

(٤)



ص ٣٥٧

White-winged
Black Tern

(٥)



ص ٣٥٣

Grested Tern (Red Sea Form)
Allied Tern


(٦)



ص ٣٥٦

Bridled Tern
= Lesser Sooty Tern.

(١)



خرشنة ساندوتش الأوربية

Sandwich Tern (European Form .) (١)

(Sterna sandvicensis sandvicensis.)

الوصف : الطول حوالى ١٥ ١/٢ بوصة . انظر اللوحة (٦٧) شكل (١)، (٢)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في سواحل الدنمارك وسواحل هولندا والجزر البريطانية ،
وجنوب أسبانيا وسردينيا وجنوب إيطاليا ، كذلك في سواحل البحر الأسود وبحر قزوين ، وتقضى
الشتاء على طول سواحل الخليج الفارسي وبلاد العرب ويعيدا عند كرتشى في السند ، وشمال إفريقيا
وقناريا والكاب وناتال .

في مصر : تحل فيها في الربيع والخريف ولكن بقلّة ، وحصل عليها من الإسكندرية في فبراير
وشوهدت في السويس في مارس وإبريل .

مميزاتها : كل القنة سوداء صيفا مع الجبهة ، أما في الشتاء فتكون الجبهة بيضاء ، والمنقار في كل
الفصول اسود طرفه أصفر ، والشوشة موجودة في كل الفصول أيضا ، وكذلك القدم أسود طول
السنة (٢) ، حذرة أكثر من غيرها من أبناء جنسها وتطير أعلى منها وأقل منها ضوضاء .

خرشنة متوجة = خرشنة متوسطة

Crested Tern (Red Sea Form .) = Allied Tern .

= Middle Tern .

(Sterna bengalensis par .)

الوصف : الطول حوالى ١٥ بوصة . انظر لوحة (٦٨) شكل (٥)
الموطن : من الأوايد ومتجولة : تتوالد حيث تقيم طول السنة في كل البحر الأحمر والبحر الأبيض
المتوسط ، وخليج عدن جنوبا إلى ساحل إفريقيا الشرقي عند مدغشقر وسيشل وناتال . وشوهدت في
سوريا .

في مصر : شوهدت مصادفة في بور سعيد والسويس في مايو ومارس وفي الإسكندرية في يونيو
ويحفل أن تتوالد في خليج السويس .

مميزاتها : كالسابقة تماما .

توالدها : البيض ٣ بلون الأرض وبه علامات ، يوضع من أغسطس إلى سبتمبر في الصومال ،
يوضع البيض في منخفض في الرمل على سطحه مباشرة بدون تبطين .

(١) يسميها الأمريكيان Cabot's tern

(٢) باطن القدم (النعل) أصفر .

خرشنة معتادة غربية
Common Tern. (Western Form.)
(Sterna hirundo hirundo.)

الوصف : الطول حوالى ١٤ بوصة : انظر اللوحة (٦٧) شكل (٣)
الموطن : من القواطع : تتوالد هذه الخرشنة العالمية التوزيع على السواحل والأنهار والبحيرات في قلب أوروبا وسواحلها ، من الرأس الشمالية في الترويج وشمال روسيا إلى بيرم جفر نمت ، جنوبا إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين ، كذلك في شمال إفريقيا في تونس ، وغربا إلى أزورة وماديرة وقناريا ، كذلك في الأقاليم المعتدلة من أمريكا الشمالية غربا إلى بحيرة سليف الكبرى ومنها ومن خليج سانت لورنس إلى داكوتا الشمالية وكارولينا الشمالية . كذلك في فنزويلا وجزائر الهند الغربية وساحل خليج الولايات المتحدة . تهاجر شتاء إلى البرازيل وفلوريدا ومكسيكو إلى بوغاز ماجلان ، كذلك في ساحل إفريقية الغربى إلى جنوبها في مستعمرة الرأس ، وفي آسيا إلى الهند وسيلان وشبه جزيرة الملايو وكذلك في العراق .

في مصر : تشاهد في الاعتدالين فيها وفي سينا في المياه الداخلية وساحل البحر الأبيض المتوسط وقنال السويس في أغسطس وسبتمبر ، وثانية في إبريل ومايو . وصدتها بنفسى في ٢٩ مايو من نهر النيل عند رشيد - وكانت مياهه ملحة مستقاة من البحر الأبيض المتوسط .

مميزاتها : أهم ما يميزها حجمها الصغير ، ومنقارها الأحمر الدموى وطرفه الأسود صيفا ، أما في الشتاء فإن المنقار كله عليه اللون الأسود . كما أن الأرجل دائما حمراء دموية . قد تأكل الحشرات على جناح الهواء زيادة على صغار الأسماك . الباقي كالسابقة . (أنظر اللوحة أمام ١٨ - ١)

الخرشنة القطبية
Arctic Tern - Sea Swallow.
(Sterna paradisaea = S. macrura.)

الوصف : الطول : حوالى ١٥ بوصة . انظر لوحة (٦٧) شكل (٤)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا عند القطب الشمالى في أقصى شمال أوروبا وآسيا ، وتهاجر شتاء إلى القطب الجنوبي مارة في طريقها بسواحل إفريقية الغربية وسواحل أمريكا الجنوبية الشرقية كلها ، وتبدأ من شمال كندا وساحل جرينلند وسواحل غرب أوروبا شمال الترويج وأيسلند ، وتقطع في هجرتها أكبر مسافة يقطعها أى طائر مهاجر في العالم . كذلك يمر بعضها في هجرتها على سواحل غرب أمريكا الجنوبية .

في مصر : سجلها هيجلن أنه شاهدها فيها . (أنظر اللوحة أمام ١٨ - ١)
مميزاتها : في الصيف : المنقار كله أحمر دموى بدون أية علامة مخالفة للونه فيه . في الشتاء : شبه الخرشنة العادية شتاء تقريبا .

خرشنة بيضاء الخد (أم بطن)

White-cheeked Tern.

(Sterna repressa.)

الوصف : الطول حوالى ١٣,٥ بوصة . أنظر اللوحة (٦٨) شكل (٣)
الموطن : من الأوباد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر ، وخليج عدن ، وعلى ساحل إفريقية الشرقى والخليج الفارسى وعلى سواحل السند ومكران ، ومن خليج عدن إلى مستعمرة كينيا . تتجول شتاء جنوبا إلى مالابار (على الساحل من جنوب غرب الهند وجزائر لاكاديف .

في مصر : يوجد في متحف سنكنبرج . Senckenberg في فرانكفورت ٤ مكتوب عليها بطاقات أنها حصل عليها من الطور في يونيو سنة ١٨٣١ ، بوساطة روبيل ، وهو التسجيل الوحيد لها داخل الحدود المصرية .

مميزاتها : أصغر من الخرشنة المعتادة التي تكون في صحتها أحيانا ، أجزاءها العليا أغمق منها . يوجد أسفل العين شبه بياض عرضى يميزها عن غيرها لونها العام معتمة اللون .

خرشنة صغيرة أوروبية^(١)

Little Tern. (European Form.)

(Sterna albifrons albifrons.)

الوصف : الطول حوالى ١٠ بوصة أنظر لوحة (٦٧) شكل (٥)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا (سواحلها ومياهها الداخلية) والجزر البريطانية - ماعدا إيطاليا وصقلية ، وتتوالد كذلك في مناطق البحر الأسود وبحر قزوين ، وفي شمال إفريقية من مصر ومراكش إلى مصر السفلى ، وفي آسيا الصغرى وفارس . وتقضى في مياه الهند (شمال غربها) والسند ومكران وفي إفريقية لغاية خط الاستواء . وتتوالد كذلك في آسيا صيفا في غرب سيبيريا إلى ميسو بوتاميا غرب الهند .

في مصر : شائعة في الاعتدالين في مايو ، ومن سبتمبر إلى نوفمبر ، وشوهدت في يونيو في الفيوم وربما كانت تتوالد فيها .

مميزاتها : صيفا : صغيرة الجسم ، صفراء المنقار ، طرفه أسود ، القنة سوداء والجهة بيضاء ، والناهض قنته بني خفيف مسمر والمنقار بني فاتح . شتاء : كلون الناهض - والأرجل صفراء طول السنة . وهي أشهر وأعم خرشنة ظهورا في مصر وخاصة في شمال الدلتا وتسمى هناك باسم (زقيق)

(١) بسميها الأمريكان Least Tern

خرشنة معتمة صغيرة (خرشنة ملجمة)
Bridled Tern (Red sea Form) = Lesser Sooty Tern.
***Sterna anaethetus fuligla.* (١)**

الوصف : الطول حوالى ١٤,٥ بوصة . انظر لوحة (٦٨) شكل (٦)
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة في النصف الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن جنوباً إلى موزمبيق وشرقاً إلى ساحل مكران والخليج الفارسي .
تتجول في غير فصول التوالد على طول ساحل الهند الغربي بعيداً عن بومباي ، ومن خليج عدن جنوباً إلى ساحل إفريقيا الشرقية عند موزمبيق .

في مصر : تشاهد داخل الحدود المصرية على ساحل البحر الأحمر في الجنوب ولكن بقلّة .
مميزاتها : الأجزاء العليا بنية مسمرة غامقة ، ومنقارها أسود ، وأرجلها سوداء وذيلها في غاية الطول ، ولها خط حاجبي أبيض يبدأ من منبت (قاعدة) الفك العلوي ماراً بأعلى العين (١٨٢) . القنة والقفا . أسود .

جنس المرشك (شليدوناس) Genus (Chlidonias)

تستوطن طيور هذا الجنس المناطق المعتدلة من نصف الكرة الشمالي . وهو يشمل خطاف البحر وأبو دقة والمرشك الملتحي (الخرشنة الملتحية) . وتمتاز بضعف مناقيرها ، وأقدامها مرتفعة طويلة الأصابع ، مشقوقة الأغشية ، كما أن الأجنحة في غاية الطول . والأذنان قصيرة مشقوقة قليلاً . الريش ناعم غزير تختلف ألوانه باختلاف الفصول والأعمار ولكن يغلب عليه سواد القطيفة في فترة التزاوج الشقان لا يختلفان تعيش في جماعات تقضى معظم نهارها سابحة فوق الماء تبحث عن قوتها من صغار الأسماك والجنبرى ومخلفات البحار وفضلات المياه الداخلية والحشرات والحيوانات البحرية الرخوة والديدان ، وهي لا تستطيع الغوص .

العش فوق نتوء من الأرض وسط المستنقعات وتارة وسط الغاب حسب ما يتراءى للطائر ، والعش من رفيع السيقان ومن الحشائش الخ . البيض من ٣ : ٤ بيضات مصفرة عليها مسحة بنية زيتونية ويقع رمادية وبنية حمراء داكنة ، والحضانة حوالى ١٥ يوماً تبدأ من مايو .

مرشك أسود أوروبي (خطاف البحر)

Black Tern (European Form.)
(*Chlidonias niger niger.*)

الوصف : الطول حوالى ٩ ١/٢ بوصة . انظر لوحة (٦٧) شكل (٧)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفاً في المياه الداخلية وسواحل كل أوروبا ماعداً اسكتلندا والجزر البريطانية واليونان وإيطاليا وأيبيريا ، وأيسلندا وسويسرة . وتتوالد كذلك في غرب آسيا — ماعداً أقصى شمالها — وشرقاً إلى بحر قزوين ، كذلك في سوريا وفلسطين . وتقضى الشتاء في إفريقيا الاستوائية .

(١) أشبه باللجام

في مصر : تشاهد في الربيع والخريف ، وصدها مرارا من بحيرة إدكو الملحة غرب الطريق الزراعي في يونيو ويوليو وأغسطس ، وربما كانت تقيم طول السنة . تشاهد كذلك في بحيرات الدلتا .

مميزاتها : صيفا : كل الرأس أسود فاحم . أما في الشتاء : فالنصف الخلفي من الفة هو الأسود فقط ، والباقي كله أبيض . المنقار بني مسود طول العام (١) . الريش في الصيف أسود والأجنحة رمادية يميزها ذلك عن (أبو دقة – المرشك الأبيض الجناح) . طعامها على جناح الهواء كالخطاف ولذا سميت باسم (خطاف البحر) وكذلك للونها . لا صوت لها يسمع .

مرشك أبيض الجناح (أبو دقة)

White-winged Black Tern.

(Chlidonias leucopterus.)

الوصف : الطول حوالي ٩ ¼ بوصة . لوحة (٦٨) شكل (٤) (٢)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في جنوب شرق أوروبا ، غرب آسيا المعتدلة والتركستان شرقا إلى أمور لاند وبحر قزوين وميسوبوتاميا ومنغوليا وشمال الصين وسيلان . ونادرة في الهند .
منها ما يقيم طول السنة في إفريقية الاستوائية .

تقضى الشتاء في إفريقية الاستوائية والجنوبية وجنوب شرق آسيا ، وأرخبيل الملايو إلى أستراليا وحلت في نيوزيلند كما حصل عليها من أمريكا الشمالية في يوليو سنة ١٨٧٣ .

في مصر : تحل في الاعتدالين ولم تشاهد في سينا ، فترى خلال مايو ، ومن نصف أغسطس إلى نصف أكتوبر وصيدت في يناير .

مميزاتها : البالغ صيفا . الجسم مع الرأس أسود ، ريش الإبط وما يبطن الجناح – أسود . أغطية ريش الطيران ، والذيل والعجز ، كل الريش أبيض . والذيل مشقوق قليلا بخلاف السوداء فإن ريش ذيلها كله مائل للسواد .

في الخريف : مثل المرشك الأسود (خطاف البحر) ولكن يعوزها اللون المعتم في الأكتاف .

تغشى المستنقعات بكثرة ولذا تسمى (خرشنة أو مرشك المستنقعات) (Marsh-tern) المنقار والأرجل – أحمر قرمزي دموي . الباقي كغيرها . طعامها الأسماك والحشرات .

مرشك أبيض الخدين (أوروبي)

whiskered Tern (European Form.)

(chlidonias leucoparius leucoparius.)

الوصف : الطول حوالي ١٠ ¼ بوصة : لوحة (٦٦) شكل (١)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في أسبانيا وجنوب فرنسا وشمال غرب البلقان ، وفي ألبانيا وشمال غرب إفريقية وشمال فلسطين شرقا إلى الهند ، وفي ميسوبوتاميا ، وفي تركيا وجنوب روسيا .
تقضى الشتاء في السودان وإفريقية الاستوائية جنوب خط الاستواء .

(١) مقار الناهض أسود قاعدته صفراء في الفك السفلي .

(٢) كذلك لوحة ٦٦ شكل (٢)

في مصر : تشاهد في الربيع في إبريل ومايو ، وبقله جدا في الخريف في سبتمبر . شائعة للغاية في منطقة قناة السويس في إبريل ومايو ، ولم تشاهد بعد في سينا ماعدا أقصى شمالها الشرقي قرب رفح حيث صيدت من هناك في آخر سبتمبر .

مميزاتها : صيفا : الجسم مظلم (دخان اللون) ، الخد أبيض . المنقار أحمر دموي أما في الشتاء فالرأس أبيض ومؤخر القنة رمادي تقريبا . المنقار قرني دخان القنة والقفا لونها أسود فقط في الصيف . طعامها الحشرات كالجراد والرعاش والنطاط والسماك الصغير وصغار الضفادع وصغار الأسماك .

جنس الأويق (جيلو شيليدرن) Genus (Gelochelidon.) = Gull-billed Tern.

هو عبارة عن مرشك أو خرشنة كبيرة الجسم ، منقاره كمنقار النورس ، وهو أسود اللون (أى المنقار) قوى قصير ، أقصر من طول الرأس . الذيل أقصر نسبيا عنه في جنس الخرشنة (Sterna) وهو أقصر كثيرا من نصف طول الجناح . الساق طويلة رشيقة القدم صغيرة . أغشية الأصابع مشقوفة . لا يختلف في سلوكه عن جنس الكركر (الاسكيوا) الا في ذكره . نوع واحد منه في العالم يزور مصر .

الأويق

Gull-billed Tern (Palearctic Form.)
(Gelochelidon nilotica nilotica.)

الوصف : الطول : حوالى ١٥ بوصة . انظر لوحة (٦٧) شكل (٨)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا على سواحل الدنمارك وهولندا وجنوب أسبانيا وسواحل جنوب المورة وقلب شمال البلقان ، وجنوب إلى شمال غرب الهند وكشمير وحتى سيلان وشمال إفريقيا (مراكش وتونس والجزائر) وفي بحر البلطيق والبحر الأسود وقزوين إلى الهند ومنغوليا . يقضى الشتاء في جنوب آسيا وسواحل إفريقيا الشرقية الاستوائية المنخفض إلى خط عرض ٨° جنوب خط الاستواء فقط . يمر في هجرته على طول ساحل البحر الأحمر ، وجنوب النيل متخذة طريق النيل الأزرق ثم الحيشة . وظهرت صدفة في استراليا .

في مصر : شائع فيها وفي سينا شتاء ، سواء على ساحل البحر أم المياه الداخلية ، وقد يكثر عند السويس والفيوم . يرى من أوائل نوفمبر ويمكث حتى آخر مارس ثم يغادر البلاد . ويحتمل أن يكون أكثر نوع من الخرش وجودا في مصر .

مميزاته : أهم ما يميزه هو المنقار الذى هو أشبه بمنقار النورس ، ومنه أخذ اسمه وهو أسود اللون في البالغ ، أما الناهض فلون منقاره بني طرفه بني مسود . وفي الصيف نجد كل الرأس من أعلاه (القنة والقفا) أسود فاحم ، أما في الشتاء فيكون الرأس كله أبيض وله بقعة سوداء على الأذن خلف العين . وقنة الناهض من الخلف رملية فاتحة تقريبا . الأجزاء العليا فضية رمادية . يغطس في الماء بكل جسمه أو بجزء منه فقط . يجلس فوق الطين لصيد فريسته ويستريح فوق الرمال والشواطئ الطينية .

جنس (أبو بلحة) = هيدروبروجنى

Genus (Hydroprogne.)

=Caspian Tern.

يشمل أبو بلحة (خرشنة بحر قزوين) وهى أكبر أنواع الخرشن جسا . المنقار أحمر دموى طويل قوى ، أطول من الرأس ، والساق أقصر بكثير من المنقار . الأقدام صغيرة . الأصابع متصلة بأغشية مشقوقه ، والجناح طويل مقوس . الذنب مشقوق قليلا لا يبلغ طوله أكثر من طول ١/٢ الجناح . الشقان لا يختلفان . طعامها الأسماك كما يبلغ كذلك صغار الطيور المائية التى تعترضه فى طريقه ، ويأكل كذلك الحشرات . يتجمع فى مكان التفريخ فى مستعمرات كبيرة ويوجد متقاربا فوق الأرض فى حفر يحفرها للبيض الذى هو من ٢ : ٣ وهو بيض قريب الشبه ببيض البط المنزل ولونه أبيض باهت مصفر به نقط رمادية ومعتمة .

نوع واحد منه فى العالم . يزور مصر .

أبو بلحة

Caspian Tern.

(Hydroprogne caspia)

الوصف : الطول حوالى ٢٠,٥ بوصة . لوحة (٦٧) شكل (١٠)

الموطن : من الأوايد والقواطع : تقيم طول السنة فى استراليا ونيوزيلند وفى أمريكا من لبرادور إلى يوكون وتحت الدائرة القطبية بقليل حيث تقضى الشتاء فى المكسيك . كذلك تقيم طول السنة على سواحل شمال إفريقية وعلى طول كلا جانبي القارة الشرقى والغربى حتى مستعمرة الرأس كما أنها تتوالد فوق البحار السبعة وسواحل أمريكا الجنوبية فقط وجزائر المحيط الهادى ، وبحر البلطيق إلى البحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود وشرقا إلى الصين واستراليا ونيوزيلند وسواحل فنلندة والسويد وجنوب أسبانيا وسواحل بحر الإديراتيك وجزائر الخليج الفارسى وسواحل مكران وفى سيلان وإفريقية الاستوائية وجنوبها . تهاجر أيضا شتاء إلى الهند وبورما . وتقيم طول السنة فى مياه قلب أوروبا والسواحل الرملية وبعض الجزائر الصغيرة بالقرب من سردينيا وسهول جنوب روسيا ذات المياه الملحة والأعشاب وفى ميسوبوتاميا . وهى تصل للحد الشمالى من نوعها فى الربيع وتهاجر للجنوب فى الخريف .

فى مصر : حصل عليها من ساحل البحر الأبيض المتوسط فى الدلتا فى ٥ سبتمبر ، وتشاهد كذلك فى الفيوم فى مارس وفى قنال السويس من نوفمبر إلى إبريل ، وكذلك فى النيل قرب القاهرة ، وكذلك على سواحل شبه جزيرة طور سينا من مارس إلى مايو ومرة فى نوفمبر .

مميزاته : يمتاز بمنقار كبير أحمر قرمزى طول السنة ، الحجم كبير ، القنة سوداء صيفا ، مخططة بخطوط بيضاء ومخطوط معتمة شتاء . مقلقة جدا بصوتها فى مواطن توالدها . تظهر فى طيرانه كأنها نورسة كبيرة ، طرف المنقار معتم قليلا شتاء . الأرجل سوداء . ترى فى طيرانها أكثر ارتفاعا عن زميلاتهما . تهاجم غيرها من الخراشن والنورس وتأخذ الطعام منها كما تصيد بنفسها كذلك السمك من فوق سطح الماء وإذا دعت الحاجة للغطس غطست بكل جسمها .

الفصيلة القشاطية (أبو مقص)

Family (Rynchopidae.)

= Scissor _ bills = Skimmers.

يعرف من هذه الفصيلة ٣ أنواع موجودة الآن في العالم ، تظن كل سواحل أمريكا الشمالية الغربية وسواحل آسيا الشرقية من مضيق بيرنج في كوريا ، وكل سواحل غرب أوروبا وبحر الإديراتيك وجنوب فرنسا وجبل طارق والبرتغال ، وهي تشمل جنسا واحدا .

جنس القشاط (أبو مقص)

رئشوبس Genus (Rynchops.)

Skimmers = Scissor bills.

تمتاز طيور هذا الجنس بالمنقار الذى هو أشبه بالسكين (ينصل السكين) ويلاصق حد (شفرة) الفك العلوى ، على حد الفك السفلى تماما ، غير أن التركيب طولى وليس عرضيا مثل أبى ملعقة Spoonill. وغيره كما أن الفك السفلى أطول بكثير من الفك العلوى . المنخر على شكل بيضاوى مختلف وهو قرب قاعدة الفك العلوى فى منخفض قليل . الجناح فى غاية الطول يمتد كثيرا وراء الذيل عند الانطباع ، وضربات الأجنحة بطيئة ، أطول القوادم الأولى ، والذيل قصير مشقوق قليلا . والجنس على ٥ أنواع ، واحد منها فى إفريقية يشاهد فى مصر .

القشاط = أبو مقص (الشكل الإفريقى)


Skimmer (African Form.) Afr . scissor – bill.


(Rynchops flavirostris.)

الوصف : الطول حوالى ١٥ بوصة . لوحة (٦٧) شكل (٩)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة فى إفريقية جنوب الصحراء الكبرى ، وفى السنغال ، وجنوبا إلى الزمبيزى ونهر الأورانج ، وسجل من السودان عند دنقلة ، وينفى مينرتز هاجن ذلك .
فى مصر : كان سابقا يتوالد فى مصر العليا ، ولكنه الآن يظهر فيها فى مارس وإبريل ومايو ويونيو . وهو على العموم قليل الوجود .

مميزاته : يشبه الخرشنة الكبيرة ، أهم ما يميزه هو منقاره الخاص به الذى هو أشبه بنصل سكين فى كلا الفكين وليس الفك منها مجوفا مثل باقى الطيور . المنقار فيرميليون ، وكذلك الأقدام ، والظهر مائل للسواد ، يغمس نصف منقاره (الفك السفلى) فى الماء فى طيرانه فانما الفك العلوى كأنه يكشط الماء حتى إذا أحس بسمكة قبض عليها فى الحال وأكلها وابتلعها وهذه عادته التى لا توجد فى غيره من طيور العالم . يتناول طعامه بهذه الطريقة عند دخول الليل .

توالده : العش على ضفاف ، الأنهار الرملية . البيض عادة ٣ لونها صخرى بها نقط ويقع بنية وأخرى أرجوانية .





(^{١١}) **الفصيلة الكركرية (استركوراريداي)**
Family (Stercoraridae) = Skua

يعرف عن طيور هذه الفصيلة قدر ٥ منها ، في حين أن الموجود منها الآن على قيد الحياة هو ٤ أنواع فقط .

جنس الكركر (استيركوراريوس)
Genus (Stercorarius) = Skua Jaeger.

طيور هذا الجنس نوع الكركر المعروف باسم (الاسكيوا) ويختلف متقارعة عن منقار النورس والخرشانات ، فالمنقار مكون من ٤ أجزاء (القير ، جزءان نهائيان – الطرف المنحني كثيرا مثل الشخص (معقوف) . والمنقار هذا قوى مقوس الطرف شبيه بالمخالب الحاد . والساق (الرسغ) عليها صفائح ترسية وأخرى شبكية بارزة (بها حراشيف مستطيلة ومربعة ظاهرة) . حادة المخلب . يتكون الذيل من ١٢ ريشه ، الوسطى منها طويلة تزيد على طول باقيه . كما أن الأجنحة أيضا طويلة مدببة . وهي مختلفة الألوان بين الفاتح والغامق . كما أنها هي طيور أشبه بالصقور من النورس شديدة البأس تخافها أبناء الفصيلة وغيرها من الطيور التي هي أصغر منها حجبا لأنها تطاردها وترغمها على ترك فريستها لها ولذا سميت (المتطفلة) ولو أنها لا تقتصر في معيشتها على هذه الطريقة بل أيضا تسعى وراء عيشها فتطير فوق البحار جادة في السعى وكذلك على شواطئ تلتقط ما يقذف به الأمواج من حيوانات بحرية .

الشقان لا يختلفان . وهي موزعة خلال الدنيا في كل المياه . نوع واحد منها يعرف في مصر .

كركر مآتورهاين = اسكيوا بوماتورسين
Pomatorhine = Pomarine skua
(Stercorarius Pomarinus)

الوصف : الطول حوالى ٢١ بوصة . لوحة (٦٧) شكل (١١)
الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في الأقاليم القطبية الشمالية ، وشوهد شتاء في الأقاليم القطبية الجنوبية (الأقاليم القطبية من شمال أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية) وهو يجل على السواحل البحرية والمياه الداخلية من أوروبا جنوبا إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وعلى طول الساحل الغربى لأفريقية ، وفى اليابان وبورما وشمال استراليا وسواحل أمريكا الشمالية شرقها وغربها كل ذلك شتاء في هجرته .

في مصر : اصطدم واحد بمنارة الأشراف في خليج السويس في ١١ إبريل سنة ١٩٢١ .

مميزاته : لا يفارق البحار ، يسرق طعام النورس ، يوجد منفردا وتارة مثنى ، سريع الطيران أشبه بطيران الشاهين ، ولا يتبع المراكب في البحر .

الرتبة الحبارية (ألكترديدس)
Order (Alectorides)

تشمل هذه الرتبة الحبارى والكركى والمرعة والغر . وهي طيور صيد هامة كما أن لها بعض خصائص الطيور الخواضة .

(١) بسميه الأمريكان Jaeger

الفصيلة الحبارية (أوتيدياى)

Family (Otidae) = Bustards.

Bustard Family.

قال الدوميرى فى كتابه حياة الحيوان الكبرى : ذكر الحبارى اسمه الحُجْرَج وفرخ الحبارى اسمه الجنير .

الموجود منها الآن فى العالم هو ٢٣ نوعا وهذه الحبارى مشهورة عند العرب يرددونها فى كلامهم العام حيث انها منتشرة فى بلاد العرب عندهم لأنها طائر صحراوى أو شبه صحراوى ، ومنها الكبير الجسم الذى يقرب من حجم الديك الرومى مثل حبارة كورى التى يصل طولها إلى ٤٤ بوصة . وهى تسير بتأن وجسمها أفقى ورأسها معتدل قائم ، أما وسط القمح والشعير فتسير بحذر تخرج رأسها ثم تخفضها ثانية ، وإذا طارت جرت على الأرض أولا ثم ارتفعت فى الجو ، ولها استعراض عرسى إذ يرفع الذكر ذيله أمام أنثاه وينشره ثانية ليتسجلب ويستهوئ فؤادها ويرى كذلك جناح الذل لها ، وقد يحدث عراك مع العدو الدخيل يتسبب عنه إراقه الدماء وتزع بعض الريش . وهذه الحبارى تجلس ورأسها غائرة فى صدرها وتستريح فى ضوء الشمس وهى أكبر أنواع الحبارى قاطبة إذا أن طولها أكثر من متر .

وعائلة الحبارى عموما محصورة وجودها فى الدنيا القديمة منها الكبير الجسم للغاية كما ذكرنا ومنها المتوسط سرعة العدو على الأرض للغاية وقليل ما تطير إلا إذا دعتها الظروف القهرية وتحب الأرض المكشوفة أو التى بها قليل من الأعشاب ومعظم الحبارى يقطن فى إفريقيا ، وقليل منها يغشى أوروبا وآسيا ، كما يوجد نوع واحد منها فى استراليا ويعرف عن العائلة قدر ٢٥ نوعا ، يوجد منها الآن حاليا على قيد الحياة ٢٢ نوعا تقطن كل إفريقيا ووسط وغرب آسيا وشرق أوروبا وجنوب غربها ، وبلاد العرب ، واستراليا وهى ١١ جنسا الأقدام متوسطة الطول تحتوى على ٣ أصابع ، والأجنحة مستديرة ، وأطول قوائمها الثلاثة ، والذيل من ١٦ : ٢٠ بوصة ، وهو خشن وغزير ويغزر الريش على الرأس والعنق ، والذكور أكبر من الإناث وأجل لونا منها ، والصغير يشبه الإناث ، وهى تختص بوجود كيس جلدى كبير تحت جلد العنق تجاه القصبة الهوائية ينتهى إلى أسفل اللسان وينحدر إلى العظمة الشوكية ولا يوجد هذا الكيس الا فى الذكور المسنة ويمتلئ بالهواء فى فترات التزاوج وينكمش فى غير هذه الأوقات ولكن تبين عندئذ الفتحة التى تحت اللسان . ماواها البرارى والحقول الفسيحة المستوية ، وهى تتحاشى مناطق الغابات وكثيف الأشجار ، وتعيش على انفراد وتارة فى أسراب صغيرة وتزداد هذه الأسراب بعد فترات التكاثر .

الطيور التى تقطن الأصقاع الجنوبية منها هى أبدة لا ترح أمكنتها أما قاطنات المناطق المعتدلة فمنها المهاجرات ومنها المتجولات ، ورغم ثقل أجسامها فهى سريعة العدو الذى تستعين به على الخبء كما أنها أيضا تحيد الطيران عند اللزوم ، وهى حذرة للغاية (١) .

(١) تجرى لمسافات طويلة أمام العدو وقد يصيدها العراب حية بالفرسان بعد أن ينال منها اجهد لأنها لا تحسن الطيران إلا قليلا .

طعامها الحبوب والبذور ، كما تقتاد أيضا الثمار وأوراق النباتات والخضرة النامية في المروج والحشائش .

فترة التكاثر هي في أواخر الخريف حيث يختص كل ذكر بأنثاه . ولا يتعداها والعش في حفرة بين حقول الحنطة أو حشائش البراري . والحضانة تقوم بها الأنثى فقط وهي حوالى ٣٠ يوما ، والبيض من ٢ : ٤ بيضات وإذا فقس البيض وبلغت الأولاد أشدها قادتها الأم وحدها ثم بعد حين يعود الذكر إلى أسرته ويقوم حارسا عليها ، وتحتاج الصغار إلى وقت طويل حتى تبلغ رشدها ويكمل نموها ويمكنها الاستغناء عن آبائها .

جنس الحبارى الصغيرة (أوتيس)

Genus (Otis) = Little Bustard

تستوطن طيور هذا الجنس أوروبا وآسيا الوسطى ، وتتميز بأن المنقار فيها أقصر من طول الرأس ، كما لا يوجد لها طوق واضح في أسفل العنق (وسادة عنقية) نوع واحد منه في مصر نادر الوجود

حبارى شرقية صغيرة

Little Bustard (Eastern Form)

(Otis tetrax orientalis)

الوصف : الطول حوالى ١٧ بوصة . لوحة (٦٩) شكل (١)

الموطن : بعضها من الأوبد والبعض من القواطع : تتوالد صيفا في السهول العظمى من وسط أوروبا وآسيا وفي غرب سيبيريا والتركستان وأفغانستان وجنوب روسيا ورومانيا واليونان وجنوب إيطاليا ، وسردينيا وكل ألبيريا ومعظم فرنسا ، وغرب البلقان .
تهاجر شتاء جنوب مواطن توالدها فترحل إلى مصر وجنوب غرب آسيا والهند ، وشوهدت صدفة في شمال غرب أوروبا وفي قبرص .

مميزاتها : في حجم الدجاجة المنزلية الكاملة النمو الكبيرة ، طويلة الرقبة والأرجل . تغشى السهول العشبية الفسيحة ، تارة تقترب من الإنسان ، وتارة تكون حذرة للغاية . قوة الطيران متموجة في طيرانها وتظهر أجنتها بيضاء للغاية في طيرانها . ترعى في الغسق والغلس (عند دخول الظلام بعد المغرب وعند الفجر وبزوغ الصباح) لذيدة اللحم للغاية . تجرى على الأرض بسرعة مثل الحجل . يميز الذكر الطوق الطويل في الرقبة الذى يعمل زاوية من أعلاه وهو أبيض اللون وسط سواد الرقبة (١) . موطنها في مصر : اثبت هيجلن وجودها شتاء في مصر على الحافة الشمالية من الدلتا وأنه شاهدها مرارا تباع في سوق الإسكندرية كما أنه يوجد بالمتحف الحيوانى الآن بالجيزة واحدة صيدت من الغطة من مصر السفلى في ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٣ . وسجلت كذلك من سيناء .

جنس الحبارى الأصلية (حبارة ماكوين) شلاميدوتس

Genus (Chlamydotis) = Houbara

=Macqueen's Bustard

تستوطن طيور هذا الجنس قارص آسيا وإفريقية وتمتاز بأجسام متوسطة وتيجان من الريش على الرءوس ، ووسادة شعرية على جانبي الرقبة لا يختلف الشقان اختلافا ملحوظا .

جنس واحد منه في مصر على نوعين .

(١) للذكر كيس في رقبته يمتلئ بالهواء وينتفخ خصوصا في فترة التزاوج .

الحبارى حبارة ماكوين الشرقية
Macqueen's Bustard (Eastern Form)
= (Houbara)

(*Chlamydotis undulata macqueenu*)

الوصف : الطول حوالى ٢٨ بوصة . انظر لوحة (٦٩) شكل (٣)

الموطن : من الأوبد ومتجولة : تقيم طول السنة حيث تتوالد في آسيا من منخفض نهر الفولجا وسهول الخزر ومنطقة بحر آرال القزوينية ، والعراق وبلاد العرب شرقا إلى غرب سيبيريا والتركستان وأفغانستان وبلوخستان .

وهي تعبر هضبة البامير لتقصى الشتاء في شمال غرب الهند ، كما أن البعض منها يهاجر في نفس الشتاء إلى بلاد العرب فيزداد عددها .

في مصر : يوجد في المتحف الحيوانى بالجيزة اثنان منها حصل عليهما من ليبيا في يونيو وديسمبر . نادرة الإقامة في سيناء طول السنة ولوحظت فيها في سهولها الشمالية .

مميزاتها : في حجم أنثى الدجاج الرومى ولكن أرجلها أطول منها . تأكل الحشرات إضافة على البذور والخضروات الباقى كالسابقة .

توالدها : تبيض الأنثى من ٢ : ٤ بيضات لونها بنى زيتونى بها بقع معتمة توضع في منخفض في الرمال قليل على وجه الصحراء . تفضل الأنثى الحفر الرملية وسط الأعشاب المحاطة بالأشجار الصغيرة للاختباء بها ، ويمكنها بذلك أن تجرى بسرعة خلال الأشجار هذه . يوضع البيض في مارس وإبريل . لم يعثر على توالدها في مصر ولو أن عرب سيناء يذكرون أنها تتوالد هناك عندهم .

حبارة ماكوين الصحراوية

Macqueen's Bustard (Saharan Form)

(*Chlamydotis undulata undolata*)

الوصف : الطول حوالى ٣٠ بوصة . لوحة (٦٩) شكل (٤) الموطن : من الأوبد : تقيم طول السنة . في الصحراء الكبرى الإفريقية غرب وادى النيل .

في مصر : حصل عليها من الضبعة ووادى النطرون في فبراير وإبريل ونوفمبر . كما شوهدت كثيرا بين واحة سيده والسلوم في فبراير سنة ١٩٢٠ م وهي تقريبا شائعة طول السنة حول وادى النطرون ولكن لا توجد شتاء في الواحات الداخلة والخارجة وإنما ترى فقط فيها في الربيع ويظهر أنها تتوالد على حافة الصحراء ، وفي الأرض ذات المحاصيل الشاسعة التي يندر أن تغشاها .

مميزاتها : كسابقتها من أبناء جنسها غير أنها أكثرهم حذرا لتعقب الصيادين لها دائما بالصيد .

التوالد : عثر على بيضة واحدة قرب وادى النطرون في ١٠ إبريل سنة ١٩١٩ وهي تمتاز عن السابقة بأن الخطوط الرفيعة المنكسرة السوداء في أجزائها العليا أكثر كثافة من الشرقية ، كما أن الريش العلوى على القنزعة أشد سوادا من الشرقية (الذى على جوانب الرقبة) أما ريش القنزعة فيه خطوط رفيعة منكسرة بنية غامقة . يشق الذيل أربعة خطوط عرضية زرقاء جوانبها سوداء في حين أن الشرقية يوجد بها ٣ خطوط فقط . الباقي كالشرقية تماما .

رتبة الكركيات (جرويفورم) Order (Gruiformes)

تشمل هذه الرتبة طائر الكرياما Cariama وأنيس الشمس Sun-bittern والكاجو Kgu ، والميرايت Mesite ، وغطاس الشمس Sun-grebe ، والمراعى Rail ، والغر Coot ، والثلاثة الأخيرة تأتي مباشرة بعد بكاشينة الجنوب Seed-Snipe والجاكانا التي هي الآن تدخل مع النورس والخواضات Charadriiformes ، ويدخل معها كذلك الجبارى Bustard . وهذه الرتبة عالمية الوجود ، وتختلف في مظاهرها اختلافا كبيرا ، ولكن الصفات التشريحية التي تلازمها جميعا وتختص بها دون كافة الطيور هي التي ربطت منها وجعلتها تحت رتبة واحدة ، ومن بين هذا التشابه التشريحي عدم التحام فقرات الظهر ، ويشذ عن ذلك جنس المرعة Rail ، كما أن الزائدة الدودية غير معطلة والحوصلة منعقدة .

أغلبها من طيور الماء الأصلية والأقلية منها تعيش حيث الجفاف وفي البرارى والمراعى والحقول : تختلف طرق معيشتها ، الصغار منها من مباحرات العش ، والبعض من ملازمات العش .

الفصيلة الكركية (جروداى)

(^١) Family (Gruidae) = Cranes

المعروف من طيور هذه الفصيلة هو ٣٨ نوعا ، والموجود حاليا هو ١٤ نوعا على قيد الحياة (^٢) . وهي توجد في كل الأرض ما عدا أمريكا الجنوبية وهي طيور قوية الأجسام متوسطة الرقاب أو طويلتها كبيرة الرؤوس أو متوسطتها أيضا ، مستقيمة المناقير منقطة قليلا من الجانبين مدببة الأطراف تبلغ طول الرأس أو تكون أطول منه قليلا وهي لينة عند القاعدة ولكنها صلبة عند الطرف . طويلة الأرجل عاريتها إلى ما فوق الرسغ ، ترفعها كثيرا عن سطح الأرض ، طويلة القباب وتحتوى الرقبة على فقرات متراكبة تارة ١٩ فقرة وأحيانا ٢٠ فقرة . وتحتوى الرجل على أربعة أصابع تتصل الخارجة منها بالوسطى بغشاء يصل المفصل الأول وذات غالب قصيرة مقوسة قليلا كليله الحافات . الجناح طويل عريض ، والقوادم ١١ قادمة أطولها الثالثة وأطول ريش الطيران هو ريش الخواى الداخلية وهي أطول من القوادم أصبع القدم الخلفى موجود . الذنب قصير مكون من ١٢ ريشة الريش قوى غزير كثيف وقد يستطيل على الرأس وأسفل العنق ، وقد يتعري جزء من الرأس والعنق . فقرات الرقبة معروفة كما ذكر ، لا يوجد بين الشقين فرق كبير ملحوظ . أحب مساكنها الحقول المنزرعة والمستنقعات والبحيرات حيث غذاؤها فيها ذكر من حشرات وأسمك وصفادع وصغار الزواحف والديدان والحبوب ، تنشط في الصباح المبكر حتى الغروب ولكنها تهتم بالغذاء صباحا ، وتلعب باقى النهار وترتاح تواصل هجرتها ليلا ونهارا ولذلك تصل بسرعة إلى مشتاتها دون عن غيرها تهاجم عشاش الغير وتلتهم الأولاد منها . غذاؤها الرئيسى الحبوب وخاصة القمح وكذلك الأزهار وأطراف أوراق الأشجار . البيض بى غامق به بقع ، والحضانة حوالى ٣٠ يوما وهي والإطعام بالإشتراك ، ومن العجيب أن الأولاد تمكث في العش يوما واحدا ثم تبارحه .

(^١) تشمل المراعى Rails + crakes والغر coots ودجاج الماء Moorhens والديك السلطان Gallinules

(^٢) متفرعة من ٤ أجناس

وهي طيور اجتماعية يمكن أن تجلس صفارها في القفص وتنمو فيه حتى إذا كبرت تعودت على أن تبارح القفص ثم تعود إليه ثانية . وتتكاثر فيه ، ولذا فهي تألف حياة الأسر بسرعة وتنمق بينها وبين صاحبها صلة قوية من الود والصداقة .

أنواعها كثيرة . نوع واحد منها يهاجر من وإلى مصر .

جنس الكركي (جروس) الرمادي

Genus (Grus) = Grey Crane.

Family Ieruidae = Crane Family.

تشتمل طيور هذا الجنس على أنواع كثيرة تستوطن آسيا وأوروبا ولهذا الجنس ما للفصيلة منميزات وصفات عددها الآن ١٤ نوعا عالمية .

الكركي الرمادي المعتاد

Common Grey Crane .

(Megalornis grus grus).

الوصف : الطول حوالي ٤٤ بوصة . لوحة (٦٩) شكل (٦) .
الموطن : من القواطع ومتجول وكان يقيم طول السنة في الجزر البريطانية يتوالد صيفا في شمال أوروبا (السويد ولا بلاند وفنلندة وروسيا جنوبا إلى البحر المتوسط وبولندة وشمال ألمانيا والنمسا وهنغاريا والمنطقة المشرفة على بحر الادرياتيك من غرب البلقان . يقضى الشتاء في إفريقيا من مراكش إلى مصر وجنوبا إلى السودان والحبيشة وكذلك في فلسطين ميسوبوتاميا وقبرص وفارس وفي التركستان والهند .

في مصر : يزورها صيفا وشتاء وزيارته نادرة ، وهو أكثر رؤية في الشتاء عن الصيف ، وتبدأ الهجرة من أوائل سبتمبر إلى أكتوبر ، وعودة الهجرة من الجنوب هي طول شهر مارس وإبريل ، وهو في الربيع أكثر رؤية من الخريف ، وشوهد ، طائرا في أسراب في سماء الواحات الخارجة في أواخر مارس طائر قريبا من سطح الأرض ، والمكان المصري الوحيد الذي يقضى فيه هذا الطائر نهاره هو بحيرة مربوط بجوار الإسكندرية ولم يعثر عليه واقفا على سطح الأرض .

مميزاته : يأكل كل شيء يصادفه في طريقه من الحشرات والحبوب والخشائش وحتى صفار الطيور والحيوانات الصغيرة . يسافر في هجرته على علو عظيم جدا قد لا يرى بصعوبة وإمعان في النظر . الرقبة نصفها والرأس أسود ويشق الرقبة خط بطولها أبيض ، والفتحة حمراء دموية الذيل ، ريشه مسترسل مثل الشعر المتدلى (هذا الريش يغطي الذيل) يكون في أسراب يمد رقبتيه للطيران للأمام في طيرانه ويسحب رجله للخلف صوته موسيقى يمكن سماعه من مسافة بعيدة أثناء طيرانه في هجرته هكذا تقريبا (Kerr-r) . كُر يطير في أسراب على شكل ٧ ، ٧٧ تقريبا أو في صف واحد يقوده واحد منها . اللون العام رمادي مزرق اسمه في مصر والعراق كركي ، وفي الشام (زُهو)^(١) .

(١) من طبائعه الوثائية انه اذا ما أسن والده عاها وتعهدها بالرعاية والغذاء وهذا نادرا جداً بين الطيور .

جنس كركى ديموازيل (انثروبيدس) = الرهو

Genus (Anthropoides) = Demoiselle Crane.

يشمل هذا الجنس كركى ديموازيل . المنقار قصير نسبيا . أصغر من الكركى الرمادى المعتاد السابق . ريش الصدر طويل مدبب ومستن كالسهم . ريش الريش طويل يعمل من ناحية القفا خصلة مسترسلة وهى ناعمة كالحرير ، الريش ناعم . يستوطن مناطق البرارى من آسيا الوسطى وينتشر حتى جنوب الهند وواى الفولجا والدانوب وجنوب اسبانيا .

الباقى فى السلوك والعادات مثل ما ذكر فى الفصيلة صفحة ٥٠٤ نوع واحد منه ، يحل كمهاجر إلى مصر .

كركى ديموازيل = الرهو (١)

Demoiselle crane

(Anthropoides vigro)

الوصف : الطول حوالى ٣٨ بوصة . لوحة (٦٩) شكل (٥) .

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا فى جنوب روسيا وعند مصب نهر الدانوب وشرقا إلى منشوريا . يهاجر شتاء إلى الهند والسودان . فى مصر : نادر الزيارة لها ولم يسجل من سينا . كما شاهده شل ومير تهاجن عند بنى سويف فى ٢ أبريل ، وفى ساء الواحات الخارجة فى مارس سنة ١٩٢٨ .

مميزاته : أصغر من الكركى الرمادى العادى ، أسود الصدر ، له خصلة ريشية ناعمة كالشعر بيضاء مسترسلة خلف الرأس . باقى لونه العام رمادى مزرق . من الصعب تمييزه وهو على ارتفاع عظيم فى الجويل يعرف صوته الموسيقى الذى هو أعلى من السابق .

الفصيلة التفلقية (المراجعة)

Family (Rallidae) = (راليداي)

= Rails (Rail Family)

تشتمل هذه الفصيلة العالمية على ١٧٧ نوعا ، يوجد منها حاليا على قيد الحياة ١١٩ نوعا فقط (٢) تحتوى على أصناف العز Coots ، ودجاج الماء وديوكه Watercocks ، والمراعى الصغيرة Rails وهى تقطن جميع الأماكن الرطبة من العالم والجافة ما عدا مناطق القطب الشمالى والجنوبى وكذلك ما عدا الصحراء الكبرى الأفريقية وبلاد العرب . وهى طيور منضغطة الأجسام مما يساعدها على اختراق الخضرة والأعشاب الكثيفة بين الأدغال والغياض والأحراش والسفانا . معظمها ذوات مخالب صغيرة ، صغيرة الرؤوس ، قصيرة الأجنحة مستديرتها تقريبا ولا يصل الجناح إلى طرف الذنب الطويل المستدير المكون من ١٢ ريشة . والريش غزير أملس .

وهى تحب المواطن القريبة من الماء والرطبة والمستنقعات ذات الغاب والدبس فى البحيرات أو المروج وحقول الحنطة كما يوجد بعضها فى الغابات وهى تقضى حياتها مختبئة بعيدة عن الأنظار ولا تعرف إلا من صوتها فى قرار القصب والخضرة وتنشط عند الغسق والغلس (وقبل طلوع الشمس بقليل)

(١) سعى بذلك لأن تزيه ريشات قصيرة غير ريشات الرأس من الخلف مثل الديموازيل .

(٢) متفرعة من ٤٦ منشا

ولا تبارح الأرض إلا مرغمة فلا تطير إلا نادرا ، كما أنها تحسن السير على الأرض وتحير بسرعة وبعضها يستطيع السباحة ومنها ما يغوص تحت الماء ، ومنها ضعيف الطيران ، والبعض لا يطير مطلقا .
والحواس حساسية نامية ، وهي تعيش منفردة ولا تتجمع في غير فترات التكاثر أو أثناء الارتحال . أهم غذائها الحبوب زيادة على الحشرات واليرقات والقواقع والديدان ، وقد تلتهم أولاد الغير من الأعشاش وصغار الحيوانات الفقيرة تتدلى أرجلها عند طيرانها وتطير لمسافات قصيرة فقط .
العش قريبا من الماء بين الأدغال متقن الصنع بحيث لا يصل الماء إليه والبيض من ٣ : ١٢ بيضة مصفرة أو رمادية باهتة بها بقع داكنة والحضانة من ١٩ : ٢١ يوما وهي بالاشتراك من الشقين والتناوب .
وتبارح الصغار العش بعد خروجها من البيض مباشرة .

جنس التفلق (المرعة) = رالوس Genus (Rallus) = Rails

يستوطن هذا الجنس بأنواعه شمال أوروبا ووسطها ووسط آسيا ، وينتشر شرقا حتى وادي الامور . وهو يهاجر إلى شمال إفريقيا وجنوب أوروبا والهند . ويمتاز بأن المنقار فيه أطول من الرأس ، وهو مستقيم أو مقوس قليلا ومنضغط من الجانبين ، والأقدام طويلة ، والساق (الرسغ) أقصر من الأصبع الوسطى بمخيلها . والأجنحة قصيرة مستديرة ، أطول القوائم الثالثة أو الرابعة أوهما معا ، كما أن الذنب قصير مكون من ١٢ ريشة مقوسة ، والريش غزير .

مواطنها المحببة هي المستنقعات التي يصعب الاقتراب منها وكذلك الأماكن الرطبة التي يختلط فيها الطين بالماء ، وتغطيها النباتات الكثيفة ، وتارة قرب الغابات حيث الغاب (القصب) والديس . أميل إلى الحياة الليلية من النهارية حيث تنشط في الغسق والغلس ، أما في النهار فتقضي ساكنة وتنام جزءا كبيرا منه . تجيد السباحة ولكنها تتحاشاها ما أمكن في الأماكن المتسعة المكشوفة ، وإذا شعرت بالخطر أسرع طائرا فنيا يشبه الجري السريع فوق سطح الماء إلى أقرب دغلة تختفي فيها ، وإذا تعذر عليها ذلك غاصت تحت الماء . وهي لا تحسن الطيران وتطير قريبة من سطح الأرض لمسافات قصيرة فقط ولا تتجمع إلا نادرا . وأهم غذائها الحشرات ويرقاتها والديدان والقواقع كما أنها تأكل البذور وخاصة بذور الحشائش والديس .

العش من أوراق الديس الجافة وأعواد الحشائش وهو ليس متينا ، ويشبه الوعاء وقد يكون له غطاء غير متقن من أعواد النبات . ويكون العش دائما وسط الماء في قلب الأدغال في مكان يصعب الوصول إليه والعثور عليه . وهي تنبئ عن غاباتها بأصواتها ليلا . والبيض من ٦ : ١٠ بيضات باهتة ذات بقع رمادية وبنية . وتبارح الأولاد العش بمجرد الفقس وتعدو كالفئران الصغيرة بين أعواد الغاب والأدغال كما أنها تستطيع السباحة من أول يوم من حياتها وتراعيها أمها حتى يتم نموها ، والحضانة بالاشتراك وتبيض الأنثى مرتين في السنة والحضانة من ١٩ : ٢٠ يوما والأطعام من ٧ : ٨ أسابيع .

(١)

ص ٣٧٧



Barbary Partridge.


(٢)



Rock Partridge = Chukor

(٣)

ص ٣٧٩



Chalmley's Sand-Partridge

(٤)


ص ٣٧٩



Nicolls Sand Partridge

(٥)

ص ٣٧٨




Hey's Sand Partridge

(٦)


ص ٣٨٠



European Quail



ص ٢٥٣



Whooper Swan

(١)

ص ٤٩



Silver-bill

ص ٢٥٨




Spur-winged Goose.

Red-necked Grebe




(٥)

ص ٢٥٥



Grey-lag Goose.



ص ٣٧٨

Green Sandpiper



مرعة الماء الأوروبية
Water-rail (European Form)
(Rallus aquaticus aquaticus .)

الوصف : الطول حوالى ١١ ¼ بوصة . انظر لوحة (٧٠) شكل (١) .
الموطن : من الأوبد والبعض من القواطع ومتجولة أيضا : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا شمال اسكندناوة ، كذلك تتوالد في غرب آسيا ، وشمال غرب إفريقيا وفلسطين ومصر ، وتقيم طول السنة في الجزر البريطانية كما يزور البعض منها هذه الجزيرة شتاء أيضا ، وقليل منها يقيم طول السنة في أيسلند . تزداد في وسط أوروبا جنوبا إلى البحر الأبيض المتوسط شتاء بما يأتى لها من شمالها .

في مصر : تقيم بها طول السنة حيث تتوالد فيها ، كما تكثر بها ، أيضا شتاء بما يأتى لها من شمال أوروبا ووسطها .

مميزاتها : مثل ما قيل عنها في الجنس سابقا . والبالغ يكون منقارة طويل رفيع ، والخاصرة بها خطوط سوداء طولية تشق بياض الخاصرة أما الصغير فهو مظلم اللون دخانى والتخطيط في الخاصرة أقل وضوحا من البالغ ، المنقار أحمر اللون . إذا طارت تدلت أرجلها خلف الذيل إلى أسفل قليلا وهي مخضرة بنية ويسمع صوتها ليلا وتقضى نهارها مختبئة بين الأعشاب المائية في قرارها .

جنس المرامي المائية (الصغيرة والرقطاء وبلون) الصغيرة
Genus (Porzana) = Crakes of water

Rail Family

يستوطن هذا الجنس بأنواعه كل أنحاء العالم ، تشمل المرامي المائية ما عدا فرخة الغيظ فهي أرضية صغيرة الجسم ، والمنقار كذلك صغير مستقيم وهو بطول أو أصغر من الرأس وليس منخفضا في فكه العلوى ، وهو منضغط من الجانبين . الأصبع الخلفية بادية الطول . الرسغ أصغر من الأصبع الوسطى بمخيلها .

تقضى حياتها في مخايء الغاب (القصب) والدبى وطويل الحشائش وهي ليست وجلة قط لعدم الاهتمام بصيدها ، بل تدع الإنسان والحيوان يقتربان منها . وهي لا تتحرك نهارا إلا قليلا وتنشط مع حلول الليل وهي تعتدى غالبا على عشائش غيرها من طيور الماء الصغيرة كما أنها سريعة الانتناس في حياة الأسر والتعلق بصاحبها ويمكن تعليمها وتدريبها بسهولة .

يبنى العش من أوراق الدبى الخ فما يوجد حولها كأعواد الحشائش وأمثالها من المواد ويبطن بمواد لينة ، وهو غير متين وغير متقن الجدران والعش داخل الأعشاب وسط الماء والبيض من ٨ : ١٢ توضع على فترات متعددة وهو مستطيل لامع أملس القشرة مصفرة اللون صادىء باهت منتشر عليه نقط كثيرة داكنة . الحضانة للأثنى مع تربية الأولاد ويفقس البيض بعد حوالى ٢٠ يوما ، وتعرف الأولاد السباحة والغوص من أول يوم تخرج فيه إلى عالم الوجود ، كما أنها تتفنن فن الاختفاء فلا تستطيع أن تظفر بها إلا الحيوانات قوية الشم . وتتفرق الصغار قبل أن يتم نضوج ريشها تاركة الأم لتضطلع بعد ذلك وحدها بالكفاح للحياة والبقاء .

المرعة الرقطاء

Spotted Crane

(Porzana Porzana)

Rail Family

الوصف : الطول حوالى ٨ ١/٢ بوصة . لوحة (٧) شكل (٤)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا شمال اسكتلندا ، وتتوالد كذلك في شمال آسيا وفنلندا إلى البحر الأبيض المتوسط وغرب آسيا إلى كشمير وباركاند وشمال غرب إفريقيا . تقضى الشتاء في إفريقيا ما عدا ساحلها الغربى ، وفى الهند وإفريقية الاستوائية ، وجنوب الصين لا تتوالد في جنوب اليونان ولا في صقلية .

في مصر : شائعة فيها شتاء وخاصة الدلتا من أوائل سبتمبر إلى أواخر مارس ، وهى كثيرة في الاعتدالين أكثر من الشتاء لأن الكثير منها يواصل هجرته للجنوب .

مميزاتها : مثل الفصيلة والجنس السابق ذكرهما . تمتاز بأنها رقطاء بيضاء على جوانب الصدر والرقبة والجناح ، الأرجل مائلة للخضرة ، والخاصرة بها خطوط طويلة منحنية بنية غامقة غطاء أسفل الذيل أصغر كرمي الذكر كالأنثى . تهاجر وقد تصطدم بأسلاك البرق وبالمنازل طعامها الخضروات المائية والحيوانات البحرية الصغيرة والديدان والحشرات .

المرعة الصغيرة

Little Lake

(Porzana Parva)

الوصف : الطول حوالى ٧ ١/٢ بوصة . لوحة (٧٠) شكل (٢)

الموطن : من الأوبد والقواطع ومتجولة أحيانا : تتوالد صيفا في النصف الشرقى من وسط أوروبا وجنوبها الشرقى - ما عدا البلقان وإيطاليا . كذلك تتوالد في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا وتقضى الشتاء في جنوب موطن توالدها وفى إفريقيا إلى الصومال وكينيا وأوغندا البعض منها يقيم طول السنة في وسط أوروبا الجنوى الشرقى والبعض يهاجر منه وإليه شتاء ، كما أنها تقيم طول السنة في الجزائر في شمال غرب إفريقيا ومنه ما يقضى الشتاء في تونس ومصر والسودان وميسوبوتاميا وبلاد العرب ، شمال غرب الهند (في بلوخرستان والسند)

في مصر : شائعة شتاء من نوفمبر إلى مايو .

مميزاتها : الذكر : الأرجل والمقار مثل المرعة الرقطاء أى خضراء زيتونية ولكن ليس بها نقط على الصدر كما لا توجد خطوط غامقة على الخاصرة . الأنثى : الصدر مائل للصفرة القمحية والأرجل خضراء فى الأثنين لها بقعة حمراء على المقار أشد صفرة من السابقة لا يوجد لون أبيض فى ريش الطيران .

مرعة بلون الغربية

Baillon's Crane (Western Form)

(Porzana Pusilla intermedia)

الوصف : الطول حوالي ٧ بوصة . انظر لوحة (٧٠) شكل (٣)

الموطن : من الأوبد والقواطع ومتجولة كذلك : تتوالد صيفا في جنوب أوروبا (أيبيريا وفرنسا وشمال إيطاليا وشمال البلقان) ومصر وشمال غرب إفريقيا ، وتقضى الشتاء في إفريقية لغاية خط الاستواء ، وفي فارس وحول البحر الأسود .

في مصر : تقيم بها طول السنة وتزداد شتاء بما يأتى عليها من أوروبا فتوجد في المواطن الرطبة وخاصة الدلتا .

مميزاتها : ليس لها بقعة حمراء في المنقار كالسابقة كالأرجل بنية محمرة وليست خضراء ، ذات خطوط طولية كثيرة على الخاصرة بنية غامقة الشقان متماثلان . باقي الطابع كالسابقة والجنس .

توالدها : شوهد عشها عند القنطرة عند قنال السويس ، البيض من ٦ : ٨ بيضات ، عثر عليها في الدلتا . البيض يرتقلى به نقط داكنة . الحضانة من ٢٠ : ٢١ يوما . العش وسط الخضرة الكثيفة وسط البحيرات وهو أشبه بفنجان صغير ومن الصعب جدا العثور عليه .

مرعة بلون الشرقية

Baillon's Crane (Eastern Form)

Baillon's Pusilla Pusilla.

الوصف : الطول حوالي ٦ بوصة . لوحة (٧٠) شكل (٥)

الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في وسط وشمال آسيا ، وتقضى الشتاء جنوبا في الهند والصين وفارس .

في مصر : نادرة جدا في مصر شتاء .

مميزاتها : أصغر مرعة ترى في مصر ، هامش القامة الأولى أبيض ظاهر ، قد تسبح في الماء وتغطس للحصول على طعامها . أصغر من السابقة الأجزاء العلوية بني بها خطوط سوداء وبيضاء الأجزاء السفلى رمادي اردوازي ، الخاصرة وغطاء اسفل الذيل ، بها خطوط طولية بيضاء وسوداء . طيرانها يشبه طيران سمانة صغيرة ولكن يميزها أرجلها الخضراء المتدلية الطويلة عندئذ .

جنس (فرخة الغيط) الصفرد

Genus (Crex) = Corncrake (كركس)

يحتوى هذا الجنس على فرخة الغيط المسماة كذلك (الصفرد) تمتاز بأن المنقار أقصر من الجسم مرتفع عند القاعدة قوى غليظ الرسغ تقريبا بطول أصبع القدم الوسطى بمخيلها أو أطول قليلا . ريش الطيران (ريش القوادم والحوافى) وأغطية الجناح ، أحمر سنامون (رملي) ماواها المروج الخضراء ذات الحشائش والمراعى الكثيفة التى تواربها ، وتختبئ جيدا فيها فى الأراضى الجافة ولا تأوى إلى المواطن الرطبة . والمستنقعات وهى مغرمة بحقول الحنطة . الجناح مستدير أطول القوادم النائية قصيرة الذنب وقَلْ من يلحظة لأن الغطاءيات فوقه تخفيه.الريش أملس وناعم .

وهي طيور ليلية أكثر منها نهارية تكمن طول النهار مخبئة وسط الأدغال العشبية وعندما تشعر بالظلام تتحرك من أجل غذائها . تأوى إلى حفر في الأرض مغطاة بأعواد الحشائش الطويلة متأمن بذلك هجمات أعدائها ليلا . تهاجم الطيور الصغيرة في أعشاشها وتقتلها وتأكل إخراجها كما تقتل صغار الفئران ولكن غذائها الرئيسى هو القمح والحبوب والبذور . تستقر كذلك في صغار النخيل المسمى (الغريب) ويصعب أن يطيرها الانسان من مكانها وقد يقتنصها أحيانا كلب الصيد . . تتدلى أرجلها أثناء طيرانها إذا طارت لمسافة قصيرة ، أما أثناء الهجرة فهي تمد رجليها وراء ذيلها . صوتها هكذا تقريبا . Crax ومنه اشتق الاسم العلمى وهو لا يسمع عادة في مصر بل في مواطن توأدها اسمها في إنجلترا سماعة الحشيش ، العش بين الحشائش في حفرة وفي الحقول العشوشية في مكان منخفض والبيض من ٧ : ١٢ بيضة بيضاء مخضرة أو مصفرة ذوات بقع بنية . والحضانة : ١٧ يوما وهي بالأنثى وحدها ، وتستमित الأم في حضن بيضها حتى أنه يمكن أحيانا أخذها باليد من عشها ، وتبارح الأولاد العش بمجرد خروجها من البيض وتتقن عملية الخب تحت إشراف مدرستها وهي أمها .

موطنها : شمال أوروبا ومعظم آسيا . نوعان منها في العالم . نوع واحد منه يزور مصر في هجرته .

فرخة الغيط (الصفرد)

Corncrake = Landrail

(Crex crex)

Rail Family

الوصف : الطول حوالى ١٠ بوصة . انظر لوحة (٧٠) شكل . (٦)
الموطن : من القواطع : تتوالد صيفا في شمال أوراسيا من الدائرة القطبية الشمالية عند خط عرض ٦٥ شمالا في روسيا وفنلندة وأورال والترويح جنوبا إلى البرانس وشمال إيطاليا وغرب سيبيريا ، وتقضى الشتاء جنوبا إلى إفريقيا وسطها وجنوبها حتى الكاب كذلك في بلاد العرب والهند ، كما أنها تنجول بعيدا إلى إستراليا ونيوزيلاند والولايات المتحدة .

في مصر : تزورها في الربيع ولكنه بقله ، وأكثر من ذلك في الخريف وكذلك في سينا مع السماء في شهر سبتمبر وأكتوبر ، وبمجرد نزولها إلى الأرض جرت وبحث عن أى مأوى يوارى حتى ولو كانت خيمة وأكثر ما توجد في الخريف هو شهر سبتمبر .

مميزاتها : نفس ما قيل عنها في الجنس سابقا .

جنس (دجاج الماء) = جالينيولا

Genus (Gallinula) = Moorhens

Rail Family

يشمل هذا الجنس صنف دجاج الماء ، ويمتاز بقصر القدم ، وأصابع القدم نفسه في غاية الطول ، وأصبع القدم الوسطى يخلبها أطول من الساق . ليس هناك انتفاخ على الأقدام . البالغ له ترس أحمر مكان الجبهة .

مأواها أدغال الغاب والديس في البحيرات والمستنقعات وعلى الشواطىء التى تكتظ بالحشائش الطويلة مثل حواف الترع وغيرها ولكنها تكون دائما في الماء العذب تجيد السباحة والغوص أكثر من

المشي ثقيلة الطيران. تحب العزلة فتمتحن لها مكانا سيطرت عليه وطردت منه غيرها من الطيور التي تستطيع إبعادها وتبدى في هذه الناحية على ضعفها ضروبا من الجراة والإقدام، وهي تدافع عن أولادها بشجاعة ، كما أنها تهاجم صغار الطيور وتقتلها. وعلى عكس ذلك فحياتها الزوجية كلها حب وحنان وعطف على الأولاد ، العش بين الحشائش المائية مرتفع قليلا عن الماء . البيض من ٤ : ٨ بيضات ، وأحيانا يصل إلى ١٠ بيضات ، وعادة ٥ بيضات ومدة الحضانة من ١٩ : ٢٠ يوما ويندر أن تبيض ثلاث مرات في السنة والبيض أصفر جلدي تمحى به بقع أرجوانية أو بنية مختلفة ويقال بأن أولاد أول فقسة تساعد كتناكيت ثانی فقسة في إطعامها .

دجاجة الماء الأوروبية (١٩٤)
Moorhen (European Form)
Gallinula chloropus Chloropus)

الوصف : الطول حوالي ١٣ بوصة . انظر لوحة (٧٠) شكل (٨)

الموطن : من القواطع والأوايد ومتجولة : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا شمال اسكندناوة ، كذلك تتوالد في شمال إفريقية وشرقا إلى وسط آسيا في التركستان والعراق ، والبعض يقيم في هذه المواطن طول السنة ومن بينها الجزر البريطانية والبعض يهاجر إلى الجنوب ، وتجولت في فاروس وأيسلند تتوالد كذلك في أمريكا الشمالية .

في مصر : تقيم بها طول السنة ، ويزداد عددها شتاء بما يأتي لها من الشمال من أوروبا فتوجد في كل مواطن البحيرات العشبية المائية من مصر وسينا في الدلتا والفيوم ومصر العليا والسفلى ووادي النطرون وكل مكان تحلو الإقامة فيها ، ولكن لا تأوى إلى الواحات الداخلة أو الخارجة أو سينا .

مميزاتها وعلاماتها : البالغ : المنقار أحمر ، طرفه أصفر ، قوس أبيض واضح على الخاصرة . أما الناهض : فالأجزاء السفلية لغطائيات الذيل بيضاء ، كما يوجد أيضا القوس الأبيض على الخاصرة وهو أفتح لونا من البالغ (بنى مسود غامق – والمنقار كله أصفر باهت بنى خفيف) .

(الباقى مثل ما قبل عنها في الجنس سابقا .)

جنس الغرّة (فولكا)
Genus (Fulica) = Coot
Rail Family

هذا الجنس على أنواع متعددة تستوطن وسط آسيا وكل أوروبا ، ويقطن نوع واحد منه مصر وتقفن أيضا أمريكا الشمالية وهي خاصة بها (١٩٠) يمتاز بأن أصبع القدم الوسطى بمخلبها أطول بكثير من الرسغ ، كما أن المخالب حادة جدا . وهي قوية الجسم ، متوسطة الطول في رقبتها ، كبيرة الرأس ،

(١٩٤) اسمها كذلك Common gallinule ويسمىها الأمريكان Waterhen Floride Gallinula =

ويسمىها الأمريكان أيضا Common gallinule

(١٩٣) لها حزام اسود ضيق بعد طرفي المنقار اسمها الغرّة الأمريكية American Coot وتوجد أخرى في

استراليا اسمها Bala coot (Porphrio Policophalus melanotus)

غروطية المنقار وهو حاد يكسو الجبهة درع كبير قرن . أصابع الأقدام طويلة مزودة بشرايح جلدية وأغشية منفصلة صغيرة تمكنها من السباحة . متوسطة الطول في الخنثى . أطول القوادم الثلاثة والرابعة . الذيل قصير يداريه غطائياته ، وعدد ريشه من ١٤ : ١٦ ريشه . لونها العام أسود . وهي تغشى مواطن المياه أينما وجدت وذلك في البحيرات العذبة والمياه الداخلية ، ولكنها لا تغشى البحار ولا الأنهار للملوحة الأولى في مياهها ، ولخلو الثانية من القصب والديس الذي يواربها عند الحاجة إلى الخبء - تجيد السباحة كما تجيد الجرى فوق الأرض وتحسن الغوص وهي إذا طارت بدأت تجرى أولا ليضعة أمتار فوق سطح الماء ثم ارتفعت بعد ذلك في الجو . تكون في جماعات غالباً وتارة مثنى وأحياناً فرادى . العش فوق الماء مباشرة أو فوق أعواد الغاب وسط الماء ، والبيض من ٦ : ١٠ بيضات ، لونه أبيض باهت به نقط ويقع داكته بينه ، والحضانة من ٢١ : ٢٣ يوما ، والعش وسط الخضرة ويندر أن يكون كافياً فوق الماء . وتبارح الأولاد العش مباشرة بعد الفقس إلى الماء ويوالها الآباء حتى تكبر وتستقل في معيشتها .

الغرة الأوروبية

Coot (European Form)

(Fulica atra atra)

الوصف : الطول حوالى ١٥ بوصة . انظر لوحة (٧٠) شكل (١٠)

الموطن : من الأوابد والبعض من القواطع ومتجول : تتوالد صيفا في كل أوروبا ما عدا اسكندناوة ، ولكنها تتوالد في جنوبها عند خط عرض ٧٠° شمالا ، وتكثر في وسط أوروبا شتاء بما يهاجر إليها من شمالها . كما أنها تقيم طول السنة في وسط أوروبا وفي الجزر البريطانية ومعظم أوروبا الجنوبية ، كذلك تتوالد صيفا في آسيا من خط عرض ٦٠° شمالا في سيبيريا والصين واليابان ، كما أنها تقيم طول السنة كذلك في كثير من أنحاء الهند والبعض يزورها شتاء أيضا وفي بورما وجاوة وسيليس وإفريقية الاستوائية . وتحولت في ماديرة ، وقتناريا وأزورة . في مصر : تقيم بها طول السنة وتكثر شتاء بما يأتى عليها من الشمال ومن أوروبا ، كما أنها تقيم طول السنة أيضا في شمال غرب إفريقيا .

تكثر في الدلتا وبحيرات الفيوم والواحات الداخلية من نوفمبر إلى أوائل إبريل ، والبعض يرحل ثانية إلى الشمال والبعض الآخر يبقى .

مميزاتها وطياتها : ثقيلة الحركة والجسم ، إذا وجدت أرضا تعترضها في طريقها بين تمرين مألين وجدناها تجرى بسرعة ثم تحتهد في أن تدخل إلى مأوى كثيف من الأعشاب المائية لتتوارى فيه قبل أن يراها أحد ، إذا كانت وسط الأعشا وطارت نهضت إلى أعلى مباشرة ثم ارتفعت في الجو ، وقد أرجلها خلفها في طيرانها ، وتجرى على سطح الماء قبل طيرانها . الباقي كما قيل عنها في الجنس كما سبق سميت الغرة لبياض جبهتها توالدها : سبق ذكره في الجنس .

جنس (بورفيريو) (Porphyrio) Genus

الدبك السلطان Gallinule =

Rail Family

طيور هذا الجنس قريبة الشبة من دجاج الماء (جالينيولا) غير أن المنقار في هذا الجنس أغلظ وأقوى ، كما يوجد على الجبهة درع قرن . القدم طويلة قوية والأصابع منفصلة كلية عن بعضها وليس أى غشاء بها . الأجنحة متوسطة الطول . أطول القوادم الرابعة . قصيرة الذنب ولكنه أطول من ذيول

بقية الفصيلة . الريش ملون جميل . أصبح القدم الوسطى في غاية الطول وهي أطول بكثير من الرسغ .
 يغشى قرار الغاب والأعواد النامية في الماء في الماء ولا يظهر في العراء وإنما يسمع صوته من داخل
 الخضرة التي لا يفارقها طعامه المواد النباتية والحبوب وخاصة الغلال والأرز وأوراق الخشائش والبذور .
 والطيور التي تقطن أوروبا الآن هي سليلة النوع الذي كان يقتني الإغريق والرومان بقرب المعابد .
 وهي تفضل المستنقعات التي حولها أو بالقرب منها حقول الحنطة ، وتآوى إلى أراضي الأرز ،
 وهي في سلوكها أشبه بدجاج الماء .

وهي في فترة التفريخ تبحث عن عشاش الطيور الأخرى وتسلبها بيضها وصغارها مستعينة
 بضخامة مناقيرها ، كما أنها تحب السمك ، العش بعيد عن العيون فوق سطح الماء مبنى من الخشائش
 والبيض من ٣ : ٥ صفراء حمرة بها بقع داكنة .

وأنواع جنسه حوالي ٣٠ نوعا تغشى القارات الاستوائية ، وحوض البحر الأبيض المتوسط ،
 والهند والصين والملايو وأستراليا ونيوزيلند ومدغشقر وإفريقية .

ديك سلطان أَلْن (ديك سلطان صغير)

Allen's Gallinule

(Porphyrio alleni) = Lesser Gallinule

Rail Family

الوصف : الطول حوالي ١٠ بوصة . انظر لوحة (٧٠) شكل (٧)

الموطن : من الأوايد ومتجول : يتوالد ويقيم طول السنة في إفريقية الاستوائية ومدغشقر ،
 وتجول في انحاء كثيرة من إقليم البحر الأبيض المتوسط . ولا يمتد وجوده في السودان أبعد شمالا من
 الخرطوم .

في مصر : تجول صدفة : إليها وحصل عليه استافور أَلْن قرب الإسكندرية Stafford Allen ،
 وأدخله موريتيوس في مصر Maurituis .

مميزاته وطبائعه : كما قيل عنه في الجنس صغير الجسم ، أجزاءه السفلية زرقاء وظهره أخضر يحرك
 ذيله أثناء تحركه . يدلي أرجله عند طيرانه .

ديك سلطان مصري

Purple Gallinule (Egyptian Form) = Green _ Backed Gallinule = Violet Gallinule = Purple

Water_hen = King Reed _ hen.

(Porphyrio Porhyrio madagascariensis)

egyptiaCus

الوصف : الطول حوالي ١٨ ¼ بوصة . لوحة (٧٠) شكل (٩) .

الموطن : من الأوايد : يتوالد ويقيم طول السنة في جنوب أوروبا ، وشمال إفريقية ومدغشقر
 والسنغال وبحيرة شاد وجنوب الحبشة وموريتيوس شمالا إلى وادي النيل وشرق مصر ، ولا كذلك في
 مراكش في المغرب .

في مصر : سبق أعلاه . كان سابقا يتوالد في الفيوم وأصبح الآن نادرا .
مميزاته : مثل الجنس كثير في بحيرات الدلتا (أدكو والمنزلة ومربوط) في قرار القصب . الأجزاء
السفلى زرقاء ، والظهر أخضر ، الأرجل حمراء والمنقار وترس على الجبهة أحمر اللون . يرى غالبا عند
الغسق قبل طلوع الشمس وبعد الغروب فوق صفحة الماء الواسعة وحتى في المحاصيل الزراعية ثم
يختبئ إذا بزغ النهار في قرار القصب المائي .

رتبة الدجاجيات (جالي جاليفورم)

Order (Galliformes=Galli)

Pheasant Family

تحتوى طيور هذه الرتبة على طيور الصيد الرئيسية الهامة وهي الطاوس ، ودجاج غينيا وجميع
الفران (التدرج) ، والأرجوس ، والقطا والحجل ، والسمانى ، والشنار ، والفرانكولين والسمانى
الأمريكية وكلها طيور صيد برية . ويدخل معها الديك الرومى الأمريكى والدجاج الهندى
واليورمادى . تحتوى القدم على ٤ أصابع . المنقار غليظ تقريبا منحني قليلا من طرفه العلوى ، صغيرة
الرؤوس ، مكثرة اللحم والأجسام وهي التى يعنى العرب قولهم بغاث الطير .

بغاث الطير أطولها جسوما ولم تظل البزاة ولا الصقور

طويلة الأعناق تقريبا في معظمها ، قصيرة الأجنحة مستديرتها ، القوادم ١٠ : ١١ قوة
الأقدام ، طويالتها نسبيا . ذكورها أكبر من إناثها لا تحيد الطيران . بالساق من خلفها شوكة واحدة أو
أكثر هي بمثابة سلاحها . مأواها الأرض والأدغال ، وغذاؤها على سطح الأرض من البذور والحبوب
والخضروات والحشرات والديدان كثير منها يحفر الأرض بأصابعه ، ولذا تسمى أيضا (الطيور النباشة أو
الحفارة) العش على سطح الأرض وقل أن يبنى على الأشجار ، وكثيرا يكون بين الأدغال ، البيض
متفاوت ، منها ما يصنع بيضه واحدة ، ومنها ما يصنع بيضا كثيرا . تبارح الصغار العش غالبا . يعاشر
الذكر أكثر من أنثى واحدة .

وهي طيور عالمية ، فصيلة واحدة منها في مصر .

كثيرة الأنواع ، مرتفعة الصدور ، العنق تارة قصير ومتوسط أو طويل ، المنقار قصير لا يزيد طوله
عن نصف طول الرأس عادة ، مغطى بالريش عند القاعدة ، الأصبع الخلفية أحيانا تكون ضامرة
فلا يظهر منها غير المخلب الخواقي من ١٢ : ٢٠ ، والذنب من ١٠ : ١٢ . المعدة قوية العضلات .
وأقرب السمانى شبيها بالسمانى الأوربية هو الذى يقطن أفريقيا الجنوبية ، كما يوجد بها أيضا سمانى ملونة
وفي آسيا .

الفصيلة الدجاجية (فازيانيداي)

Family (Phasianidae) =Pheasant Family.

تحتوى هذه العائلة على ٤٨ جنسا ، يعرف من أنواعها ٢٢١ نوعا ، ولكن الموجود منها الآن حاليا
هو ١٧٤ . تقطن كل مناطق وأقاليم العالم ما عدا مناطق القطبين (الشمالى والجنوبى)

وهي تشمل دجاج غينيا Guineafowl ، والتركى (الديك الرومى) Turkeys والقطا Crauses ،
والتدرج الأصل Tru-Pheasant ، والسمان الأمريكى American Quails ، والسمان المعروف

(سمان الدنيا القديمة) True Quail ، والكياركيلى Capercaillie ، والطاوس Peafowls ، ودجاج الغاب Tungle-Fowls .

تمتاز بأن الريش يغطي فتحات الأنف ، وقد تكون عارية الأجنحة . متوسطة الطول ، والخواقي طويلة في الذكور وكذلك ريشات الذنب ، السامة متوسطة الطول ، إما عارية من الريش ، أو يكسو الريش جزء منها ، الأصابع عارية من الريش ، وكثيرا ما توجد أجزاء عارية في منطقتي الرأس والعنق العنق على الأرض البيض مختلف العدد متحد اللون أو مختلفه ، الساق في الذكور له شوكة حادة أو غير حادة .

في مصر منها ٣ أجناس .

جنس الشنار (إلكترس) حجل الكترويس Genus (Alectoris) = Partridges chukars

تسوطن طيور هذا الجنس أوراسيا وإفريقيا ، وتتميز بوجود بروزات غير مدببة على الرسغ تشبه الشوكة . الذنب ١٤ ريشة ؛ ونادرا ١٦ ريشة ، الخاصرة ذات خطوط طويلة مقوسة واضحة سواده وبيضاء وأحيانا كستنائية الساق والقدم لونها دائما أحمر . لا يختلف الشقان للذكر عقدة ليست حادة على الساق التي هي موجودة في التدرج . قال الدوميرى : يعيش الحجل ١٠ سنوات .

الحجل المغربي

Barbary Partridge (Gyrenaican Form)

(Alectoris Barbara barbata)

Pheasant Family

الوصف : الطول حوالى ١٣ بوصة . لوحة (٧١) شكل (١)

الموطن : من الأوابد : يتوالد صيفا في المناطق الجبلية من سردينيا ، وجبل طارق وشمال أفريقيا في شمال سيرنيكا .

في مصر : يقيم بها طول العام داخل الحدود المصرية حول السلوم وسيدى برانى ومرسى مطروح ولا يبعد أكثر من ذلك شرقا . وكان سابقا شائعا في مصر ولكن الآن انقرض معظمه منها وأصبح نادر الوجود .

مميزاته : الحجل الوحيد الذى رجلاه حمراء ، والذى يوجد في غرب النيل ، والوحيد الذى رجلاه حمراء ويقطن في غرب النيل ، وهو لا يحل في أى مكان آخر شرق النيل . المنقار أحمر . الخاصرة بها خطوط طويلة عريضة سوداء وبيضاء . سريع العدو والطيوان إذا افزع ، موطنه قرار الو.يان من وسط هضبة ليبيا إلى السهل البحرى إذا أطلق عليه أحد النيران وأصابه المقذوف النارى وجرح بفعله ولم يمت رمى بنفسه في البحر كى لا سقع أسيرا في يدى الصياد وذلك إذا كان بجوار ساحل البحر الأبيض المتوسط صوته هكذا تقريبا (كاكيليك Kakelik) يردده بسرعة مقلق للغاية في الفجر وعند الغسق في الربيع والسيف .

توالده : لم يعثر على عش له داخل الحدود المصرية البيض في الجزائر من ١٠ : ١٨ بيضة صفراء معتمة أو رملية ذات نقط بنية غامقة .

شنار سينا (حجل سينا)

Chukor (Siao Form .)

(Alectoris groeca sinaica .)

Pheasant Family

الوصف : الطول حوالى ١٣ ١/٢ بوصة . اللوحة (٧٢) شكل (١٩٦) (٣) .
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة في وادى نهر الأردن ومنخفض البحر الميت وشمالا إلى دمشق ، وخلف لبنان وصحراء الشمالية ولا يوجد هناك يحل في هذه النواحي ما عدا الحجل الرملى (أموبيروكس) الذى يحل على التلال بين البحر الأحمر ووادى النيل .

في مصر : يقيم طول السنة في شبه جزيرة سينا ماعدا السهل البحرى أى بجوار البحر .
مميزاته : يمتاز بأنه أكبر من الحجل الرمالى (Perdix) - أحمر الرجلين ، أحمر المنقار ، الذقن مائلة للبياض وكذلك زوره ، له خطوط عرضية كثيفة على الخاصرة - لا يطير في مكانه إلا إذا جرى خلفه أحد واضطره للطيران . يستقر في مكانه في جبال سينا في الثلوج صيفا وشتاء .
التوالد : البيض من ٦ : ١٢ توضع في منخفض تحفره الأنثى تحت مأوى شجرة أو صخرة لونه أصفر باهت مبقع يوضع في سينا في أوائل مارس .

جنس أموبيروكس (الحجل الرملى)

Genus (Ammoperdix) = Sand Partridge .

موطن طيور هذا الحجل الرملى شمال شرق إفريقية وجنوب غرب آسيا . وهو في حجم الحجل الصغير . أصفر المنقار ، الذنب ١٢ ريشة ، مستدير الحافة ، يبلغ طوله عادة نصف طول الجناح ، أطول القوائم الثالثة ، ومن ثانی قادمة إلى الخامسة بطول واحد ، وكلها أقل قليلا من الثالثة . المخالب قصيرة منحنية قليلا . ليس بالساق شوكة خلفية ، ولا يزيد طوله عن طول الأصبع الوسطى بما في ذلك المخالب . الشقان مختلفان في اللون قليلا . البيض بدون بقع .

مأواه الأماكن المقفرة والمنعزلة . نوعان منه ، احدهما في مصر على ثلاثة أشكال .

حجل هيز الرملى (الحجل التهامى) = الحجل الفلسطيني

Hey,s Sand - Partridge

Ammoperdix heyi heyi .

الوصف : الطول حوالى ١١ بوصة . انظر لوحة (٧١) شكل (٥)
الموطن : من الأوبد : يقيم طول السنة في وادى الأردن ، ومنخفض البحر الميت ، ومعظم الأجزاء المقفرة من شمال غرب بلاد العرب .

في مصر : يقيم وشائع طول السنة في الوديان المقفرة والأماكن المتكسرة من سينا ، ولا يوجد في السهول بجوار البحر .

(١٩٦) كذلك لوحة ٧١ شكل (٢)

مميزاته : يوجد في جموع صغيرة في الوديان المقفرة ذات الحجارة والضحور ، وعند القفيظ ، وفي شدة الحر نجده يتظلل تحت صخرة نائثة ، وإذا طورد جرى بسرعة عظيمة وإذا اعترضه صخور قفز من صخرة لأخرى ، أما إذا طار فإنه يحدث صفيرا أحادا بفعل الأجنحة ويندر ألا يحدث هذا الصوت ، وإذا أطلق الصياد النيران عليه وأفلت منه ونجى ثم عثر عليه الإنسان أمكنه أن يقبض عليه بيده أما إذا انتظر الصياد مرة أخرى فإنه يضع منه . قليل الوجود ، فأنحر اللحم . سمى التهامي نسبة إلى تهامة وهي مكان ببلاد العرب على اسم قبيلة كانت تقطن بها . القدم مائل للصفرة وكذلك المنقار .

وكذلك أهم ما يميزه لونه الأحمر الوردي العام في أجزائه السفلى وذقنه الرملية وصدرة الرسادي البني .

توالده : العش تحت شجرة في الصحراء في حفرة صغيرة في الأرض . البيض من ٥ : ٧ بيضات لونه أصفر جلدي رملي ، يوضع في وادي الأردن في شهر أبريل .

الحجل المصري = حجل نيقول الرمل

Nicoll,s Sand -Partridge .

Ammoperdix heyi nicolli

الوصف : الطول : حوالي ١١ بوصة . انظر لوحة (٧١) شكل (٤)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة حيث يتوالد في الوديان والأراضي الخزونية الوعرة في طريق القاهرة – السويس جنوبا إلى خط عرض ٥٧° شمالا ، وليس في غرب وادي النيل ، وفحصت الأنواع من طريق القاهرة – السويس ، ووادي خوف ، وأسيوط ، وعلى مسافة ٣٠ ميلا شرق هذا المكان .

في مصر : ذكر أعلاه .

مميزاته وطبائعه : طبائعه مثل التهامي السابق ، وشكله مثله غير أنه ليس له بياض على الجبهة القنة أفتح لونا من سابقه ، والخطوط العرضية المتكسرة على الردف وغطاء أعلى الذيل أقل من سابقه . سريع العدو ، ولا يستطيع الطيران .

الأنثى مائلة للون الرملي أكثر من أعلاها من سابقتها .

الحجل النوبي = حجل شُلْمَلِي الرمل

Cholmley,s Sand Partridge .

(Ammoperdix heyi cholmleyi)

الوصف : الطول حوالي ١١ بوصة لوحة (٧١) شكل (٣)
الموطن : من الأوايد : يقيم طول السنة على تلال ووديان والأراضي الصخرية الوعرة بين وادي النيل والبحر الأحمر جنوبا إلى خط عرض ٢٦° شمالا إلى خط عرض سواكن على الأقل .
في مصر : لا يوجد في غرب وادي النيل . ولم يفحص بعد بالقرب من أسوان وطريق قنار القصير وجبلي علبة .

مميزاته وطبائعه : كالسابق ولم يفحص البيض بعد . وهو أعمق من السابق عموما ، وليس له حزمة بيضاء أمامية . الرأس حزمة شديدة وليس له بياض في الصدغ . بالأنثى خطوط عرضية مائلة للسواد في رأسها وليست بنية ، وأجزاءها العليا أكثر عتيا من حجل يقول .

جنس السمانى (كوتورنيكس)

Genus (Coturnix) = Quails

Pheasant Family

تحتوى طيور هذا الجنس على السمان الرئيسية ، وهى أصغر طيور الصيد . أول قادمة بطول الثانية أو أطول ، والخوافى أقصر نسبيا . ليس في خلف الساق شوكة .
ملء الجسم ، قصير المنقار وضعيفه ، مرتفع عند القاعدة ، قصير القدم ، طويل الأصابع ، الجناح طويل نسبيا ومدبب الذنب قصير للغاية غير ملحوظ .

يفضل المواطن المنزرعة كالقمح والبرسيم والحلبة (المحاصيل الغلالية) ، ولا يأوى الغابات ولا الأحراش . سريع الجرى والطيران . طعامه البذور والحبوب وتارة الثمار وأوراق النباتات وكذلك الحشرات . يرافق الذكر عدة إناث . يقاتل كل غريب عن مسكنه وعشه حتى الموت . العش بين حقول القمح وأمثاله في منخفض في الأرض يغطى ببعض النباتات الجافة . الحضنة بالأنثى وحدها ومدتها من ٢٠ : ٢١ يوما .

السمانى الأوروبية

Quail (European Form .)

(Coturnix coturnix coturnix .)

Pheasant Family

الوصف : الطول : الذكر حوالى ١/٢ بوصة . والأنثى حوالى ٨ بوصة . انظر لوحة (٧١) شكل (٦) .

الموطن : من القواطع : يتوالد صيفا في كل أوروبا ماعدا شبه جزيرة اسكندناوة ، كما أنه يزداد عدده في دول جنوب أوروبا المشرقة على البحر الأبيض المتوسط في الربيع والخريف بما يهاجر لها من الشمال والجنوب . وقليل منه يتوالد في شمال غرب أفريقية ، وجنوب غرب آسيا من بلاد العرب وفارس إلى أفغانستان وبلوخستان والسند وكذلك في الهند وكشمير ، ووسط آسيا شرقا إلى بحيرة بيكال وسوريا وفلسطين . يقضى الشتاء في الهند زيادة على توالده في شمالها الغربى ، ويشتو كذلك في إفريقية الاستوائية في السودان والحبيشة إلى خط الاستواء وبحيرة شاد وشمال أوغندة والصومال .

في مصر : شائع فيها هي وسينا في الربيع والخريف ، وهو قليل في الواحات الداخلية والخارجية ، وقليل منه يقضى الشتاء في مصر وخاصة مصر العليا . وهجرة الخريف هي من آخر أسبوع في أغسطس إلى آخر أكتوبر كما يلاحظ ذلك في الدلتا ، وما بقى بعد ذلك فهو نادر ، وربما يبقى ليقضى فصل الشتاء فيها كما صلت بنفس واحدة من رشيد في ٢٦/١١/٥٠ ، ثم يرحل إلى الجنوب . أما هجرة الربيع فهي تبدأ من آخر فبراير إلى آخر إبريل .

مميزاته وطبائعه : أشهر من نار على علم ، وهو أشهر طيور الصيد البرية المعروفة في مصر عندنا ، وأعمها انتشارا ، يباع كل عام في سوق الطيور بالإسكندرية بالميدان عند مسجد إبراهيم الشيخ ، كذلك في رشيد وبور سعيد ودمياط وذلك في الحريف في شهر سبتمبر . وهو أطيب اللحوم ، يوجد منفردا أو مثنى ، يتوارى بمجرد نزوله من طيرانه إلى الأرض فيبحث عن أقرب غصن يؤويه من الأعشاب وصغار النخيل في الرمال والعقب والأراضي المنزرعة سمسما وذرة إلخ . وتارة تحت شقوق المقابر أو الصخور ، وإذا طار من مكنم هب مفزوعا بصوت مصحوب بصفير ، وهو محرم صيده في الربيع في بريطانيا. خشية عليه من الانقراض ، وإذا طارت واحدة من مكانها لاتبعد كثيرا ثم إذا حطت ثانية لا تستقر على الأرض بل تجرى وتغير مكانها فلا يعرف الصياد موطنها بالضبط .

الأنثى البالغة شتاء هي في لونها مثل الذكر وكذلك صيفا . فيكون الذن والزور أصفر باهت . أسفل الزور وأعلى الصدر بها نقط مستطيلة سوداء . البطن أبيض مصفر . الخاصرة بها خطوط كثيرة سوداء وبيضاء وخطوط متعرجة حمراء رملية .

يمتاز الذكر بالطوق الأسود في زوره من أعلاه إلى أسفله يليه خط أسود بينها بياض .

الرتبة النعامية (استرثيونيفورمس)

Order (Struthioniformes .) = Ostriches

تحتوى هذه الرتبة على رتبة النعام بأنواعه وأشكاله المختلفة .

الفصيلة النعامية (استرثيونيداي)

Family (Struthionidae .) = Ostriches .

Ostrich family

تحتوى هذه الفصيلة على جنس واحد وهو جنس النعام بأنواعه المختلفة ، وينتسب من هذا الجنس ٧ أنواع معروفة ، لا يوجد منها الآن في العالم غير نوع واحد بأشكاله المختلفة مثل نعام الصحراء الكبرى الإفريقية *Masai Ostriche* ، ونعام الصومال *Ostriche Somali* . ونعام الكاب Cape Ostriche وهذه تقطن صحارى إفريقيا وآسيا ، وكانت تقطن بلاد العرب سابقا وانقرضت منها الآن . وهي أضخم طائر موجود حاليا على وجه الأرض ، تمت بصلة إلى نعام (الريا) التى في أمريكا الجنوبية ولنعام (الإيمو ، والطاسوارى - اللذين فى استراليا وما حولها من الجزائر) . وهي عديمة الطيران ، ذات أرجل قوية جدا تعدو بها وتسبق أمهر جياذ الخيل وهذا سلاحها في الهروب والعدو ، كما أنها تدافع بأرجلها بالركل للغريب فتحدث له إصابات خطيرة قد تؤدي إلى موته . القدم بها أصبعان فقط ، الكبير له برثن أشبه بمنسم البعير لأنه غليظ ، الأرجل عادية من الريش مع الفخذين من أسفلها (إلى ما تحت الفخذين . ريشه يباع بثمان غال ، والريش قابل للإبتلال بالمطر ، فإذا أمطرت السماء تندى ريشها كله بالماء لأنه ليس عليه مادة زيتية .

(١٩٧) جنس النعامة (استرثيو)

Genus (Struthio .)Ostrich

لهذا الجنس ما للفصيلة من خصائص ومميزات (١٩٨) .

نعامة شمال إفريقيا

Ostrich (North African Form .)

(Struthio camelus camelus .)

الوصف : ارتفاعها حوالي ١/٧ أقدام لوحة (٧٢) شكل (١) حوالي ٨٠ بوصة .
الموطن : من الأوايد : تقيم طول السنة حيث تتوالد في شمال إفريقيا جنوب جبال أطلس ، ومن
أعلى السنغال وإقليم النيجر في إفريقيا الغربية الفرنسية إلى السودان والحبشة . (لوحة ٧٤) .

في مصر : كانت موجودة في عام ١٨٥٠ م على الأقل ، ولا شك أنها حلت في الصحراء المصرية
على كلا جانبي وادي النيل ، وأصبحت الآن نادرة الوجود . ولا تزال تشاهد الآن بقايا عظامية لها
ومحارات لبيضها بكميات هائلة في الصحراء الغربية لمصر خصوصا بين سيوة والسلوم ، وشوهدت في
الصحراء الشرقية ١٨١٦ م . على أنها كانت تقطن في شرق النيل وغربه ، وقد رسمها قدماء
المصريين .

مميزاتها : تعيش دائما في أسراب من ٦ : ٨ ؛ وربما زاد هذا العدد في غير شهر التكاثر وخاصة من
الذكور .

وكان العرب يطلقون على النعامة اسم (الجمل الطائر) كما هو مفهوم من أسمها اللاتيني
(Camelus) بمعنى الجمل .

(١٩٧) اسمها أيضا camel — bird كانت سابقا واسعة الانتشار في إفريقيا أما الآن فهي تحمل في أجزاء من جنوب
الصحراء الكبرى الإفريقية .

(١٩١) ورتبة النعام Order Struthioniformes لها فقط نوع واحد one Species معتمد الأجناس races من بينها
sahara ostrich + Masai ostrich + نعامة الصومال + نعامة الكاب cape ostrich ويأق الأجناس races تتميز بتفاوت في
اللون والشكل قليلا وذلك في جلد الرقبة والرأس والجلد العادي من الريش .

القمرى المطوق

Collared Dove = Collared Turtle Dove .

(Streptopelia decaocta .)

الوصف : الطول حوالى ١١ بوصة . انظر الصورة لوحة (٧٤) شكل (١) .
الموطن : من الأوابد (١٩٩) يقيم طول السنة في وسط أوروبا في البلقان وفي كل آسيا الصغرى وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقا ولبنان وسوريا والعراق ، وأطراف شمال مصر وفي الدنمارك وإنجلترا وجنوب أسكتلندا وألمانيا . حيث يشاهد هناك وهويبيت في الحدائق ويأكل مع الحمام والحمام منها نهارا وكذلك في حدائق القرى والمدن .

في مصر : تتجول بعض أفراد منه إلى الدلتا وحول قناة السويس والإسماعيلية وبعض أنحاء من الوجه القبلي وفي الواحات المصرية ، وتقيم حيث الأمن ، وبدأ يظهر في مصر ابتداء من سنة ١٩٣٠ حيث يتأقلم في الأماكن الآمنة .

مميزاته : هو أكبر أنواع القمرى الذى يشاهد في مصر ، يرى دائما مثنى أو في جموع قليلة ، له شبه طوق ولكن ليس كاملا بل أشبه بخط منحن أسود وفوقه خط منحن أبيض فوق خلف الرقبة ، الظهر رمادى عمر قليلا وكذلك الصدر وأعلى البطن أحمر رملى ، ولون أسفل البطن أبيض . يمتاز بسهولة عن القمرى الأوروبى بأطراف ريش الجناح المائلة للسواد وبطرف الذيل الأبيض العريض قليلا من أسفله وليس للصغير الذى لم يبلغ ليس له طوق في رقبته وهو قليل الوضوح . صوته هكذا coo تردد ثلاث مرات طيرانه في اتجاه واحد . يربيه الناس في المدن في الأفقاص . يتوالد خلال أوروبا في المزارع والحدائق وخاصة المجاورة لسكنى الإنسان .

بطه موسكوفى Muscovy Duck

Cairina moschata

اصطاد أحد أصحابي بطه بيضاء كلها من بحيرة إدكو سنة ١٩٢٧ ويظهر أنها كانت متجولة مع البط المهاجر من أوروبا إلى مصر بعدما هاجر من موطنها الأصل في أمريكا الجنوبية والمكسيك . وهى مثل البط السودانى المستأنس عندنا تماما غير أنها بيضاء البينومول قاعدة منقارها أنثفاخات حمراء وكان طولها حوالى ٢ بوصة . وقد اكتشف هذا البط في أمريكا الجنوبية ، في القرن السادس عشر بواسطة الناقحين الاسبانلأمريكا الجنوبية ثم أدخل إلى أوروبا وباقي الشرق حتى عم وانتشر واستأنس ، فلما استأنسه الانسان ثقل عن الطيران وقل استعمال الأجنبية وخلد إلى السكون وظهرت منه أنواع كثيرة مختلفة الألوان عن طريق التهجين .

(١٩٩) موطنه الأصل معظم جنوب آسيا وهو يقيم هناك ، وفي العشرين سنة الأخيرة زحف متجولا خلال الأناضول والبلقان جنوبا إلى شمال إيطاليا ، وجنوب السويد وإلى هنغاريا ، والدنمارك ، وبريطانيا ففي سنة ١٩٣٠ وصل إلى الأناضول وسوريا والعراق وجنوب شرق بلاد العرب ثم أخذ يزحف ويقيم في سنة ١٩٣٨ إلى قلب أوروبا في النمسا وتشيكوسلوفاكيا والدنمارك وشمال فرنسا وفي سنة ١٩٦٥ وصل إلى قلب فرنسا ثم وصل في سنة ١٩٨٠ إلى لبنان ومصر والشام وشرق البحر الأبيض المتوسط .

- تأليف الكولونيل ميزر ترهاجن
1-Nicoll's Birds of Egypt
2-A Field Guide to the Birds of Britain and Europe . by Roger Peterson etc .
3-African Handbook of Birds (Birds of Eastern and North Eastern Africa
by coptain loftain C.H.B. Grant.
4-Birds of South Africa (Roberts).
5-Birds of the the World ,by Hans Hrass
6-The World of Birds by Fisher and Petrdon.
7-Birds of Cyprus. by David A. Bannerman etc.
8-Birds of the Sudan .by Cave and Macdonald.

- ٩ - طيور مصر - للدكتور أحمد حماد الحسيني .
١٠ - الطيور المصرية - تأليف النجومى وحسين فرج ومحمد عبد المنعم المنيرى
ومصطفى كمال فايد .
١١ - المشاهدات والملاحظات التى رآها المؤلف فى جولاته ورحلاته فى أنحاء
جمهورية مصر العربية .



ص ٢٠٠



ص ٩٢

Hypocolius (Grey Hypocolius)

ص ٢٠٨




ص ٢٠٢

البيامة المصرية

Plam Dove: Yaughing Dove: Lenevgal Dove.
(streptopelia senegalensis oegyptiaca)

ص ٢٩٦



أحمر رمل Cinnamon دخان اللون Dusky نبات الحلفا (سعادى) Sedge قمحى اللون Buff
 دثيق - غثيط Mistle (شجرة الزيزفون) شجرة المخيط Lime Tree أميرى Fiscal السوسن (قرحنة)
 Euphorbis يصيح Whoop الطيور الفئينة Perching Birds شجاع - حري Martial الطيور المقلدة
 Mocking Birds قزم = Pigmy Idwarf = صرار الليل = الجُذُج Cricket صقور
 العصفاف Accipiters = Bird Hawks ابن عرس Weasel مكسوة - مرتدية Clad طبقة Layer ملون -
 مرقش Variegated بر مائي Amphibian عائلة - فصيلة - عشيرة Family رتبة Order نوع
 Species جنس Genus رقى - طار - دف Tambourine شكل . Form = Phase ويصح أن تكون رتبة
 واحدة ذات فصيلة واحدة ، ذات جنس واحد بشكل واحد أو عدة أشكال مثل النحام .
 مائى - بحرى Aquatic يتجول - يطوف Peregrinate جبل - صرود Subalpine علق -
 عوسج Bramble مقنّع Masked عجاج - صياح - صخاب Clamorous لا بس
 نظارة . Spectacled زيتون Olivaceous شرشور Finch ذئ - سافل Scrube بحيرة في اسكتلندة أو
 انجلترا أو ايرلند = بحيرة متصلة بالبحر بفتحة ضيقة ، لُح Loch .

النطق الصحيح الانجليزى لأسماء بعض الطيور

ص ٢٥٤ (هَر - ير) Harrier ص ٣٥١ (مَر جانصار) Merganser ص ٢٣٠ (بَرَج - رَن)
 Peregrine ص ٢٣٠ (فول - كُن) Falcon ص ٣٤٣ (بو - شارد) Pochard ص ٤٩٦ (إسكُو - أ)
 Skua ص ١٢٢ (مَيْل) (مَيْلَت) Mistle = Mistletoe ص ١٧٠ (إسُولِي) Swallow ص ٤٣٣ (ساند -
 بِيَّيار) Sandpiper ص ٣٠٤ هِرَن Heron (رِي - يا) Rhea ص ٢٧٥ (أُسْبِرِي) Osprey ص ١١
 (مَاجِبَائِي) Magpie ص ٤٩٦ (إسكُو - أ) Skua = (يَجَر) Jaeger ص ٢٧٧ (لامسار - جِيَر)
 Lammergeyer = Lammergeier ص ٣٩٤ (جِراوِس) Grouse (جَن - يَ) Guinea ص ٥٠٨
 Demoiselle ص ١١ (تَشَف) Chough (أَج - تانت) Adjutant (كَبَر - كَلِي) Caper-
 caillie (كَنْدَر) Condor (كاس - وِرِي) Cassowary ص ٣١٣ (بِتْرَن) Bittern ص ٢٩٨ (أَيِس)
 Ibis بلاقاره Plover .

زمردى (أخضر) Emerald عقيق Agate نصف راحة اليد وقد انفرجت أصابعها Semi-
 palmated، الدامي Bleeding، جَمَشَت (بنفسجى مزرق) Amethyst، فيروز (أخضر مزرق)
 Turquoise، كوارتز، مَرُو (أخضر خفيف) Quartz، سهل التفتت كالديق Mealy Redpoll، عقيق
 (أخضر عقيقى) Garnet، صامت Mute، زبرجد (أخضر مزرق) Aquamarine، الأوز الصيَّاح
 Whooper swan، طوباز (أخضر معرق بسواد) Topaz، رمادى Cinereous، أو بال (أخضر غامق)
 Opal، حجر الدم (أخضر مسود بخطوط حمراء) Bloodstone، بنى عمر مارون (أخضر داكن) Ma-

roon مقتزع = ذو قنزة أى شوشة Pileate-Pileated ساتان ، = (أطلس) = نسيج حريري Satin ،
 عرش Regent علم مثلث الشكل Pennant ، يتذبذب = يرتعش Quaker مكا = شكولاته Macka ،
 علم = راية Standard ، بحيرة = لُح Loch ، مكون من صفحات Laminated قلم تلوين ، - المغرة
 الحمراء Keel ، منطقة خالية من الريش Apterium. PL. Apteris ، سمكري - عامل مهمل Tinker ،
 أكل النبات Herbivorous ، من ذوات العُدو Cursorial r لندأغب عل جانب الغم lappet التي تنشط
 في الظلام الخفيف Crepuscular ، أكلة السمك piscivorous ، الفك العلوي أو الفك العلوي max-
 illa ، رصاصي اللون . plumbeous ، طيور صغيرة تبقى في العش بعد الفقس Midicolours
 القسمة Lores ، أعلى المنقار Culmen ، الوشاح Mantle ، القنة Crown ، العجز Rump ،
 أحلاب الغم Rictal Bristles ، السواعد = ريش الإبط Axillaries ، الرسغ Tarsus الوشاح
 Mantle = Back + scapulars ، الشبكة المربعة الخلفية للرسغ Tarsus rectangulate الخاصة Flank
 ، يهتف - يصيح Whoop الرسغ Tarsus = shank ، زوائد القوائم Bastard-primary ، زوائد
 الجناح alula = Bastard-Wing مقلد Mimic المرأة المعدنية (الخراشق الملونة في البطة) Speculum
 ، مطرب - رخيم Melodious ، صقع - مكان Tract - حصي - حصاء Shingle ، محتد - لابس
 حذاء Booted ، تقليد - محاكاة Mimicry ، حوض السفينة - مرفأ Dock ، رمي الشكل - مدبب
 الطرف Lanceolated ، اختصار - إيجار Abreviation ، سبخة - مستنقع - غبضة - بطيحة Marsh
 ، أورفيوس - شجي - مطرب Orphean ، أرض مغمورة بالماء Swamp - مستودع - خزان ماء
 Reservoir - مصب نهر Estuary بحر قزوين Transcaspia - سنجابي Cinerea = cinereous لعد -
 غيب - هدب Lappet سخام القدر - مهيب Sooty حزن - حداد Mourning لامع صقيل Glossy
 شعب - صخور قريبة من سطح الماء Reef أكليل - تاج Coronet رمادي مزرق - أخضر بلون
 البحر - مغطى بزغب أزرق Glaucous سلافى - (صقلى) Slavonian الصقر ذو الساق الحادة Sharp-
 shinned hawk يقف في مكانه في طيرانه (في الطيران) Hover غابات الزان Beech-
 woods يصف (في الطيران) Soar صخرة عالية - قمة Crag جبل - خاصة بجبال الألب Alpine
 مرمي - رخامي Marmoreal = marmorean = Marmorea (eous) Marmora الطيور الجواثم Passerines القطب
 الجنوبي Antarctic القطب الشمالي Arctic قسطل Chestnut قنفلى - يرتقالى غامق Pink زيتون
 Olive أصفر ليمون Lemon رمادي - نراى - أزرق فاتح Grey = Ashy خوخى Peach مانجو Man-
 goe يرتقالى = فرميليون Vermillion بنى غامق Dark brown = Sepia بنفسجى عمر Lilac = Violet
 أزرق سماوى Green Blue = Azure قمرى Crimison = scarlet أردوازي - أزرق معتم slate
 ياقوق - عنابى Ruby أصحم - رملى - سنامون - يرتقالى - فرقة Rufous = Tawny = Bay = Cin-
 namon أنعة - لجام - يلجم Bridle أرجوانى - أحمر مزرق Maroon = Purple لحية Whisker أحمر
 قسطل بنى = ماهوجنى Mahogany فرو - كساء الحيوان (صوف أو فروة) Pelage فلدى السمك -
 سلم - حرشفة Scale أتيق = شجرة التنوب الفضى Spruce أمواج الشاطئ الصخرى Surf مكسو
 Pelagic وحيد - منعزل Solitary ، مهرج Harlequin - معمم - بطرطور Hooded قزمى Pigmy -
 وردى Roseate يلق كالناقوس = مُصَفق Clapper ناسك - متعبد Hermit - زمارة - صفارة Pipe -
 مُزَمَّر - مصفر Piping كبدى اللون Hepatic - مدبر الشر أو المكاييد - صانع البيرة Brewer صدرى -
 مختص بالصدر Pectoral - لازوردى Lazuli .

المحتويات

صفحة	
٧٤	تصدير ٥ جنس الصعو
٧٨	الاهداء ٧ جنس الفتاح (أبو فصادة)
٨٤	المقدمة ٩ فصيلة مصاصى العسل
٨٤	صيد الطيور ١٣ جنس السنيرس (أبو الزهور)
٨٤	طيور الصيد ١٤ جنس التمبر (مصاصى العسل)
٨٧	تاريخ الطيور ١٥ الفصيلة الدقناشية
٨٧	مراتب الطيران ١٧ جنس الدقناش
٩١	الغزل عند الطيور والتكاثر ١٨ فصيلة الخناق (هيوكوليوس)
٩٢	نقصان الطيور وانقراضها ١٩ جنس الخناق (هيوكوليوس)
٩٣	معادة طريفة عن الهجرة للخطاف ٢٢ الفصيلة البلابلية
٩٤	هل تعلم ٢٥ عائلة آكلة الذباب
٩٧	اسماء الطيور ٢٨ فصيلة الموازج أو (السلفيداي)
	الطيور التي تزور مصر صيفا
٩٧	للتوالد فيها حسب الجدول المبين على اليسار .. ٣١ (فسكوبوس) (شاديات الحمامات)
	احكام عامة في الدين تتعلق بالصيد والذبائح
١٠٣	وما يمنع أكله وما يباح من كتاب الفقه ٣٥ جنس لوسينيولا (المغنى أبو شارب)
	الصيد بالنبل والبنديقية
١٠٣	= صدّاحة الغاب ٣٦ جنس لوكومشيلأى جنس آكلة الجنادب
١٠٤	رتبة العصفوريات (باسيريغورمس) ٣٧ (الجراد الصغير)
١٠٦	عائلة الزراير أو الفصيلة الزُرُزُورية ٤٣ جنس أكر وسيفالوس (الموازج المائية)
١٠٩	سوادية ترسترام ٤٥ جنس هيبوليس (جنس الخنثع)
١١١	فصيلة الصفر ٤٥ جنس سيلفيا (هازجة الحدائق)
	العائلة العصفورية (فرينجيليداي)
١٢٠	فصيلة السناج ٤٨ جنس إري ثرسينجيا جلاكتوتس
١٢١	جنس العصفور فضى المنقار (إيوديس) ٤٩ (البلبيل الأحمر المغنى)
١٢٢	جنس الدُرُس (اميرزا) ٥٧ جنس إسكوتوسيركا (غنة الشجر)
١٢٤	عائلة القُتر أو الفصيلة القُتيرية ٦١ جنس برنيا
١٢٥	فصيلة هزازى الذنب ٧٣ جنس سيستكولا
	جنس كراتيروبوس (الثرثرة)

١٧٩	جنس (هالكيون)	١٢٦	جنس توردوس (الدج والشحور)
١٨٠	رتبة بيكيفوزم (ناقر الخشب)	١٣٠	جنس متكولا
١٨٠	عائلة بيكيداي (ناقر الخشب)	١٣٣	البقير = الأبلق (جنس أنانثي)
١٨١	عشيرة جنجيناى (اللواء)	١٤٤	جنس سيركيلا (مسويد الصخور)
١٨١	جنس جنكس		جنس ساكسيكولا
١٨٢	رتبة (كوكوليفورم) الكوكيات	١٤٦	(القبلى = سمان القصب ، والفسقة)
١٨٢	فصيلة الكوكيات (الكوكو الأصل)	١٤٩	جنس فونيكوروس (الحميراء)
١٨٣	جنس كنترووبوس (الكوكال)	١٥١	جنس لوسينيا (الهزار والحسينى)
١٨٤	جنس كوكولوس (الكوكو)	١٥٤	جنس إرتاكوس (أبو الحناء)
١٨٥	جنس كلاماتور - جنس الكوكو الأرقط		فصيلة أكستروريداى (ضانوك)
١٨٦	رتبة بستاكيفورم (البيغاوات)	١٥٥	(عصافير الشوك)
١٨٧	فصيلة البيغاوات (بستاكيداي)	١٥٥	جنس يرونلا - ضانوك - أو عصفور الشوك
١٨٧	جنس بستاكولا (الدرة)	١٥٦	فصيلة الطروغولوس (الرن)
١٨٧	رتبة استريجيفورم (اليوم)	١٥٧	جنس سنكلوس (شحور الماء)
١٨٨	فصيلة استريجيدياى (اليوم)	١٥٨	الفصيلة الخطافية (الخطاف والستونو)
١٨٨	جنس البوبو (اليوم الكبير)	١٦١	جنس دليشون (ستونو البيت)
١٩٠	جنس (أنوس) الشج (= يوم الأشجار)	١٦١	جنس رباريات (ستونو الرمال والشواهد)
١٩٠	جنس آسيو (اليوم المتوسط) الأقرن	١٦٤	رتبة السمائم
١٩٢	جنس (أثين) (اليوم الصغير)	١٦٥	فصيلة السمائم الأصلية
١٩٣	جنس استركس (الخبل)	١٦٥	جنس السمامة
١٩٤	جنس تيتو (يوم الأجران = اليوم الأبيض)		رتبة كبرى مُلجى
١٩٥	رتبة أكتيترس (جوارح الطير) الصقريات	١٦٧	[رتبة (أبى النوم السُديات]
١٩٦	جنس الصفور الأصلية (البزاة)	١٦٨	الفصيلة النومية
٢٠٤	جنس أكوولا (العقبان) النمقاية	١٧١	رتبة الضوضيات
٢٠٨	جنس (هيراتوس) (عقاب بونلى والمسيرة)	١٧١	فصيلة الوروار (ميروبيدياى)
٢١٠	جنس بتيو (الحوام) والصقر الجراح	١٧٢	جنس الوروار
٢١٢	جنس كركس (المزارات)	١٧٤	الفصيلة المهددية (يوبويدياى)
	جنس صفور الطيور (العصافير)	١٧٥	الفصيلة الأخيلية (كوراسيدياى)
٢١٤	(أكسيبتير)	١٧٦	جنس الأخيل
٢١٧	جنس الحدأة (ملفوس)		الفصيلة السماكية (هلكيو ينداي)
٢١٩	جنس إلانوس (الحدأة سوداء الجناح) (الكوهية)	١٧٧	= صيادى السمك
	جنس الشمطة (عقاب بحر بيضاء الذيل)	١٧٨	جنس السماك الأبقع (سيريل)
٢٢٠	هايلياتيتوس	١٧٩	جنس (ألسيدو)

٢٥٧	جنس أوز الشجر (ألبوشين)	٢٢١	جنس برنيس (حوام النحل)
٢٥٨	جنس الشهر مان		جنس العقاب الصرارة (عقاب الثعبان)
٢٥٩	جنس (أبو فرة) = كسارك	٢٢٢	كيركا يوتوس (عقاب قصيرة أصابع القدم)
٢٦٠	جنس البط الأصلي (أناس)	٢٢٤	جنس المنسور (العقاب النسارية) (يانديوم)
٢٦٤	جنس الكيش (اللقاط) = اسباتيولا	٢٢٥	جنس (العقاب الملتحية) جيبايتوس
٢٦٥	جنس (المونس) = نيسا	٢٢٦	جنس الرخمة المصرية (نيوفورن)
٢٦٦	جنس البط الغطاس (نيروكا)	٢٢٧	جنس الرخمة السوداء (نكروسترس)
٢٦٩	جنس البط أبو مروحة (أكسيورا)	٢٢٨	جنس جيس (النسر)
٢٧٠	جنس البلقشة (ميرجس)	٢٢٩	جنس إجيوس (النسر الأسود)
٢٧٢	رتبة البجعيات	٢٣٠	جنس ترجوس (النسر الاجتماعي)
٢٧٢	فصيلة غراب الماء (فلاكو وكورا سيداي)		رتبه (جرسورس = سيكونيفورمس)
٢٧٣	جنس غراب الماء (فلاكو وكورا كس)	٢٣١	« اللقلييات »
	فصيلة رئيس البحر (الطائر الاستوائي) -	٢٣٢	الفصيلة اللقليية (سيكونييداي)
٢٧٥	فانيونيداي	٢٣٢	جنس سيكونيا (اللقلق) = العنز
٢٧٦	جنس رئيس البحر (فاشون)		فصيلة (بليجاديداي = بلاتلدياي
٢٧٧	الفصيلة الأطشية - سوليداي	٢٣٦	(- أبو منجل وأبو ملعقة)
٢٧٨	جنس (الأطيش) = شولا	٢٣٦	جنس بلاتاليا (أبو ملعقة)
٢٧٩	الفصيلة البجعية - بليكانيداي	٢٣٧	جنس بليجادس (أبو منجل)
٢٨٠	جنس البجع (بليكانوس)	٢٤٠	فصيلة أريدياي (البلشون أبو قردان والواق)
	رتبة طيور النوء (توبينارس)	٢٤١	أرديا - جنس (البلشون)
٢٨١	= بروسيلار يغورمس	٢٤٢	جنس البلشون الأبيض (أجرتا)
٢٨٢	الفصيلة الجلمية	٢٤٤	جنس أبي قردان - أرديولا
٢٨٢	جنس جلم الماء (برفينوس)	٢٤٦	جنس الواق (غراب الليل) (الواق الكبير)
	الرتبة الغماساطية (بيجويوديس =	٢٤٧	جنس الواق الصغير (إجزوير تشوس) الحناش
٢٨٥	بوديسيفورمس)	٢٤٨	جنس الواق الكبير (الأينس = الوبة)
٢٨٦	الفصيلة الغطاسية (برديسيداي)	٢٤٩	رتبة (فيونيكوبري) = الرتبة النحامية البشروش
٢٨٦	جنس الغطاس (بوديسبس)	٢٥٠	الفصيلة النحامية
٢٨٩	الفواصيات = رتبة الغماسيات (جافيفورم)	٢٥٠	جنس النحام (البشروش)
٢٩٠	الفصيلة الغماسية (كوليميداي)	٢٥١	رتبة الوزيات (أنيسيريس) - دواجن الماء
٢٩٠	جنس الغماسية (كوليمبوس)	٢٥٢	فصيلة النمل والأوز والبط والبلقشة (أنا نيداي)
٢٩١	رتبة الحماميات (كولو ميفورمس)	٢٥٢	جنس النمل (سيجنوس) (الأوز العراقي)
٢٩١	الفصيلة الحمامية « كولومبيدياي »	٢٥٣	جنس الأوز (أنسر)
٢٩٢	جنس الحمام الأصلي « كولوميا »	٢٥٦	جنس برانتا (أوز البحار)

٣٣٧	فصيلة (دروما ديداي)	٢٩٤	جنس القمرى (أستريتوبيليا)
٣٣٨	جنس الحنكور (دروماس)	٢٩٧	جنس يمامة الكاب (أويثا)
٣٣٨	الفصيلة الكروانية	٢٩٨	الرتبة القطاوية (توكلتس)
٣٣٩	جنس الكروان الجبلى	٢٩٨	الفصيلة القطاوية (تيزكليتيداي)
٣٤٠	الفصيلة الجليسيرية - كورسور ييداي	٢٩٩	جنس القطا (يتركليس)
٣٤٠	جنس الجليل (كورسوريوس)		رتبة القطقاطيات - شرادرييفورس
٣٤١	فصيلة أبى اليسر (اليسرية)	٣٠٢	(الطيور الخواضة والقطقطيات)
٣٤٢	جنس أبى اليسر	٣٠٣	الفصيلة الطيطوية (شرادرييداي)
٣٤٣	جنس طائر التمساح (بلوفيانوس)	٣٠٤	جنس الطيطوى (شرادريوس)
٣٤٤	الرتبة النورسية (لارى = لاريفورس)	٣٠٨	جنس القطقاط الرامدى (اسكواتارولا)
٣٤٤	الرتبة النورسية (لارى = لاريفورس)	٣٠٩	جنس القطقاط الشامى
٣٤٤	الفصيلة النورسية (الاريداي)	٣١٠	جنس القطقاط الاجتماعى
٣٤٥	جنس النورس (لاروس)	٣١١	جنس القطقاط البلدى
٣٥٢	جنس الحرشنة (إسترنا)	٣١٢	جنس أريناريا (قلاب الحجر)
٣٥٦	جنس المرشك (شليديوناس)	٣١٣	جنس الدجج اجيات (كلدريس)
٣٥٨	جنس الأويق (جيلوشيليدرن)	٣١٦	جنس الحجوالة (فيلوماشوس)
٣٥٩	جنس (أبو بلحة) = هيدروبروجنى	٣١٧	جنس ترنجيتس (طيطوى يرتقالى الصدر)
٣٦٠	الفصيلة القشاشية (أبو مقصص)	٣١٨	جنس المدرؤان
٣٦٠	جنس القشاش (أبو مقصص) رنوبس	٣١٩	جنس الطيطوى عريض المنقار (ليميكولا)
٣٦١	الفصيلة الكركرية (استيركوراريدياي)	٣١٩	جنس الطيطوى (ترنجا)
٣٦١	جنس الكركر (استيركوراريوس)	٣٢٥	الفصيلة الفالاروبية (فالاروبيدياي)
٣٦١	الرتبة الحبارية (الكتريدس)	٣٢٥	جنس الفالاروب
٣٦٢	الفصيلة الحبارية (أوتيديدياي)	٣٢٥	جنس أبى مغازل أبوساق
٣٦٣	جنس الحبارى الصغيرة (أوتيس)	٣٢٦	جنس النكات (ريكوفيرستر)
	جنس الحبارى الأصلية (حبارة ماكوين)	٣٢٧	جنس البقويقة (ليموزا)
٣٦٣	شلاميدوتس	٣٢٩	جنس كروان الماء (نرمنيوس)
٣٦٥	رتبة الكركيات (جروفورم)	٣٣١	جنس البكاشينة (كاييلا)
٣٦٥	الفصيلة الكركية (جروداي)	٣٣٣	جنس (البكاشينة الصغيرة) لينموكرييتس
٣٦٦	جنس الكركى (جروس) الرمادى	٣٣٣	فصيلة الخوليات
٣٦٧	الفصيلة التفلقية (المراعية) راليداي	٣٣٣	جنس الخولى (رستراتولا) البكاشينة المزوقة
٣٦٨	جنس التفلق (المرعة) = رالوس	٣٣٤	جنس ديك الغاب (حمار الحجل) اسكولوباكس
	جنس المراعى المائية (الصغيرة والرقطاء وبلون)	٣٣٦	فصيلة آكل المعار (هابو ماتو برديدياي)
٣٦٩	الصغيرة	٣٣٦	جنس آكل المعار (هابا توبوس)

٣٨٠ جنس السمانى (كوتورينكس)	٣٧١ جنس (فرخة الغيط) الصفرد كيركس
٣٨١ الرتبة النعامية (استرثيونيفورمس).	٣٧٢ جنس (دجاج الماء) دجالينيولا
٣٨١ الفصيلة النعامية (استرثيونيداي)	٣٧٣ جنس الغمرة (فولكا)
٣٨٢ جنس النعام (استرثيو)	٣٧٤ جنس (بورفيريو)
٣٨٤ مراجع الكتاب	٣٧٦ رتبة الدجاجيات (جالى جاليفورم)
	معنى بعض كلمات تتعلق بالكتاب فى	٣٧٦ الفصيلة الدجاجية (فاز يانيداي)
٣٨٥ المؤلفات الانجليزية	٣٧٧ جنس الشنار (إكترس) حجل الكترويس
٣٨٥ النطق الصحيح الانجليزى لأسماء بعض الطيور	٣٧٨ جنس أمويردكس (الحجل الرملى)
٣٨٧ المحتويات		

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٠٤٣٢ / ١٩٩٢

ISBN 977 - 01 - 3221 - 7